



289,3

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

*In Exchange from
The Naturhist. Ges zu Nürnberg*

No. 3272, & 3460.

Mar. 13. 1865-

ABHANDLUNGEN
der
NATURHISTORISCHEN
G E S E L L S C H A F T
zu
NÜRNBERG.

III. B a n d, I. H ä l f t e.

NÜRNBERG.
W i l h e l m S c h m i d.
Sm 1864.

Recd Mar. 13, 1865

Vorwort.

Die naturhistorische Gesellschaft zu Nürnberg beginnt mit dem vorliegenden Hefte den dritten Band ihrer Abhandlungen, und es dürfte insbesondere unsern auswärtigen Mitgliedern nicht unangenehm sein, bei dieser Gelegenheit einige Notizen über den Bestand und die Thätigkeit derselben hier zu finden.

Wenn von der Vermehrung der Mitgliederzahl einer Gesellschaft auf eine erhöhte Theilnahme an dem Streben und den Zwecken derselben geschlossen werden darf, so sind wir in der angenehmen Lage, berichten zu können, dass dieselbe sich in der That, namentlich seit den letzteren Jahren durch eine stete Zunahme der Mitglieder kundgibt. Während die Gesellschaft im Jahre 1852, als sie das erste Heft naturwissenschaftlicher Abhandlungen der Oeffentlichkeit übergab, nur 24 ordentliche Mitglieder zählte, welche Zahl sich bis zum Jahre 1858 auf 54 erhöhte, stieg dieselbe im Jahre 1861 auf 113, und das neueste hier beiliegende Verzeichniss weist einen Bestand von 201 ordentlichen Mitgliedern nach.

Hand in Hand mit der numerischen Vergrößerung unserer Gesellschaft ging auch eine Aenderung ihrer Gestalt. Während dieselbe von ihrer Gründung an (22. October 1801) mehr denn 50 Jahre lang fast aus-

schliesslich nur Fachmänner oder doch solche, welche als Dilettanten sich mit einem oder dem anderen Fache aus dem Gebiete der Naturgeschichte sich beschäftigten, in sich vereinigte, suchte man allmählig durch Vorträge von mehr allgemeinem Interesse auch Laien für die Gesellschaft zu gewinnen. Ebenso konnte der grosse Fortschritt, den die naturwissenschaftlichen Fächer, Chemie und Physik, machten und die hohe Bedeutung, welche dieselben in der Neuzeit in allen Lebensbranchen sich errungen, nicht verfehlen, auch in der naturhistorischen Gesellschaft eine besondere Berücksichtigung zu finden, als eine Wissenschaft, welche nicht nur dem Drange nach Erforschung des Lebens, sondern auch der Industrie und dem Handel eine stets reichlich fliessende Quelle von Befriedigung ist.

Wenn, wie schon erwähnt, die immer reger werdende Theilnahme, welche die Einwohnerschaft Nürnbergs den Bestrebungen unserer Gesellschaft zuwendet, ein richtiges Verständniss des innigen Zusammenhanges zwischen Wissenschaft und Gewerbe bezeugend, sicherlich als ein gutes Omen für das fernere Gedeihen derselben bezeichnet werden muss, so ist es andertheils eine beklagenswerthe Thatsache, dass die Bemühungen des Vereins um Beschaffung einer naturhistorischen Sammlung bisher immer noch resultatlos geblieben sind. Schon in der frühesten Zeit, insbesondere aber um das Jahr 1856, waren die Bestrebungen der Gesellschaft dahin gerichtet, denen sich jedoch Hindernisse in den Weg legten, die zum Theil in der Be-

schaffung der nöthigen pecuniären Mittel, zum Theil in der Beschaffung eines passenden Locales lagen. Als im Jahre 1862 Herr Dr. J. W. Sturm im Gefühle der zu grossen Last, welche nach dem Ableben seines um die Naturforschung gleichfalls hochverdienten und mit rastlosem Eifer stets mit ihm arbeitenden Bruders, nun auf ihm allein ruhen würde, und im Bestreben seine Sammlungen seiner Vaterstadt zu erhalten, unserer Gesellschaft einen Erwerbungsplan vorlegte, der wohl geeignet schien, in uns Hoffnungen zu erwecken, vielleicht doch noch in den Besitz dieser unvergleichlich schönen und werthvollen Sammlung zu gelangen, mussten wir doch zu bald die Erfahrung machen, dass trotz nicht unbedeutender Opferwilligkeit Einzelner der Ausführung desselben nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen. Wenn die Gesellschaft auch schmerzlich diese Hoffnung schwinden sah, so wird sie es sich doch angelegen sein lassen, das für naturgeschichtliche Zwecke unumgänglich nothwendige Mittel, wie die Beschaffung einer Sammlung, stets im Auge zu behalten. Was wir bisher besitzen, eine kleine Partie Vogelbälge, Geschenk von dem Leibarzte Sr. Majestät des Königs Otto von Griechenland, Herrn Dr. Lindermeier, sowie eine kleine geognostische Souite aus dem Fichtelgebirge, verdient wohl den Namen einer Sammlung noch nicht.

Die Thätigkeit der Gesellschaft besteht vorherrschend in naturwissenschaftlichen Vorträgen, welche in überwiegender Weise auf dem Gebiete der populären Darstellung sich bewegen. In der jüngsten Zeit wurde

die in vielen anderen Vereinen sich als fruchtbringend bewährte Einrichtung eines Fragekastens in das Leben gerufen, welche durch Veranlassung von Discussionen über naturwissenschaftliche Dinge auch in unserem Kreise eine vielseitig belebende Wirkung nicht verfehlte. Während die Hauptthätigkeit der Gesellschaft in die Winterhalbjahre fällt, in die alle 14 Tage statthabenden Vereinsversammlungen, so gehen doch auch die Sommermonate für Vereinszwecke nicht unbenützt vorüber. Abgesehen von geselligen Zusammenkünften, werden öfters gemeinschaftliche Excursionen unternommen, welche von Fachmännern geleitet, stets anregend und belehrend auf die Theilnehmenden einwirken.

Zur Chronik unserer Gesellschaft gehörig muss hier noch die vor 2 Jahren vorgenommene Revision und beziehungsweise Aenderung der Statuten erwähnt werden. Nachdem im Jahre 1846 schon eine Erneuerung der ersten im Jahre 1802 entworfenen Statuten bewerkstelligt worden war, wurden dieselben neuerdings einer Revision unterworfen und die darin vorgenommenen zeitgemässen Aenderungen in der Generalversammlung vom 11. November 1862 zum Beschlusse erhoben. Diese betreffen insbesondere die Zusammensetzung des Directoriums, welches durch die weitere Wahl eines II. Secretärs, eines besonderen Bibliothekars, während früher der Secretär dessen Geschäfte mitbesorgte, und eines Conservators um drei Mitglieder vermehrt wurde und nun aus sechs Mitgliedern besteht. Ferner bestimmten die neuen Statuten statt der dreijährigen die jährliche

Wahl des Directoriums. Die Eingangs erwähnte Erweiterung der Grenzen der Vereinsthätigkeit fand in den neuen Statuten gleichfalls einen bestimmten Ausdruck.

Die sehr reichhaltige Vereinsbibliothek wurde dadurch für die Mitglieder zugänglicher gemacht, dass ein gedruckter Catalog angefertigt wurde und einzelne Werke den Mitgliedern in das Haus gegeben werden. Die vom Vereine gehaltenen Zeitschriften circuliren, soweit es thunlich ist, unter den Mitgliedern.

Was den Bestand der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft anlangt, wurde schon bemerkt, dass sich die Anzahl derselben seit dem Jahre 1861, als der letzte Band unserer Abhandlungen erschien, von 113 auf 201 vermehrte. Neue Ehrenmitglieder ernannte die Gesellschaft in diesem Zeitraume 8 und beträgt die Anzahl derselben zur Zeit 47, nachdem leider durch den Tod uns 3 derselben entrissen wurden, nämlich die Herren Dr. J. Curtis in London, C. von Braun, Exc., herz. Sächs. wirkl. Geh. Rath etc. zu Altenburg und Dr. J. L. von Schönlein, k. preuss. Geh. Obermedicinalrath etc. in Bamberg.

Die Zahl der correspondirenden Mitglieder vermehrte sich durch 5 neue Ernennungen von 64 auf 65, indem wir auch in dieser Classe leider 4 Todesfälle zu berichten haben: die Herren Prof. Dr. Herold zu Marburg, k. Decan und Pfarrer Köberlein zu Kempten, S. Schmidt, Apotheker zu Wunsiedel und Dr.

J. Schuch, praktischer Arzt zu Regensburg. Die namentliche Aufführung der neu aufgenommenen Ehren- und correspondirenden Mitglieder unterblieb hier, da dieselben in dem begedruckten Mitgliederverzeichniss enthalten sind.

Die bisher häufig verzögerte Herausgabe der Hefte unserer Vereinsschrift war nur eine Folge des oft mageren Kassastandes; es wird, um den Beitritt zum Vereine möglichst zu erleichtern, der sehr geringe Beitrag von nur 2 fl. jährlich gefordert — bei der Zunahme der Mitglieder und der dadurch bedingten Verbesserung der Kassaverhältnisse, wird die Gesellschaft von nun an öfter und ohne allzulange Pausen Gelegenheit nehmen können, ein Lebenszeichen von sich auch nach Aussen zu geben.

Möge dieser kurze Bericht dazu dienen, unsern verehrlichen auswärtigen Mitgliedern ein ohngefähres Bild von dem Leben und Bestande der Gesellschaft zu geben und gleichzeitig auch ihre Theilnahme an dem Gedeihen derselben zu wahren.

Nürnberg im April 1864.

Dr. Eduard Baierlacher.

I n h a l t.

	Seite
Ueber die Heirathen unter Blutsverwandten. Ein Vortrag gehalten in der Gesellschaft am 10. März 1863 von Dr. Wilhelm Merkel, praktischem Arzte	1
Ueber Natron und dessen Bereitung aus Kryolith von Chr. Voit, Chemiker. Ein Vortrag, gehalten in der Gesellschaft am 3. November 1863	24
Assam, das mittlere Stromgebiet des Brahmaputra von Hermann von Schlagintweit, vorgetragen am 20. October 1863	30
Die Steinkohlen und unsere fossilen Brennstoffe. Ein Stück zur Bildungsgeschichte unserer Erde mit culturhistorischen und ökonomischen Streiflichtern. Vortrag, gehalten in der Gesellschaft am 28. October 1862 von Carl Clauss . .	42
Die Vögel Mittelfrankens. Ein Beitrag zur Kenntniss der geographisch-statistischen Verbreitung der deutschen Vögel von A. J. Jäckel, k. Pfarrer in Sommersdorf und Thann bei Ansbach	74
Die europäischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium von Dr. L. Koch. (Aus einer Monographie der Drassiden vorläufig mitgetheilt.)	137

X

	Seite
Cheiracanthium Nutrix Walck	139
„ „ Mildei n. spec.	144
„ „ carnifex. Fabr.	149
„ „ Seidlitzii n. spec.	154
„ „ pelagicum C. Koch	158
Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Nürnberg im Jahre 1863 von Dr. Küttlinger, k. Bezirksarzt . . .	159
Der Graphit und seine wichtigsten Anwendungen von Dr. Heinr. Weger	167

VERZEICHNISS

der

Mitglieder der naturhistorischen Gesellschaft

zu Nürnberg im April 1864.

Directorium der Gesellschaft.

- Director:* Dr. med. Ed. Baierlacher, praktischer Arzt.
I. Secretär: Dr. med. Wilhelm Merkel, praktischer Arzt.
II. Secretär: Dr. med. Wilh. Fuchs, praktischer Arzt.
Bibliothekar: Dr. H. Weger, Professor an der k. Kreisgewerbschule.
Conservator: C. Clauss, Kaufmann.
Cassier: C. H. Klinger, Kaufmann.

Ehrenmitglieder.

- Se. Königliche Hoheit Maximilian, Herzog in Bayern.
Se. Durchlaucht Maximilian, Prinz von Wied-Neuwied.

Herr Dr. A. Bello, Rector der Akademie an der Universität zu Santiago de Chile.

- „ Dr. C. G. C. Bischof, k. preuss. Geh. Bergrath und ord. Prof. der Chemie und Technologie etc. in Bonn.
„ Dr. A. Braun, Professor der Botanik an der Universität und Direktor des k. botan. Gartens und des k. Herbariums zu Berlin.
„ Dr. C. L. Brehm, sen., Ornitholog und Pfarrer zu Renthendorf an der Orla.
„ B. S. Castellanos, Direktor der k. archäolog. Akademie und General-Direktor der Normal-Schulen des Königreichs Spanien zu Madrid.
„ Dr. J. Domeyko, Professor zu Santiago in Chile.
„ Dr. L. J. Fitzinger, Kustos-Adjunct am k. k. zoolog. Hofcabinet zu Wien.

Herr Dr. F. Flügel, Privatgelehrter zu Leipzig.

- „ Dr. H. R. Göppert, k. preuss. Geh. Medicinalrath, Professor der Medicin und Botanik, Präses der schlesisch. Gesellsch. für vaterländische Kultur zu Breslau.
- „ Dr. J. Gould, F. L. S. zu London.
- „ Dr. F. E. Guérin-Meneville, Professor und Direktor der Cuvier'schen Gesellschaft zu Paris.
- „ Dr. W. Haidinger, k. k. Sectionsrath im Ministerium des Innern und Direktor der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien.
- „ Dr. L. Ritter v. Heufler, k. k. wirkl. Kämmerer, Sectionsrath im Ministerium des Cultus und Unterrichts, Vice-Präsident des zoolog.-botanischen Vereins zu Wien.
- „ C. H. G. von Heiden, Bürgermeister der Stadt Frankfurt a. M.
- „ Dr. W. J. Hooker, F. R. S., L. L., Ober-Direktor des botanischen Gartens in Kew bei London.
- „ Dr. J. R. L. Comte de Kerkhove, dit van der Varent, Präsident der archäologisch. Akademie Belgiens und Vice-Präsident der Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Antwerpen.
- „ Dr. F. von Kobell, k. erster Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates und Professor der Mineralogie an der k. Universität zu München.
- „ F. Lambrecht, k. holl. Hauptmann auf Sumatra.
- „ Professor Dr. Freiherr J. v. Liebig, Vorstand der Akademie der Wissenschaft etc. zu München.
- „ Dr. Lindermeyer, Leibarzt Sr. Maj. des Königs v. Griechenland.
- „ Dr. C. F. P. v. Martius, k. b. Geh. Rath, Präsident der k. bayer. botan. Gesellschaft zu Regensburg etc., zu München.
- „ Dr. Mettenius, Professor der Botanik und Direktor des k. botan. Gartens zu Leipzig.
- „ Dr. H. v. Mohl, Professor der Medicin und Botanik an der k. Universität und Direktor des botan. Gartens zu Tübingen.
- „ Dr. J. G. Morris, Pastor zu Baltimore.
- „ Dr. J. W. Freiherr v. Müller, Privatgelehrter zu Paris, ehemal. k. k. General-Consul für Central-Afrika.
- „ Dr. K. Müller, Privatgelehrter zu Neustadt a. d. S.
- „ Dr. R. A. Philippi, Professor an der Akademie zu Santiago de Chile.
- „ Dr. E. Pöppig, Professor der Zoologie und Direktor des naturhist. Museums an der k. Universität zu Leipzig.
- „ Dr. J. G. L. Reichenbach, k. sächs. Hofrath, Prof. der Botanik, Director der k. zoolog. und mineralog. Museums und des botan. Gartens zu Dresden.
- „ A. Riza-Rangabé, Universitätsprofessor in Athen.
- „ Dr. J. A. Ried, praktischer Arzt zu Valparaise in Chile.
- „ Dr. F. F. Runge, Professor der Gewerbkunde zu Oranienburg.

XIII

Herr Dr. P. Savi, Professor zu Pisa.

- „ Dr. A. v. Schauss-Kempfenhausen, k. griech. Consul in München.
- „ Dr. H. Freih. v. Schlagintweit, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ Dr. R. Freih. v. Schlagintweit, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ Dr. M. J. Schleiden, grossh. Sachsen-Weimarsch. Hofrath und Prof. der Botanik, so wie Direktor des botanischen Gartens an der Universität zu Jena.
- „ Dr. A. Schnizlein, Professor d. Botanik und Direktor des botanischen Gartens an der k. Universität zu Erlangen.
- „ Dr. C. T. E. v. Sieboldt, Prof. d. Zoologie an d. k. Universität und 1. Conservator der zoolog.-anatom. Sammlungen des Staates zu München.
- „ Dr. C. A. Steinheil, k. bayer. Ministerialrath, Conservator der mathemat.-physical. Sammlungen des Staates und Professor der Mathematik an der Universität zu München.
- „ Dr. J. W. Sturm, Naturhistoriker zu Nürnberg.
- „ Dr. W. F. R. Suringar, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens zu Leyden.
- „ Dr. C. M. Tallaviana zu Laibach.
- „ K. Freiherr v. Zu-Rhein, k. bayer. Reichsrath u. Regierungs-Präsident von Oberbayern zu München.
- „ B. L. F. v. Voltz, Exc., k. bayer. wirkl. Staatsrath etc. zu München.

Korrespondirende Mitglieder.

Herr A. D. Bache, Professor und Superintendent United States Coast, Survey in Washington.

- „ Dr. Spencer F. Baird, Professor und Secretär am Smithsonian-Institut zu Washington.
- „ Dr. A. Besnard, k. Regiments- und prakt. Arzt zu München.
- „ J. F. Caflisch, Secretär des naturhistor. Vereins in Augsburg.
- „ Dr. Calvi, Professor zu Genua.
- „ Dr. Stephan delle Chiaje, praktischer Arzt und Professor der Medicin an der Universität zu Neapel.
- „ Dr. H. Döbner, Herzogl. Sachs.-Meining. Medicinalrath und Hofmedicus in Meiningen.
- „ Dr. O. Döpping, Chemiker zu St. Petersburg.
- „ Dr. Th. Dompierre, k. bayer. Regimentsarzt.
- „ L. Dufour zu S. Sever.
- „ Dr. J. Dumas, Professor der Medicin an der Universität zu Montpellier.
- „ Dr. F. Emmert, k. Pfarrer zu Schweinfurt.

- Herr Dr. J. A. A. Erlenmeyer, prakt. Arzt, Direktor und Oberarzt der Privat-Heilanstalt für Gehirn- und Nervenkrankheiten zu Bendorf bei Coblenz.
- „ Dr. A. L. A. Fée, Professor der Botanik und Pharmacie an der medicin. Facultät, Direktor des botan. Gartens zu Strassburg.
- „ L. G. Fehr, Lehrer in Gunzenhausen.
- „ Dr. A. Fischer v. Waldheim, wirkl. kaiserl. russ. Staatsrath und Vice-Präsident der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau.
- „ L. Frischmann, k. zweiter Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates zu München.
- „ K. Fuss, Professor zu Hermannstadt in Siebenbürgen.
- „ Dr. D. A. Godron, Professor und Rektor der Akademie zu Montepellier.
- „ Dr. S. S. Haldemann, Professor zu Columbia in Pensylvanien.
- „ J. Hall, Staatsgeolog von Jowa und Paläontolog für die Staaten New-York, Albany etc.
- „ F. Ritter von Hauer, k. k. Bergrath und erster Reichsgeolog bei der k. k. geolog. Reichsanstalt, Vice-Präsident des zoolog. botanischen Vereins zu Wien.
- „ Dr. Th. von Heldreich, früher Professor und Direktor des naturhistorischen Museums zu Athen.
- „ Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer, k. Stadtgerichtsarzt und Direktor des zoologisch-mineralogischen Vereins u. d. k. botan. Gesellschaft zu Regensburg.
- „ J. F. C. Hofmeister, Buchhändler zu Leipzig.
- „ Dr. J. Hoffmann, Verlagsbuchhändler zu Stuttgart.
- „ A. le Jolis, Botaniker, Stifter, Präsident und beständiger Secretär d. kais. naturwissenschaftl. Gesellschaft zu Cherbourg.
- „ H. Koch, Direktor des zoologischen Museums zu Triest.
- „ Dr. F. A. Kolenati, Professor der Naturgeschichte u. Botanik am technologischen Institute zu Brünn.
- „ Dr. C. R. König, Lehrer an der Realschule und Adjunct am I. Univers.-Laboratorium zu Leipzig.
- „ Dr. E. Kratzmann, praktischer Arzt zu Marienbad.
- „ Dr. H. C. Küster, Vorstand des k. Telegraphenamtes zu Bamberg.
- „ Dr. W. Lachmann, Professor zu Braunschweig.
- „ Dr. E. Lang, Apotheker zu Neutra in Ungarn.
- „ M. A. Maccary, praktischer Arzt zu Nizza.
- „ Dr. C. B. F. Merklein, Professor zu Schaffhausen.
- „ Dr. J. Milde, ordentlicher Lehrer der Naturwissenschaften und Botanik an der zweiten höhern Bürger- und Realschule zu Breslau.
- „ Dr. J. Müller, fürstl. waldeckischer Medicinalrath, Vice-Direktor des norddeutschen Apotheker-Vereins zu Berlin.

Herr Dr. W. Müller, ordentl. Professor an der k. Universität zu Kiel.

- „ Dr. A. Mousson, Präsident der naturhistor. Gesellschaft zu Zürich.
- „ Dr. G. D. Nardo, praktischer Arzt zu Padua.
- „ J. Natterer, Kustos am k. k. Hof-Naturalienkabinet zu Wien.
- „ Dr. A. A. v. Palliardi, fürstl. reuss.-schleiz. Medicinalrath und Badearzt zu Kaiser-Franzensbad in Böhmen.
- „ Dr. Rehm, prakt. Arzt zu Markt Sugenheim.
- „ Dr. C. v. Renard, kais. russ. Staatsrath und erster Secretär der kais. naturf. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau.
- „ V. B. Rosales, chilenischer General-Consul zu Hamburg.
- „ Dr. E. Rückert, Pfarrer zu Schweina.
- „ Dr. P. Savi, Professor, Director des Museums zu Pisa.
- „ Dr. A. Sauter, k. k. Kreisarzt zu Salzburg.
- „ Dr. C. H. Schauenburg, prakt. Arzt und Privatdocent an d. k. Universität zu Bonn.
- „ Dr. A. Schenk, Prof. d. Botanik u. Director des botan. Gartens an d. k. Universität zu Würzburg.
- „ Dr. A. Schilling, praktischer Arzt zu Ebermannstadt.
- „ Dr. C. F. Schimper, Privatgelehrter zu Schwetzingen.
- „ Dr. F. Schlegel, praktischer Arzt zu Altenburg.
- „ F. J. Schmidt, Kaufmann zu Schischka bei Laibach.
- „ Dr. v. Schönberg, Leibarzt Sr. Maj. des Königs von Neapel.
- „ Dr. C. H. Schultz, Bipontinus, Hospitalarzt und Direktor der naturf. Gesellschaft „Polichia“ zu Deidesheim.
- „ Dr. Karlos Segeth, zu Santiago in Chile.
- „ Dr. A. Skovitz, Herausgeber der österr. botan. Wochenschrift in Wien.
- „ Dr. L. Spengler, Hofrath etc. im Bade Ems.
- „ Fr. Tempsky, Buchhändler in Prag.
- „ V. Graf v. Trevisan, Privatgelehrter zu Padua.
- „ Dr. P. J. Vallez, Direktor des ophthalmischen Instituts zu Brüssel.
- „ Dr. R. Wagner, Professor an der k. Universität zu Würzburg.
- „ Dr. G. C. Wittstein, Professor in München.

Ordentliche Mitglieder.

Herr E. Angerer, k. qu. Oberlieutenant.

- „ Dr. med. Ed. Baierlacher, praktischer Arzt.
- „ J. A. G. Bäumlner, Kaufmann.
- „ Dr. med. A. Barthelmess, praktischer Arzt.
- „ J. F. Bauer, Oberlehrer.
- „ S. Bayerlein, Kunsthändler.

Herr C. F. Beck, privatisirender Apotheker.

- „ A. Beckh, Kaufmann.
- „ Dr. W. Beckh, praktischer Arzt.
- „ Dr. med. et philos. E. Freiherr v. Bibra, Gutsherr auf Schwebheim in Unterfranken.
- „ Dr. J. M. Birkmayer, praktischer Arzt.
- „ Dr. G. Birkner, praktischer Arzt.
- „ Fr. Bleicher, Kaufmann.
- „ C. A. Braun, Besitzer der Phil. Raw'schen Buchhandlung.
- „ A. v. Bressensdorf, k. Bahnbeamter.
- „ C. Burger, k. geistlicher Rath und Stadtpfarrer.
- „ J. S. Büchner, Oberlehrer.
- „ C. Clauss, Kaufmann.
- „ Ed. Clauss, Kaufmann.
- „ P. Cnopf, Banquier.
- „ L. Dengler, Lehrer an der k. Kreisgewerbeschule.
- „ J. P. W. Dietz, Buchdruckereibesitzer.
- „ H. Dirsch, Hotelbesitzer.
- „ G. Dötsch, Assistent der Mathematik.
- „ C. Drechsel, k. Rechtsanwalt.
- „ G. Drittler, k. Bankhauptbuchhalter.
- „ J. Eberhard, Inspektor am germanischen Museum.
- „ Dr. philos. Ed. Ebermayer, Chemiker.
- „ W. F. Echt, Flaschnermeister.
- „ E. Eckert, Besitzer der Apotheke zum heiligen Geist.
- „ F. J. G. Elssmann, Privatier.
- „ C. Engel, Verwalter am landwirthschaftlichen Institut zu Lichtenhof.
- „ C. J. F. A. Engelhard, Privatier.
- „ C. Engelhard, Rechtsrath.
- „ A. Ertheiler, Kaufmann.
- „ Dr. A. v. Eye, Vorstand der Kunstsammlungen des germanischen Museums.
- „ J. Falk, Fabrikbesitzer.
- „ A. Falke, k. Forstamtsactuar.
- „ Dr. Ludwig Feuerbach, Privatgelehrter.
- „ A. Firsching, Professor an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ A. Förderreuther, Buchhalter.
- „ J. Förderreuther, Kaufmann.
- „ F. Friedrich, Besitzer der Apotheke zu St. Johannis.
- „ P. Chr. Fuchs, Fabrikbesitzer.
- „ Chr. Fuchs, Kaufmann.
- „ Dr. med. Wilh. Fuchs, praktischer Arzt.
- „ Joh. Fuchs, Kaufmann.
- „ J. Galimberti, Hotelbesitzer.
- „ H. Gebhardt, Fabrikbesitzer.

XVII

Herr L. Gebhardt, Kaufmann.

- „ C. v. Gemming, k. Obristlieutenant und Platzstabsoffizier bei
der k. Kommandantschaft Nürnberg.
- „ P. Gessner, Kaufmann.
- „ L. Göschel, Apotheker.
- „ J. G. Göss, Antiquitätenhändler.
- „ G. F. Gonnermann, Kaufmann.
- „ G. W. E. Graf, Kaufmann.
- „ W. Graf, Chemiker.
- „ F. M. Gürster, Kaufmann.
- „ G. Häberlein, Gold- und Silberarbeiter.
- „ Dr. R. Hagen, Fabrikbesitzer.
- „ J. Hahn, Fabrikbesitzer.
- „ C. Ritter von Haubner, Rittergutsbesitzer.
- „ Dr. H. Hauck, Lehrer an der Handelsschule.
- „ J. G. Häupler, Lehrer am Port'schen Institut.
- „ A. Heerdegen, jun., Kaufmann.
- „ G. Herfort, Kaufmann.
- „ Dr. Fr. Herold, k. Gymnasialprofessor.
- „ L. Hessenauer, Besitzer der Paradies-Apotheke.
- „ N. Hoffmann, Mechaniker.
- „ J. G. Hofmann, Privatier.
- „ C. S. Freiherr von Holzschuher, k. k. Hauptmann.
- „ G. Huber, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ A. J. Jäckel, k. Pfarrer zu Sommersdorf.
- „ J. B. Jegel, Chemiker.
- „ H. Jungmann, Kaufmann.
- „ G. Kappelmayer, Chemiker.
- „ A. A. Keerl, Kaufmann.
- „ Kellein, k. Forstamtsactuar.
- „ Dr. J. C. Kellermann, k. Inspektor d. Kreis-Landwirthschafts-
schule zu Lichtenhof.
- „ Dr. J. G. Kellermann, Professor an der k. Kreis-Landwirth-
schaftsschule zu Lichtenhof.
- „ H. Kellner, Glasmaler u. Lehrer an der k. Kreisgewerbschule.
- „ H. F. E. Kieser, herzogl. Leuchtenb. Bergmeister.
- „ J. G. Kimmel, Buntpapierfabrikbesitzer.
- „ Dr. philos. H. Kleemann, Chemiker.
- „ C. H. Klinger, Kaufmann.
- „ Dr. L. C. Koch, praktischer Arzt.
- „ A. Kohn, Banquier.
- „ J. Kohn, Banquier.
- „ Dr. A. R. J. König, quiesc. Lehrer an der Handelsschule.
- „ Dr. Th. Krafft, k. Studienlehrer.
- „ A. Kreling, Director der Kunstgewerbschule.

XVIII

Herr G. Kröner, Lehrer am k. landwirthschaftlichen Institut zu Lichtenhof.

- „ Dr. A. Küttlinger, k. Bezirksarzt.
- „ W. Lamprecht, Kaufmann.
- „ A. Langenbrunner, k. Post-Official.
- „ J. A. Langhans, Seiden- und Damastweber.
- „ Dr. Leupold, praktischer Arzt.
- „ C. Leybold, k. Betriebs-Ingenieur.
- „ C. Leydel, k. Betriebs-Ingenieur.
- „ J. Leykam, Kaufmann.
- „ Fr. Freiherr v. Löffelholz, k. Revierförster zu Lichtenhof.
- „ J. L. Lotzbeck, Buchhändler.
- „ Dr. M. Maas, praktischer Arzt.
- „ K. Mahla, Kaufmann.
- „ F. C. Meyer, k. Professor an der Kunst- und Kreisgewerbschule.
- „ S. Meinel, Kaufmann.
- „ J. Merk, Kaufmann.
- „ C. S. Merkel, Besitzer der Apotheke zum Mohren.
- „ Dr. W. Merkel, praktischer Arzt.
- „ Dr. Joh. Merkel, praktischer Arzt.
- „ Dr. G. Merkel, praktischer Arzt.
- „ L. Merklein, Lebküchner.
- „ J. F. Methsieder, Lehrer am Port'schen Institut.
- „ E. Model, Privatier.
- „ J. L. Müller, Kaufmann.
- „ J. F. J. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.
- „ P. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.
- „ Dr. A. Zur Nedden, Zahnarzt.
- „ A. Neger, Fabrikbesitzer.
- „ Dr. J. Neger, Chemiker.
- „ J. Oehninger, k. k. Rittmeister.
- „ Dr. P. von Olching, Privatgelehrter.
- „ Dr. Th. Oppler, Fabrikdirector.
- „ P. Pabet, Kaufmann.
- „ C. Paraviso, Kaufmann.
- „ G. A. v. Pattberg, k. Forstwart zu Mögeldorf.
- „ Dr. H. Freiherr v. Pechmann, praktischer Arzt.
- „ C. Perge, Conditor.
- „ M. G. Pfann, Lehrer.
- „ J. G. Pfeiflen, Kaufmann.
- „ G. Pretscher, Optikus.
- „ C. Probst, Photograph.
- „ C. Puscher, Privatier.
- „ W. Puscher, Marktsadjunct u. Handels-Appell.-Gerichts-Assessor.
- „ Dr. G. Rauhenzahner.

Herr Dr. philos. C. Reinhard, Chemiker.

- „ J. Reissig, Kaufmann.
- „ Reisinger, k. Bezirksingenieur.
- „ J. M. M. Richter, Kaufmann.
- „ F. Riemann, Privatier u. Gutsbesitzer.
- „ C. H. Römhild, Kaufmann.
- „ M. Rosenechon, Professor an der k. Kreisgewerbschule.
- „ L. Schäffer, Oberlehrer.
- „ F. Schaumberger, k. Regimentsauditor.
- „ J. H. Scharrer, Kaufmann.
- „ J. Scheitberger, Kunstdrechsler.
- „ E. Scheltle, Fabrikbesitzer.
- „ W. Schmid, Buchhändler.
- „ C. Schmidmer, Kaufmann.
- „ L. Schmidmer, Kaufmann.
- „ E. Schmidt, Landgerichts-Thierarzt.
- „ F. Schmidt, Kaufmann in Cadolzburg.
- „ J. Schmidt, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ Schöberlein, Fabrikdirector.
- „ F. Schönberg, Cand. Theol. und ordentl. Lehrer an der Handelsschule.
- „ E. A. v. Schorn, Privatier.
- „ H. Schrag, Buchhändler.
- „ Th. Schröder, Lehrer der Mathematik am k. Gymnasium.
- „ F. J. G. Schrodt, k. Regierungs-Rath und Stadt-Commissär.
- „ J. C. D. v. Schwartz, Kaufmann.
- „ L. v. Schwartz, Kaufmann.
- „ S. v. Schwartz, Ingenieur.
- „ K. Schwarz, städtischer u. Bezirks-Thierarzt.
- „ U. E. Sebal, Buchdruckereibesitzer.
- „ G. Seitz, Fabrikbesitzer.
- „ Dr. med. Solger, praktischer Arzt.
- „ E. Spreng, Ingenieur u. Director des Gaswerkes.
- „ F. Stern, Chemiker.
- „ J. Stief, Spielwaarenfabrikant.
- „ Dr. C. Stölzel, Professor an der k. Kreisgewerbsschule.
- „ E. Thiess, Kaufmann.
- „ C. Tölke, Kunstgärtner.
- „ M. Völkel, Oberlehrer.
- „ C. Voit, Chemiker.
- „ C. F. Walpuski, Kaufmann.
- „ Dr. Th. Weber, praktischer und Curarzt zu Streitberg.
- „ Dr. H. Weger, Professor an der k. Kreisgewerbsschule.
- „ J. A. Weiss, Kaufmann.
- „ J. F. Weyssel, Besitzer der Apotheke zum goldnen Stern.
- „ C. J. G. Freiherr von Welser, Rittergutsbesitzer.
- „ J. E. Weltrich, Freiherrl. v. Tucher'scher Administrator.

Herr G. Wheeler, Consul der vereinigten Staaten v. Nord-Amerika.

- „ J. Werther, Fabrikbesitzer.
 - „ H. C. A. Wild, Kaufmann.
 - „ Dr. J. Wildberger, Hofrath und Director der orthopädischen
Heilanstalt in Bamberg.
 - „ F. Winkler, k. Regierungs- und Kreisforstrath in Ansbach.
 - „ Dr. Winkler, k. Bezirksarzt.
 - „ B. Wiss, Kunstmühlbesitzer.
 - „ A. Wolf, Oberlehrer.
 - „ L. K. Wucherer, k. Bezirks-Maschinenmeister.
 - „ J. B. Wünsch, Kaufmann.
 - „ A. Zahn, Kaufmann.
 - „ E. Zahn, Kaufmann.
 - „ J. Zeltner, Fabrikbesitzer.
 - „ J. G. Zeltner, Brauereibesitzer. .
 - „ H. Zeltner, Fabrikbesitzer.
 - „ J. Zeltner jun., Kaufmann.
 - „ H. Zeuner, Fabrikdirector.
 - „ E. Zimmerler, Samenhändler.
 - „ Fr. Zöbisch, Chemiker.
 - „ A. Zöllner, Kaufmann.
-

Ueber die Heirathen unter Blutsverwandten.

Ein Vortrag gehalten in der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg am 10. März 1863

von

Dr. Wilhelm Merkel,
praktischem Arzte.

Im vergangenen Herbst war in den verschiedensten öffentlichen Blättern und unter ihnen auch in Nürnberger Zeitungen der Bericht eines Herrn Boudin in Paris an die Akademie der Wissenschaften daselbst mitgetheilt, welcher weitläufig die Gefahren besprach, welche Heirathen unter Blutsverwandten nach sich ziehen sollten ¹⁾).

Ich werde Ihnen in Kurzem das Resumé dieses Berichtes vorführen und hiebei auch der übrigen Arbeiten gedenken, welche sich gegen Heirathen unter Blutsverwandten aussprechen; denn es sind nicht blos Franzosen, sondern auch Engländer, Amerikaner und einige deutsche Forscher, welche sich auf diesem Gebiete versucht haben und deren Beobachtungen, weil sie durch Zahlen gestützt sind, eine eingehende Kritik verlangen. Wenn ich Ihnen nun die Fakta vorgelegt habe, welche gegen die genannten Ehen sprechen, will ich versuchen, Sie mit den Geboten und Verboten der ältesten Gesetze und Rechte, die wir kennen, bekannt zu machen, um daraus möglicherweise zu entnehmen, aus welchen Beweggründen die früheren Gesetzgeber Heirathen unter den nächsten Blutsverwandten verboten.

¹⁾ Dangers des mariages consanguins et nécessité des croisements, mémoire lu à l'Académie des sciences le 16 juin 1862 par M. Boudin, médecin en chef de l'hôpital militaire de Vincennes.

Die Züchtung und Kreuzung von Thieren endlich, sowie Experimente, welche geradezu in Rücksicht auf unser Thema bei Thieren angestellt wurden, können uns auch einige Momente zum genaueren Studium unserer Frage bieten; und auf sie uns stützend, die uns ein unbestreitbares Resultat geben, wollen wir die Rassenkreuzung der Menschen erforschen, ob die Kreuzung zur Fortbildung einer Race nothwendig ist, gleichwie dann bei den einzelnen Individuen Heirathen mit Hereinziehen fremden Bluts nothwendig wären, um Familien, die auf der Höhe ihrer Entwicklung stehen, vor einem organischen Verfall zu behüten und zu bewahren. Auf einer solchen Basis wollen wir dann den Werth der statistischen Zahlenreihen, die Richtigkeit der Dokumente, welche die Gegner der Heirathen unter Blutsverwandten anführen, prüfen und nach einer Sichtung des Terrains in dieser Weise sehen, was denn in Wirklichkeit übrig bleibt, um zu beweisen, dass eheliche Verbindungen Verwandter bestimmte Naturgesetze überschreiten oder gar verletzen, ob sie nicht am Ende ebenso nützlich wie schädlich sein können.

Ein unpartheiisches Studium aller der erwähnten Gesichtspunkte nebst einer genauen Zusammenstellung der Meinungen und Ansichten sämmtlicher mir zugänglichen Autoren¹⁾ wird uns lehren, ob das absolute Verdammungsurtheil gerechtfertigt ist, welches von der grösseren Zahl der Mitlebenden, von vielen Aerzten und Naturforschern ohne genauere Erkenntniss ausgesprochen wird, ob es nicht die einfache Reproduktion einer allgemein angenommenen Meinung ist, welche eine vox populi, als vox dei angesehen wird.

Dr. Boudin in Paris²⁾, aufmerksam gemacht durch verschiedene Nachtheile, welche Ehen unter Blutsverwandten der Natur der Sache nach in Folge der Erblichkeit nach sich ziehen, unterzog sich einer sorgfältigen Bearbeitung der vorliegenden Frage;

¹⁾ Eine der besten kritischen Arbeiten über Heirathen unter Blutsverwandten hat Gilbert W. Child. M. D. Oxon. M. R. C. P. in der british and foreign medico-chirurgical review, april 1862 geliefert, dessen kräftiger Argumentation ich häufig folgte.

²⁾ Danger des unions consanguines. Annal. d'hyg. publ. 1862.

er fand hiebei, dass abgesehen von allen erblichen Einflüssen von Seite der Eltern auf die Kinder gewisse Krankheiten bei letzteren häufiger beobachtet werden, welche bei den Kindern in nicht blutsverwandten Ehen nur selten zur Erscheinung kommen. Unter diesen Krankheiten ist nach ihm besonders die Taubstummheit der Kinder, zu welchen Heirathen von Blutsverwandten die nächste Veranlassung geben sollen. Es sind nicht missstaltete, kränkliche, selbst mit Erkrankungen der Sinne behaftete, blutsverwandte Eltern, welche taubstumme Kinder bekommen, sondern kräftige, gesunde Leute, deren Kinder einzig und allein in Folge der Blutsverwandtschaft der Eltern eine besondere Disposition zur Taubstummheit haben und taubstumm geboren werden.

Boudin berechnete, auf Grund der vom statistischen Bureau in Paris veröffentlichten Dokumente, dass die Zahl der blutsverwandten Ehen in Frankreich jährlich circa 2% beträgt, wobei aber leider der Grad der Verwandtschaft nirgends angegeben ist; derselbe fand ferner bei seinen Untersuchungen der Taubstummen in den Instituten zu Paris, Bordeaux und Lyon, dass daselbst die Zahl der Taubstummen, welche aus Ehen unter Blutsverwandten entsprossen waren, im Vergleich zur Gesamtzahl der Taubstummen aus gekreuzten Ehen sich im Durchschnitt wie 27 : 100 verhielt, dass also mit anderen Worten von 100 Taubstummen 27 aus Ehen blutsverwandter Eltern stammen. Daraus würde resultiren, dass in Folge der blutsverwandten Ehen das Verhältniss der Taubstummen in Frankreich ein bedeutend höheres ist, als es in der That wäre, wenn die Taubstummheit bei allen Ehen gleich häufig vorkäme.

Auch der weitere oder nähere Grad der Blutsverwandten der Eltern hat nach eigenen Beobachtungen Boudin's einen Einfluss auf die Taubstummheit der Kinder; denn wenn man nach demselben mit 1 die Gefahr bezeichnet, ein taubstummes Kind in einer gekreuzten Ehe zu erzeugen, so steigt die Gefahr auf 18 bei Heirathen unter Geschwisterkindern, auf 37 bei Heirathen unter Onkeln und Nichten, auf 70 bei solchen zwischen Neffen und Tanten.

Doch nicht allein direkt soll die Taubstummheit bei Kindern blutsverwandter Eltern entstehen; sie kommt auch manchmal indirekt in gekreuzten Heirathen vor, wenn nur eines der Ehegatten aus einer blutsverwandten Ehe entsprossen ist; ja nach Chazarain¹⁾ soll es sogar möglich sein, dass sich der schädliche Einfluss der Ehen unter Blutsverwandten erst in der zweiten Generation bemerkbar macht. — Dass die Lehre von der Erbllichkeit der Krankheiten gar keinen Anhaltspunkt gibt, die Häufigkeit der Taubstummheit in blutsverwandten Ehen zu erklären, beweist nach Boudin nicht bloß allein die bereits angeführte Thatsache, dass ganz gesunde blutsverwandte Eltern taubstumme Kinder zeugen, sondern hauptsächlich auch, dass taubstumme, aber nicht blutsverwandte Eltern nur höchst ausnahmsweise taubstumme Kinder bekommen, dass sie im Allgemeinen sprechende und hörende Kinder haben. Demnach würde die Häufigkeit der Taubstummheit bei Kindern blutsverwandter Eltern vollständig unabhängig von jeder krankhaften Uebertragung sein.

Einen Beweis für die eben angeführten Behauptungen findet Boudin erstens in der geographischen Verbreitung der Taubstummheit, indem die Zahl der damit Behafteten steigt mit der Abgeschiedenheit der Ortschaften und der Schwierigkeit der Kommunikation. So zählt man im Seine-Departement auf 10,000 Menschen 2 Taubstumme; in Corsika 14, in den hohen Alpen 23, in Island 11, im Kanton Bern 28.

Ein zweiter Beweis sind Herrn Boudin die nach ihm häufigen Heirathen unter Blutsverwandten bei den Juden, hervorgehoben theils durch die Toleranz des mosaischen Gesetzes, theils durch die grosse Zerstreuung der Juden überhaupt. Auch Dr. Liebreich²⁾ will bei seinen Untersuchungen ein ähnliches Resultat finden, indem er in Berlin 27 Taubstumme auf 10,000 Juden berechnete, während 6 Taubstumme auf 10,000 Protestanten und nur 3,1 auf 10,000 Katholische kommen sollen.

¹⁾ Chazarain, du mariage entre consanguins, Thèse de Montpellier 1859.

²⁾ Deutsche Klinik 1861.

Es wächst nach ihm überhaupt das Verhältniss der Taubstummheit mit der Leichtigkeit der Erlaubniss blutsverwandter Ehen durch Civil- und Religionsgesetze. Das auffallendste Verhältniss soll sich endlich in einigen Staaten Nordamerikas finden, wo man im Jahr 1840 im Staate Jowa 2,3 Taubstumme auf 10,000 Weisse, dagegen 212 Taubstumme auf 10,000 Schwarze zählte; bei der farbigen Bevölkerung, bei welcher die Sklaverei blutsverwandte Ehen begünstige, wäre demnach die Zahl der Taubstummen 91mal höher, als bei der weissen, welche das civile, moralische und religiöse Gesetz beschütze; das civile Gesetz hauptsächlich in den Staaten Ohio und Massachusets, wo die gesetzgebenden Versammlungen nach Boudin in besonderer Berücksichtigung der ausserordentlichen Gefahren, welche die daselbst sehr häufigen blutsverwandten Heirathen nach sich zögen, diese letzteren geradezu verboten hätten.

Die meisten Autoren, welche über Ehen unter Blutsverwandten geschrieben haben, beschränken sich bei der Untersuchung der Gefahren, welche diese Heirathen mit sich bringen, auf die angeborene Taubstummheit¹⁾, andere aber beschäftigen sich noch mit Blödsinn, Geisteskrankheiten, Albinismus und gewissen Formen von Gesichtsstörungen und nehmen an, dass die Entwicklung dieser Erkrankungen in einem gewissen Connex mit Ehen unter Blutsverwandten stehe²⁾. So fand Dr. Liebreich³⁾ in Berlin, dass von 100 Individuen, welche mit einer gewissen Form von Netzhautentzündung des Auges behaftet waren, 45 von blutsverwandten Eltern und häufig jüdischen Ursprungs waren.

Ich will Ihnen schliesslich noch in Kurzem die 2 umfassendsten statistischen Tabellen vorlegen, welche die Gegner der blutsverwandten Ehen anführen. Die erste hat Dr. Bemiss⁴⁾ von

¹⁾ Fréquence de la surdi-mutité chez des enfants nés de mariages consanguins. — Note de M. Brochard, lue à l'Académie des sciences le 7 juillet 1862.

²⁾ Du danger des mariages consanguins sous le rapport sanitaire, par F. Devay. Paris. 1862.

³⁾ Deutsche Klinik 1861.

⁴⁾ North-American medico-chirurgical review 1857.

Louisville, die zweite Dr. Howe ¹⁾ zusammengestellt; wie gesagt, beide entschiedene Feinde der blutsverwandten Ehen. Die Statistik des Dr. Bemiss umfasst 34 blutsverwandte Ehen; hievon sind von

28 Heirathen unter Geschwisterkindern ersten Grads 7 unfruchtbar,

und von 6 Heirathen unter Geschwisterkindern zweiten Grads sämtliche fruchtbar.

Die Gesamtzahl der Kinder betrug 192, was das Mittel von 5,6 auf jede Ehe gibt, oder von 7,1 auf jede fruchtbare Ehe.

Von den 192 Kindern sind 58 in den ersten Lebensjahren an den gewöhnlichen Kinderkrankheiten gestorben; 134 gelangten zu höherem Alter; hievon befinden sich im erwachsenen Zustande 46 bei guter Gesundheit, 32 sind schwächlich ohne weitere Angabe der Krankheit, über 9 fehlen die Nachrichten und 47 werden als krank bezeichnet.

Die verschiedenen Krankheiten vertheilen sich folgender Maassen, 23 Skrophulöse, 4 Epileptische, 2 Stumme, 2 Irre, 4 Blöde, 2 Blinde, 2 Missstaltete, 6 Kurzsichtige, 5 Albino, 1 Veitstanz; es haben mithin mehrere Individuen zwei oder mehr Krankheiten zu gleicher Zeit geboten. Von den früheren Verhältnissen der Familien ist bloß erwähnt, dass in 3 Familien Skrophelkrankheit herrscht, und dass diese 3 Familien 16 Erkrankungen geliefert haben.

Als besonders auffallend bei Betrachtung der angegebenen Ziffern ist die ungemeine Fruchtbarkeit dieser Ehen zu erwähnen, während, wie wir nachher noch sehen werden, als das erste, wenn nicht das einzige Zeichen der Degeneration der Thiere bei fortgesetzten Paarungen blutsverwandter Thiere eine Verminderung der Fruchtbarkeit angenommen wird. Es steht ferner die Mortalitätszahl der Kinder, welche Dr. Bemiss angibt, unter dem Mittel, welches man gewöhnlich für die ersten 5 Lebensjahre angibt.

¹⁾ Journal of Psychological Medicine, April 1857.

On the causes of idiocy (Psycholog. journ. 1858).

Dr. Howe hat eine Statistik von 17 Fällen von Heirathen unter Blutsverwandten zusammengestellt; auf diese 17 Ehen kamen 95 Kinder, also auf eine Ehe wiederum die hohe Zahl von 5,58. Von diesen 95 waren 37 gesund, 12 skrophulös oder schwächlich, 1 ein Zwerg, wiederum bloß 1 taub, aber 44 blödsinnig.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese Zahlen zu viel beweisen. Denn wenn man sagt, dass mehr als die Hälfte der Kinder, welche aus Ehen unter Geschwisterkindern abstammen, blödsinnig sind, so beweist es eben, gelinde gesagt, einfach, dass den Thatfachen, auf welchen diese Statistik beruht, keine einfachen Fälle zu Grunde liegen. Die Heirathen unter Geschwisterkindern sind bei uns und anderwärts nicht so selten, dass ein so ungeheuerliches Resultat, wenn es wahr wäre, nicht schon bemerkt worden wäre. Und gerade in dieser Beziehung sind die beiden angeführten Statistiken im hohen Grade auseinander gehend; auf 194 Individuen fand Dr. Bemiss nur 4 Blöde, also 2%, während Dr. Howe bei 95 Kindern diese Krankheit 44mal traf, was dem Verhältniss von 46% entspricht. Wenn also der Blödsinn wirklich die Folge von Heirathen Blutsverwandter ist, woher kommen dann so höchst verschiedene Resultate?

Bevor ich nun die vorliegenden Beobachtungen und Statistiken einer eingehenderen Untersuchung und Kritik unterziehe, will ich Ihnen mittheilen, was uns von den Sitten, Gebräuchen und Gesetzen der ältesten Völker in Bezug auf Heirathen unter Blutsverwandten bekannt ist. Es ist freilich nur wenig, was ich hierüber finden konnte. Wir können aber daraus entnehmen, dass in den frühesten Zeiten Heirathen unter Blutsverwandten erlaubt waren, dass es hauptsächlich Religionsgesetze waren, welche die Sitten der Völker in Hinsicht der blutsverwandten Ehen umänderten und dass wohl erst nach und nach die Völker im festen Glauben an das göttliche Verbot der blutverwandten Ehen dieselben als unheilbringend und schädlich betrachteten.

Bei den alten Egyptiern waren, wie Diodorus Siculus erzählt, Ehen zwischen Bruder und Schwester erlaubt; es war sogar

Sitte, dass der König seine Schwester zur Gemahlin nahm; römische Schriftsteller erzählen dies noch von den Ptolemäern. Die Götterlehre der Egyptier erzählte dergleichen auch von ihren Gottheiten, so hätte Osiris seine eigene Schwester Isis zur Frau genommen, ein anderesmal sogar mit seiner andern Schwester Nephtis, die an seinen und ihren Bruder Typhon verheirathet war, Ehebruch getrieben, was durch einen liegen gelassenen Blumenkranz verrathen worden sei. Bei den Atheniensern, hauptsächlich auch unter den kleinasiatischen Völkern sind Ehen unter den nächsten Verwandten erlaubt gewesen; es waren blos Ehen der Kinder untereinander, sowie Ehen zwischen Eltern und Kindern verboten.

Plutarch schreibt über die Römer in seiner Abhandlung über den Ursprung des Verwandtenkusses, 6te Frage: „vielleicht ist auch desswegen die Liebe der Verwandten bis auf den Kuss beschränkt worden und dieses als das einzige Zeichen der Blutsfreundschaft übrig geblieben, weil es unerlaubt war, seine Blutsfreundinnen zu heirathen. Denn ehemals heiratheten Römer ihre Blutsfreundinnen ebensowenig, als jetzt Tanten oder Schwestern, und erst spät ist die Heirath unter Geschwisterkindern ¹⁾ durch folgenden Zufall erlaubt worden. Ein unbegüterter, beim Volk aber sehr beliebter Mann kam in den Verdacht, dass er ein Mädchen, das mit ihm Geschwisterkind und dabei die einzige Erbin ihres Vaters war, in die Ehe genommen hätte und durch sie im Wohlstand lebe. Als er nun darüber verklagt war, unterliess das Volk die Untersuchung der Sache, sprach ihn frei, und machte das Gesetz, dass Ehen unter Geschwisterkindern und allen noch weitläufigeren Blutsfreunden erlaubt, die zwischen näheren aber verboten sein sollten.

Justinianus ²⁾ verbietet absolut nur Ehen zwischen Personen,

¹⁾ Die ältesten römischen Gesetze untersagten dieselben. Tacitus, Annal. XII. c. 6.

²⁾ Inter eas personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae non possunt; ferner an einer andern Stelle; Inter eas personas, quae ex transverso gradu cognationis junguntur, est quaedam similis observatio, sed non tanta.

welche in einem Verhältniss wie Eltern zu Kindern oder wie Geschwister zu einander stehen.

Am wichtigsten für uns sind die Ehegesetze von Moses; sie sind für Protestanten grossentheils gewissermassen noch gültig, indem es bei Dispensationen hauptsächlich auf sie ankommt; Katholiken kann kraft des Ausspruches des tridentinischen Concils¹⁾ vom Papst in gewissen Fällen Dispensation verliehen werden.

Moses verbietet die Ehen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, mit Stief- und Schwiegertochter, mit Stief- oder Schwiegermutter, mit des Bruders Wittwe, mit des Vaters oder der Mutter Schwester und mit der Wittwe des Vatersbruders.

Vor Moses scheint die Sitte einige dieser Heirathen erlaubt zu haben, so finden wir z. B., dass Abraham seine Stiefschwester²⁾ zur Frau nahm, sein Sohn Isaak³⁾ heirathete seine leibliche Cousine, und sein Enkel Jakob nahm gleichfalls seine leiblichen Cousinen zu Frauen⁴⁾. Die erste dieser Verbindungen vereinigte nähere Verwandte, als unsere modernen Gesetze erlauben, und gewiss, wenn die allgemein angenommenen Ideen über Heirathen unter Blutsverwandten der Ausdruck der Wahrheit wären, müssten die 12 Patriarchen ein sehr heruntergekommenes Geschlecht gewesen sein. Und gleichwohl können wir gerade das Gegentheil behaupten, wenn wir von diesen Leuten nach 14 Generationen eine Nation abstammen sehen, welche 600,000 streitbare Männer zählte, was wenigstens auf 8 bis 10 Millionen Köpfe schliessen lässt. — In Kurzem sei noch angeführt, dass die ganze Geschichte im Buche Tobias sich um einen Fall von blutsverwandter Heirath dreht.

¹⁾ Sessio 24, canon 3. Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse ecclesiam in nonnullis eorum dispensare aut constituere, ut plures impediunt ac dirimant, anathema sit. Ferner sessio 24 caput 5: in secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam causam.

²⁾ Genesis Kapitel 20, Vers 12.

³⁾ Genesis Kapitel 24, Vers 15.

⁴⁾ Genesis Kapitel 29, Vers 10.

Dr. Bemiss¹⁾, der diese Thatsachen schon erwähnt hat, stimmt damit überein, dass sie die Annahme ausschliessen, es sei diese Race durch Heirathen unter Blutsverwandten degenerirt und schlägt zur Erklärung 2erlei vor. 1) Man muss vermuthen, dass das Volk der Juden bei Betrachtung von diesem speciellen Gesichtspunkte aus, ausnahmsweise günstige Bedingungen bot, oder man muss 2) annehmen, dass zur Patriarchenzeit die Organisation des Menschen noch eine höhere, eine vollendetere war, als jetzt, so dass ihn die Naturgesetze der Entartung, der Degeneration entweder noch nicht berührten, oder blos das Resultat hatten, stufenweise die Gränzen des Lebens zu vermindern.

So gewiss es nun ist, dass ein solches Beweissystem keine Widerlegung erlaubt, ebenso gewiss überzeugt es auch nicht²⁾. Es läuft allen Regeln einer gesunden Logik zuwider, einem Phänomen eine geheime und unerklärliche Ursache zuzuschreiben, nachdem man von jenem Beweise entlehnt hat, um eine Theorie aufrecht zu erhalten. Auf der andern Seite befiehlt das Gesetz Mose, dessen Anordnungen doch alle zum Hauptzweck das physische Gedeihen des jüdischen Volkes hatten, geradezu, dass die Töchter sich blos in dem Stamm verheirathen sollen, dem sie angehören. Es war das, wenn auch eine indirekte, so doch bestimmte Aufforderung zu Heirathen unter Verwandten. Bemerkenswerth ist die Thatsache, welche die Ursache abgab zur Verkündung des Gesetzes³⁾; 5 Mädchen heiratheten ihre leiblichen Vettern, damit nicht ihr Erbtheil bei Heirath in einen andern Stamm diesem zufalle⁴⁾. — Wenn solche Heirathen die schlimmen Resultate nach sich ziehen sollten, die man ihnen vorwirft, so ist

¹⁾ Journal of psychological medicine April 1857. page 368.

²⁾ Dr. Gilbert W. Child., a. a. O.

³⁾ 4. Buch Mose 36. Kapitel.

⁴⁾ Nach Mosis Gesetz erbten blos die Söhne; die Töchter waren nach einem alten Herkommen von der Erbschaft ausgeschlossen; waren keine Söhne da, so erbten die Töchter; eine Erbin aber durfte nicht ausser dem Stamm, und pflegte nicht ausser der Familie zu heirathen. Michaëlis, mosaisches Recht Bd. 2. Theil 2. Seite 56.

es kaum begreiflich, warum ein solches Gesetz überhaupt gegeben wurde.

Bei all den Gesetzen, welche gegen die Heirathen unter den nächsten Verwandten gerichtet sind, scheint mir endlich der Grund keineswegs darin zu liegen, dass sie eine Verschlechterung der Race, ein Herabkommen des Menschengeschlechts verhüten sollen; nirgends spricht ein Gesetzgeber, ein Concil sich dahin aus. Diese Gesetze sind nur deshalb gegeben, um durch ein direktes Verbot der Heirathen in die Verwandtschaft Unzucht und Unsittlichkeiten in den Familien vorzubeugen; es ist auch möglich, dass der *respectus parentelae* bei sittlich hoch entwickelten Völkern, wie bei den alten Römern und Germanen eine weitere, aber jedenfalls entfernter stehende Ursache des Verbotes abgab. Nirgends finden wir aber bei der Besprechung dieses Thema in älteren, unparteiischen Schriftstellern, dass die blutsverwandten Ehen in Folge schadenbringender, gesundheitsgefährlicher Einflüsse zu umgehen seien, oder dass Völker, bei denen sie gang und gäbe waren, an Grösse, Gestalt, Wissen geringer gewesen wären, als solche, bei denen sie verboten waren; dass jene diesen nachgestanden hätten.

Wir wollen nun zusehen, welche Anhaltspunkte uns die Züchtung der Thiere, resp. die Paarung blutsverwandter Thiere zur Aufklärung der vorliegenden Frage liefert. Denn gerade bei den Funktionen der Reproduktion zeigt der Mensch am meisten alle Attribute seines animalischen Wesens und deshalb auch können Resultate, welche uns das Studium dieser Funktion bei den Thieren gibt, unter gewissen Cautelen auf den Menschen übertragen werden. Ich sage unter gewissen Cautelen, denn wir dürfen hier ein wichtiges Faktum nicht vergessen, welches etwaige schlimme Chancen bei Thieren dadurch eigenthümlich vermindert, dass wir willkürlich nur vollkommen gesunde Thiere paaren. Andererseits aber finden die Paarungen der Thiere nur in so nahverwandtem Grade statt, dass dadurch ein Vergleich wieder eher ermöglicht wird. So wird z. B. ein Viehzüchter die Paarung einer Kuh mit dem Bruder ihres Vaters nie als eine Paarung unter Blutsverwandten ansehen.

Die genealogische Reihenfolge der Paarungen beobachtete man mit grösserer Sorgfalt bloss bei Pferden und Hornvieh¹⁾.

Ein Viehzüchter hatte während 20 Jahren bloss 3 Bullen, deren einer von dem andern abstammte, und hatte fortwährend Thiere erster Qualität; sie sind als Zuchtthiere gesucht; sein Vieh frisst gut, entwickelt sich gut und ist gesund; doch scheint es, als sei die Fruchtbarkeit besonders auf Seite der männlichen Thiere etwas vermindert. Ein anderer Züchter, auf den man sich verlassen kann, gibt an, dass seine Thiere unter denselben Verhältnissen ebenso gross und fett geworden seien, wie ihre Eltern²⁾.

Eine Heerde von 300 Merinos pflanzte sich im Verlaufe von 22 Jahren immer unter sich selbst fort³⁾; es waren hiebei selbstverständlich alle Arten der Blutsverwandtschaft vertreten und dennoch trat keine Krankheit ein, ja es verbesserte sich sogar die eigenthümliche Art der Heerde.

Ich könnte noch mehr Beispiele anführen, allein ich glaube, die wenigen erwähnten sind schon genug, um zu überzeugen, dass Paarungen blutsverwandter Thiere wenigstens direkt keine Krankheiten erzeugen, welche man allein auf Rechnung der Blutsverwandtschaft setzen könnte; es ist jedoch nach zuverlässigen Beobachtungen nicht auszuschliessen, dass lange fortgesetzte Paarungen blutsverwandter Thiere, wenn auch nur unter Zuhilfenahme gewisser hygieinischer Einflüsse von der Norm abweichende Effekte nach sich ziehen. Es beruht dies darauf, dass in einer Species jedes Individuum gewisse eigenthümliche Merkmale bietet, und dass jede dieser individuellen Eigenthümlichkeiten in einer gewissen Art bereits eine Abweichung vom idealen Typus der Race ist. Wie ein gleichartiges Geschöpf, schon allgemein angenommen, bloss ein ihm gleichartiges wieder hervorbringt, so sind die individuellen Charaktere um so ausgeprägter und entwickelter, je mehr man Thiere paart, welche durch Blutsverwandt-

¹⁾ Coate's Herd-Book 1846.

²⁾ Observations on breeding for the turf etc. by Nicolas Hanckey Smith, London 1825.

³⁾ Beaudouin, Comptes-Rendus le 5. Août 1862.

schaft mit einander verbunden sind. Die individuellen Eigenthümlichkeiten sind Anfangs ohne Gefahr; wenn sie aber im Verlaufe der Zeit durch fortgesetzte Paarungen wachsen und sich über eine gewisse Gränze entwickeln, so entfernen sie endlich die Individuen vom ursprünglichen Racentypus so weit, dass sie gewisse Unvollkommenheiten erzeugen. Es sind dies Unvollkommenheiten, Verschlechterungen im physiologischen Sinn, denn im gewöhnlichen Leben bezeichnet man sie mit dem Namen von Verbesserungen, da sie eine Zunahme von Fähigkeiten bei den Thieren in sich schliessen. Obwohl sie nemlich nicht dazu dienen, das Leben und die Gesundheit des betreffenden Individuums zu fördern, so bringen sie doch eine höchstmögliche Entwicklung der Körperformen und der am meisten vom Menschen geschätzten Eigenschaften des Thieres mit sich¹⁾. Mag auch diese Entwicklung einzelner Fähigkeiten der Thiere auf Kosten ihrer weiteren Konstitution, auf Kosten ihrer Lebensdauer erzielt werden, wir suchen sie gleichwohl in Folge von unseren Bedürfnissen und zwar nach der Art der Thiere in verschiedener Weise zu befördern. Bald ist es das Ueberwiegen des Muskelsystems, die Neigung zum Fettwerden oder zu beträchtlicher Milchabsonderung, bald wie bei Vollblutpferden²⁾ eine ausnehmend schnelle Gangart; vom Nützlichkeitsstandpunkt aus lauter sehr werthvolle Eigenschaften, physiologisch genommen jedoch mehr weniger wirkliche Anomalieen. Die schönen englischen Racen, das Durham Rindvieh, das New-leicester Schwein u. s. w. wahre Kunstwerke menschlicher Industrie, eine Bewunderung der ganzen Welt, ein Schatz für ihre Eigenthümer, sind in Wirklichkeit wahre Monstrositäten in ihrer Entwicklung, ein Gegensatz aller hygieinischen Grundsätze. Denn was sieht man in der That bei diesen Thieren? eine Vernichtung der natürlichen Formen, eine widernatürliche Fettentwicklung, ein

¹⁾ Note sur la consanguinité, par M. A. Sanson. Académie des sciences, séance du 21. Juillet 1862.

²⁾ Stonehenge, the horse in the stable and field, pag. 139, sagt: almost our blood horses are bred in-and-in. (accouplement en dedans, Inzucht).

³⁾ Gourdon, Comptes-rendus le 11. Aout 1862.

vorschnelles Wachsthum, welches das Lebensziel heranrückt, die Fruchtbarkeit schwächt, zu kachektischen Affektionen disponirt.

Alle diese Erfolge und sogenannten Verbesserungen darf man aber nicht bloß auf die blutsverwandten Paarungen, die zur Erzielung dieser Formen sehr häufig, besonders in England, angewandt werden, beziehen; sie sind nur das bedingende, jedoch allmählich ganz in den Hintergrund gedrängte Moment. Denn regelmässig kommen noch weitere, durch die Praxis und die Wissenschaft geheiligte Mittel in Gebrauch, auf Thiere gewünschte Eigenschaften zu übertragen, wie die Castration, die fortwährende Stallfütterung, das Schoppen, die Erziehung, lauter Mittel, durch welche man mehr oder weniger die natürlichen Eigenschaften der Individuen abändert und einem gewissen Ziele zuführen kann. Und gerade aus der allmählichen Entwicklung der gewünschten Formen, welche nur mit Zuhilfenahme der verschiedensten Mittel bezweckt werden, erkennt man, dass die Blutsverwandtschaft an und für sich auf die künstliche Vervollkommnung der Thierarten nur einen sehr geringen Einfluss hat; sie wirkt nur als ein accessorisches Moment einer andern Kraft, der Erbllichkeit. Der Hauptfaktor zu Vervollkommnungen, zu Modifikationen einer Race bleibt immer derjenige, welcher die effektive Entwicklung einer verbesserten Konstitution hervorruft. In gut beobachteten Fällen findet man aber bei den Individuen nur von den Eltern ererbte Eigenschaften und solche, die sich nachher unter dem Einfluss von hygieinischen Einwirkungen entwickeln. Jene ererbten und auch erblichen Eigenschaften nun, welche durch die Organisation dem Individuum zukommen, sind durch eine methodische Uebung, welche die Kraft der Organe stärkt, einer verschieden hohen Entwicklung fähig, und dadurch der Ausgangspunkt von Veränderungen derjenigen Eigenschaften, welche bei den Thieren in Hinsicht der Nützlichkeit als Verbesserungen betrachtet werden können. Es ist dies dasselbe Verhältniss bei Entwicklung der Muskelkraft der Thiere, oder von intellektuellen Eigenschaften, wie beim Hund oder Pferd, oder bei den oben angeführten Beispielen einer vermehrten Fettbildung, einer beträchtlichen Milchabsonderung, einer vorzeitigen Entwicklung.

Bei jeder Generation wächst die Vervollkommnung um so viel, als jedes der gepaarten Thiere durch die funktionelle Gymnastik sich selbst verbessert hat. Die Paarung ist demnach schon im Allgemeinen nicht die Ursache der Verbesserung, sondern nur das Mittel der Uebertragung; und blutsverwandte Paarungen wirken in keiner anderen Weise, als indem sie die Erbllichkeit erhöhen und begünstigen. Durch blutsverwandte Paarungen erzielen demnach die Züchter eine stärkere Gewissheit des Verbleibens der Eigenschaften und der Charaktere, welche sie Interesse haben, fortzupflanzen; und ergreifen damit ein ebenso geeignetes, als wirksames Verfahren, neue Formen oder ausserordentliche Fähigkeiten zu fixiren.

Als ein Beispiel hievon, von der Fixirung neuer Formen durch Paarung blutsverwandter Thiere, will ich nur anführen den Ursprung der Schafe mit den kurzen Beinen¹⁾; es ist dies eine Race, wie sie in einigen Ländern, namentlich in England fortgepflanzt wird, weil man bei ihnen den Nutzen sah, dass sie die Einfriedigungen der Felder nicht überspringen; absichtlich pflanzte man diese zufällige Verunstaltung eines einzigen Individuums fort, welche sich zuerst bloß bei einigen seiner Nachkommen und endlich bei Allen vorfand. Vollkommen ähnlich ist nebenbei gesagt die Fortpflanzung von 6 Fingern an jeder Hand in einigen französischen Ortschaften²⁾.

Die Thatsachen, welche sich uns so eben durch die Beobachtung von Paarungen blutsverwandter Thiere aufdrängten, lassen sich in einige Sätze zusammenfassen, die für uns um so werthvoller sind, als wir nachher dasselbe Resultat bei den Ehen blutsverwandter Menschen finden werden.

Die Paarung blutsverwandter Thiere ist an und für sich nicht schädlich; sie ist auch keinem Naturgesetz entgegen. Diese Art der Paarung erhöht, wie man schon a priori erwarten konnte, die Eigenthümlichkeiten der Individualität der Abkömmlinge; unter bestimmten hygieinischen Einflüssen können diese Eigenthümlich-

¹⁾ Flourens, Académie des sciences, le 4. Aout 1862.

²⁾ Gazette hebdomadaire S. 597. 1860.

keiten eine krankhafte Entwicklung nehmen, und daraus physiologisch genommen eine Entartung der Race folgen, welche freilich vom Nützlichkeitsstandpunkt aus auch als Verbesserung angenommen werden kann. Sind die Eltern selbst nicht krank, so haben Paarungen blutsverwandter Thiere keine Tendenz, Krankheiten bei den nachkommenden Geschlechtern zu erzeugen. Werden die blutsverwandten Paarungen mehrere Generationen hindurch fortgesetzt, besonders bei sehr nah verwandten Thieren, so scheint und zwar nur nach einem Beobachter die Fruchtbarkeit etwas abzunehmen, zumal die Zeugungsfähigkeit männlicher Thiere etwas herabgesetzt.

Sehen wir nun zu, wie wir die angeführten Thatsachen beim Menschen verwerthen können. Dr. Gilbert W. Child (medical times and gazette 1862) behauptet, dass analog den Paarungen blutsverwandter Thiere auch Heirathen unter Blutsverwandten durchaus keinen Nachtheil bei den Abkömmlingen erkennen lassen, so lange die Eltern nur gesund und frei von krankhaften Anlagen sind. Derselbe führt als Beweis hiefür die Erfahrungen an, welche er auf seinen Reisen in Schottland an Menschen machte, welche in abgeschiedenen Gegenden oder Eilanden lebend sich ohne alle Vorsichtsmassregeln nur unter einander verehelichten. Die Bewohner eines kleinen Thals, Glenfinlass, in den Hochlanden von Perthshire gaben ihm an, dass seit Menschengedenken kein Mann ausserhalb seines kleinen Stamms geheirathet habe; sämtliche Familien waren gesund und von Mittelgrösse. Dasselbe Verhältniss fand Child auf den kleinen schottischen Inseln und einzelnen Fischerdörfern in Cornwall.

Ganz entsprechend obigen Erfahrungen eines sehr glaubwürdigen Forschers lehrt uns das Studium der verschiedenen Menschenracen, dass sich ein Volksstamm um so reiner erhält, um so mehr seine ihm zukommenden Eigenthümlichkeiten bewahrt, je mehr er bei Heirathen sich blos auf seine Stammesgenossen beschränkt. Die reine Race und der individuelle Typus kann entweder nur unverändert bestehen bleiben oder sie müssen verschwinden; denn immer substituirt sich eine Race der andern, ein Typus dem andern; nie dienen Kreuzungen von Völkern dazu,

Racen, die im Zustand des organischen Verfalls sich befinden, wieder neu zu beleben; überlebte verkommene Racen¹⁾ weichen in kurzer Zeit der jüngeren kräftigeren und lebensfähigeren andrängenden Race. Es ist ferner durch die Anthropologie erfahrungsgemäss bestätigt¹⁾, dass Kreuzungen von Menschenracen um so unfruchtbarer sind, je differenter und verschiedener die physiologischen Attribute der Racen sind; sie haben dagegen eine um so grössere Anwartschaft auf Fruchtbarkeit von sich und ihrer Nachkommenschaft, je näher sie sich stehen. Eine Unfruchtbarkeit obiger Art²⁾ ist sehr bemerklich zwischen den Nachkommen von Europäern und Malaien; sie ist fast absolut in den Verbindungen der angelsächsischen Race, einer der ausgeprägtesten, mit den Eingebornen Australiens und Neuseelands³⁾. Was endlich noch die Vitalität, die Gesundheit, die Intelligenz, die Moral von Abkömmlingen entfernter stehender Racen betrifft, so hat man nie bezweifelt, dass diese Bastarde im Allgemeinen schlagende Beweise einer geringen Stufe der Entwicklung geben⁴⁾.

Es liegt nun gewiss innerhalb der Gränzen einer regelmässigen Induktion, wenn man bei den Individuen dasselbe Gesetz annimmt, wie bei den Racen. Wir haben dasselbe bereits oben bestätigt gesehen, wo wir fanden, dass die mittlere Zahl der Geburten bei Ehen unter Blutsverwandten eine höhere ist, als bei gekreuzten Heirathen. Man ist aber auch bei den Menschen, wie bei den Thieren, zu dem Schlusse berechtigt, dass, je näher sich Völker und Einzelne in körperlicher und geistiger Entwicklung stehen, um so mehr sich gleiche und ähnliche Eigenschaften auf die Nachkommen übertragen, sich daselbst fixiren und consolidiren, abgesehen natürlich von allen pathologischen Einflüssen. Wir kommen demnach auch hier auf die bekannten Gesetze der Erblichkeit zurück, und sehen durchaus nicht die Nothwendigkeit ein, an die Stelle von Gesetzen unbestimmte

¹⁾ Broca, Recherches sur l'hybridité animale en général et sur l'hybridité humaine en particulier Paris 1860.

²⁾ Gazette hebdomadaire Nr. 32. 1862.

³⁾ Strzelecki, physik. descriptions of New-South-Wales.

⁴⁾ Boudin, Géographie médicale 1857. t. 1.

Hypothesen treten zu lassen, wie es die Gegner der blutsverwandten Heirathen thun, wenn sie behaupten, die Entstehung der Mängel, Gebrechen und Krankheiten bei der Nachkommenschaft blutsverwandter Ehen beruhe in der Thatsache der Blutsverwandtschaft selbst und umgehe die bestimmten Gesetze der Erblichkeit.

Bei der Lösung eines so schwierigen Problems wie des vorliegenden ist es nothwendig, anstatt der Versicherungen Beweise, anstatt einer allgemein angenommenen Meinung Thatsachen, anstatt unbestimmten Schätzungen Zahlen zu bringen. Gewiss ist desshalb gerade hier die numerische Methode von grösstem Werth, weil es sich um Constatirung von Zahlen zur Vergleichung handelt; ja man kann dreist behaupten, dass, wenn die vorliegende Frage so wenig Fortschritte in den letzten Jahren gemacht hat, trotz der ausdauernden Bemühungen strebsamer Männer, der Fehler darin liegen mag, dass die statistische Methode nicht im weitesten Umfang angewandt wurde. Aber wie mühselig zu sammeln, wie schwer zusammenzustellen sind solche Statistiken, die nur einigermaßen auf Exaktheit Anspruch machen, in Fällen, wo isolirte Thatsachen werthlos, wo Experimente unmöglich sind! Ich mache blos auf die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit aufmerksam, eine genaue Kenntniss von den Antecedentien der einzelnen Eltern zu bekommen. Was für Krankheiten und Familiengeheimnisse gibt es hier zu entwirren! Die einen verschweigen sie, die andern richten die Thatsachen nach ihren Ansichten zurecht, verstümmeln die Wahrheit, sei es aus Vergesslichkeit oder aus andern Beweggründen. Ja man kann sich behaupten, dass es in der grössten Mehrzahl unmöglich ist, Gewissheit zu erlangen; denn arme Personen sind gewöhnlich zu unverständlich, zu unwissend, um genügende Antwort zu geben, und Leute in bessern Verhältnissen bewahren wiederum Familiengeheimnisse mit der grössten Aengstlichkeit oder sind nicht selten selbst von ihren Eltern in Unkenntniss darüber gelassen worden. Das ist nur ein Blick auf die Hindernisse, welche sich bei Zusammentragung einer Statistik entgegenstemmen, einer Statistik, wo sich schliesslich doch alle Irrthümer nur auf einer Seite ansammeln.

Denn was beweist am Ende die Statistik des Dr. Bemiss und Howe mit 53 blutsverwandten Ehen? oder die Berechnungen des Dr. Boudin, welcher sämtliche blutsverwandte Eheleute mit seinen Zahlen erschreckte, die die vorzügliche Entstehung der Taubstummheit aus blutsverwandten Ehen nachweisen? Wie hat ferner Herr Dr. Boudin untersucht? Obwohl in der Nähe des grössten Taubstummeninstituts in Paris lebend, hat er es nicht der Mühe werth gefunden, alle Zöglinge daselbst zu befragen, sondern hat bloß einen Theil derselben (95 von 225) untersucht; und hat von dieser kleinen Zahl ausgehend seine Berechnungen angestellt. Gerade weil auch das Verhältniss der Taubstummen aus blutsverwandten Ehen zu den Taubstummen aus gekreuzten Ehen so auffallend übereinstimmend ist — 28 : 100 — beweist nicht die Präcision der Angaben, sondern dass irgend ein Radikalfehler in den Rechnungen liegen muss. Dieser wurde in der That bereits nachgewiesen durch die Berechnungen der Taubstummen in verschiedenen Departements, zumal dem der Rhone, wo sich eine viel geringere Zahl der Taubstummen aus blutsverwandten Ehen vorfand, als man nach den Berechnungen Boudins über das Verhältniss der Taubstummen aus gekreuzten Ehen zu den Taubstummen aus blutsverwandten Ehen hätte finden dürfen. Ich stelle nur noch einfach die Frage, ob bei den angegebenen Schwierigkeiten der Untersuchung Schlüsse erlaubt sind, aus den einigen Hunderten untersuchter Taubstummen im Allgemeinen, wobei sich circa 28% aus blutsverwandten Ehen abstammend befinden sollen, eine Statistik aufzustellen, die sich auf die 29,600 Taubstummen, welche sich 1861 in Frankreich vorfanden, beziehen darf? Schliesslich noch kann und darf ich es auch nicht unerwähnt lassen, wie ein Beweis, dessen Gültigkeit man lange nicht anzutasten wagte, endlich in ein grosses Nichts zerrann; es ist das angebliche officiële Dokument der gesetzgebenden Versammlung von Ohio, welches Heirathen unter Blutsverwandten geradezu verbot, weil auf 3900 Kinder im genannten Staat, welche von 873 Heirathen unter Vettern und Basen kämen, 2890 sich befänden, welche mit vollständigem Blödsinn oder schweren Krankheiten und Gebrechen behaftet seien. Eine genaue Nachforschung bei den dortigen me-

dicinischen Gesellschaften ergab, dass ein solches Gesetz gar nie gegeben wurde, dass die erwähnten Thatsachen geradezu nicht vorhanden seien.

Um noch einen der Beweise der Gefährlichkeit blutsverwandter Ehen wegzunehmen, protestirt der Oberrabbiner Isidor in Paris¹⁾ in einem Brief an die Akademie der Wissenschaften daselbst gegen die neuesten Behauptungen, als sei die Zahl der Taubstummen bei den einigermaßen häufigeren Ehen Blutsverwandter unter den Juden eine höhere, als bei den Christen; er nimmt die Zahl der Taubstummen in seiner Gemeinde von 25,000 Menschen auf höchstens 4 an, was, wenn das Pariser Verhältniss als Basis für das französische gilt, auf 100,000 Juden in Frankreich circa 16 Taubstumme ergibt — ein enormer Gegensatz zu Liebreich's bereits oben angeführten Berechnungen, welche auf 10,000 Juden in Berlin 27 Taubstumme nachweisen.

Jedenfalls erhellt aus allen Angaben, dass die Statistiken eine solche Menge von Widersprüchen in sich schliessen und mit so greifbaren Fehlern behaftet sind, dass man bei späteren Untersuchungen neue Gesichtspunkte gewinnen muss und hauptsächlich die Antecedentien der früheren Generationen kennen zu lernen hat; dann könnte man am Ende constitutionelle Erkrankungen finden, welche durch das Zusammentreffen blutsverwandter Ehen und gleichartiger Temperamente fähig wären, sich in bestimmte Erkrankungen umzubilden. -- Eine so genaue Untersuchungsmethode ist aber bis jetzt noch nicht befolgt worden.

Es erübrigt mir noch, nach all dem Negativen, das ich angeführt habe, Ihnen endlich auch einige Angaben von den Aerzten zu geben, die durch ihre Untersuchungen gefunden haben, dass Heirathen unter Blutsverwandten an und für sich keine schädlichen Folgen für die Nachkommenschaft in sich schliessen. So hat Dr. Bourgeois²⁾, ein ausgezeichnete französischer Arzt, 68 Ehen

¹⁾ De la surdi-mutité parmi les Israélites, considérée par rapport à la question des mariages consanguins, lettre de M. Isidor, grand rabbin de Paris à M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, le 21. Juillet 1862.

²⁾ Sur les résultats attribués aux alliances consanguines, extrait

unter Blutsverwandten genau untersucht und in keinem Falle einen nachtheiligen Einfluss bemerken können; unter den Familien, welche er mit blutsverwandten Ehen durchsetzt angibt, und welche durchaus nie einen schädlichen Erfolg hatten, zählt er seine eigene auf. Dr. Séguin aîné¹⁾ behauptet dasselbe bei 10 Heirathen unter Blutsverwandten seiner eigenen Familie.

Der bereits mehrmals genannte Dr. Child führt alle Gefahren, welche blutsverwandte Ehen mit sich bringen sollen, auf die Gesetze einer erhöhten Erbllichkeit zurück, welche diese Heirathen in sich schliessen.

Flourens, einer der berühmtesten französischen Physiologen, behauptete in der Akademie der Wissenschaften, zu demselben Resultat gekommen zu sein. Seiner Ansicht gemäss sprachen sich noch Andere aus.

Ich selbst habe mich schliesslich seit über 2 Jahren vergeblich bemüht, nur einen Krankheitsfall aufzufinden, welcher auf das alleinige Faktum einer blutsverwandten Ehe zurückzuführen wäre.

Zum Schlusse will ich Ihnen noch zeigen, welches in meinen Augen die natürlichen Folgen der Heirathen unter Blutsverwandten sind, unter welchen Bedingungen sie schädlich werden können, unter welchen Umständen sie ohne Gefahr, ja selbst vortheilhaft sein können. Zur Erleichterung der Argumentation diene Ihnen ein der Arbeit des oben genannten Dr. Gilbert W. Child entnommenes Beispiel: Der Grossvater ist mit einer Anlage zur Schwindsucht behaftet; er überträgt die Krankheitsanlage seinen beiden Söhnen B und C; B hat 2 Söhne D und E; C eine Tochter F; F ist also Geschwisterkind mit D und E; D nimmt nun eine Frau aus einer fremden Familie, frei von tuberkulöser Anlage; C heirathet seine Cousine F. In diesem Falle ist es klar, dass die Kinder von D unendlich mehr Chancen haben, gesund zu sein, als die von E; aber wohlgemerkt nicht, weil E seine Cousine geheirathet hat, sondern weil dieser eine Frau heirathete, die die-

d'une note de M. Bourgeois. Académie des Sciences, séance du 26. janvier 1863.

¹⁾ Gazette hebdomadaire 33. 1863.

selbe Krankheit im latenten Zustande hatte, wie er, und deren Constitution der seinigen sehr ähnlich ist.

Auf ein solches Faktum kann man bis zu einem gewissen Grade die Resultate, welche die Erfahrung bei den Thieren lehrt, anwenden. Wie bei ihnen aufeinanderfolgende Paarungen blutsverwandter Thiere die Eigenthümlichkeiten jedes Individuums in erhöhtem Maasse reproduciren, ebenso dürfen wir in unserem supponirten Fall zu der Erwartung berechtigt sein, nicht allein eine ausgeprägte Disposition zu derselben Krankheit zu finden, sondern auch die gleiche physische und intellektuelle Constitution.

Nehmen wir aber einmal an, dass der Grossvater, seine 2 Söhne, sowie ihre betreffenden Frauen keine Spur von tuberkulöser Anlage böten und dass die 2 Enkel D und E, sowie deren Cousine F vollkommen gesund wären; nimmt dann D seine Frau aus einer tuberkulösen Familie, während E wie vorhin seine Cousine heirathet, so ist es sicher, dass jetzt, was die Gesundheit der Kinder betrifft, die Chancen geradezu umgekehrt sind. Alles drängt zur Annahme, dass die Kinder von E und F ganz gesund sein werden und nur die Eigenthümlichkeiten ihrer Familie schärfer ausgeprägt erhalten. Es ist aber sehr zu befürchten, dass die Kinder von D bei der ausgesprochenen Anlage ihrer Mutter ebenfalls tuberkulös werden, obgleich ihr Vater keine Blutsverwandte heirathete; die schlimmen Chancen sind aber jedenfalls in diesem zweiten Beispiel bei den Kindern von D viel geringer, als vorhin bei den Kindern der verheiratheten Geschwisterkinder.

Durch Vorstehendes sind wir zu folgenden Schlussfolgerungen berechtigt:

Es gibt keinen Lehrsatz in der Wissenschaft, auf welchen sich die Theorie stützen kann, Heirathen unter Blutsverwandten seien an und für sich gefährlich.

Den Thatfachen, welche zu beweisen scheinen, dass Heirathen unter Blutsverwandten an und für sich eine Tendenz haben gewisse Krankheiten herbeizuführen, stehen zahlreiche andere, gut beobachtete Fälle gegenüber, die das Gegentheil beweisen.

Das Studium der Kreuzung der menschlichen Racen belehrt uns, dass Bastarde um so unfruchtbarer, um so tiefer stehend an

Körper und Geist sind, je grösser die körperlichen und geistigen Unterschiede der Eltern sind, dass dagegen Verbindungen gleichartiger Racen an Fruchtbarkeit und Entwicklungsfähigkeit der Abkömmlinge alle andern übertreffen.

Heirathen unter Blutsverwandten ziehen an und für sich eine Verschlechterung der Race nicht nach sich; sie befestigen und entwickeln jedoch in erhöhtem Grade bei den Kindern die individuellen Eigenthümlichkeiten der Eltern, seien es nun physische oder intellektuelle, krankhafte oder andere; in dieser Beziehung mögen sie manchmal eine Veränderung der Race herbeiführen.

Ueber Natron und dessen Bereitung aus Kryolith.

Von

Chr. Voit,

Chemiker der Farbenfabrik Pabst und Lambrecht.

Zu dem Aufschwunge, den die Industrie seit dem letzten halben Jahrhundert genommen hat, trug ohne Zweifel auch die fabrikmässige Gewinnung des kohlensauren Natron und dessen Anwendung anstatt des kohlensauren Kali bei und es möchte daher ein kurzer Abriss der Geschichte dieser beiden Alkalien nicht ohne Interesse sein. Es reicht deren Kenntniss bis in das früheste Alterthum zurück, da man schon lange die Erfahrung hatte, dass Wasser, über Pflanzenasche gestanden, einen eigenen ätzenden Geschmack und zugleich die Eigenschaft annahm, fettige Substanzen anzugreifen; das durch Eindampfen erhaltene Salz wurde aus dem Arabischen Alkali (Aschensalz) oder Laugensalz genannt. Fast eben so alt ist die Erfahrung, dass genannte Eigenschaften durch Behandlung mit gebranntem Kalk noch viel entschiedener hervortreten und die Flüssigkeit und das daraus erhaltene Salz thierische Substanzen, als Fett, Haut, Wolle, Haare gänzlich auflöst; man nannte daher dieses ätzendes und jenes mildes Alkali oder Laugensalz und die Alchemisten Paul Aegineta und Geber geben schon im achten Jahrhundert genaue Vorschriften zu deren Darstellung; noch viel früher wandte man die Asche zur Bereitung der Seife und des Glases an.

Dühamel zeigte zuerst 1736 und Marggraf 1758, dass das Alkali aus der Asche der Pflanzen des Binnenlandes von dem aus der Asche der am Meeresstrande wachsenden Pflanzen verschieden sei. Schon lange kannte man auch ein Salz, welches in

Aegypten und Persien beim Eintrocknen einiger Seen aus der Erde wittert, das schon Plinius unter dem Namen Nitrum beschreibt und seit Jahrhunderten gesammelt unter dem Namen Trona in Handel und zur Glasfabrikation benutzt wurde. Man fand jetzt, dass das Alkali aus den am Meere wachsenden Pflanzen mit diesem Salze und auch dem sogenannten Mauersalpeter, der aus alten Mauern herauswittert, identisch ist und dass dieses Alkali auch die Grundlage des Kochsalzes ist, wesshalb man es mineralisches Alkali nannte und jenes aus den Binnenpflanzen vegetabilisches oder Pflanzenalkali.

Die Bereitung des mineralischen Alkali durch Einäschern der Strandpflanzen, meistens zu den Gattungen *Salsola* und *Salicornia* gehörend, die zu diesem Zwecke auch angebaut wurden, gab einen Erwerbszweig für die Küstenländer Spaniens, Frankreichs und Englands und es kam als graublaue geschmolzene Salzmasse in den Handel, die meistens in den südlichen Ländern verbraucht und im Französischen Soude genannt wurde, woraus der deutsche Name Soda sich bildete oder auch Natron, nach dem lateinischen Nitrum, unter welchem Namen Plinius das Salz der ägyptischen Seen beschreibt. In Deutschland und den holzreichen nördlichen Ländern wendete man das Pflanzenalkali an, das durch Auslaugen der Holzasche und Calciniren des erhaltenen Salzes in Töpfen bereitet wurde und daher auch den Namen Pottasche erhielt, wovon die Franzosen für dieses Alkali den Namen Potasse entlehnten.

Pottasche und Soda enthalten die Alkalien als kohlen-saures Kali und Natron nebst einer Menge anderer Salze, die in den Pflanzen enthalten waren. Der grössere oder geringere Gehalt an kohlen-saurem Alkali bestimmt den Werth der Handelswaare und dieser variirt sehr. Sie finden ihre Hauptanwendung zur Seifenbereitung, Glasbereitung, in der Färberei, Bleicherei und zur Darstellung vieler chemischen Präparate.

Da die Soda oft sehr geringhaltig an kohlen-saurem Natron und in einzelnen Fällen das Natron besser zu verwenden ist, als das Kali, so hat man sich schon im vorigen Jahrhundert Mühe

gegeben, das Natron aus dem Kochsalze, das überall so häufig vorkommt, in reinem oder kohlensaurem Zustande abzuscheiden. Namentlich Frankreich, das arm an Holz ist und nur geringe Soda produzierte, hat, da während der Revolution die Einfuhr der natürlichen Soda verboten war, einen Aufruf an alle französischen Chemiker ergehen und sie einladen lassen, geeignete Methoden anzugeben zur Fabrikation der Soda aus dem Kochsalze. Es wurde viel versucht; Scheele hatte schon die Zersetzung des Kochsalzes mit Aetzkalk angegeben, da das an alten Mauern auswitternde kohlen saure Natron auch durch Einwirkung salzhaltigen Wassers auf den Kalk des Mörtels entsteht, Chaptal schlug die Zersetzung des Kochsalzes mit Bleiglätte vor und so wurden noch verschiedene Methoden angegeben, die aber alle theils nur eine sehr unvollkommene oder langsam vor sich gehende Zersetzung des Kochsalzes bewirkten, theils auch zu kostspielig waren. Endlich wurden diese Versuche doch mit Erfolg gekrönt; ein französischer Wundarzt, Namens Leblanc, entdeckte Ende des vorigen Jahrhunderts eine Methode, mittelst welcher das Kochsalz durch billige Materialien vollständig zersetzt wird und die daher auch geeignet war, im Grossen ausgeführt zu werden und sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Es geschieht dieses durch Verwandlung des Kochsalzes mit Schwefelsäure in schwefelsaures Natron oder Glaubersalz und Umsetzung dieses Salzes durch Glühen mit kohlen saurem Kalk und Kohle in Schwefelcalcium und kohlen saures Natron.

Beide Zersetzungen geschehen in Reverberiröfen; es werden auf 2 Atome Glaubersalz 3 Atome kohlen saurer Kalk und 8—10 Atome Kohle genommen, es bleibt dadurch 1 Atom Kalk unzer setzt, der mit dem gebildeten Schwefelcalcium eine im kalten Wasser unlösliche Verbindung eingeht, wodurch also aus der geschmolzenen Masse, die früher als rohe Soda in Handel kam, das kohlen saure Natron mit kaltem Wasser ausgelaugt werden kann; dabei lösen sich aber auch, da die Umsetzung nie so ganz genau vor sich geht, immer etwas Schwefelnatrium, Aetznatron, unzer setztes Kochsalz und Glaubersalz mit auf; jetzt wird diese rohe Soda gleich in den Fabriken gereinigt und kommt entweder kry-

stallisirt oder entwässert in verschiedenen Graden der Reinheit in den Handel.

Die Erfindung der Darstellung der künstlichen Soda war ein grosser Hebel für die Industrie und wird gleich der schon ein halbes Jahrhundert früher im Grossen ausgeführten Erzeugung der Schwefelsäure durch Verbrennen des Schwefels stets denkwürdig bleiben in den Annalen der Geschichte der Chemie, so wie diese uns eine wohlfeile starke Mineralsäure verschafft hat, so verdanken wir jener ein wohlfeiles Alkali. Die künstliche Soda hat daher gar bald die natürliche, wovon die beste aus Spanien kam, verdrängt und während bei uns wenigstens die Pottasche das wohlfeilere Alkali war, wurde es jetzt umgekehrt und statt Pottasche kam jetzt vielfach Soda, als billiger, in Anwendung, z. B. zur Fabrikation der Seife und des Glases. In Bleichereien, Kattundruckereien und chemischen Fabriken aller Art hat man oft ein Alkali nöthig, wo es ganz gleich ist, ob man Kali oder Natron nimmt, wo man jetzt immer Natron anwendet, was noch den Vortheil hat, dass man, trotzdem es billiger ist, auch weniger braucht, da das Natron ein kleineres Mischungsgewicht hat, so dass man, wozu 13 Pfund kohlen-saures Kali nöthig sind, mit 10 Pfund kohlen-saurem Natron ausreicht. Spanien hat durch diese Erfindung freilich auf einmal einen Industriezweig, der ihm jährlich wenigstens 20 Millionen Franken eintrug, unwiederbringlich verloren.

Nach dieser Erfindung sind noch andere Methoden, das Glaubersalz in Soda umzuwandeln, versucht und auch ausgeführt worden; so wird z. B. nach Prückner das Glaubersalz durch Glühen mit Kohle in Schwefelnatrium verwandelt und dieses durch Behandlung mit Kupferoxyd in Schwefelkupfer und Aetznatron zersetzt; nach Kopp leitet man durch das trockne Schwefelnatrium Kohlensäuregas und Wasserdampf, wodurch unter Entweichen von Schwefelwasserstoff sich kohlen-saures Natron bildet, immer aber kam man wieder auf das Leblanc'sche Verfahren als das vortheilhafteste zurück.

Seit 3 Jahren macht ein ganz neues Material zur Sodafabrikation Epoche, dieses ist ein Mineral, das in Grönland vorkommt, der Kryolith. Dieses Mineral war bis vor wenigen Jahren noch

eine Seltenheit und hatte nur durch seine Zusammensetzung die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich gezogen; es besteht nämlich aus 1 Atom Fluoraluminium und 3 Atomen Fluornatrium ($\text{Al}^2\text{F}^3 + 3\text{NaF}$). Rose zeigte zuerst 1855, dass sich durch Zusammenschmelzen mit Natrium leicht daraus das Aluminium-Metall darstellen lasse. Die Aluminiumfabrikanten bedienten sich alsbald dieser einfachen Methode und man fand jetzt, dass dieses bisher so seltene Material in Grönland in collosalen Lagern vorkommt und die Ausbeute überstieg bei weitem den Bedarf der Aluminiumfabrikanten. Man dachte daher an eine andere Verwerthung, nämlich das Natron als Soda oder Aetznatron und die Thonerde als schwefelsaure Thonerde daraus darzustellen. Thomson in Kopenhagen hatte sich schon vor Rose auch mit diesem Mineral beschäftigt und entdeckte 1850, dass es auf nassem und trockenem Wege leicht durch Kalk zersetzt wird, es bildet sich unlösliches Fluorcalcium und leicht lösliches Natronaluminat, welches so gut wie Natronlauge die Fette verseift, wesshalb die Seifensieder die erste Anwendung davon machten; in der neuesten Zeit aber entstanden in Kopenhagen und Harburg grossartige Fabriken, die daraus Soda und schwefelsaure Thonerde darstellen. Das feingemahlene Mineral wird mit 6 Atomen kohlensaurem Kalk (Kreide) in einem Flammofen geglüht und die erhaltene poröse Masse mit Wasser ausgelaugt. In die erhaltene Thonerde — Natronlauge leitet man das Kohlensäure-Gas, das sich durch die Zersetzung des Kryoliths mit dem kohlensaurem Kalk bildet, und von den Flammöfen durch einen Ventilator aufgesaugt wird; dadurch erhält man eine ganz reine Lösung von kohlensaurem Natron und ebenfalls ganz reines Thonerdehydrat schlägt sich nieder. Die Lösung liefert eingedampft eine sehr reine Soda und die Thonerde löst sich im Hydratzustande sehr leicht in Schwefelsäure und liefert durch Eindampfen eine schwefelsaure Thonerde, die als ganz eisenfrei für die Färberei von grossem Werthe ist.

Weniger glücklich als beim Natron war man bis jetzt mit dem Kali gewesen, das auch in ungeheurer Menge im Mineralreich vorkommt, da es einen Bestandtheil des Feldspath und

Glimmers ausmacht, die mit Quarz die verbreitetsten Felsarten, den Granit und Gneis zusammensetzen, und ausserdem auch noch in vielen andern Mineralien. Aber in allen diesen Gesteinen ist das Kali als schwerlösliches Silikat enthalten und mit andern Erdsilikaten verbunden, die sich nur durch Glühen mit andern Basen aufschliessen und zersetzen lassen. Die unorganische Natur bietet uns daher kein Material dar, aus dem wir direkt das Kali gewinnen könnten, sondern die Vegetation ist die Vermittlerin, die es dem Mineralreich entzieht und es uns bietet. Wenn wir nämlich die Pflanzen verbrennen, so bleibt die Asche zurück und diese enthält die mineralischen Bestandtheile der Pflanzen, unter diesen auch das Kali und den Theil, der mit organischen Säuren verbunden war, jetzt im kohlensaurem Zustande. Die Darstellung dieses Alkalis ist daher dieselbe noch, wie sie in den frühesten Zeiten war, durch Auslaugen der Pflanzenasche und Glühen des durch Eindampfen erhaltenen Salzlückstandes erhält man die Pottasche, aus der man durch Behandeln mit wenigem Wasser das leicht lösliche kohlensaure Kali von den schwerer löslichen fremden Salzen, die auch in den Pflanzen enthalten waren, trennen und im reineren Zustande erhalten kann.

Möge diese kurze geschichtliche Darstellung zeigen, wie es der Wissenschaft und Industrie gelingt, die im Schoos der Erde verborgenen Schätze auszubeuten und sich nutzbar zu machen.

Assam, das mittlere Stromgebiet des Brahmaputra.

Von

Hermann von Schlagintweit,

Ehrenmitglied der naturforschenden Gesellschaft, correspondirendes Mitglied der
Academien von München, Madrid, Lissabon, der kais. leopold.-carol. Academie,
der British Association, der geographischen Gesellschaften von Berlin, Paris,
St. Petersburg, Wien etc.

Vorgetragen am 20. October 1863.

Ihre freundliche Einladung, die Vorträge über naturwissenschaftliche Gegenstände in Ihrem Vereine heute zu eröffnen, gereicht mir zur besonderen Auszeichnung. Da in Ihrem Kreise ernstes Studium und nicht weniger selbständiges Forschen trefflich vertreten sind, glaubte ich am besten einen Gegenstand zu wählen, der in geographischer Beziehung ein nicht zu ausgedehnter ist; es wird mir diess Gelegenheit bieten, mit der Darstellung der topographischen Formen auch die Erläuterung mancher physicalischer Verhältnisse zu verbinden. Assam, das ich heute versuchen werde zu schildern, kann als das mittlere Stromgebiet des Brahmaputra bezeichnet werden. Die Flüsse der Tropen sind wegen der grösseren Mächtigkeit atmosphärischer Niederschläge von überraschenden Dimensionen, und es entwickelt sich längs ihrer periodisch befeuchteten Ufer der Vegetationscharakter jener Zonen mit besonderer Deutlichkeit; Assam ist überdiess auch seitlich durch Regionen begrenzt, die ein mehr als gewöhnliches Interesse bieten. Auf der rechten Thalseite zieht sich in nordöstlicher Richtung der Himalaya entlang, der gerade hier viel des Neuen, noch viel des Unerforschten auch in seinen Ausläufern mir geboten hat. Auf der linken Thalseite, fast parallel mit dem Rande des Himalaya, ist das Thal durch die Hügelländer der Garro-Khassia- und Nagaländer begrenzt, die Ursitze von Racen, die

in Sprache und Sitte nicht weniger als in Körperform wesentlich von den Bewohnern Indiens sich unterscheiden.

Assam erstreckt sich von $25\frac{1}{2}^{\circ}$ nördlicher Breite bis 28° , und von 90 bis $96\frac{1}{4}^{\circ}$ östlicher Länge von Greenwich; der Flächeninhalt des Gebietes ist etwas über 22000 engl. Quadrat-Meilen¹⁾, desto mehr überrascht es, wie gering die Verschiedenheit der Terraingestaltung dieses Gebietes ist²⁾. Welche Mannigfaltigkeit bietet bei gleichen Dimensionen jeder Theil des mittleren Europa, selbst wenn wir dabei nicht die Gebiete der Alpen mit eingeschlossen denken. Hier ist Alles ein einziger, riesig breiter Saum längs der Ufer, der sich nicht nur in seiner Form, auch in den Sand- und Thongebilden, wie sie noch jetzt im Flusse selbst stetig ihre Lager verändern, als die Anhäufung niedergesunkener Gesteine und Suspensionen erkennen lässt, von einer Mächtigkeit, wie sie vielleicht ausser längs der amerikanischen Ströme wohl nirgends sich wiederholt.

Die Aufstauung eines seichten Binnensees, dem die tropischen Regen die Abwaschungen von ausgedehnten Gebirgen längs der beiden Seiten zuführten, kann als die erste bestimmte Form in der geologischen Periode der Jetztzeit gedacht werden; und während die allmählig immer tiefer sich einschneidende Erosion ihn alljährlich entleerte, hatten sich auch in dem nun offen gelegten Thale eine Menge von Seitenflüssen des Brahmaputra eingeschnitten, die jetzt die Zahl von nicht weniger als 62 erreicht haben, selbst wenn wir nur jene Flüsse einschliessen, die schiffbar und durch ihr Austreten bemerkbar sind. Nachdem der Brahmaputra sie aufgenommen, führt er sie seinem mit dem Ganges gemeinschaftlichen Delta zu.

Die Breite des Stromes in seiner jetzigen Gestalt ist sehr

¹⁾ Bayern hat etwa 32000 solcher Meilen.

²⁾ Es wurden zur Erläuterung vorgelegt: 1 grosse Manuscriptkarte in 3 Folioblättern; ein Flussprofil und die Originale von 10 Panoramen und Ansichten, theils in Oel, theils in Aquarell von H. v. S. ausgeführt. Mehrere derselben werden im Atlas zum 4. Bande de „Results of a scientific Mission to India and High Asia“ erscheinen.

verschieden. In der Nähe von Tezpur bietet sich eine jener Ansichten, die ihn in seiner grössten Breite zeigt; sie beträgt hier beinahe 25 englische Meilen, wobei allerdings grosse Massen von Inseln, theils mit Vegetation bedeckt, theils unmittelbare Sandablagerungen, die einzelnen Arme des Flusses trennen. Etwas oberhalb Gohatti, der Hauptstadt von Assam, fand ich einige der schmalsten Stellen, wo die ganze Wassermenge zwischen Uferländern von nicht ganz einer engl. Meile Entfernung zusammengedrängt ist, wobei auch die Tiefe in entsprechender Weise vermehrt ist.

Die Anzahl der Bevölkerung ist verhältnissmässig sehr gering; sie beträgt nur 710000 Seelen mit Einschluss selbst einiger sehr wilden und kaum noch als Assamesen zu betrachtenden Völkerstämme längs der beiden Ufer; verglichen mit einem Terrain von derselben Ausdehnung im mittleren Deutschland liessen sich wenigstens 3—4 Millionen erwarten. Die Bewohner sind (mit Ausnahme von etwa $\frac{1}{6}$) Hindus, und zwar Hindus, welche jedem civilisirenden Einflusse der Europäer so lange fremd geblieben sind, dass sie noch sehr viel des Belehrenden über den ursprünglichen Cultus der Hindus geben können. Ich hatte Gelegenheit, das Land und seine Bewohner während eines längeren Aufenthaltes 18^{55/56} kennen zu lernen; ein europäischer Lieutenant, Mr. Adams, war mir als Begleiter zugetheilt worden, der Anfangs nur wenig von meinen eigenen Routen sich entfernte, später aber, als er die Art der Beobachtungen mehr kennen gelernt hatte, auf der Seite der Naga-Gebirge in nordwestlicher Richtung das Terrain untersuchte. Bei Erwähnung der Bevölkerung ist ganz besonders hervorzuheben, dass dem Saume des ganzen Gebietes entlang wilde Völkerstämme sind, die von jeher den Hindus grosse Schwierigkeiten machten durch räuberische Einfälle und rohe Plünderungen, was zugleich in unerwarteter Weise und zum grössten Nachtheile für sie selbst wesentlich dazu beigetragen hat, dass das ganze Land sich unter englischer Oberhoheit befindet. Die ersten positiven historischen Nachrichten, die wir über Assam besitzen, reichen nur bis 1770, wo zum erstenmal die Hindu Paschas, zunächst durch Streitigkeiten mit den kleinen Seitenlinien des Fürstenhauses veranlasst, die Hilfe der englischen Nachbarn beanspruchten; den

Einfällen der Mongolischen Dynastieen scheinen sie stets mit grosser Energie widerstanden zu haben. Die Versuche zur Wiederherstellung der Ruhe durch die englische Vermittlung war nur von geringem Erfolge. 1815 wurde der Herrscher von seinem Minister vertrieben und er flehte nun den Schutz des birmanischen Reiches an. Dieses ist nur durch ein sehr grosses Hügelland getrennt und das Thal des Iravádi ist im obern Theile vom Gebiete des Brahmaputra so wenig entfernt, dass eine Zeit lang der Brahmaputra als der obere Theil des Iravádi bezeichnet worden ist, was aber bereits 1826 die Untersuchungen von Wilcox als unrichtig nachgewiesen haben. Die birmanische Regierung setzte die Paschasfamilie wieder ein, es brachen aber neue Unruhen aus und 1820 waren es die Engländer, die sich ihrer Nachbarn annahmen und den Fürsten wieder auf den Thron setzten. Aber, wie sie sich bald überzeugen mussten, „verstand er gar nicht zu regieren“. Er machte den Engländern immer mehr Schwierigkeiten, so dass sie ihn 1826 wieder absetzten und das Land von dieser Zeit bis heute eine Provinz des indo-britischen Reichs bildet. Ich glaube, dass — abgesehen von der Rechtsfrage des Besitzes — den Bewohnern damit nur geholfen ist, denn es ist nicht zu leugnen, dass unter der englischen Herrschaft die gleichmässige Vertheilung der Steuern, das positive Eigenthumsrecht, die Berechtigung auch der Privaten zur Ausübung von Handel, Bergbau und Bodencultur — dass alles diess unter der englischen Regierung mit viel mehr Billigkeit und Gerechtigkeit behandelt wird, als es unter der Regierung eingeborner Fürsten geschieht. Ja, die factische Ausübung der englischen Principien findet eine der wesentlichsten Schwierigkeiten gerade im Character der Eingebornen. Es ist unvermeidlich, Eingeborne als untergeordnete Beamte, als Schreiber und Steuereinnehmer anzustellen und gerade diese sind es, deren Bestechlichkeit und Ungerechtigkeit der englischen Regierung mehr Schwierigkeiten macht, als etwa der Widerstand der Eingebornen gegen die Principien der Verwaltung.

Die Casten der Hindubevölkerung sind auf beiden Seiten des Stromes dieselben; zwar ist er so gross, dass noch nie eine Brücke, auch keine Schiffbrücke die Ufer verbunden hat, aber

Flüsse sind überhaupt fast nirgends eine Racengrenze zwischen den Bewohnern ihrer Ufer gewesen; im Gegentheile, den Strömen folgte fast überall das allmähliche Ausbreiten der Stationen zu beiden Seiten des Thales; in nicht zu grosser Entfernung davon können dagegen die Verschiedenheiten bedeutender werden. So auch hier. Die beiden Gebirgsränder sind der Sitz höchst eigenthümlicher und zugleich unter sich sehr verschiedener Racen, deren Studium für die Ethnographie von höchstem Interesse, aber nicht ohne Schwierigkeit ist. Ihre Namen sind auf der östlichen Seite die Abors, Singphos, Mishmis, Akhas, welche zum Theil jenen schmalen Saum bewohnen, der als das Sumpfgebiet, die Tarai, das Himalaya bekannt ist. Eine andere Gruppe, bedeutend zahlreicher, ist über ein grösseres Terrain auf der südöstlichen Seite vertheilt. Dies sind die Garros, Dschaintias, Khassias, Nagas. Besonders die ersteren Racen sind, wie nur noch wenige andere Bewohner der Erde, wirklich Wilde. Sie haben keinen geregelten Wohnsitz, sondern benützen Blockhäuser, Verschanzungen, Höhlen, Steine, Geflechte von Bambus- und andern Gesträuchen als Wohnung, in einem gemeinschaftlichen Raume für Menschen und Vieh; auch sind sie, was für dieses Terrain wegen der ziemlich kühlen Winter nicht auffallend genug sein kann, beinahe ganz ohne Bekleidung. Selbst die Frauen sind nur sehr wenig bedeckt. Die Männer tragen meist nur einen Strick um die Hüften und etwa ein Gehänge um den Hals, dazu kommen bisweilen noch Schmuckgegenstände und Waffen. Unter den ethnographischen Gegenständen meiner Sammlungen sind gerade die Objekte, die es mir gelang, von diesen Völkern mir zu verschaffen, auch durch ihre Formen sehr eigenthümlich. Da bereits im vorigen Sommer die Gesellschaft den Besuch der Sammlungen, die sich jetzt auf der Jägersburg befinden, zum Gegenstande einer gemeinschaftlichen Excursion gewählt hatte, darf ich wohl hier an einige der Einzelheiten erinnern. Besonders ungewöhnlich in ihren Formen sind die Ohrgehänge, bei denen die Durchbohrung des Ohrläppchens bis zu einem Durchmesser von mehr als einem Zolle allmählig erweitert wird; eine andere Eigenthümlichkeit sind die Gegenstände zur Kopfschmückung; es sind darunter auch einige aus Sil-

berblech, roh getrieben, einer Krone nicht unähnlich. Die Analogie ihrer Form mit jenen Reifen aus Bambus und Holz, die ebenfalls um den Kopf nicht als Schutz gegen Sonne und Regen, sondern als Schutz gegen Verletzungen getragen werden, lässt mit grosser Wahrscheinlichkeit erkennen, dass hier, wie in vielen europäischen Formen, die Krone weniger eine Modifikation des Huttes, als eine Verfeinerung der ursprünglich schützenden Stirnreife gewesen ist.

Die Zahl der Individuen all dieser wilden Stämme wird 4000 bis 5000 nur wenig übertreffen, und überdiess werden sie wohl bald ganz verschwinden. Wo immer Civilisation und solche ursprüngliche rohe Formen sich berühren, ist zum Theile ein Kampf, durch Einfälle hervorgerufen, unvermeidlich, zum Theile ist ein Zurückziehen der Aboriginer die Folge, wobei Klima und unvollkommene Ernährung nicht weniger zerstörend einwirken, — so dass die höheren Racen der Vorwurf gewaltsamen Uebergreifens nicht ganz so strenge trifft, als man zunächst erwarten könnte.

Die geologischen Verhältnisse dieses Terrains liessen mich nur wenig von Bedeutung erwarten; die Neigung des Thales ist nur eine sehr geringe und dabei gleichförmige. Von Sadiya, an der oberen Grenze des mittleren Stromgebietes und über 1000 Meilen vom Meere entfernt, fällt der Fluss während des ganzen Laufes bis zum Beginne des Deltas nur 200 englische Fuss; aber die Erhebungen im Thale selbst sind herrliche Granitmassen, die besonders dadurch von Interesse waren, weil sie sich hier am östlichen Saume des Himalaya in sehr geringer Entfernung von seiner Basis wiederholen, während im ganzen übrigen Himalaya oder in Tibet Granite nirgends wieder auftreten. Die Form der inselartigen Felsenmassen und ihre Vertheilung berechtigen zu der Erwartung, dass die ganze Basis des Brahmaputra-Thales in nicht sehr bedeutender Tiefe unter der Decke der neuesten Flussablagerungen aus solchen Gesteinen gebildet ist. Auch die Formen dieses Granites sind ebenso wie in Europa häufig halbkugelförmige Hervorragungen mit schaaliger Absonderung. Im obern Theile von Assam findet man, was für diese Provinz sehr wichtig ist, reiche lateritartige Eisenerze zu beiden Seiten des Flusses.

Die Gegend besitzt auch sehr viele Braunkohlen (aber nicht Steinkohlen) am Rande des Himalaya.

Unter den Gegenständen, welche auf die äussere Gestalt eines Landes von besonderem Einflusse sind, müssen vorzüglich die Vegetations-Verhältnisse hervorgehoben werden. Der Charakter derselben ist in den verschiedenen Theilen von Assam sehr wechselnd; bald zeigen sich im Stromgebiete selbst eine Menge dünenartiger Sandbänke, mit rohrartigen Gestrüppen bedeckt; andere Theile bieten reich bebaute Fluren, durch riesige Waldgruppen getrennt. In den Wäldern sind besonders der Tikbaum, (die *Tectonia*), der Sissubaum und eine *Dalbergia* für den Handel wichtig. Manches, was die Tropen durch seine, von unserer Vegetation auffallend verschiedene Form charakterisirt, beginnt bereits in Assam etwas seltener zu werden; die Cocus- und Dattelpalme bilden hier keine ausgedehnten Gruppen mehr, sie werden selbst nur selten gepflanzt. Die Betelnuss ist häufiger; auch die grossen indischen Feigenbäume, an denen durch ihre herabhängenden Luftwurzeln zahlreiche neue Stämme sich bilden (die *Ficus religiosa*), findet man, besonders in der Nähe grösserer Bauten, die mit Hindukultus des Liebesgottes Kama verbunden sind. Laubbäume haben aber stets eine gewisse Aehnlichkeit des Typus, dass sie das landschaftliche Bild im Allgemeinen, ungeachtet aller individuellen Verschiedenheiten den Charakter weniger ändern, als man erwarten sollte. Unter den wesentlich neuen Formen Assams, für die Europa keine Analogen hat, ist besonders die *Caryota urens*, eine Art von Sagopalme, hervorzuheben. Ihre Krone reicht selten über 40 Fuss vom Boden; erst bei 25 bis 30 Fuss beginnend hat sie die Form eines Kohles, eines Bündels von riesigen Blättern, die in zarte Ausläufer sich theilen und garbenartig sich niederbeugen; den Nahrungsstoff erhält man durch Trocknen des körnerartigen Markes. — Die nicht cultivirten Flächen sind am häufigsten von niedrigem Unterholze bedeckt; bisweilen sind es meilenweit die Verästelungen einer einzigen Species von *Calamus* oder *Bambus*, welche den Dschangel bilden. Solche Formen sind etwa mit den Schilfrohrgruppen an einigen unserer Alpen-Seen zu vergleichen, aber nicht nur ihre Ausdehnung, auch die Dimensionen der

einzelnen Pflanzen sind in unerwarteter Form vergrössert. Dabei sind die einzelnen Rohre mit grosser Regelmässigkeit, 1 bis $1\frac{1}{2}$ Fuss von einander abstehend. Der Boden ist ohne allen Unterwuchs und frei von abgefallenem Laube, weil dieses durch die Ueberschwemmungen während der Regenzeit immer wieder mit neuem Schlamme bedeckt wird. In den grösseren Wäldern ist das Bild so verschieden als möglich von dem Charakter des Rohr-Dschungels, da der Boden so dicht mit Gras und Farren und Unterholz bedeckt, dass man die Riesenstämme des Waldes gewöhnlich nur von einem Hügel herab oder von den Gipfeln eines Baumes in ihrer vollen Grösse beurtheilen kann. Diese Wälder bieten auch noch ein anderes grosses Interesse dadurch, dass sie die Herberge zahlreicher und sehr verschiedener Thiere sind, von dem grössten herab bis zu dem kleinsten. Ein vortreffliches Terrain für zoologische Studien und zugleich das schönste Gebiet für grosse und reichlich belohnende Jagden.

Die Jagd auf die Raubthiere sowohl als auf die grössten Büffelarten ist eine der anregendsten, die vorkommen kann; sie wird auf Elephanten ausgeführt, auf welche man eine Art von hohen Lehnstuhl setzt, auf dem auch viele Gewehre schussfertig aufgerichtet sind. In den meisten Fällen kann man bis zum Momente des Angriffes kaum beurtheilen, was sich zeigen wird. Man hört gewöhnlich nur ein kurzes, fluchtartiges Geräusch, denn auch der Tiger entweicht immer lieber als er angreift, und erst wenn er durch einen Graben oder zu festes Dickicht an schneller Flucht sich gehindert sieht, kehrt er sich, wie auch der Büffel, angreifend gegen den Elephanten, und es ist mitunter keineswegs gleichgültig, welches die Erfolge des Schiessens sind, und wie die Ruhe des Elephanten den Jäger unterstütze. Besonders wichtig ist es, dass der Elephant nicht zu aufgeregt sich zeige, um dem Thiere keine Blössen zum Angriff zu bieten.

Unter den grösseren Thieren sind vor Allem die wilden Elephanten zu nennen. Im Allgemeinen sind sie in Indien jetzt selten geworden, da überdiess jeder Versuch einer Züchtung in Gefangenschaft bis jetzt ohne Erfolg geblieben ist. In Assam aber, besonders im nordöstlichen Theile, sind sie noch jetzt so häufig

dass sie mitunter selbst in die Ansiedelungen und Pflanzungen zerstörend einbrechen. Auch das Rhinoceros kommt bisweilen vor, aber nur in geringer Anzahl und niemals wie die Elephanten, zu grösseren Heerden vereinigt. Unter den rinderartigen Thieren trifft man einen schönen, kolossalen Büffel, *Bos Arni* und den Mitton, *Bos Gavaeus*, der ohne Muskelhöcker, unserem Auerochsen sehr ähnlich ist. Von hirschartigen Thieren fällt besonders der *Cervus hippelaphus* auf, nach dem Elenthier das grösste dieser Gruppe. In wunderbarem Contraste mit diesem findet sich hier am Saume des Himalaya ein Zwerghirsch, der nur die Höhe von etwas über einen Fuss erreicht. Von diesem hat auch das Männchen kein Geweih; ein ungewöhnlich zierliches Thierchen, das aber wegen seiner geringen Widerstandsfähigkeit gegen Raubthiere rasch ausgerottet wird, wo immer die Wälder beginnen, gelichtet zu werden. Charakteristisch für Assam sowohl als für Indien im Allgemeinen ist das Auftreten des Tigers und einiger Leopardarten, das sehr häufig vorkommt; die Angriffe gehen gewöhnlich von sicherem Hinterhalte aus; viele Hausthiere, auch einzelne Feldbauer und Reisende unterliegen dem Tiger in bedentenderer Zahl, als man erwarten sollte; dagegen haben grössere Gruppen von Reisenden gewöhnlich nichts zu fürchten, oder nur dann, wenn man mit Waffen ihn angreift.

Zur Vervollständigung des allgemeinen Bildes jeder von uns fremden Region ist auch die Charakteristik ihrer meteorologischen Verhältnisse gewöhnlich nicht weniger bezeichnend, als die Schilderung der landschaftlichen Formen; hier steht besonders die Regenmenge in unmittelbarer Verbindung mit der Wassermasse des Stromes. Die Regenmenge erreicht hier eine auch für tropische Regionen mehr als mittlere Grösse. In Europa beträgt sie im Jahre gewöhnlich 20 – 30 Zoll, in Assam erreicht dieselbe etwas über 80 englische Zoll, und dem ganzen Fusse des Himalaya entlang ist der Niederschlag, der etwas über 100 Zoll angenommen werden kann, mehr als das Dreifache des mittleren Europa. Die Wassermenge in Brahmaputra ist daher, namentlich auch wegen der auf dem Himalaya schmelzenden Schneemassen, eine sehr bedeutende, und es war mir besonders wichtig, die Wassermenge durch direkte

Messungen zu bestimmen. Das Princip ist zwar ein sehr einfaches, aber bei der Ausführung in einem so grossen Flusse immerhin nicht ohne Schwierigkeit, wenn man mit Zuverlässigkeit und Genauigkeit verfahren will. Um die Wassermenge eines Flusses zu bestimmen, misst man zuerst die Breite, dann werden Sondirungen gemacht, die Tiefen bestimmt, und die Fläche des Durchschnittes berechnet, aus den Sondirungen und ihren Entfernungen unter sich; nachdem die Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen bestimmt ist, wird ihr mittlerer Werth mit der Fläche des Durchschnitts multiplicirt. Der daraus berechnete Cubikinhalt gibt dann die Wassermenge auf einen Zeittheil, z. B. eine Sekunde bezogen. Die Fehler bei einer solchen Berechnung sind um so geringer, je tiefer der Fluss, je gleichmässiger und schneller sein Lauf. An seichten Stellen, wo die Geschwindigkeit sehr ungleich modificirt ist, wird überhaupt nur ein weniger genaues Resultat zu erreichen sein. An der Stelle in der Nähe von Gohatti, wo ich die Wassermenge bestimmte, um eine möglichst enge, aber gleichförmige tiefe Stelle des Flusses benützen zu können, war die Breite des Flusses 4951 engl. Fuss (5280 Fuss sind eine englische Meile) und die Tiefe in den mittleren Theilen betrug zwischen 53 und 54 englische Fuss. Die Geschwindigkeit ist geringer, als man vielleicht für einen Strom von solcher Grösse erwarten möchte; sie beträgt an dieser Stelle nur 7—9 Fuss in der Sekunde. Aber der Fluss hat hier, wo die Messung gemacht ist, nur eine Höhe von 120 Fuss über dem Meere, und sein ganzes Gefälle ist hier in seinem mittleren Theile bereits sehr gering. Die resultirende Wassermenge war für die Zeit des niederen Wasserstandes 318,200 Cubikfuss in der Sekunde und bei hohem Wasserstande 894,300 Cubikfuss in der Sekunde. Wie bereits erwähnt, ist unter solchen Umständen an eine Brücke über den Fluss nie zu denken gewesen und jetzt noch wird das Uebersetzen über den Fluss nur in Booten ausgeführt. Dies belebt ihn oft in sehr unerwarteter Form. Was solches Uebersetzen besonders vom europäischen unterscheidet, ist, dass gewöhnlich Elephanten zu einem grösseren Transporte gehören, die dann immer schwimmend die Boote begleiten, und die Stromschnellen in regelmässi-

ger Bewegung durchziehen; nur diess ist gefährlich für die Leute, welche auf dem Rücken der Elephanten als Führer sich befinden, dass die Thiere gerne ganz untertauchen, und dass die Führer vielfach die grössten Schwierigkeiten haben, es zu verhindern, und die Thiere in der gehörigen Ruhe zu halten, um so mehr, als gewöhnlich Alle es nachahmen wollen, wenn der eine oder andere der Elephanten zu tauchen begann.

Die Temperaturverhältnisse des Landes waren mir besonders dadurch von Interesse, dass diese Region an der nördlichen Grenze der tropischen Länder lag. Die Differenz der höchsten und niedersten Temperatur ist bedeutender, als die geringere Entfernung vom Meere es zunächst erwarten liess; dessenungeachtet nimmt Assam nicht mehr an jener heissen Jahreszeit Indiens Theil, die mit unserem Frühling zusammenfällt. In anderen Provinzen, von mehr continentaler Lage, z. B. in Hindostan, kommt dagegen die heisse trockene Jahreszeit noch in einer bedeutend grösseren nördlichen Breite vor. In Assam ist die mittlere Jahrestemperatur $23,7^{\circ}$ C.; zum Vergleich sei erwähnt, dass sie im centralen Deutschland nur 9 bis 10° C. erreicht. In der Winterszeit ist Assam verhältnissmässig kühl und für die Europäer ganz angenehm; die mittlere Temperatur der Wintermonate Dezember, Januar, Februar beträgt 16° ; im Frühling steigt sie rasch auf 24° , im Sommer auf 28° , im Herbst geht sie auf 20° zurück. Es ist für Assam besonders eigenthümlich, dass die Regenzeit schon im März beginnt, während diess im übrigen Indien erst gegen Juni der Fall ist. Diess ist auch die Ursache, dass die Monate der wärmsten Jahreszeit hier bereits wieder Monate unseres Sommers sind. Auch der Nebelmassen ist noch zu erwähnen; wenn lange andauernd, werden sie dem Gesundheitszustande sehr gefährlich. Besonders für die weniger durch Kleidung geschützten Eingebornen werden sie die Veranlassung zu heftigen, selbst epidemisch auftretenden Erkrankungen; für die Europäer ist wegen des Fiebers die gefährlichste Periode jene des ersten Trocknens nach den Ueberschwemmungen der Regenzeit.

Die Nebel, welche nicht selten dicht wie local gebannte

Wolken den Lauf des Flusses bezeichnen, verändern auch den Character des landschaftlichen Bildes in ganz eigenthümlicher Weise.

Auch hier begegnen wir wieder dem Einflusse der gewaltigen Fluth, welche für den Eingebornen den Strom zum Sohne des Brahma, für den Naturforscher ganz Assam zum Ufergebilde des Brahmaputra macht.

Die Steinkohlen und unsere fossilen Brennstoffe.

Ein Stück zur Bildungsgeschichte unserer Erde mit
culturhistorischen und ökonomischen Streiflichtern.

Vortrag, gehalten in der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg
am 28. October 1862

von

Carl Clauss,

Berg- und Hüttendirector a. D. und Grosshändler in Nürnberg.

Bei meiner langjährigen Wirksamkeit im Gebiete der Montan-Industrie, der ich auch fortan meine vermittelnde Thätigkeit widme, habe ich gern alle Gelegenheiten wahrgenommen, nicht bloß in die Wesenheit wichtiger, mineralischer Vorkommnisse einzudringen, sondern auch von der Wesenheit rückwärts über deren Entstehungsweise nachzudenken. In so weit ich dadurch zu genügenden, thatsächlich zu belegenden Resultaten gelangte, bin ich sich bietenden Veranlassungen gern gefolgt, dieselben vor das Forum der Wissenschaft zu bringen, stets bereit, richtigeren Anschauungen der Kritik die meinigen unterzuordnen, aber auch hoch erfreut, wenn dadurch eine Anregung zu weiteren Forschungen gegeben worden war.

Möchte es mir gelungen sein, auch in unserem naturhistorischen Kreise das Interesse für geologische Forschungen durch vorliegende Abhandlung einigermaßen gefördert zu haben.

Unter Allen durch den Bergbau gewonnenen Mineralien gibt es ausser den Eisenerzen wohl keines, was den Aufschwung der Industrie und der Gewerbe mehr befördert, keines, was zum materiellen Wohl der Völker wesentlich beigetragen, keines, was ganze Länder und Völker reicher und mächtiger gemacht, sie auf

den Höhepunkt blühender Cultur empor gehoben hat als die Steinkohle.

Als Einleitung werfen wir einen Blick auf die Brennmaterialien im Allgemeinen; indem wir zunächst der vegetabilischen gedenken, deren bedeutender Verbrauch schon unsere Voralten auf die Benutzung solcher Brennstoffe hinführen musste, die wir, obschon unbezweifelt auch vegetabilischen Ursprungs, heute in der festen Kruste unseres Planeten als Fossilien wiedertreffen, und die wir, darunter deren wichtigste und werthvollste Gattung die Steinkohlen, genauer zu betrachten Gelegenheit nehmen wollen.

Wie die Cultur der Menschheit auf ihrer grossen dem Laufe des Sonnenlichts folgenden Wanderung von Ost nach West gewisse Pflanzen, — die Cerealien, den Wein u. s. w. — zu Begleitem hatte, die dankbar der Generation, die sie pflegt, ihre Früchte darbringen, so werden von der Civilisation gewisse andere Pflanzengeschlechter angefeindet, die zu ihrer Entwicklung bis zur Nutzbarkeit mehrerer Menschen-Alter bedürfen.

Diese Bedrängten sind diejenigen der edlen Bäume, welche unsere schönen Nadel- und Laubholzwälder bilden.

In wälderreichen Ländern sahen wir die Cultur erblühen, und kahl wie Aegypten, Palästina, der Pelepones, die ausonische und iberische Halbinsel verlässt sie dieselbe wieder, wenn sie zu andern Nationen hinüber wandert.

Die Cultur ist an die gemässigte Zone gebunden, in der sich die negativen und positiven Bedingungen für die höchste Entwicklung der geistigen Fähigkeiten vereinigen. In dieser Zone bedarf der Mensch des Holzes zur Herstellung seines festen Obdachs, zur Bereitung seiner Speisen, vor allem aber zur Erwärmung der Räume, in denen er sich während eines mehr oder minder bedeutenden Theils des Jahres aufhält. Er bedarf des Brennstoffs zur Gewinnung der Metalle, zur Bereitung der Gefässe des täglichen Gebrauchs, des Glases und der meisten jener tausend Dinge und Geräthe, welche schon vor 2000 Jahren römische Kunst und Industrie berühmt machten, und jener abertausend Gegenstände, die

wir heute in den Krystallpalästen industriellen Fortschritts bewundern müssen. Consumirte aber schon das Leben und Schaffen jener Völker weit mehr vegetabilischen Brennstoff, als ihre Länder hervorzubringen vermochten, so dass die Wälder allmählig verschwanden, so musste das Missverhältniss zwischen Brennstoffproduction und Verbrauch immer prägnanter und Besorgniss erregender hervortreten, je dichter die Bevölkerung der civilisirten Welt wurde, je rascher sie die sich immer mehrenden Producte der Industrie consumirte, je höhere Anforderungen sie an die Leistungen derselben stellte.

Aber die Weltregierung hatte in ihrer unerforschlichen Weisheit auch für diesen Fall Vorsorge getroffen, indem sie der Menschheit in einer einst untergegangenen, verschütteten, scheinbar versteinerten, ja sogar in der noch heute untergehenden, vermodernenden und auf ihren Gräbern wieder rastlos neues Leben entwickelnden Vegetation tausend- und abertausendfach den Brennstoff wieder ersetzte, den sie bis dahin der edleren Vegetation auf der Erde, den üppigen Ur- und Hochwäldern entzogen hatte.

Diese gewissermassen den Uebergang vom Stein- zum Pflanzenreich vermittelnden fossilen oder mineralischen Brennstoffe lassen sich unter Zugrundelegung ihrer Bildungsperioden in zwei Gruppen:

fossile Brennstoffe aus der geschichtlichen, und
solche aus vorgeschichtlicher Zeit sondern.

Die erste Gruppe umfasst also alle mineralischen Brennstoffe, deren Entstehung in eine im Bereiche der Geschichte liegende Zeitperiode oder in die Gegenwart fällt. Zu ihr gehört fast ausschliesslich der im Alluvium und den Bildungen der Neuzeit vorkommende Torf, ein Product der nassen Vermoderung von Sumpfpflanzen oder anderer auf feuchtem Boden gedeihender Gewächse, Algen, Moose, Flechten u. s. w.

Seine Bildung erfolgt in den sogenannten Torfmooren noch heut zu Tage, überall da, wo stagnirende, — von undurchdringlichen Gebirgsschichten aufgehaltene — Wasser, nicht zu hohe Temperatur und eine entsprechende die Organe zur Fortpflanzung liefernde Schicht solcher Pflanzen vorhanden

sind. So gewahrt man in Torfmoren der Umgegend von Greifswalde in Pommern ganz deutlich, dass an derselben Stelle, an welcher heute Torf gestochen wird, schon früher eine Gewinnung stattfand. Das Torfmoor zu Alt-Warmbruch bei Hannover wird jetzt zum zweiten Male abgestochen, nachdem in den letzten 3 Jahrzehnten eine 4–6' starke, neue Torflage entstanden war. Die Bildung anderer Torfmore kann aber schon vor mehreren Jahrhunderten begonnen haben und bei andern hat man auch innerhalb Jahrhunderten keine Nachbildung erkannt. Nur die in dem Torfe eingeschlossenen organischen Reste — animalische wie vegetabilische, von letzteren ganze Baumgruppen — und Erzeugnisse menschlicher Kunst und Industrie können einen Beweis für die Verschiedenartigkeit seines Alters liefern.

Jedenfalls erhöhen sich die Torfmore, in welcher Zeit aber eine Schicht Torf von einer gewissen Dicke gebildet wird, dafür haben sich Verhältnisszahlen bis jetzt noch nicht auffinden lassen, da offenbar die Entwicklung an verschiedenen Orten auch eine ganz verschiedene ist.

Die Mächtigkeit der Torflager variirt zwischen 2 und 40 Fuss.

Einzelne Torfmore zeigen deutliche Schichtung; bei andern erkennt man dieselbe nicht, die Masse erscheint wie gefilzt und nur schwache Linien von verschiedenen Farben auf den Bruchflächen bekunden ein succesives Nachwachsen.

Der Torf kommt unter höhern Breitengraden vor, in denen ein jährlicher Frost immer wieder das Wasser aus der neugebildeten Humussäure entfernt und so die Zersetzung derselben während eines bedeutenden Theils des Jahres vermindert.

Er findet sich in der Regel über Sand, Thon und Mergel meistens in Niederungen und hügelichen Gegenden in grossen, weiten Thalflächen zu Tage, unter dem Meeresniveau zuweilen mit 30' hohen Schichten von Thon und Schlamm bedeckt, oft aber auch auf den höchsten Stellen mancher Gebirge und auf Plateaus über Granit, Gneis, Grauwacke und Sandstein, so z. B. auf dem Schwarzwald in 3600' Meereshöhe, auf der hohen Veen

zwischen Eupen und Montjoie, in den Ardennen, auf dem Harze, in den Vogesen und auf dem Erzgebirge.

Die bedeutendsten Torfmore liegen in den norddeutschen Niederungen und den Marschländern, welche sich von Holland bis zur russischen Gränze hinziehen. Auch in Schottland gibt es weite Torfmore, welche zum Theil die letzten Ueberreste grosser Seen sein mögen, an deren Stelle sich zwar noch immer Wasser sammelt, aber nicht mehr in zureichender Menge, um der Verdunstung das Gegengewicht zu halten. Die Torf bildende Vegetation konnte daher dort kräftig gedeihen. Die in Virginien und Nordkarolina an der östlichen Küste Amerikas bekannten grossen Sümpfe, der Elend- und Alligator-Sumpf sind nichts weiter als Torfmore, in denen Torfmoos (*Sphagnum*) und Torfhaide (*Andromeda*) ein bedeutendes Uebergewicht über andere dort wachsende Pflanzen behaupten. Ebenso verdienen hier die mit Rennthiermoosen (Torfbildenden Flechten) bedeckten Steppen Sibiriens, die Tundras, der Erwähnung als unabsehbare Torfmore.

Norwegen und Schweden, Russland, die Donauländer, Belgien und Frankreich besitzen mächtige, ausgedehnte Torfmore, aber auch in Baden, Württemberg, der Schweiz und unserm Bayern kommen nicht unbedeutende More vor, aus denen Torf mit Nutzen gewonnen werden kann, dessen Gewinnung und Verwerthung besonders bei den in letzteren Ländern fühlbaren Steinkohlenmangel noch mehr Aufmerksamkeit als bisher verdient, wenn wir auch nicht verkennen dürfen, dass gerade in Bayern vielfache wichtige technische Fortschritte in dieser Beziehung gemacht worden sind, bei welchen wir uns an die Namen Exter und Weber, — welch Letzterer namentlich das Problem der Torfverkohlung trefflich gelöst hat, — dankbar zu erinnern haben. Wir wenden uns nun zur zweiten Gruppe, welche die Brennstoffe aus der vorgeschichtlichen Zeit in sich begreift, und verlassen, wenigstens in soweit es deren genetische Erklärung anlangt, den für die erste Gruppe, durch sinnliche Wahrnehmung vorgezeichneten, unfehlbaren Weg, um den wissenschaftlichen, durch Geognosie gebahnten und durch Paläontologie erleuchteten, aber

weniger sichern, scharfsinniger, oft auch gewagter Hypothesen zu betreten.

Ein rüstiges Voranschreiten auf diesem Pfade hat dem ersehnten Ziele näher gebracht. Allein wann, so möchte man bei jedem wissenschaftlichen Haltepunkt fragen, wann werden wir am Endpunkt unserer Forscherreise, wann vollkommen befriedigt dort angelangt sein? Gar viele geistvolle Mit- oder Vorpilger meinten schon oft, dieses Ziel erreicht zu haben, nach welchem es uns Geologen mit magnetischer Kraft hinzieht, allein keinem war es gelungen; denn das, was sie für das Ziel gehalten, war nichts weiter, als ein wissenschaftlicher Halt- oder Sammelpunkt. Für den Einen war es der Neptunismus, für Andere der Plutonismus und Vulkanismus, welchen sie entweder einseitig mit allen ihnen zu Gebote stehenden Vertheidigungsmitteln zu behaupten suchten, oder ihren Irrthum erkennend, wieder verliessen, um auf neu entdeckten Wegen vorwärts zu dringen. Keiner von Allen, die nun schon seit Jahrhunderten diesen Weg einschlugen, hat bis jetzt das wahre Ziel dieser Forscherreise erreicht, und keiner, der nur mit menschlicher Kraft begabt, wird jemals dahin gelangen und sagen können: „so und nicht anders entstand unsere Erde.“

Viele gelehrte Naturhistoriker, welche den vorbezeichneten Weg zur Bestimmung und Erklärung vorgeschichtlicher geologischer Vorgänge beschritten haben, sind hierbei meist den Wegweiser ihrer grossen Meister und Vorgänger, eines Werner, Humboldt, Buch u. s. w. in der Hand, diesen entweder unbedingt gefolgt, oder haben wirklich neue Gesichtspunkte aufgesucht, neu aufgefundenes Material sorgfältig zusammengetragen und unter Zurückführung ihrer neuen Beobachtungen auf die Annahmen Jener, deren Aufzeichnungen so weit ergänzt, dass die darauf gegründeten Hypothesen sich der Wahrheit zu nähern schienen.

Nur einige unserer bedeutenden Forscher im Gebiete der Geologie haben sich dabei eines natürlicheren Führers bedient, welcher sich ihnen in der Analogie der vorgeschichtlichen, mit den noch heute alle Tage unter unsern Augen erfolgenden geologischen Vorgängen darbot. Die Benutzung physikalischer Apparate, namentlich des Mikroskops in der Hand eines Ehrenberg u. A. und

die auf viele, ja die meisten Mineralien anzuwendenden Entdeckungen im Gebiete der Physik und Chemie, womit sich besonders Gustav Bischoff, Bunsen, Blum, Volger, Wöhler u. A. eingehend beschäftigt haben und welche der Erstere in seinem Meisterwerke „chemisch-physikalische Geologie“ uns überliefert hat, sind für die genetische Erklärung der Mineralgebilde Hilfsmittel geworden, welche gegen früher ein bei weitem rascheres Fortschreiten im Wege richtiger geologischer Erkenntniss gestatten werden. Auch wir halten uns an das, was unter unsern Augen vorgeht und schliessen daraus zurück auf früher Entstandenes, in dem wir uns dabei von den obengenannten naturheimischen Führern gern geleiten lassen.

Unter den mineralischen Brennstoffen der vorgeschichtlichen Zeit finden wir zwei verschiedene Bildungen; eine jüngere, die Braunkohlen und eine ältere, die Schwarz- oder Steinkohlen.

Die Braunkohlen sind gleich dem Torfe durch feuchte Vermoderung veränderte Pflanzenstoffe. Sie gehören der Tertiärformation an, welche abwärts nach jetzt üblicher Unterscheidungsweise in drei Gruppen, die sogenannte miocäne, oligocäne und eocäne eingetheilt wird.

Die mittelste Gruppe hat man wegen ihrer vorherrschenden Einschlüsse mächtiger Braunkohlenlager auch kurzweg die Braunkohlen-Formation genannt.

In ihr liegen die Braunkohlen oft 50—90' mächtig entweder auf Sandstein oder auf Thon, mit denen die einzelnen Kohlenlager wechseln. Ihre Decke, durch neptunische Ablagerungen gebildet, besteht in der Regel aus Thon, bisweilen aber auch aus bituminösen Schiefern oder Mergeln, welche dann wieder von Bildungen der Neuzeit, Diluvium, Gerölle u. s. w. bedeckt sein können. In den zunächst auf der Kohle liegenden Schichten findet man gewöhnlich Pflanzenversteinerungen, entweder im Thon, Schieferthon oder Mergel eingebettet. Je nachdem die Braunkohlen eine grössere oder geringere Decke von Gesteinen über sich haben, ist ihre Beschaffenheit als Pechkohle den Steinkohlen ähnlicher, die Pflanzenfaser mehr zersetzt und der Kohlenstoff vorherr-

schender, im andern Falle nähert sie sich mehr dem Holze als Lignit oder bituminöses Holz, in welchem alle Structurverhältnisse noch deutlich zu erkennen sind. Erstere scheinen demnach einer altern, Letztere einer jüngern Bildungszeit anzugehören.

Zwischen Beiden liegt die sogenannte Morkohle, ein breiartiges Product zersetzter Pflanzenstoffe. Eine weitere Art, die Blätter- oder Papier-Kohle ist schieferiger Natur und ihre einzelnen sehr dünnen Lagen, welche sich leicht trennen lassen, sind die Ursache zu ihrer Benennung geworden.

Wir erklären uns nun die Bildung der Braunkohlen auf ähnliche Weise wie die der Torfmore, und wie in jenen mächtige Baumstämme sich finden, die einst auf demselben Boden gewachsen sein müssen, auf welchem sich dann die Vermorung einnistete und ihr Gedeihen abschnitt, so können wir auch die Pechkohlen und Lignitstämme für solche, in der Braunkohlenmorbildung erstorbene Baum-Gattungen halten, namentlich wenn wir sie aufrecht stehend in den heutigen Braunkohlenlagern antreffen.

Bei der Ablagerung von Ligniten wird bisweilen auch eine Bildung, ähnlich den Anhäufungen von Treibholz an der sibirischen Küste, angenommen, wie sie der schwedische Reisende Hedenström unter dem Namen „der hölzernen Berge“, auf dem Lande ostwärts von der Mündung der Lena bis zur Behringsstrasse gesehen zu haben beschreibt, oder wie sie, durch Meeresströmungen erklärt, schon von Darwin¹⁾ an der Küste des Feuerlands beobachtet wurden. So suchte man sich auch die Entstehung der am Fusse des Harzes vorkommenden, nach Dr. Hartig aus zerriebnem Mulm von Cypressen und Thujabäumen bestehenden Braunkohlenablagerungen zu erklären, deren Urstoffe in der Vorzeit durch solche Meeresströmungen dort angeschwemmt worden sein sollten.

Eine Natur-Erscheinung, welche häufig im Spätherbst und Winter vorkommt, hat, da sie einen Beitrag zur Erklärung bedeutender, durch die Natur hervorgebrachter Holzanhäufungen liefern kann, meine Aufmerksamkeit erregt. Es sind dies die durch

¹⁾ The Temple of Nature or the origin of society. London 1803.

Absetzen von Glatteis auf den Aesten und Zweigen der Bäume hervorgerufenen Eisbrüche. Die Zerstörung, welche solche Eisbrüche, bedingt durch das grosse Gewicht der anhaftenden Eismassen, anrichten, sind oft so bedeutend, dass in kaum 24 Stunden die stärksten Bäume entästet, geborsten, zerknickt und entwurzelt im chaotischen Durcheinander beisammenliegend gefunden werden. An Eisbrüchen war der Herbst des Jahres 1858 namentlich reich, und theilnehmend las man im November genannten Jahres die Nachrichten, welche aus mehreren Gauen Deutschlands, dem Hunsrück, dem Schwarzwald, aus Nassau, der Mosel- und Main-Gegend die dadurch angerichteten Verwüstungen meldeten.

So traurige Eindrücke solche Naturerscheinungen im Allgemeinen auch hervorrufen mögen, so bleiben sie doch für den Naturforscher ein interessanter Beitrag zur Beurtheilung aller der Mittel, welche der Natur zur Hervorbringung wechselseitiger Zerstörung und neuem Entstehen geboten sind.

Die Vegetation, welche zur Zeit der Braunkohlenperiode die Erde bedeckte, scheint schon eine sehr mannichfaltige gewesen zu sein.

Da liegen zwischen Blättern von Ahorn, Weiden, Pappeln, Birken u. s. w. Lorbeerzweige, ja sogar Palmenhölzer. Nicht blose Abdrücke, sondern man kann das zarteste Pflanzengewebe mit dem Messer aufheben und unter dem Mikroskop bis zur letzten Zelle verfolgen. Kätzchen von Erlen (*alnites Kaefersteinii*) zeigen noch die polygonalen Figuren ihres Blütenstaubes.

Ganze Vorrathskammern von Früchten bewahrt der Kohlenmulm, reife und unreife Walnüsse erkennt man darunter leicht; selbst die Weintraube (*vitis Teutonica*) fehlt nicht. So fördern die Bergleute von Salzhausen in Hessen-Darmstadt aus dem dort auftretenden grossen Braunkohlenlager ganze Haufen, an ihren thränenförmigen, mit zierlichen Nabelhöckern versehenen Kernen, erkennbarer Treber. „Den edlen Saft aber trank die durstige Erde selbst, — sagt Quenstedt in seinem Sonst und Jetzt, — denn auch der schaffende Boden will manchmal wieder geniessen von dem, was aus ihm entkeimt, auf ihm gedeiht.“

Heute freilich ist Manches anders geworden; das hungrige

Volk gönnt der Erde in manchen Ländern kaum mehr die Abfälle ihrer Tafel, die abgenagten Knochen ihres Schlachtviehs, ja oft selbst nicht einmal die Excremente. Hinaus nach andern Ländern wandern auch diese für kräftiges Wachsthum und Gedeihen der jungen Saaten unentbehrlichen Stoffe, und dankbar muss es daher anerkannt werden, wenn die Wissenschaft durch ihre Apostel, einen Liebig und Stöckhardt, selbst von verschiedenen Voraussetzungen ausgehend, solchem Treiben mit vernehmbarer Stimme Einhalt zu gebieten sucht.

Die Braunkohlenformation findet sich auf der ganzen Erde in mehr oder weniger bedeutender Ausdehnung verbreitet, namentlich ist Mittel-Europa damit reich bedacht worden.

Unser dahin gehörendes, weiteres deutsches Vaterland betreffend, so hat Leopold v. Buch diesem Gegenstand eine specielle Untersuchung gewidmet, und die sämtlichen deutschen Braunkohlenablagerungen systematisch geordnet, indem er die im mittleren und nördlichen Deutschland in sehr grosser Zahl zerstreut liegenden Braunkohlenformationen in 7 Gebiete:

- das oberrheinische,
- „ rheinisch-hessische,
- „ niederrheinische,
- „ thüringisch-sächsische,
- „ böhmische,
- „ schlesische und
- „ norddeutsche

zusammenfasste.

Eine scharfe Grenze zwischen Braun- und Steinkohlen zu ziehen, ist nur in chemisch-technischer Beziehung unter Berücksichtigung ihres verschiedenen Kohlenstoffgehalts und des dadurch bedingten Heitzeffects als Brennmaterial möglich. In mineralogischer Beziehung lässt sich die Erstere nur beim Ritzen an ihrem braunen Strichpulver, vor Letzterer, mit schwarzem Strichpulver erkennen.

Um aber auch in geognostischer Hinsicht eine Unterscheidung beider Kohlenarten eintreten zu lassen, so sind die Geologen dahin übereingekommen, unter Braunkohlen nur diejenigen

fossilen Brennstoffe zu begreifen, welche der Tertiärperiode angehören, dagegen die Kohlen aller älteren Gebirge gemeinsam mit dem Namen „Schwarz- oder Steinkohlen“ zu bezeichnen. — —

Unter allen fossilen Brennstoffen bilden die Steinkohlen die technisch wichtigste, anscheinend verbreitetste, jedenfalls durch bergmännische Arbeiten am meisten aufgeschlossene und ausgebeutete Gruppe, ja sie sind, wie Eingangs gesagt, nächst den Eisenerzen ohnstreitig die wichtigsten Mineralien, da ohne sie der jetzige blühende Stand der Gewerbe und Industrie nicht wohl denkbar ist.

Steigen wir von den zuletzt verlassenen Tertiärschichten unserer festen Erdkruste alle Schichten der sog. secundären Formationen berührend, gegen den Mittelpunkt der Erde hinab, so begegnen wir in einigen derselben verschiedenen Steinkohlenablagerungen. So:

zwischen Kreide und Jura in der sogenannten Wealdenformation der Wealdenkohle (in Deutschland an der Porta Westphalica Gegenstand eines nicht unbedeutenden Bergbaues),

im Lias der sogenannten Liaskohle (namentlich in Oesterreich zur Gewinnung gelangend),

zwischen Keuper- und Muschelkalk der Lettenkohle, (welche besonders in Frankreich an einzelnen Punkten sich bauwürdig zeigt und auch in Schwaben schon oft vergebliche Hoffnungen erweckte.)

Alle diese genannten Kohlengebilde bleiben indessen, was Verbreitung, Mächtigkeit, Bauwürdigkeit und technischen Werth anlangt, weit hinter der eigentlichen und vorzugsweise sogenannten Steinkohle zurück, welche zwischen Rothen-Todliegendem und Bergkalk ihr Lager hat. Aber auch weiter hinab in den oberen Schichten des sogenannten Uebergangs- — silur- und devonischen — Gebirges finden sich noch Steinkohlen vor, die als ältere Bildungen zumeist mit dem Namen Kohlenblende oder Anthrazit bezeichnet werden. —

Wie die zwischen dem Rothen-Todliegenden und Bergkalk eingelagerte Gebirgsgruppe, wegen ihrer bedeutenden Einschlüsse

an Steinkohlen von allen Geognosten als Steinkohlenformation anerkannt ist, so wird die Schichtengruppe des Uebergangsgebirgs, in welcher die Anthrazitlager in grösserer Ausdehnung auftreten, häufig auch Anthrazitformation genannt.

Oft fehlt der gleichzeitig als unterstes Glied der Steinkohlenformation angesehene Bergkalk ganz, so dass die Steinkohlenformation dann unmittelbar auf dem Uebergangsgebirge ruht, und dann rücken sich die Steinkohlen und Anthrazit führenden Gebirgsschichten so nahe, dass Beide, besonders bei der Identität ihrer genetischen Verhältnisse zusammengefasst und geologisch gemeinsam betrachtet werden können.

Die wichtigsten Punkte des eigentlichen Vorkommens der Steinkohlenformation befinden sich zwischen dem nördlichen Polarkreise und dem Wendekreise des Krebses, was namentlich auf Taylors Kohlenkarte¹⁾ sehr anschaulich gemacht worden ist.

In Nordamerika reichen wichtige Kohlenlager nur bis zum 50. Grade nördlicher Breite, in der alten Welt 6 bis 8 Grad höher hinauf.

Einzelne, wie es scheint, unwichtigere Ablagerungen finden sich aber auch nördlich und südlich von den bezeichneten Grenzen, so im Norden an der Ost- und Westseite von Grönland, an mehreren Punkten am Eismeere, zwischen der Baffingsbai und Behringsstrasse, aber nur jene der Insel Melville und Byom Martin gehören zur eigentlichen Steinkohlenformation. Auch auf Spitzbergen und der Bäreninsel weist die Karte ächte Steinkohlen nach.

Noch ungewisser ist das Auftreten der eigentlichen Steinkohlenformation im Süden vom Wendekreis des Krebses. In Südamerika scheint die Kohle von St. Catharina in der brasilianischen Provinz Desao Pedro zu ihr zu gehören. In Afrika findet sich angeblich Kohle in Aethiopien und in Mozambique; ferner fand man sie in Port Natal und in Madagaskar, jedoch ist das geologische Alter aller dieser Bildungen zweifelhaft. Im chinesischen und birmanischen Reiche, auf Sumatra, Borneo und Java, sowie auf den benachbar-

¹⁾ Statistik of Coal Philadelphia 1848.

ten Inseln kommen Kohlen vor, doch scheinen auch diese eben so wenig der eigentlichen Steinkohlenformation anzugehören, wie die Kohlen in Neuseeland, jene an der Ostküste von Australien und die in Vandiemensland aufgefundenen, welche man für Kohlen der Oolith- (Jura) Formation gehalten hat.

Die Anzahl der über der ganzen Erde verbreiteten Steinkohlenablagerungen, die man wegen der muldenförmigen Vertiefungen, in denen sie liegen, Steinkohlenbecken nennt, ist hiernach nicht mit Sicherheit anzugeben. Man schätzt deren 250 bis 300. Nordamerika und England sind mit Steinkohlen am meisten gesegnet, aber auch in unserm deutschen Vaterland tritt die Steinkohlenformation an zahlreichen Stellen in bald mehr bald weniger umfangreichen Becken abgelagert auf. Zwei dieser Becken, das der untern Ruhr und in Oberschlesien gehören zu den grössten und wichtigsten, welche überhaupt auf dem Continent von Europa bekannt sind, aber auch in einer unserer Provinzen, in Rhein-Bayern und daran grenzend in Rhein-Preussen findet sich das sogenannte Saarbecken, — von den unruhigen Nachbarn, den industriellen Franzosen, schon oft mit lüsternen Blicken betrachtet, — welches immer noch den wichtigsten der übrigen europäischen Länder an die Seite gestellt werden darf.

Mit besonderer Berücksichtigung der in diesen Gebieten eigenthümlichen Entwicklung der Kohlenformation zerfällt dieselbe nach von Dechen ¹⁾, welchem besonders das Verdienst der Belebung des Steinkohlenbergbaus im Saarbecken, so wie der rheinischen Bergindustrie im Allgemeinen gebührt, in fünf Abtheilungen und zwar von oben nach unten in:

flötzarmen Sandstein,
productives Kohlengebirge,
flötzleeren Sandstein,
Kulm und
Kohlenkalkstein.

In den ersten beiden Gliedern dieser Gruppe finden sich

¹⁾ von Viebahn. Beitrag zur Zollvereinsstatistik. Berlin 1859.

Steinkohlen mit den in den Gebirgsschichten parallel laufenden und wie diese einfallenden (d. h. nach einer bestimmten Weltgehend hin geneigten) plattenförmigen Massen eingelagert.

Diese, bergtechnisch Flötze genannt, folgen denn auch allen Verwerfungen, Biegungen, Knickungen, kurz allen Störungen des ganzen Kohlengebirges, von welchem diejenigen Schichten, auf welchen die Flötze ruhen, das Liegende oder die *Soble*, diejenigen, welche dieselben bedecken, das Hangende oder Dachgestein heissen.

Wie schon der Name anzeigt, gibt es in dem obersten Gliede der Kohlenformation, dem flötzarmen Sandstein, nur wenige im Vergleich zu der grossen Anzahl Flötze des productiven Kohlengebirges, in welchem oft 20, 30, 50, ja sogar über 100 solcher durch Schiefer- und Thon-Schichten getrennter Kohlenlager übereinander gethürmt sind. Im Ruhrbecken z. B. hat man 80, im Saarbecken 130 bauwürdige Flötze entdeckt. Ihre Dicke oder Mächtigkeit ist oft sehr verschieden und wechselt zwischen einigen und 100 Fuss. Eine ebenso grosse Verschiedenheit herrscht in Bezug auf ihre Breiten- und Längen-Ausdehnung.

Wie in der Braunkohlenformation, so finden wir auch hier in den, die Steinkohlenflötze überlagernden thonigen, schiefrigen und sandigen Gebirgsschichten, jenen geologischen Archiven der Vorwelt, die wichtigsten Urkunden über ihre Bildung in zahlreichen Versteinerungen und Abdrücken von Pflanzen; während die Steinkohle selbst, als eine homogene, pechartig-glänzende Masse, dem unbewaffneten Auge aller pflanzlichen Merkmale baar erscheint. Schichtenweise dazwischen liegt hier und da eine matte, schwarze, abrusende Faser, verfaultem Holze gleichend, in welchem man unter dem Mikroskop die Structur der Nadelhölzer (d. h. punktirte Gefässe) aufgefunden hat, die, wenn auch nicht genau mit den lebenden Geschlechtern übereinstimmend, doch den *Araucarien* am Nächsten stehen, welche in jener, bei unsern Antipoden wachsenden riesigen *Norfolksfichte* (*araucaria excelsa*) einen würdigen Repräsentanten haben. Aber auch in der dichtesten Kohle gewahrt, gehörig zubereitet, das scharf bewaffnete Auge Pflanzenzellen und Harzbehälter, so dass man mit der grössten Bestimmtheit behaupten

ten darf, auch die Steinkohle sei der Ueberrest einer früheren Vegetation, aber in einer Weise concentrirt und comprimirt, dass sie als der vollkommenste aller Brennstoffe angesehen werden muss. —

Aber wie war jene Pflanzenwelt beschaffen? Wir wollen in Nachstehendem diese Frage zu beantworten suchen:

Die Steinkohlen-Flora von unseren bedeutendsten Paläontologen untersucht, ergab über 900 Arten. Ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass sicherlich sehr viele der zartesten Pflanzen, namentlich Schwämme, Moose, Flechten und andere niedere Bildungen, sowie alle Diejenigen, welche durch Wasser leicht zersetzt werden, kein deutliches fossiles Andenken von sich hinterlassen haben, so hat man doch angenommen, dass im Vergleich mit den jetzt lebenden Pflanzenarten, deren es wenigstens 80,000 gibt, die zur Zeit der Steinkohlenperiode existirende Landpflanzenwelt unserer Erdkugel weit weniger mannichfaltig war, und nur aus Pflanzen von vergleichungsweise einfacherer Form und Structur bestand.

Können auch wir uns dieser Anschauungsweise nicht entschlagen, indem wir mit Darwin annehmen, dass die heutige organische Welt das Ergebniss eines viele Millionen Jahre hindurch fortgesetzten Entwicklungsganges von natürlichen Materien, unter dem Einflusse allgemeiner und ewiger Naturgesetze ist, und dass dieser Entwicklungsgang mit einfachen Formen von niedern Lebenserscheinungen begonnen, und erst unter steter Umgestaltung durch Erblichkeit, individuelle Variation, Vererbung der Variation, den Kampf um das Dasein und natürliche Züchtung (natural selection), diesen Hauptgrundsätzen der Darwin'schen Theorie¹⁾, zur Erzeugung der heutigen unendlich mannichfaltigen Lebenswelt geführt hat; so muss doch hier in Betracht gezogen werden, dass die, fast unerschöpfliche Massen von Steinkohlen bergenden Gebirgsgruppen immerhin nur einen verhältnissmässig sehr kleinen

¹⁾ Darwin Charles. Die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder die Erhaltung der vervollkommeneten Racen im Kampfe um's Dasein. Deutsch von Dr. K. G. Bronn. Stuttgart 1863.

Theil der Erdoberfläche einnehmen und dass, so wie heute, es damals schon Pflanzen gegeben hat, die vorzugsweise gern in einzelnen für ihr Gedeihen erspriesslichen Gegenden in grossen Massen zusammenwuchsen und im Kampf um's Dasein den Sieg davontrugen, wie wir es heute bei den Torfmoosen, Haidekräutern, ja selbst bei unsern Nadelhölzern wahrnehmen. —

Die niedrigste Stufe vom Pflanzenreich wird von blüthenlosen (Cryptogamen) aus blosen Zellengeweben gebildeten Pflanzen (Cellulares) den Tangen, Algen, Lichenen (Flechten), Moosen, Schwämmen eingenommen. Ihnen folgen aufwärts die Cryptogamen mit Zellen und Gefässtextur (Vasculares), zu denen die Glieder- und Blatt-Farren gehören. Ueber diesen stehen die blüthentragenden Pflanzen mit Gefässtextur (Phanerogamen), welche sich in zwei grosse Unterabtheilungen scheiden: diejenigen mit einem Saamenlappen (Monocotyledonen), bei welchen die neue Substanz von Innen ansetzt (endogene), z. B. das Zuckerrohr, die Palme, und diejenigen mit zwei Saamenlappen (Dicotyledonen), bei welchen die neue Substanz von aussen unmittelbar unter der Rinde sich absetzt (exogene), wie z. B. bei der Fichte, Ulme, Eiche und allen europäischen Waldbäumen.

Von cellularischen Cryptogamen sind aus oben erwähnten Gründen in den versteinerten Herbarien der Kohlenperiode nur wenige und undeutliche Spuren zu finden.

Den für uns erkennbaren Grundtypus der, an den Stellen, wo wir heute Steinkohlen finden, in grauer Vorzeit wuchernden Vegetation bilden die Farrenkräuter. *

Wir finden unter ihnen besonders die Gliederfarre mit denen zur Familie der Equiseten gehörigen Calamiten, die sich von unsern Schachtelhalmen nur durch Mangel der gezähnten, tutenförmigen Scheiden an den Gelenken und durch die Grösse und Stärke des Stammes, welche die der ersteren 4—5 Mal übertrifft, unterscheiden.

Ferner die zierlichen, aber viel kleinern Asterophiliten oder Sternblättrigen, die mit Pflanzen der Gegenwart nur sehr wenig Aehnlichkeit darbieten.

Auch die Blattfarren mögen damals in bedeutender Zahl

vertreten gewesen sein, doch haben einzelne der aufgefundenen Exemplare durch ihre gigantischen Formen Aehnlichkeit mit denen, welche heute auf den Inseln der stillen Südsee und des atlantischen Ozeans ihr üppiges Wachsthum entfalten.

Im Allgemeinen war ihr Character mit unsern Farren der gemässigten Zone übereinstimmend. Ebenso wie heute gab es damals Farren mit wenig entwickelten, unter dem Boden sich verbreitenden Stängeln. Andere wie die Psarronien mit dickem, knollenförmigem Stamm den heutigen Maraticeen vergleichbar und wiederum andere, die wirkliche Baumfarren waren, wie z. B. die Cyothëiten. Dass aber der Bau der Blätter und der an der Unterfläche derselben gestellten Fruchthäufchen mit dem derselben Theile vieler unserer heutigen, Mittel-Europa angehörigen Farrenarten übereinstimmt, zeigen die mannichfachen Abdrücke, von denen hier namentlich die *Pecopteris truncata* mit deutlich ausgeprägten Fruchthäufchen aus der Steinkohlenformation von Wettin (preussische Provinz Sachsen) Erwähnung verdient.

Eine weitere hierhergehörende, auch jetzt noch lebende Pflanzengattung sind die Bärlappe (Lycopodien), welche in niedriger Gestalt unter gemässigten Breitegraden vorkommen, in den Tropengegenden aber sich zu einer bedeutenden Höhe erheben. Gar manche Glieder dieser Familie kamen in der Steinkohlenperiode vor und haben wohl auch einen Beitrag zur Bildung der Kohlensubstanz geliefert. Nach den von ihnen vorhandenen fossilen Resten, woran namentlich das böhmische Kohlengebirge reich ist, scheint die fossile Gattung, nach ihrer schuppigen Aussenseite *Lepidodendron* genannt, eine Höhe von 65 bis 80 Fuss, eine Stammdicke von 3 bis 6 Fuss und Blätter von 20 Zoll Länge gehabt zu haben. In den Wäldern, welche zur Bildung der Kohlenlager während der Kohlenperiode beitrugen, haben unbezweifelt die *Lepidodendren* die Stelle unserer Fichten eingenommen und die weniger stattlichen Farrenkräuter und Calamiten mit Schatten versehen, und scheinen sie mit den weiter unten zu nennenden *Sigillarien* überhaupt die vorherrschenden Bäume der Steinkohlenwäldungen gewesen zu sein.

Die andern leitenden Pflanzen der Kohlenvegetation scheinen

keine Stellvertreter mehr auf der jetzigen Oberfläche der Erde zu haben und konnte daher ihr Character auch nicht so deutlich bestimmt werden.

Zu den Bemerkenswerthesten dieser Pflanzen gehören die zuweilen auch zu den Tannen gerechneten Sigillarien oder Siegelbäume, welche man allgemein für die verbreitetste aller Steinkohlenpflanzen hält, so selbst, dass die Steinkohlen an manchen Stellen nur aus ihnen zusammengesetzt sind. Mehrentheils kommen die Sigillarien in einer liegenden oder mehr oder weniger schrägen Stellung in den tauben (d. h. kohlenleeren) Zwischenschichten der Kohlenbecken vor. Manche dieser Stämme sind 40 bis 60 Fuss lang und 3 bis 5 Fuss dick. Mit den Stämmen der Baumfarren haben sie die an der Stammpерipherie sich zeigenden Narben abgefallener Blattstiele gemein, nur sind diese bei den Sigillarien merklich zahlreicher und überdies in, der Länge nach verlaufenden Reihen, übereinander gestellt. Die Form dieser Narben ist äusserst regelmässig, als ob sie mit einem Siegel darauf gedrückt wären, was die Veranlassung zu ihrer Benennung gegeben hat. Aber auch der innere Bau dieser Stämme ist verschieden von dem der Baumfarren, da eine wirkliche Holzachse mit Markstrahlen darin wahrgenommen wird und sie am Gipfel verästelt sind. Sie dürften demnach mit gleichem Rechte zur Classe der Cycadeen gezählt werden, obschon sie von diesen auch wieder in einigen Beziehungen und namentlich in der Stellung der Blattnarben abweichen. In der That scheint es, als ob in diesen sonderbaren Pflanzen mehrere Grundformen verschmolzen seien, so fremdartig und abweichend von dem, jetzt lebender Pflanzen ist der Bau ihrer Stämme.

In Saarbrücken und Westphalen kommen aufrecht stehende Sigillarien-Stämme, sehr häufig im Innern mit Thoneisenstein erfüllt oder ganz in denselben umgewandelt vor, denen der deutsche Bergmann den bezeichnenden Namen „Eisenmänner“ gegeben hat.

Nicht weniger merkwürdig sind die fossilen Pflanzenreste, die früher als Stigmaria beschrieben, sich jetzt als Wurzelstöcke von Sigillarien erwiesen haben. Es sind mehr oder weniger kuppelförmige Stücke, die zuweilen bis zu 6 Fuss Durchmesser haben

und sich nach unten in eine Menge Aeste vertheilen, welche oft eine grosse Länge erreichen. Ihr Name ist abgeleitet von den sich an ihrer Peripherie befindenden Tüpfeln (Stigmata), kleine eiförmige Höhlungen mit kleinen Knötchen in der Mitte, auf welchen die noch hier und da sichtbaren feinen Wurzelfasern eingewachsen waren.

Von Monocotyledonen gab es einige Palmen (Flabellaria und Nöggerathia), welch' letztere, von Göppert in Breslau, dem bedeutenden schlesischen Steinkohlenuntersucher, zu den Farren gerechnet werden, während Ad. Brongniart sie als zu den Cycadeen gehörig aufführt.

Die Dicotyledonen sind nur durch Coniferen und diese wieder nur durch eine einzige exogene Gattung vertreten, von welcher vereinzelte Exemplare in Sandsteinschichten, so z. B. ein Stamm von 2 Fuss Dicke und 47 Fuss Länge im Craigleith-Steinbruch bei Edinburg aufgefunden wurden. Dieser Stamm als *Araucaria* bestimmt, gehört zu einer Pflanzengattung, welche — wie bereits angedeutet — gegenwärtig nur noch auf den Norfolkinseln in der Südsee und vielleicht in einigen andern fernen Gegenden zu Hause ist. —

So war nach der Anschauung der vorweltlichen Herbarien aus der Steinkohlenformation die Steinkohlen bildende Vegetation beschaffen. Sie bestand aus niedern Formen der botanischen Stufenfolge, von welchen vielleicht gerade der grösste Theil durch gänzliche Zersetzung aller pflanzlichen Merkmale beraubt worden ist, während nur der bei weitem kleinere, der Zersetzung mehr widerstehende Theil jener Flora unserer Erforschung zugänglich war.

Meist frucht- und blüthenlos, wie sie war, scheint ihr Wachsthum und Gedeihen doch üppiger gewesen zu sein, als wir es heute auf den begünstigsten Flecken der Erde wahrnehmen. Wegen der Härte ihrer Pflanzen-Blätter, wegen ihrer Armuth an fleischigen Früchten und mehlhaltigen Saamen war sie wenig geeignet, Thieren Nahrung zu spenden.

Einzelne Reptilien (Saurier); zahlreiche Fische; fast sämtliche Eckschupper; wenige Gliederthiere, besonders Muschelkrebse

(*Limulus rotundatus*), Spinnen und Schaben; viele Weichthiere, Armfüsser (*Productus* und *Spirifer*) meist im Kohlenkalkstein, Kopffüsser (*Goniatites*) in den übrigen Formationsgliedern, scheinen, nach den fossilen Resten zu schliessen, die Hauptrepräsentanten der Steinkohlenfauna gewesen zu sein.

Monoten in ihren Formen, ohne schimmernde Farbenpracht, ohne blumengeschmückte Rasenteppiche, ohne Vögelgesang, müsste eine Steinkohlen-Landschaft einem menschlichen Besucher ein düstres Schaubild dargeboten haben. —

Aus der Aehnlichkeit einzelner Formen jener erloschenen Pflanzenarten in unsern heutigen Steinkohlenlagern, mit lebenden Arten heisser Länder, haben die meisten Geologen annehmen zu müssen geglaubt, es habe einst überall die Witterung der Tropen geherrscht, und es sei diese hohe Temperatur durch die Wärmeausstrahlung der damals noch nicht abgekühlten Kruste unserer allgemein für einen Feuerball gehaltenen Erde hervorgerufen worden¹⁾.

Immer geneigt, wie der Mensch ist, die grossen Mächte der Natur, welche still und allmählich wirken, zu übersehen und rasch verlaufende Vorgänge für die Entstehung dessen anzunehmen, was uns fertig unter die Augen tritt, glaubte man die Bildung der Steinkohlenlager von sogenannten Welt-Catastrophen, welche den plötzlichen Untergang der gesammten organisirten Schöpfung auf der Erde zur Folge gehabt, herleiten zu müssen. Ja man nahm sogar an, dass die zusammengeschwundene Pflanzenmasse der Kohlenlager durch unterirdische verkohlende Gluthen in ihren heutigen Zustand verwandelt worden sei.

Urwälder, wie sie jetzt zwischen den Wendekreisen stehen,

¹⁾ Sollte die Aehnlichkeit der Steinkohlen-Flora mit den Pflanzenformen der Tropen absolut durch Annahme tropischer Hitzgrade in der gemässigten und kalten Zone erklärt werden wollen, dann verdiente eine jüngst aufgetauchte astronomische Hypothese, nach welcher alle 200,000 Jahre sich die Achsenstellung der Erde so weit verändert, dass die Pole in den Aequator fallen, mindestens gleiche Berechtigung mit der Feuerballhypothese der Plutonisten.

mussten in den Steinkohlenlagern begraben und heiss, wie zwischen den Wendekreisen, musste es damals in allen Gegenden gewesen sein, wo sich heute Steinkohlen finden. Aber selbst die ältesten Steinkohlenlager Deutschlands, soweit sie reich an fossilen Ueberresten baumartiger Gewächse, lassen nirgends — wie wir sahen, — etwas von jener Mannichfaltigkeit verschiedener Arten erkennen, welche die Eigenthümlichkeit und den besondern Reiz der Urwälder tropischer Länder ausmacht, von denen wir Sehnsucht erregende Schilderungen unserm grossen Meister naturhistorischer deutscher Classicität, Alexander v. Humboldt, in seinem Kosmos, verdanken. Vielmehr trägt die grosse Einförmigkeit der Steinkohlen-Vegetation ganz den Character der Pflanzenwelt, jenes gemässigten Klimas, welcher noch heute in den Torfmorgegenden des norddeutschen Tieflandes vorherrschend ist.

Wie wir die Entstehung des Torfes unter unsern Augen noch heute beobachten, wie wir die der Braunkohlen auf gleiche Weise erklären konnten, und das Vorhandensein grösserer Holzmassen in denselben von verschiedenen auch noch heute stattfindenden grossen Holzanhäufungen ableiteten, so können wir uns auch nicht entschliessen, für die Steinkohlen andere genetische Verhältnisse anzunehmen. Die Steinkohlenlager sind nichts anderes, als nach und nach untergegangene, durch neptunische Niederschläge überzogene Torfmore der Vorzeit; die in denselben sich vorfindenden Holzüberreste erklären sich analog denen, die wir in den Braunkohlenlagern, die wir in den heutigen Torfmoren finden. Sie gehören baumartigen Pflanzen an, welche entweder durch die successive Vermorung der Stellen, wo sie wuchsen, durch Eisbrüche, durch Senkungen des Bodens u. s. w. untergegangen, auch wohl hie und da angeschwemmt und durch die später darüber sich erstreckende Steinkohlenmorbildung integrirende Bestandtheile unserer Steinkohlen geworden sind.

So besteht von unsern Torfmoren — von denen der Küstensümpfe Virginiens und den sibirischen Tundras — zu den Braunkohlen, Steinkohlen und Anthraciten wohl noch ein Unterschied des Umwandlungszustan-

des der vermoderten Pflanzenmasse, aber kein Unterschied in der Bildungsweise. —

Die Bildung von Land und Meer, von Berg und Thal ist eine in der fernsten Vor- und Urzeit mit den ersten Naturgesetzen der Weltregierung beginnende gewesen, und rastlos ist sie seitdem fortgeschritten, meist vom menschlichen Auge ungesehen. Und so schafft sie auch noch heute fort die Natur. Pflanzen und Thiere entwickeln sich zu Millionen und aber Millionen und ihre Leichen bilden Berge, Wasserläufe führen Unmassen fester Stoffe, dem Auge kaum erkennbar, mit sich fort und deponiren sie wieder weit entfernt von ihren Quellen, Auswaschungen des Erdbodens, führen zu Senkungen und Seen, die nach und nach wieder durch Pflanzen und Thiere ausgetrocknet werden. Feuererscheinungen innerhalb der Erdkruste, hervorgerufen durch chemische und physikalische Kräfte, führen zu Schmelzungen, Schlackenflüsse treiben aus denselben empor und erstarren zu Felsgebilden; Erdwasser suchen dem Feuer zu steuern, hochgespannte Dämpfe entwickeln sich im Kampfe und schleudern das Wasser als Thermen, Sprudel und Geyser wieder hinaus aus dem Erdgehäuse. So reichen sich Zerstörung und Neubildung die Hand. So ist die Geschichte unserer Erde — wie man wohl gesagt hat — eine auseinandergerollte Gegenwart, und Alles scheint nur im ewigen Wechsel zu bestehen. —

Bei einem solchen allmählichen Umgestaltungs-Process sollten sich aber auch die diese Veränderungen begleitenden Ausscheidungen aus Braun- und Steinkohlenlagern nachweisen lassen. Und wirklich wird man bei genauer Beobachtung solche Umwandlungsausscheidungen, in verschiedenen Formen auftretend, erkennen.

Kohlensäure-Exhalationen, selbst aus jüngern sedimentären Schichten, sind an verschiedenen Orten aus dem darunter liegenden Steinkohlengebirge herrührend erkannt worden. Wasserquellen einzelner Braunkohlengebirge zeigen einen starken Kohlensäure-Gehalt und treten als Kohlensäuerlinge zu Tage. Brennbare und exploitirende Gase, welche als „schlagende Wetter“ die gefährlichsten Feinde des Steinkohlenbergmann's sind, entweichen aus den Klüften der Kohlenflötze oder aus Spal-

ten des Steinkohlegebirgs und erweisen sich als Kohlensäure und Kohlenwasserstoffverbindungen (Sumpf- und Oelbildende Gase).

Mit gasförmigen Ausscheidungen schliesst aber deren Reihe nicht ab. Wir möchten vielmehr hier die Ansicht aussprechen, dass alle ausserhalb der drei Grundtypen brennbarer Mineralien (Torf, Braun- und Steinkohlen) liegenden flüssigen und festen Kohlenwasserstoff-Fossilien, welche häufig als selbstständige Bildungen betrachtet werden, sich als secundäre Verbindungen, d. h. als Ausscheidungsprodukte betrachten lassen, welche aus dem grossen mehr oder weniger langen und vollständigen Umwandlungsprozess, den Erstere seit ihres vegetabilischen Daseins zu bestehen hatten, hervorgegangen sind.

Unter die flüssigen Ausscheidungsprodukte bei Umwandlung der Holzfaser in mineralischen Brennstoff gehört vor Allem das Steinöl (Petroleum), welches durch die Massenhaftigkeit, in welcher es an einzelnen Orten auftritt, durch seine Leuchtkraft und durch seinen billigen Preis bestimmt scheint, die meisten der jetzt angewendeten flüssigen Beleuchtungsmittel zu verdrängen. Gerade die Entdeckung fast unerschöpflich scheinender Petroleumquellen in dem Alleghany-Kohlegebirge in Nordamerika¹⁾ muss unsere oben ausgesprochene Ansicht bestätigen, dass hier, wo Kohlen und Petroleum sich neben einander finden, letzteres ein Ausscheidungsprodukt der Umwandlung der Pflanzenfaser in Steinkohle und wenn wir den Umgestaltungsprozess als fortgesetzt annehmen wollen, der Kohle in den dort in Lagern von unermesslicher Mächtigkeit auftretenden Anthrazit ist. Wie hier tritt das Petroleum nirgend wo in so massenhafter Weise auf; demungeachtet verdienen andere Fundorte desselben im Staate New-York, auf Cuba, am Cayagasee, bei Syrakus, in Galicien und in der Walachei, die

¹⁾ Das Alleghany-Kohlegebirge nimmt einen Flächenraum von 3000 deutschen □ Meilen ein, von denen nach Taylor circa 1900 deutsche □ Meilen abbauwürdige Köhlenflötze enthalten. Es erstreckt sich über die Staaten Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Virginien, Maryland, Ohio und Pennsylvanien.

beiden Letzteren namentlich für europäische Consumption, hohe Beachtung.

Von flüssigen Ausscheidungen nennen wir hier noch den Bergtheer, welcher mehr oder weniger ergiebig in Persien und in Frankreich auftritt, ohne gerade in technischer Beziehung grössere Bedeutung erlangt zu haben.

Von festen Kohlenwasserstoff-Ausscheidungen bestätigt zunächst das elastische Erdpech unsere Ansicht, indem es sowohl bei South-Bury in Massachussets, als bei Montrelais in Frankreich sich in der Steinkohlenformation vorfindet. Ein neuer Fundort scheint sich für dasselbe in den Donaufürstenthümern aufzuthun, wo man ihm wegen seines Paraffin-Gehalts grössere Aufmerksamkeit widmet und es bereits zu exportiren anfängt. Hierher gehört ferner der Bergtalg (Halchetin, Scherrerit), welcher z. B. bei Merthyr-Tydwile in England kleine von Kalkspath umgebene Gänge in den zur dortigen Steinkohlenformation gehörigen Eisenerzlagern ausfüllt. Bei Loch-Tyne in Schottland schwimmt er in einem Torfsumpf auf Wasser, bei St. Gallen in der Schweiz durchtränkt er Braunkohlen und fossiles Holz. Auch der Ozokerit von Slonik in der Moldau ist eine Art Bergtalg.

Es wird nun noch der verschiedenen Arten von Bitumen und Asphalt Erwähnung zu thun sein, welche im Central- und Süd-Amerika, in Californien und Nicaragua, auf Cuba, in Afrika bei Kairo, am todtten Meere, in Italien bei Neapel und a. a. O. theils massenhaft, theils spärlicher vorkommen. Specieller wollen wir nur des berühmten Bitumensees auf der Insel Trinidad gedenken, welcher das Ende der Bucht la Brae bildet und einen Umfang von mehreren englischen Meilen einnimmt. Das Bitumen ist von dickflüssiger Consistenz und stark schwefelhaltig. Es fliesst von einer Uferhöhe dem Meere zu, breitet sich auf dessen Oberfläche aus und erhärtet nach und nach. In geringer Entfernung vom Ufer steigen beträchtliche Mengen von Naphta (Steinöl) aus unterirdischen Quellen empor und auf einzelnen Klippen und Bänken des von einer üppigen Vegetation farrenkrautähnlicher Pflanzen bedeckten Ufers gehen Lignitlager zu Tage aus. Somit wäre wieder ein erneuter Beweis für unsere oben

ausgesprochene Ansicht der Umwandlungs-Ausscheidungen geliefert.

Ob Bernstein und Rotinit, welche wir häufig in Braunkohlenlagern und an den Küsten der Ostsee — wo mächtige Braunkohlenlager auftreten — finden, auch solche Zersetzungsprodukte, oder ob dieselben fossile Harze, noch zur Zeit ihres vegetabilischen Lebens den Kohlenbäumen entträufelt sind, steht noch in Frage. Wir möchten uns für die letzte Ansicht entscheiden und führen den Beweis dafür durch Einschlüsse von Insecten, an welchen die Bernsteinstücke mehr oder minder reich sind.

Als seltenere feste Kohlenwasserstoff-Verbindungen dieser Gattung lassen wir endlich noch folgen: den Fichtelit in Bäumen von Föhrenholz im Torf bei Redwitz, den Hartit an Stämmen aus den Braunkohlen bei Oberhaart, den Konlit von Utznach und das Tekoretin in Fichtenstämmen aus den Sümpfen von Holtegaard und schliessen damit die Reihe dieser Zwischengruppe brennbarer Mineralkörper ab, um uns wieder zurück zur Hauptgruppe der fossilen Brennstoffe zu wenden. —

Die allmähliche Umwandlung der Pflanzen in fossiles Brennmaterial besteht hauptsächlich in einer Reduction der Pflanzenfaser auf ihren Kohlenstoffgehalt, welcher bei dem Holze zwischen 46 und 50%, beim Torf 55—60%, bei der Braunkohle 68—72%, bei der Steinkohle zwischen 73 und 90%, beim Anthracit bis zu 96% beträgt.

Der Torf ist relativ reicher an Sauerstoff als Braunkohle, und diese reicher als Steinkohle, und der ohne Zweifel aus derselben hervorgegangene Anthracit, welcher fast als Wasserstoff- und Sauerstoff-freie Steinkohle betrachtet werden kann.

Der Gehalt an Kohlenstoff nimmt also von der Holzfaser bis zum Anthracit hin zu, der Sauerstoffgehalt dagegen ab¹⁾.

¹⁾ Nach Analysen aus Liebig und Koop's Jahresberichten von 1848 und 1849 u. A. enthält:

	Kohlenstoff: Wasserstoff: Sauerstoff:		
Holz	49.	6,3.	44,6.
Torf	60.	6,5.	33.

Die Steinkohle besteht hiernach im Wesentlichen aus Kohlenstoff mit Sauerstoff und Wasserstoff in verschiedener Zusammensetzung. Beigemischt sind fast immer mehr oder minder grosse Mengen erdiger Bestandtheile, — namentlich der zwischen den Flötzen lagernde Kohlenschiefer — Schwefelkiese, Wasser u. s. w. Die Menge der beigemischten unverbrennlichen Theile bezeichnet der Asche- und Schlacken-Gehalt der Kohle. Der Schwefel entweicht bei der Verbrennung der Kohle meist als schweflige Säure, zum Theil auch als Schwefelsäure, und nur ein kleiner Prozentsatz bleibt in der Asche an Basen gebunden zurück.

Betrachten wir nun den Process der Verbrennung selbst etwas näher. Was geschieht mit der Kohle, wenn wir dieselbe in offenem Feuer verbrennen?

Der Kohlenstoff derselben verbindet sich mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft zu einem durchsichtigen Gase, Kohlensäure, welches bei Berührung mit glühenden Kohlen, wie dies meist der Fall ist, durch weitere Aufnahme von Kohlenstoff sich in ein die Metalloxyde reduzierendes, bei Einathmung giftiges Gas, das Kohlenoxydgas, verwandelt. Der Wasserstoff der Kohle geht mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft eine Verbindung, Wasser, ein, welches ebenfalls durchsichtig als überhitzter Wasserdampf entweicht. Bei jeder vollständigen Verbrennung erfolgen daher nur durchsichtige Körper, Kohlensäure, Kohlenoxydgas und Wasser. Jener schwarze Rauch, den wir aus den Schornsteinen entweichen sehen, und der die industriellen Städte mit einem förmlichen Dunstkreis umlagert, ist unverbrannter Kohlenstoff, eine Verschwendung, der trotz aller möglichen Rauchverzehrungs-Erfindungen bis jetzt noch nicht vollständig abgeholfen worden ist.

Möchte der menschliche Geist und die practische Hand der Techniker noch Mittel und Wege finden, einem solchen unfrei-

	Kohlenstoff:	Wasserstoff:	Sauerstoff:
Braunkohle	71,5.	5,9.	25.
Steinkohle	82,5.	5,5.	12.
als mittlere Durchschnittszahlen.			

willigen Luxus zu steuern, der im Laufe der Zeiten Capitalien von Millionen verschlingt.

Bei Verbrennung der Kohle ohne Zutritt der Luft, also bei einer weiteren Verkohlung derselben, welche in verschlossenen Oefen oder zur Gewinnung aller sich dabei ergebender flüchtiger Producte in Retorten bewerkstelligt wird, entsteht ein mit heller Flamme brennendes Gas, Kohlenwasserstoff- oder Leuchtgas, welches, wie schon der Name andeutet, zur Gasbeleuchtung dient, und eine schwarze ölige Flüssigkeit, Steinkohlentheer, woraus durch weitere Destillation ätherische, leichte Oele, flüssige Kohlenwasserstoffe (Benzin, Benzol) gewonnen werden, aus denen das Anilin dargestellt wird, welches durch seine chemisch-farbenbildende Kraft zu einer vollständigen Regeneration der Färberei geführt hat. Das bei der Theerdestillation sich ergebende schwere Oel hat anticeptische Eigenschaften, die es zur Conservirung von pflanzlichen und thierischen Körpern geeignet machen. Man gewinnt daraus Kreosot (Phenylsäure), welches diese Eigenschaften in weit höherem Grade besitzt. Als Rückstand bleibt Pech, welches als Bindemittel zur Fabrikation von Kohlenziegeln (Briquettes) aus Steinkohlenabfall, oder als künstlicher Asphalt benutzt wird.

Das in den Retorten oder Verkohlungsöfen zurückbleibende Product ist der Kok, eine schwammig-aufgeblähte, feste Masse von grauem, metallischem Ansehen, welche schwer, aber mit starker Hitze, gleichförmig ohne Rauch und Geruch verbrennt und vorzüglich im Hochofen beim Schmelzen der Eisenerze und des Eisens, zum Heizen von Dampfkessel-Feuerungen, bei Locomotiven etc. angewendet wird.

Braunkohlen und Torf lassen sich auch verkohlen, doch ist ihr Kok nicht so fest und desshalb für gewisse Zwecke weniger brauchbar als Steinkohlen-Kok. Der dabei gewonnene Theer liefert bei weiterer Destillation Beleuchtungsöle, Photogen und Solaröl und das zur Kerzenfabrikation so beliebte Paraffin¹⁾.

¹⁾ Die Destillation der mineralischen Brennstoffe mit Einschluss

Nach ihrem Verhalten in der Hitze werden die Steinkohlen in Sandkohlen, welche zerfallen und keinen Kok geben, in Sinterkohlen, nur an ihren Aussenflächen zusammenschmelzend und in Backkohlen, welche beim Erhitzen in einen breiartigen Zustand gerathen, sich aufblähen zu einer blasenartigen Masse und den besten Kok liefern, eingetheilt.

Die Heizkraft der Brennstoffe wird durch die bei ihrer Verbrennung entwickelte Wärmemenge, d. h. durch die Quantität ihres verflüchtigten Kohlenstoffs und die dazu erforderliche Zeit bestimmt. Heizkraft und Preis bedingen deren Brennwerth.

Ein Centner Steinkohlen gibt einen dreimal grösseren Heizeffect, als das gleiche Gewicht Holz, welches demnach nur $\frac{1}{3}$ des Preises der Steinkohle betragen sollte, um beide auf den gleichen Brennwerth zu reduzieren¹⁾.

Werfen wir nun zum Schlusse noch einen Blick auf die Geschichte der Benutzung der fossilen Brennstoffe.

Ueber die Verwerthung des Torfes und der Braunkohle als Brennmaterial gibt uns schon Plinius einige bezeichnende Aufschlüsse, indem er in seiner historia naturalis von unsern im Nor-

der als secundär erwähnten brennbaren Fossilien, welche ausser den oben genannten technisch wichtigsten eine grosse Reihe anderer flüssiger und fester Producte ergibt, bildet einen besonderen Industriezweig der Neuzeit. Zur näheren Kenntniss desselben verweisen wir auf: „Oppeler, Dr. Theodor, Handbuch der Fabrikation mineralischer Oele“ als bestes und vollständigstes Werk darüber.

¹⁾ Nach Grouville leisten in zweckmässig construirten Oefen

$3\frac{1}{2}$ Pfd. Lohkuchen so viel als:

$2\frac{1}{2}$ Pfd. trockenes Holz,

$2\frac{1}{4}$ Pfd. Torf I. Qualität, trocken,

$1\frac{4}{5}$ Pfd. Braunkohle,

1 Pfd. Steinkohle.

(NB. Lignit, bit. Holz, lufttrocken, stellt sich zur Steinkohle, wie $1\frac{2}{3}$: 1.)

Bem. d. Verf.

den Deutschlands vor 1800 Jahren lebenden Vorfahren den Chauci erzählt: „Eine Misera gens bewohnt an den Ufern des Meeres, welches zweimal binnen Tag und Nacht unübersehbare Strecken überfluthet, Sandhügel, oder mit den Händen errichtete Dämme. Wenn das Wasser kommt, gleichen ihre Hütten Schiffenden, wenn es geht, Schiffbrüchigen. Nur von fliehenden Fischen nähren sie sich, da gibt es keine Milch, mit Erde kochen sie ihre Speisen, mit Erde machen sie Feuer und wärmen ihre vom Nordwinde erstarrten Glieder und Eingeweide.“

Aber auch die Steinkohlen wurden schon in der ersten geschichtlichen Zeit benutzt, auch sie scheinen der Alles ergreifenden Aufmerksamkeit der Römer nicht entgangen zu sein, als sie das kohlenreiche Britannien unterjocht hatten, denn obgleich die Insel damals sehr reich an Hochwald war, fanden sich doch Bruchstücke von Steinkohlen auf dem Herde des 1824 ausgegrabenen römischen Bades zu Wroxeter. Sir Sysoms fand Steinkohlenasche im Camin einer römischen Villa bei Worcester und grosse Kohlenstücke wurden in einem römischen Wohnhause bei Great Withcomb ausgegraben.

Als Handelsartikel erscheint die Kohle erst zu Ende des 12. Jahrhunderts, wie aus einem unter der Regierung Richard's Löwenherz ausgefertigten Freibrief hervorgeht, der den Mönchen von Holyrood den alleinigen Abbau der benachbarten Kohlenfelder zusichert. Zur Seite steht diesem Schriftstücke ein anderes aus gleicher Zeit, durch das der stolze normännische Baron de Guinez dem Capitel von Newcastle den Vertrieb der Kohlen aus seinen Feldern von Witheside und Pinkie gestattet.

Ein halbes Jahrhundert später gab Heinrich der III. den Einwohnern von Newcastle die Erlaubniss, Kohlenbergwerke zu bauen, legte jedoch dafür der Stadt zugleich die für damalige Zeit hohe Steuer von 100 Pfund St. pro Jahr auf, woraus hervorgeht, dass schon zur Mitte des 13. Jahrhunderts — also zur Zeit Conrad des IV. der Hohenstaufen — die Steinkohle beträchtlichen Handelswerth in England hatte.

Am Ende des 13. Jahrhunderts hatte Newcastle bereits einen sehr ausgedehnten Kohlenhandel. Die Kohle war in London

eingeführt worden, wo sie zwar noch nicht im Hausgebrauche, dafür aber desto mehr für gewerbliche Zwecke unter der Siedpfanne der Brauer, auf den Herden der Schmiede verwendet wurde.

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts hatte der Kohlenverbrauch in London schon in so gewaltigen Verhältnissen zugenommen, dass der Unwille des Volks gegen den dadurch erzeugten Rauch und Russ in sehr lebhaften Kundgebungen laut wurde, die sich selbst in einer Zeit hörbar machten, deren wilde Bewegung zu Aufruhr, Bürgerkrieg und Königsmord heraufschlug. Eduard dem II. wurden Petitionen für gänzliche Unterdrückung der Benutzung von Kohlen, die giftig für das Leben von Mensch, Thier und Pflanzen seien, vorgelegt und eine wahrhaft fulminante Proclamation gegen den harmlosen, noch verkannten Stoff geschleudert. Allein auch die Regierung vermochte deren Benutzung nicht zu unterdrücken, obwohl sie mit Strafen aller Art dagegen eingeschritten war.

Wie alle sehr leidenschaftlich beginnende Bewegungen, ohne vernünftige Grundlage, milderte sich auch dieser Fanatismus bald, und je dichter die Wolke von Steinkohlen-Qualm wurde, die sich auf die Städte Englands lagerte, um so ruhiger liess man sich das anscheinend Unvermeidliche gefallen, bis 1673 Carl dem III. Gesetzesvorschläge gegen das Rauchen der Schornsteine vorgelegt wurden, die indess aus Mangel an Mitteln dem Uebel zu begegnen ohne Resultat blieben.

Fast 300 Jahre scheint man der Sache rathlos gegenüber gestanden zu haben, denn erst an den berühmten Namen Denys Papin's knüpft sich die Kunde von einem Apparat zur Verhütung des Rauches bei Herdfeuerungen.

Und nun erst, mit der Erfindung und Verbesserung¹⁾ der Dampfmaschine, tritt die Steinkohle ihr grosses Regiment an. Gegenseitig stützen und heben sich nun der neue Motor und das neue Brennmaterial, um der Industrie in ihrer Gesamtheit Bewegungskräfte von solcher Gewalt, solcher Leitbarkeit und sol-

¹⁾ durch Savery 1698. Newcomen 1705. James Watt 1763.

cher Ungebundenheit an Raum und Ort zu liefern, dass sie ohne dieselben nimmermehr ihr grosses Amt hätte erfüllen können. Und so, wie die erste Dampfmaschine von Newcomen nur dazu diente, die Wasserhaltung seiner Kohlengruben zu besorgen, so waren die Eisenbahnen lange Zeit nur für den Transport von Steinkohlen bestimmt.

Wie gross die Verbreitung der Steinkohlen auf unsrer Erde ist, und bis zu welcher Production und Consumption sie gestiegen, mögen nachstehende statistische Zahlenangaben erläutern:

Von den 9,488,000 deutschen Quadratmeilen Oberfläche oder 2,424,000 deutschen Quadratmeilen Landes unserer Erde nehmen die Steinkohlen-Lager ca. 8000 deutsche Quadratmeilen ein, davon kommen:

	deutsche Quadratmeilen	m. einer Produkt. per Jahr v.
auf Grossbritannien	600	1,000,000,000 Ctr.
„ Vereinigten Staaten Amerikas	6000	250,000,000 „
„ Preussen	200	168,000,000 „
„ Belgien	32	150,000,000 „
„ Frankreich	100	140,000,000 „
„ Oestreich	100	50,000,000 „
„ sonstige deutsche Staaten	52	30,000,000 „
„ Spanien, Portugal u. Italien	180	20,000,000 „
„ sonstige Länder der Erde	736	192,000,000 „
Zusammen ¹⁾	8000	2,000,000,000 Ctr.

Wir haben endlich noch zweier Mineralien zu gedenken, welche sich als reiner Kohlenstoff in amorpher und kristallisirter Form betrachten lassen. Es ist dies der Graphit, welcher für unsere Stadt eine Quelle lohnender Industrie als färbender Bestandtheil der Bleistifte geworden ist und durch seine Feuerbeständigkeit auch das beste Material zur Darstellung von Schmelztiegeln liefert; und der reinste, härteste und kostbarte aller Edelsteine der Diamant.

Wie für den Luxus der Diamant den höchsten Werth hat, so haben ihn die Steinkohlen für die Industrie, in welchem Sinne man diese wohl auch schwarze Diamanten nennen könnte.

¹⁾ Steinkohlenstatistik von 1854.

Mögen diese schwarzen Diamanten unserer vaterländisch-deutschen Gewerbethätigkeit durch Entlastung von staatlichen Bergwerksabgaben, durch zweckentsprechende billige Productions- und Verkehrs-Verhältnisse immer mehr zugänglich gemacht werden; dann ist ihrem kräftigen Gedeihen eine sichere Bürgschaft mehr geboten und ihre Ueberflügelung, durch in dieser Beziehung bisher begünstigtere Staaten, nicht zu fürchten. —

Die Vögel Mittelfrankens.

Ein Beitrag zur Kenntniss der geographisch-statistischen Verbreitung der deutschen Vögel

von

Andreas Johannes Jäckel,

k. Pfarrer in Sommersdorf und Thann bei Ansbach.

Mittelfranken ist in naturhistorischer Beziehung so vielseitig und fleissig durchforscht, wie nicht leicht ein zweites Stück deutschen Landes; eine der bevorzugtesten Stationen wissenschaftlicher Thätigkeit aber war von jeher Nürnberg, woselbst denn auch die Ornithologie seit etwa 70 Jahren durch eine Reihe namhafter Gelehrten und fleissiger Faunisten eine vorzügliche Pflege fand. Vor Allen nenne ich den Professor Dr. Johann Wolf, den ersten Begründer und Stifter unserer naturhistorischen Gesellschaft, dessen hundertjährige Geburtstagsfeier wir am 26. Mai 1865 in festlicher Versammlung und dankbarer Erinnerung zu begehen haben, nächst ihm den Professor Dr. Wagler († 23. August 1832), Dr. Michahelles, Dr. Hahn, den unvergesslichen Dr. Joh. Heinr. Christ. Friedr. Sturm († 24. Januar 1862) und seinen Bruder Dr. Joh. Wilhelm Sturm. Viel Brauchbares für gegenwärtige Arbeit fand ich im Taschenbuche der deutschen Vögelkunde von Dr. Meyer und Dr. Wolf, in einem Bande handschriftlicher Aufzeichnungen des Letzteren, deren Benützung ich der Güte meines verehrten Freundes Dr. Wilhelm Sturm verdanke, in der Fauna boica von Reider und Hahn, in Jakob Sturm's Deutschlands Fauna, in Wagler's einzelnen Beiträgen zur bayerischen Fauna und anderwärts. Sehr viele seltene, in Mittelfranken erlegte Vögel enthielten oder enthalten noch verschied-

dene öffentliche oder Privatsammlungen, das Universitäts-Cabinet zu Erlangen, die herzoglich leuchtenberg'sche Sammlung zu Eichstädt, die Sturm'sche und die ehemals Ziegler'sche Sammlung zu Nürnberg, vereinzelte, da und dort zerstreute Seltenheiten die zahlreichen kleinen, von mir gemusterten Privatsammlungen von Landgeistlichen, Forstbediensteten, Aerzten und wohlhabenden kleinstädtischen Bürgern. Ich selbst habe während 25 Jahren die mittelfränkische Ornis an den verschiedensten Oertlichkeiten des Kreises um Nürnberg, Wendelstein, Schwabach, Roth a. S., Cadolzburg, Ammerndorf, Ansbach, Sommersdorf, Herrieden, Feuchtwangen, Kloster Sulz, Erlangen und im Aischgrunde schon als Gymnasiast, dann während meiner Studien- und Candidatenjahre und auf 2 Pfarreien, ich darf es wohl sagen, mit aller Gründlichkeit erforscht, während dieser ganzen Zeit ununterbrochen Tagebücher geführt und in verschiedenen Gegenden Beobachtungsstationen gegründet, von welchen aus mir seit anderthalb Jahrzehnten von vorzüglichen Kennern und scharfen Beobachtern regelmässige Jahresberichte über den Zug und Strich, über das Brütgeschäft und alles Bemerkenswerthe aus dem Bereiche unserer Vogelwelt zugesendet wurden. Auf diese Weise habe ich die Vorkommnisse um Rothenburg o. T., Burgbernheim, Windsheim, Uffenheim und Gunzenhausen vollständig kennen gelernt und dürfte dieser Apparat mehr als hinreichen, um ein getreues Bild unseres Kreises in ornithologischer Beziehung entwerfen zu können. Allen Förderern meiner Studien verbindlichsten Dank, besonders Herrn Dr. J. W. Sturm, Herrn Forstwart Jägerhuber in Arberg und Herrn Forstgehilfen W. Donle in Dormitz.

Vultur und Gyps. Von dem Vorkommen eines braunen oder grauen Geiers in Mittelfranken ist mir mit Bestimmtheit Nichts bekannt geworden. In früherer Zeit, als in Bezug auf öffentliche Reinlichkeit die Zustände in Süddeutschland denen des europäischen Südens noch einigermaßen ähnlich waren und allerorten noch die Leichname Justifizirter auf Galgen und Rad faulten, sind Aasgeier bei uns ungleich häufigere Erscheinungen gewesen, als in unserem civilisirten Jahrhundert, und dürfen mit hoher Wahrscheinlichkeit jene in der Lebensgeschichte des Mark-

grafen Georg Friedrich zu Brandenburg-Ansbach († 1603) bertüchtigt gewordenen Adler hieher gedeutet werden. Bei dem Kloster Sulz liessen sich nämlich 1602 acht Adler sehen, die sich in der Gegend bei 12 Tagen, und zwar der eine allein hinter des Klosters Hirtenhaus, die sieben anderen aber auf einem Haberacker, sowie auf einer Brache bei dem Holze Brambach hinter dem nahen Orte Dombühl aufhielten. Der Markgraf kam ihnen am 15. Juli so nahe, dass man sie wohl hätte schiessen können. Weil aber der durch Träume und Naturereignisse geängstigte, abergläubische Fürst die Adler als Vorzeichen seines baldigen Todes betrachtete, so wollte er sie nicht schiessen, sondern lebendig fangen lassen. Ehe aber der Zeug dazu von Ansbach gekommen, waren die unheimlichen Vögel hohen Fluges nordwärts weiter gezogen. Ein dergleichen Vogel, heisst es in den Pfarrakten von Kloster Sulz, ist im Jahre 1579 bei Ansbach gesehen und von einem Falkner Franz Gärtner am Galgenberge geschossen worden „und ist ganz braun von Federn gewest.“ Das gesellige Beisammensein von 7 Stücken, die Jahreszeit, der Aufenthalt auf dem Boden und endlich die Farbe sprechen ziemlich unzweideutig für ächte Geier. Gewöhnliches Raubzeug hätte auch die fürstliche Jägerei mit Sicherheit anzusprechen gewusst und hätte den Markgrafen nicht mit Todesfurcht erfüllt.

1. *Falco subbuteo* L. Ein unter dem Namen „Weissback, Weissbäcklein, Lerchenfalke, Lerchenstössl“ allgemein bekannter, zeitig im Frühjahr vorkommender, bei uns horstender und mit den Feldlerchen wegziehender Falke.

2. *Falco peregrinus* Briss. Der Wanderfalke horstet in Mittelfranken nicht, auf dem Striche aber ist er einer unserer gewöhnlicheren, überall vorkommenden Raubvögel, kommt schon im letzten Drittel des August und anfangs September, häufiger erst im Oktober und November zu uns, jagt auf zahme und wilde Tauben, auf Enten, Rebhühner, Staare, wird im Stoss, selbst auf Lerchenheerden gefangen, hält sich den Winter über gerne in Gegenden, wo ihm alte Bergschlösser oder Thürme und Zwinger alterthümlicher Städte zu Hochwarten dienen, und verlässt uns wieder im März.

3. *Falco gyrfalco* L. Dass der Gierfalke wirklich schon einmal bis nach Mittelfranken sich verirrt hat, beweist unwiderleglich ein im Besitze des Herrn Handschuch, Gehilfen am germanischen Museum in Nürnberg, befindliches Oelgemälde, worauf ein junger Gierfalke mit nachstehender Unterschrift abgebildet ist: „Dieser hier befindliche, wilde, rothe, nordische Göhrfalk ist den 17. November 1790 zwischen Neuses und Ornbau (bei Triessdorf, der Winterresidenz des Markgrafen Alexander von Brandenburg-Ansbach gelegen), als dieser Falk einige Feldhühner verfolgte, von dem Jägerburschen Namens Johann Wilhelm Hüttlinger (einem Sohne des Triessdorfer Oberförsters und Oberpiqueurs Hüttlinger) geschossen und wegen seiner Seltenheit, einen solchen wilden nordischen Falken hier zu Land zu sehen, ausgestopft und sonach abgemalt worden.“ Dass es kein entflogener Baizvogel war, geht aus diesen Worten und aus dem Umstande zur Genüge hervor, dass der genannte Jägerbursche als markgräflicher, am Sitze des fürstlichen Hofes angestellter Jagdbediensteter Kunde davon gehabt haben müsste, wenn ein so edles kostbares Thier, welches ja dann auch Attribute der Falknerei getragen hätte, den Falkenknechten in dem nahen Gunzenhausen oder bei der Jagd durchgegangen gewesen wäre.

4. *Falco aesalon* Gm. Zur Strichzeit in ganz Mittelfranken nicht selten, meistens junge Vögel, seltener alte ausgefärbte Männchen. Er kommt gewöhnlich im letzten Drittel des Septembers und zieht anfangs März wieder fort, doch traf Herr Forstwart Jägerhuber in Arberg bei Gunzenhausen einen Merlin noch am 19. April 1855 an und bei Neustadt a. A. wurde ein schönes altes Männchen noch im Juli 1847 erlegt, so dass es scheint, dass einzelne Paare hie und da auch bei uns brüten. Er wird öfter auf Vogelheerden gefangen, woselbst er auf die Lockvögel stösst. Im Residenzschlosse zu Eichstädt wurde im Winter 1821 ein junger Merlin gefangen, welcher in der Hitze der Verfolgung eines Sperlings in einen Saal geflogen war.

5. *Falco vespertinus* L. Dieser schöne Falke kommt regelmässig alle Jahre auf dem Striche durch Mittelfranken. Da man gewohnt ist, sein Erscheinen bei uns als eine grosse Selten-

heit anzusehen, so will ich durch einen Auszug aus meinen Notizbüchern beweisen, dass der Rothfussfalke diess nicht ist, sondern häufig genug bei uns durchzieht. Im Spätherbst 1832 wurde ein junges Männchen auf einem Vogelheerd bei Nürnberg gefangen. Am öftesten wurde er in der Nähe dieser Stadt auf dem Dutzendteich von dem seligen Dr. Friedrich, seinem Bruder Dr. Wilhelm Sturm und mir beobachtet. Die genannten Herren trafen ihn einmal am 10. Mai zugleich mit *Larus minutus* und *Sterna leucoptera* an; ich selbst sah am 12. Mai 1848 ebendasselbst 8 Stück über einer in den Hauptweiher verlaufenden nassen Wiese, in deren Nähe sich weitere Wiesen und ein Torfstich befanden, nicht weit von der den Teich umgebenden Föhrenwaldung längere Zeit umherfliegen und traf das Jahr darnach am 3. Mai an der nämlichen Stelle wieder eine kleine Gesellschaft, am 10. Mai 1850 aber einen Flug von wenigstens 20 Stücken. Einzelne Paare oder kleine Flüge bemerkten die Herren DD. Sturm am Dutzendteich den 20. Mai 1850, den 10. Mai 1852, anfangs Juni 1853, den 13. Mai 1857 und am gleichen Tage des folgenden Jahres. Am 4. Mai 1860 sahen sie 7 Stück, welche so wenig scheu waren, dass sie auf 10 Schritte an die Beobachter herankamen, und endlich am 25. Juni 1861 drei dieser Falken, von welchen ein Pärchen bis Mitte Juli häufig gesehen wurde und vielleicht in der Gegend gebrütet hat. Bei Erlangen wurde ein altes Männchen in der Nähe dieser Stadt, ein Pärchen bei Eichstädt, ein zweites Pärchen vor etwa 20 Jahren am Fusse des Hohenlandsbergs auf der Krähenhütte vor dem Uhu erlegt und in den letzten Tagen des Monats April 1863 fünf Stück, welche in der Gegend von Triessdorf über einer bis Walpurgis jeden Jahres mit Wasser angestemmtten Wiesenfläche bei dem Dorfe Heglau gegen Abend umherflogen, längere Zeit beobachtet.

Falco cenchris Naum. Ein Männchen, bei welchem auch ein Weibchen gesehen wurde, schoss im Mai 1840 eine Stunde von Erlangen bei Möhrendorf, nahe der mittelfränkischen Kreisgrenze, der jetzige Revierförster Ernst Wich zu Aurach.

6. *Falco tinnunculus* L. Nächst dem Mäusebussard der gemeinste Raubvogel Mittelfrankens. Er kommt zeitig im Früh-

jahre zu uns, brütet in Feldhölzern, sehr selten auf Stadtthürmen oder unbewohnten, verfallenden Schlössern und zieht im Spätherbste, die letzten Verspäteten im November und December weg: einzelne — besonders Männchen — bleiben in gelinden Wintern ganz bei uns, leiden aber, wenn einige Zeit tiefer Schnee und höhere Kältegrade anhalten, durch Nahrungsmangel so sehr, dass sie ganz von Kräften kommen, in die Nähe der Dörfer, ja selbst nach den Städten sich ziehen und daselbst entweder ganz ermatet mit den Händen gefangen oder über kühnen Wagnissen erschlagen oder aber verhungert gefunden werden. Ein äusserst nützlicher Vogel, in dessen Innerem ich meistens Mäuse und Insekten, oft sehr viele Maulwurfgrillen und Heuschrecken (*Locusta verrucivora*), Professor Wolf die nämlichen Thiere und auch gemeine Eidechsen fand. Auf den Vogelheerden sticht er gerne auf die Lockvögel, besonders die Vorläufer, und wird gefangen.

7. *Pandion haliaëtus* L. Ein Zugvogel, der Ende März oder anfangs April bei uns ankommt, in einzelnen Strichen horstet und im September und October uns wieder verlässt. Wasserarme Gegenden sehen ihn sehr selten oder gar nicht; wo grosse Weiher vorhanden sind oder eine Anzahl kleinerer Weiher eine bedeutendere Wasserfläche bildet, fischt „der Weissbauch“ zum grossen Verdrusse des Fischereibesitzers während der beiden Strichperioden nur zu oft, in wald- und wasserreichen Gegenden aber, wie in der Nähe des Dutzendteiches bei Nürnberg, nistet er in den Reichswald-Revieren Lichtenhof, Fischbach, Altenfurth, Feucht, Röthenbach bei Lauf und anderwärts alljährlich in einzelnen Paaren auf riesigen Föhren- und Fichtenüberständen. Vor 1800 horstete er hinter Erlenstegen auf hohen Tannen. Bei den Fischereien wurden in verschiedenen mittelfränkischen Teichen Weissbauchgerippe auf lebenden Karpfen, Schlagmüttern, gefunden.

8. *Circaëtus gallicus* Vieill. Ein Weibchen dieses sehr zerstreut und sparsam vorkommenden Adlers erhielt Professor Wolf am 25. April 1801 aus dem Reichswalde St. Laurenzi bei Nürnberg und fand in dessen Magen Reste von *Anguis fragilis*, *Coluber natrix* und *austriacus*.

9. *Pernis apivorus* L. Der Wespenfalke gehört zu den besseren ornithologischen Vorkommnissen unseres Kreises, kommt im März und April bei uns an, horstet und zieht im September und October wieder weg. Professor Wolf erhielt viele Exemplare aus dem Laurenzi-Forste bei Nürnberg, vom Dutzendteich, von der Gritz bei Mögeldorf, von Hammer, Laufamholz und Röthenbach bei Lauf in den Jahren 1799—1814. Eines dieser Exemplare wollte eben auf dem Dutzendteich ein Huhn davontragen, ein anderes plünderte ein Nusshehnerest, von dessen 7 Eiern es 3 zerbrochen und ausgefressen hatte, als es vom tödtenden Blei ereilt wurde. In den Mägen dieser Falken fand Wolf Eidechsen (*Lacerta agilis* und *crocea*), Nattern und Blindschleichen, Raupen, Mai- und andere Käfer und Heuschrecken. Auch bei Erlangen, Cadolzburg, Neustadt a. A., Windsheim, Hoheneck, Feuchtwangen, Dombühl, Rothenburg o. T., Gunzenhausen (Arberg, Lellenfeld etc.), bei Ansbach in der Feuchtlach, bei Schalkhausen, im Burgerwalde bei Herrieden und endlich bei Eichstädt horstet der Wespenfalke.

10. *Buteo vulgaris* Bechst. Unser gemeinster Raubvogel. Die in den strengen Wintermonaten bei uns sich herumtreibenden Mäusebussarde sind jedenfalls Zuzügler aus Norden; die bei uns brütenden verlassen uns im Spätherbst und kommen Mitte Februars bis März wieder. Rein weisse, gelblichweisse, weisse mit gewöhnlich gefärbten Flügeln, auch die ganz dunkle Varietät, der sogenannte schwarze Mauser oder Rusgeier, kommen zuweilen vor. In dem harten Winter 1845 erhielt ich am 1. April einen Bussard, welcher erfroren, fest an dem Ast einer Fohre mit beiden Fängen angekrallt und so herunter hängend gefunden worden war. Der Landwirthschaft ist dieser Vogel in hohem Grade nützlich, da er sich hauptsächlich von Mäusen und schädlichen Insekten nährt. Ich fand im Magen eines am 21. Juli 1855 erlegten Weibchens 20 Maulwurfsgriillen; so viele zählte ich und hatte das Thier noch mehr gefressen; denn es war der ganze Magen damit vollgepfropft. Professor Wolf schnitt am 14. November 1804 aus einem Bussardmagen nicht weniger als 20 Raupen der *Triphaena pronuba*, aus anderen Mäuse, Eidechsen, Blindschleichen, Mai-, Rosskäfer, Maulwurfsgriillen und die grosse grüne Heu-

schrecke. Im Frühjahr wird manchmal ein Bussard auf dem Vogelheerde und im Winter im Habichtstoss gefangen, auch fängt er sich manchmal einen Eichelheher.

11. *Buteo lagopus* Brunn. Der Rauchfuss-Bussard kommt alljährlich nicht selten auf dem Striche, manchmal schon anfangs, gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte des Oktobers zu uns, bleibt den Winter über und verlässt uns wieder im März. Einzelne Paare scheinen auch bei uns zu brüten, wenigstens beobachtete Dr. Brandt in der Umgegend von Neustadt a. A. (Illesheim, Steinbach, Sugenheim) diesen Raubvogel alljährlich, obwohl nicht häufig, doch zu jeder Jahreszeit und wurde ihm einst von Illesheim ein solcher Bussard zugleich mit einem Pirol im Fleische eingeliefert. Herr Forstwart Jägerhuber, ein vorzüglicher Kenner und Beobachter, erlegte in der Gegend von Gunzenhausen bei Arberg 2 Stücke am 2. Mai 1854 und sah ebendasselbst einen Einzelnen am 11. Juni 1855. Ist ebenso nützlich, wie der vorige, sammelt sich in grosser Anzahl im Herbst in Gegenden an, die von Mäusen schwer heimgesucht sind, und wird manchmal auf dem Vogelheerd gefangen.

12. *Aquila naevia* Briss. und *clanga* Pall. Schreiadler kommen nur selten zu uns. Der selige Dr. Friedrich Sturm erhielt einen solchen Adler am 24. November 1824 aus der Gegend von Nürnberg zum Ausstopfen. Ob derselbe zu der grossen oder der kleinen Schreiadler-Art gehörte, konnte nicht mehr ermittelt, dagegen kann mit Gewissheit gesagt werden, dass ein im Jahre 1811 in der Gegend von Rothenburg o. T. von einem Feldbaume bei Gebstattel herabgeschossener, sehr schöner Adler ein *Aquila clanga* Pall war.

13. *Aquila chrysaëtos* L. Hie und da verstreicht sich ein Steinadler im Winter, manchmal auch im Sommer ein junger Vogel zu uns und wurden dergleichen Verirrte bei Wilhelmsdorf, Eichstädt, Solenhofen, Gunzenhausen, Arberg, Uffenheim und anderwärts erlegt. Sie waren in der Regel gänzlich abgemagert und ausgehungert, zeigten ein von ihrer sonstigen Lebensweise verschiedenes auffallendes Benehmen, stürzten sich, von Hunger gequält, sogar auf nahe an den Orten Schlitten fahrende Knaben oder heimkehrende Schulkinder, setzten sich, wie diess erst am 25. De-

cember 1862 in hiesiger Gegend in dem Dorfe Arberg der Fall war, auf Häuser oder Bäume in deren Nähe oder blieben Stunden lange, von Elstern, Krähen und kleinen Vögeln geneckt, auf Feldbäumen unbeweglich sitzen.

14. *Haliaeetus albicilla* Briss. Der Seeadler kommt auf dem Striche von der Isar, dem Lech und der Donau herauf, öfter als der Steinadler, mit welchem ihn die Jäger vielfach verwechseln, auf die mittelfränkischen Gewässer, meistens jedoch nur junge Vögel. Ein altes Männchen mit wachsgelbem Schnabel und reinweissem Schwanze wurde bei Eichstädt, ein ebenso schönes altes Weibchen am 14. November 1854, nachdem es sich Tags zuvor auf dem Dutzendteich und bei Erlenstegen hatte sehen lassen, nahe der Gerasmühle bei Reichelsdorf, ein junger Seeadler 1835 über der Verfolgung von Wildenten nahe an Erlangen von der Regnitzbrücke aus von dem jetzigen Revierförster E. Wich in Aurach, andere bei Weissenburg und Wassertrüdingen, bei letzterer Stadt ein junger Vogel noch am 24. Mai 1852 geschossen. Der bei der Gerasmühle erlegte Adler hatte Knochen eines Hasen im Magen.

15. *Milvus regalis* Briss. Einer unser gewöhnlicheren Raubvögel, in einzelnen Strichen, wie im weissen und schwarzen Gau, bei Windsheim, Uffenheim, Rothenburg und anderwärts gemein, seltener bei Nürnberg, Erlangen und Ansbach, doch überall im ganzen Kreise horstend. Er kommt anfangs März bis anfangs April bei uns an, zieht Mitte Oktober wieder fort und bleibt in gelinden Wintern in einzelnen Fällen ganz da. 1852 sah ich am 27. December bei Burgbernheim bei ausserordentlich milder Witterung einen Milan über die Felder revieren und 1802 wurde bei Nürnberg ein Weibchen bei grosser, lange anhaltender Kälte und tiefem Schnee am 18. Januar auf einem Vogelheerd gefangen. Im Herbst 1853 gab es im Gollachgau unsäglich viele Mäuse und ihretwegen ausserordentlich viele Mäusefeinde, ausser Rabenkrähen und Kornweihen viele Milane, welche der reichlichen Nahrung halber erst kurz vor Weihnachten wegzogen. Mittelfränkische Benennungen dieses Vogels sind: Milone, Gorner, Guraar, Guro, Gura, Gabel-Zwieselgeier, Gabelweihe, Gabel-Schwalbenschwanz.

16. *Milvus niger* Briss. In Mittelfranken sehr selten.

Am 1. Juni 1861 sah ich einen schwarzen Milan über Sommersdorf, am 22. Juni 1863 wieder einen Einzelnen eine Stunde von da über Weiherschneitbach kreisen. Es scheint, dass er in der Gegend brütet.

17. *Astur palumbarius* L. Der Taubenhabicht, auch der „Vogel, Hacht, Taubenhacht, Taubenvogel, Hasenstössel, Hühnergeier“ genannt, ist nirgends selten und, wie schon die angeführten Volksnamen andeuten, dem Jäger und Taubenliebhaber von schlimmer Seite bekannt genug. Wir sehen ihn zu jeder Jahreszeit. Am 5. Juli 1747 wurde auf der Cadolzbürger Wildfuhr in dem Holze Weissensee ein Habicht gefangen, welchem aus der Befiederung der Innenseite des Schenkels hoch oben am Leibe ein deformer Fang, 3 Vorderzehen von der halben Länge der normalen, hervorstehen. Das den Falken in Lebensgrösse auf der Faust eines Falkners darstellende Oelbild befindet sich im Besitze des Herrn Forstwarts E. Graf zu Rauhenzell.

18. *Astur nisus* L. Allenthalben das ganze Jahr hindurch vorhanden und fast jedem Kinde bekannt. Im Winter jagt er den Sperlingen in den Dörfern mit solchem Eifer nach, dass er erst vor wenig Tagen in einem Dorfe hiesiger Gegend einem in einen grossen Reissighaufen sich verschlüpfenden Sperlinge nachsetzte und sich so darinnen verwirrte, dass ein herzuspringender Bauer den Räuber am Schwanze hervorzog, freilich aber nichts als die Schwanzfeder des ungestümen Thieres in der Hand behielt. Er wird gewöhnlich „Hächtlein“ genannt.

19. *Circus cyaneus* L. Die Kornweihe hat früher im mittleren und unteren Aischgrunde gebrütet, findet sich aber nunmehr nur noch in den beiden Strichperioden, im März und April und wiederum im September bis Mitte November. In gelinden Wintern und bei starker Mäusevermehrung bleiben sie manchmal bis Ende December; einzelne werden auch von Schnee und Kälte überrascht. So zogen sie im Spätherbst 1853 aus der Gegend von Uffenheim, wo es von Mäusen wimmelte, erst um Weihnachten ab; Wolf erhielt einen jungen Vogel am 23. December 1820 von Kalchreuth; ich selbst sah ein altes Männchen in der Gegend von

Erlangen am 16. Februar 1859. Wird manchmal auf dem Lerchenheerd gefangen.

20. *Circus cineraceus* Mont. Ich sah Exemplare, die im mittleren Aischgrunde bei Tanzenhaid geschossen wurden; Wolf erhielt sie aus der Gegend von Ansbach.

21. *Circus aeruginosus* L. Selten in den beiden Strichperioden im September und Oktober und wieder im April, wurden Rohrweihen bei Nürnberg auf dem Dutzendteich, bei Ansbach, Arberg und Eichstädt gesehen und erlegt. Im Magen einer solchen Weihe fand Wolf eine Wassernatte (*Arvicola amphibius*).

22. *Strix flammea* L. Standvogel, auf Kirchthürmen, alten Schlössern, in Städten und Dörfern brütend und besonders in der Gegend von Windsheim, Uffenheim, Rothenburg o. T. sehr verbreitet, viel seltener bei Nürnberg. Hier hatte sich im Jahr 1645 ein Schleiereulen-Paar in der St. Lorenzkirche einen höchst merkwürdigen Nistplatz erwählt, nämlich auf dem grünen Vorhange, welchen der Rath der Stadt um den berühmten englischen Gruss, ein Meisterstück des Veit Stoss, in Folge einer Predigt des bekannten Eiferers Andreas Osiander¹⁾, hatte machen lassen. Im Juli genannten Jahres wurde das Kunstwerk* herabgelassen von dem Unrathe gereinigt, welchen die darin heckenden Eulen gemacht hatten, und mit einem neuen Vorhang bekleidet.

23. *Ulula uralensis* Pall. Seit Professor Wagler in einem Fichtenwäldchen bei Erlangen eine solche Eule schoss, wurde sie bei uns von keinem Forscher mehr beobachtet.

24. *Ulula aluco* L. Ein weit verbreiteter Standvogel. Die rothe Varietät erhielt Wolf aus der Gegend von Nürnberg öfters unter dem Namen „rothe oder Feuereule.“

25. *Aegolius otus* L. Ein Strich- und Zugvogel, in manchen (mäusereichen) Jahren ungemein häufig, so dass man öfters 20 und noch mehr Stücke beisammen findet. Die bei uns brütenden „Hörnleinseulen“ ziehen jedenfalls alle fort und kommen im Februar und März wieder in unsern Waldungen an. Die bei uns überwinternden dürften wohl nordische Gäste sein und solchen er-

¹⁾ Er nannte die Maria „die guldene Grasmagd.“

geht es, wenn sie nur reichliche Mäusenahrung finden, selbst in strengen Wintern sehr gut. In dem schneereichen grimmig kalten Winter 1844/45 erhielt ich aus der Gegend von Nürnberg viele dieser Eulen, die alle sehr fett und mit Mäusen vollgestopft waren. Gibt es wenig Mäuse, so ergeht es ihnen oft recht elend. So wurde mir einst Mitte December bei tiefem Schnee und grosser Kälte eine zum Gerippe heruntergemagerte Ohreule gebracht, welche über dem Versuche, in einen Taubenschlag einzudringen, erschlagen worden war und im Magen nichts hatte, denn 5 Weizenkörner, ein Gerstenkorn und 2 Linsen.

27. *Aegolius brachyotus* Forster. Die Sumpfohr-Eule kommt auf dem Striche im September und Oktober in mäusearmen Jahren nur in geringer, wenn es aber viele Mäuse gibt, in sehr grosser Anzahl zu uns und bleiben bei reichlicher Nahrung selbst in den kältesten Wintern da, wie diess 1844/45 bei Nürnberg der Fall war, wo mir viele solcher Eulen geliefert wurden, die, während das Haar- und Federwild fast ausstarb, alle wohl genährt und fett waren.

27. *Nyctale Tengmalmi* J. Fr. Gm. Ein sehr schöner, seltener Kauz. Professor Wolf erhielt ein Weibchen vom Hammer bei Nürnberg im November 1802, ein Männchen aus der Nähe seiner Vaterstadt am 25. Juni 1803, ein Weibchen, welches aus dem Neste im Loche einer Tanne bei Rossstall genommen wurde und 2 Eier hatte, am 27. Mai 1808, endlich ein Stück ohne Angabe des Geschlechts, welches am 13. Oktober 1818 auf einem Vogelheerde bei Feucht gefangen worden war. Ich selbst sah bei einem Ausstopfer zu Fürth ein in der Gegend geschossenes frisches Exemplar, sowie anfangs Juni, im Herbst und im December 1844 und am 19. Januar 1847 in der Nähe von Erlangen auf der Reichswaldrevier Puckenhof erlegte Alte und da selbst ausgebrütete Junge. Auf der angrenzenden Revier Dormitz schoss Herr Forstgehilfe Wilh. Donle im Winter 1860 bei grosser Kälte ebenfalls einen Raufusskauz; drei in den Jahren 1828 1833 und 1845 in der herzoglichen Fasanerie bei Eichstädt erbeutete Stücke zierten die leuchtenberg'sche Sammlung und ein

bei Ansbach auf der Revier Schalkhausen erlegtes Exemplar eine mir bekannte Privatsammlung.

28. *Surnia noctua* Retz. In alten Bauwerken, in Stadtmauern und Thürmen, hohlen Bäumen, Gewölben etc. gar nicht seltener Standvogel, welcher überall nistet, wo ihm Baumhöhlen und Gemäuer Brüteplätze bieten. Das Geschrei des „Todtenvogels“ oder der „Klagemutter“, wie dieses Käuzchen gewöhnlich genannt wird, hält der Aberglaube in Stadt und Land für das gewisse Anzeichen eines baldigen Todesfalles.

29. *Surnia passerina* L. Eine Sperlings-Eule der herzoglich von leuchtenberg'schen Sammlung wurde im Herbst 1829 eine halbe Stunde von Eichstädt bei dem Ziegelhofe in der Droselschneide im Bogen gefangen.

30. *Surnia funerea* Lath. wurde einmal im Aischgrunde und zwar im Frühling 1845 bei Tanzenhaid geschossen.

31. *Bubo maximus* Ranz. Ein Stand- und Strichvogel, in den meisten Gegenden nur auf dem Strich, im Jura des Altmühlthales aber in einzelnen Paaren, im Nürnberg'schen Gebirgslande in der Gegend um Lauf, Henfenfeld, Engelthal, Schnaittach, Reicheneck, Happurg, Hersbruck, Hohenstadt, Eschenbach, Lichtenstein u. s. w. gar nicht selten horstend. Von diesen Standorten aus verstreicht er im Winter manchmal und wurden einzelne Exemplare des Uhus an vielen Orten des Kreises geschossen. Früher hat ein Paar in der St. Blasii-Kapelle bei Rothenburg o. T. gebrütet, nachdem aber die Jungen weggenommen und die Alten im Fuchseisen gefangen worden waren, haben solche Eulen nicht mehr daselbst gehaust. Bei Neustadt a. A. wurde vor längeren Jahren ein kranker Uhu geschossen, in dessen Magen ein Stück Igelschwarte gefunden wurde, deren Stacheln in die bereits brandige Magenwand ziemlich tief eingedrungen waren. Endlich sey noch die Anführung verstattet, dass an der Fallhütte bei Cadolzburg, wo sich der Uhu auf dem Striche manchmal einfindet, am 20. Oktober 1828 ein solcher Vogel erschlagen wurde, der an einem Fang ein Kettlein mit einem Ringe trug, auf welchem der Name eines Ortes in Böhmen eingravirt war.

32. *Cypselus apus* L. Ein gemeiner Zugvogel, der selten

schon in den Tagen vom 20. bis Ende April, gewöhnlich erst in den ersten Tagen des Mai bei uns ankommt, in den Mauerritzen der Thürme, Stadtgräben, Ruinen, in Felsenritzen und Staarenkobel an hohen Häusern der Städte brütet und in den letzten Tagen des Juli, gewöhnlich am 26. oder 27. dieses Monats, schon wieder abzieht. Im Jahre 1860 blieb eine einzelne „Mauer- oder Steinschwalbe“ wenigstens noch 14 Tage nach Abzug ihres Gatten und aller andern Gattungsgenossen in Nürnberg zurück, um ihre Jungen in einem Staarenkobel am Hause der Herren DD. Sturm vollends gross zu füttern. Bis Mitte August wandern die letzten Verspäteten und die nordischen Durchzügler von uns fort und gehört ein einzelner Vogel dieser Art, den Herr Dr. J. W. Sturm am 7. September 1856 über der Höhe des Moritzberges kreisen sah, zu den grössten Seltenheiten. Am 16. Mai 1857 hörten die eben genannten Herren in einem der beiden Staarenkobel an ihrem Hause einen gewaltigen Rumor und bald klägliches Schreien eines Vogels. Sie nahmen daher den Kobel ab und gewahrten einen Staaren, der mit aller Kraft sich anstrengte, aus dem Loche herauszukommen, aber von einer unsichtbaren Gewalt in dem Kobel zurückgehalten wurde. Der eine der Herren zog kräftig an dem Staare, um ihn zu befreien, musste aber, wenn er den Vogel nicht tödtlich beschädigen wollte, nachlassen. Nach Abnahme des Deckels wurde der arme Matz aus den Krallen eines *Cypselus apus* erlöst, der nun mit seinem Weibchen in fernerhin unangefochtenem Besitze des Kobels blieb und darin brütete.

33. *Caprimulgus europaeus* L. Kommt Ende April und anfangs Mai, brütet in unsern Wäldern und verlässt uns wieder im August und September, einzelne erst im Oktober. Mittelfränkische Benennungen: Nachtfalter, Nachtschatten, Nachtpatscher, Wegflagge, Wegflackerer, Frosch-, Hietschenmaul.

34. *Cuculus canorus* L. Ein allgemein bekannter Zugvogel, kommt von Mitte April, selten früher, bis Anfang Mai bei uns an, brütet und zieht im August wieder weg. Sehr schöne rothbraune Kuckucke wurden bei Nürnberg, Herrieden etc. erlegt.

35. *Jynx torquilla* L. „Drehhals, Ottermännchen, Giess-

vogel.“ Kommt im April, brütet und zieht im August und September wieder weg.

36. *Gecinus viridis* L. Stand- und Strichvogel.

37. *Gecinus canus* Gm. L. Stand- und Strichvogel, seltener als der vorige.

38. *Dryocopus martius* L. Seltener Stand- und Strichvogel, unsere grossen Nadelwaldungen bewohnend. „Hohlkrähe, Holzhenne, Holzgöcker.“

39. *Picus major* L. Ein allerwärts bekannter Stand- und Strichvogel.

40. *Picus medius* L. Stand- und Strichvogel, aber in vielen Gegenden ziemlich selten, bei Nürnberg im Reichswalde, bei Schwabach, Neustadt a. A., bei Uffenheim, Windsheim, Gunzenhausen, Eichstädt etc. brütend.

41. *Picus minor* L. Ziemlich seltener Stand- und Strichvogel.

42. *Apturnus tridactylus* L. Von seinem Vorkommen in Mittelfranken ist nur ein einziges Beispiel bekannt; ein Exemplar wurde nämlich in der Nähe des ehemaligen Stiftes Rebendorf bei Eichstädt erlegt.

43. *Alcedo ipsida* L. Der Eisevogel ist ein allgemein bekannter Stand- und Strichvogel. Im Winter, wenn bei grosser Kälte alle Gewässer zufrieren, geht mancher dieser schönen Vögel zu Grunde. So erhielt Wolf am 17. Januar 1802 einen erhungerten Eisevogel aus Nürnberg, dem der Koth am After in der Grösse einer Flintenkugel angefroren war.

44. *Merops apiaster* L. Im Jahre 1777 wurden bei Roth a. S. in der Nähe des Dorfes Untersteinach an der Haide 15 Stücke gesehen und einige davon geschossen. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts erschien er häufig abermals im Ansbachischen. Im Jahre 1825 traf Professor Wagler bei Schniegling zwischen Nürnberg und Fürth an der Regnitz 3 Bienenfresser an und fehlte im Beisein des Herrn Dr. J. W. Sturm, dem ich diese Notiz verdanke, den einen davon im Sitzen zweimal. Im Sommer 1830 hielten sich 6 Stück fast 2 Monate lang eine Stunde von Nürnberg auf der Feldflur bei Wetzendorf auf, in den fol-

genden Jahren wurden wiederum bei Schniegling solche schöne Vögel gesehen und brütete ein Paar daselbst. Ein junger, eben abgeflogener, noch nicht vollkommen erwachsener Vogel wurde von einem Knaben mit der Hand gefangen und stand ausgestopft in der Privatsammlung des vormaligen Bleistiftfabrikanten Leonhard Ziegler in Nürnberg.

45. *Coracias garrula* L. Die schöne „Mandelkrähe“, auch „Mandelhäher, Blauhäher“ genannt, findet sich auf dem Zuge im Mai und wieder im August und September in den meisten; brütend nur in einigen Gegenden Mittelfrankens. Ihr Sommeraufenthalt ist durch das Alter der Holzbestände bedingt. Wo die alten Hölzer niedergemacht oder die einzelnen hohlen Eichen in den Junghölzern geschlagen werden, da muss die Mandelkrähe sich wegziehen. So war sie vor Jahren in mehreren Gegenden bei Cadolzburg, Fürth, zwischen Nürnberg und Erlangen in längst verschwundenen Hochbeständen häufig, während sie jetzt daselbst kaum mehr einmal auf dem Zuge einmal einspricht. Häufig brütet sie noch im Nürnberger Reichswalde, sowohl im Forstamte Sebaldi als auch im Forstamte Laurenzi, ganz besonders aber auf letzterer Seite dieses grossen Forstes, ferner bei Schwabach, Roth a. S., Petersgmünd, Weissenburg, Pappenheim, Eichstädt u. s. w.

46. *Upupa epops* L. Der Wiedehopf kommt selten schon im letzten Drittel des März, gewöhnlich im zweiten Drittel des April, manchmal erst zu Ende dieses Monats zu uns, brütet und verlässt uns wieder im August und September. „Wiedhopp, Saulocker.“

47. *Alanda cristata* L. Die „Hauben-, Hänbleins-Schöppleins-, Mistlerche“ gehört zu denjenigen Vögeln, welche durch Vorrücken und Ansässigmachen in Gegenden, wo man sie früher nur auf dem Zuge oder gar nicht kannte, die Aufmerksamkeit des Ornithologen in hohem Grade auf sich ziehen. In den Jahren 1807 bis 1810 zeigte sie sich in der Gegend von Nürnberg als seltener Strichvogel im Herbst und Winter, 1814 brütete sie nach Aufzeichnungen Wolfs an der Bärenschanze, breitete sich allmählich immer mehr aus, war im Jahre 1826 schon ein recht häufiger Brüttevogel und ist jetzt in der ganzen Umgegend der

Stadt zu jeder Jahreszeit höchst gemein, ebenso bei Fürth, Erlangen, in geringerer Zahl bei Schwabach, Roth a. S., Neustadt a. A. und anderwärts. Eine Liebhaberin des Keupersandes, der Kunststrassen und Eisenbahnen breitet sie sich, aus der Gegend von Fürth, Nürnberg und Erlangen vordringend, noch immer weiter aus und könnte ich interessante Details hierüber mittheilen, wenn ich nicht fürchten müsste, allzu weitläufig zu werden. Auf schwerem Boden, wie im schwarzen Gau, von Windsheim nach Rothenburg hinab, auch auf dem schweren Lehm Boden bei Sommersdorf traf ich sie niemals brütend, sondern nur auf dem Striche, entweder nur im September und Oktober in wenigen Exemplaren (Ammerndorf bei Cadolzburg und Sommersdorf), oder nur im Winter und dann zahlreich (Uffenheim, Gollachostheim etc.) Dazu bestimmt, das ganze Jahr ihre Nahrung auf dem Boden zu suchen, im grössten Schmutz und gräulichsten Sudelwetter auf Wegen und Chausseen, in den frequentesten Strassen der Städte, auf Schrankenplätzen, vor Wirthshäusern und die Gossen entlang den ganzen Tag auf und ab zu trippeln, scheint sie Gegenden nicht zu lieben, auf deren durch Regen- und Thauwetter in zähen Brei verwandeltem, langsam austrocknenden Boden, sie vor Kothklumpen an den Füßen nicht fortzukommen im Stande wäre.

48. *Alauda arborea* L. Die Haidelerche ist ein allgemein bekannter Zugvogel, kommt in manchen Jahren schon in den Tagen vom 17. bis 20. Februar, gewöhnlich erst anfangs März, brütet, verstreicht anfangs Oktober, zu welcher Zeit sie an schönen Herbsttagen zum Abschiede hie und da noch in abgebrochenen Strophen singt, und verschwindet erst mit dem Schneefall ganz aus unsern Gegenden.

49. *Alauda arvensis* L. Die „Kornlerche“, ein gemeiner Zugvogel, kommt anfangs bis Mitte Februar bei uns an, brütet und verstreicht im Oktober wieder. Viele halten die ersten starken Fröste und Schneefälle aus und lassen sich erst durch ernsthaftes Winterwetter nach Süden treiben; in gelinden Wintern bleiben nicht wenige Lerchen ganz bei uns. Ganz weisse, sehr viel weissgescheckte und semmelfarbene Varietäten kommen bei diesem gemeinen Vogel nicht sehr selten vor.

50. *Phileremos alpestris* L. Am 15. Februar 1831 wurde ein sehr schönes Männchen der Schneelerche, welches ausgestopft in der ehemals Ziegler'schen Sammlung stand, im Garne mit Feldlerchen bei Nürnberg gefangen.

51. *Melanocorypha calandra* L. Eine bei Nürnberg gefangene Kalandlerche stand in der eben genannten Sammlung.

52. *Plectrophanes nivalis* L. Der Schneeammer kommt nur manchmal in strengen Wintern zu uns. Wolf kaufte am 16. Februar 1815 einen lebendigen Jungen auf dem Nürnberger Vogelmarkte, ein junges, auf einem Vogelheerde bei Wöhrd gefangenes Männchen meiner Sammlung erwarb ich ebendasselbst am 23. März 1845. In den Wintern 1844/45 und 1846/47 zeigten sich in der Gegend von Nürnberg kleine, im Winter 1849/50 grössere Flüge dieses Ammers in den letzten Tagen des März, ganz nahe an Steinbühl bei tiefem Schnee eine Schaar von etwa 30 Stücken, wovon ein junger Vogel erlegt wurde. Am 15. Februar 1853 wurde nahe der Stadt wieder ein Trupp beobachtet, darunter alte Vögel im Winterkleide. Ein altes Weibchen der ehemals herzoglich leuchtenberg'schen Sammlung wurde im Februar 1843 in der Gegend des tiefen Thales nahe an Eichstädt geschossen.

53. *Plectrophanes lapponica* L. Ich kaufte auf dem Nürnberger Vogelmarkte anfangs December 1856 ein junges Weibchen, welches auf einem Vogelheerde bei Glaishammer gefangen wurde.

54. *Emberiza melanocephala* Scop. Nach dem Zeugniß der Fauna boica des von Reider und Hahn wurde ein altes Männchen bei Nürnberg gefangen.

55. *Emberiza hortulana* L. Ein sehr seltener Ammer. Wolf schoss am 4. Mai 1800 ein Männchen, welches auf einer Eiche sass und sang, hinter dem Dorfe Lay zwischen Nürnberg und Fürth herab, im Mai 1801 erhielt er aus der Umgebung der Stadt Männchen und Weibchen, am 28. April und 3. September 1802 je ein Weibchen. Die Herren DD. Sturm hielten ein am 2. Mai 1851 gefangenes Männchen 2 Jahre und 2 im Herbst 1849 aus einem Fluge von 3 Stücken bei Nürnberg gefangene Männchen lange Zeit, das eine davon 12 Jahre hindurch in der

Gefangenschaft. Im Jahre 1851 und 1852 hat je ein Paar im herzoglichen Hofgarten zu Eichstädt gebrütet und am 30. April 1855 wurden in hiesiger Gegend auf einem Brachacker bei Arberg 6 Ortolane angetroffen und ein Männchen davon erlegt. Vor beiläufig 100 Jahren muss dieser Vogel im Ansbachischen zahlreicher vorhanden gewesen sein, da sich in den Baizregistern des Markgrafen Carl Friedrich Wilhelm von 1730 — 1755 Ortolane aufgeführt finden. Von unseren heutigen Jägern kennt sie nur noch selten Einer und selbst unsere Vogelfänger verkaufen die wenigen Stücke, welche ihnen hie und da in die Netze gehen, als fremde Emmerlinge.

56. *Emberiza cirrus* L. Der Zaunammer wurde sehr einzeln schon in der Umgebung Nürnbergs gefangen.

57. *Emberiza citrinella* L. Ein gemeiner Stand- und Strichvogel. „Emmerling, Hämmerling.“

58. *Emberiza miliaria* L. Brütet in vielen Gegenden, im Rednitz-, Pegnitz- und Regnitzgrunde, in der Gegend von Nürnberg, Fürth, Erlangen, in den Seitengründlein, z. B. an der Ribert bei Ammerndorf, an der Schwarzach bei Altdorf, im ganzen Aisch- im Tauber- und Gollachgrunde und gehört zu denjenigen Vögeln, bei welchen man ein allmähliges Vorrücken ihrer Verbreitungsgrenzen wahrnehmen kann. Er ist in Mittelfranken Zugvogel, kommt manchmal schon im Februar, gewöhnlich erst im März und verlässt uns im Oktober wieder. Auf dem Herbstzuge lässt er manchmal an schönen Tagen noch einen abgebrochenen Gesang vernehmen. Ich habe ihn im Winter niemals im Freien angetroffen, noch gefangen auf dem Vogelmarkte gesehen und nur von einem einzigen Paare glaubwürdig gehört, welches am 1. Januar 1852 bei Rothenburg o. T. gefangen wurde. „Grauer Emmerling.“

59. *Emberiza oia* L. Am 22. December 1801 wurde bei Schnee und mässiger Kälte ein Männchen in der Gegend von Nürnberg bei Eibach mit Goldammern und vor etwa 10 Jahren abermals ein prächtiges Männchen im Frühlingskleide in der Nähe der Vorstadt Wöhrd gefangen.

60. *Emberiza schoeniclus* L. Ein Zugvogel, der im April und März zu uns kommt, in einzelnen Gegenden, wie bei

Nürnberg an der Pegnitz, am Dutzendteich, bei Ammerndorf, Rothenburg o. T. am Lindlersee und anderwärts in geeigneten Lagen brütet und den Oktober und November hindurch, einzeln bis in den December hinein auf dem Wegzuge gesehen wird. „Röhrleins-, Röhrles-, Rohrspatz.“

61. *Passer montanus* L. Gemeiner Standvogel. „Ringel-, Ringles-, Feldspatz.“

62. *Passer domesticus* L. Sehr gemeiner Standvogel. Ganz weisse, isabellgelbe, hell chokoladenfarbene Varietäten sind nicht selten. „Spatz.“

63. *Pyrrhula rubicilla* Pall. Stand- und Strichvogel, in verschiedenen Gegenden brütend, so im Nürnberger Reichswalde, in dem Gebirgstriche östlich von Nürnberg (Hersbruck u. s. w.), in den Laubwaldungen des schönen Höhenzuges bei Burgbernheim. Im Winter trifft man ihn allerwärts. Noch am 5. September 1853 erhielt ich von Cadolzburg einen soeben ausgeflogenen jungen Gimpel. „Dompfaff, Blutfink, Goll, Haile, Heule.“

64. *Corythus enucleator* L. Der Hakengimpel wurde bei Nürnberg wenige Male gefangen, ein Pärchen, welches in der Sturm'schen Sammlung steht, Ende Novembers 1821, ein einzelnes Exemplar 1829 ebenfalls im November.

65. *Dryospiza serinus* L. Der Girlitz, in vielen Gegenden gar nicht oder nur auf dem Zuge sehr selten vorkommend, ist erst neuerdings in den Umgebungen Nürnbergs und Erlangens häufig geworden, brütet hier, zieht im Oktober und selbst noch anfangs November wieder weg und bleibt auch manchmal im Winter bei uns. Die Herren DD. Sturm erhielten am 28. December 1852 ein Exemplar aus dem Schübelgarten bei Nürnberg. Schon zu Wolfs Zeiten brütete dieses liebliche Vögelchen in der Gegend genannter Stadt, wie ein Nest seiner Sammlung beweist, welches jetzt in der Sturm'schen Sammlung steht; auch finde ich in Wolf's handschriftlichem Nachlass einen Girlitz erwähnt, den er Mitte Mai 1802 erhielt. Allmählich verbreitete er sich in der Gegend mehr und mehr, gehörte aber noch in der Mitte der 40ger Jahre zu den seltenen Vorkommnissen und wurde von mir nur etliche Male auf der Allerwiese und in anstossenden Gärten

bei Sct. Johannis bemerkt. Bald darnach hörte man sein artiges Gesängchen recht häufig und in den Jahren 1853 und 1854 war er bereits aller Orten in Nürnbergs und seiner Vorstädte Umgebungen, in den Gärten und Anlagen, im Stadtgraben, bei Hummelstein, Gleishammer, Dutzendteich, Steinbühl etc. fast gemein und nimmt seitdem an Häufigkeit noch immer zu. Auch in der Gegend von Erlangen war er früher als Brütevogel selten, ist aber daselbst seit beiläufig 1851 zahlreich vorhanden. Anfangs Mai 1830 hörte ihn der alte Brehm in einem Garten Erlangens singen; etliche fröhlich singende und eifersüchtig sich verfolgende Männchen beobachtete ich am 21. April 1845 in dem Eichenwäldchen am Fusse des Welsgartens und gegenwärtig bevölkert er den Schlossgarten und die schönen Umgebungen Erlangens, wie den Burgberg mit seinen Gärten, die hohen Laubdächer der Eichen bei den Kellern etc. als ein ziemlich gewöhnlicher Vogel. Bei Eichstädt und anderwärts hat man ihn zur Strichzeit auf dem Heerde gefangen. Zur Zeit der Reife des Kohl- und Salatsamens fällt er familienweise auf denselben und thut Schaden.

66. *Acanthis spinus* L. In den meisten Gegenden findet er sich nur in den beiden Strichperioden, manchmal in grosser Menge; im Nürnberger Reichswalde brütet er auch in einzelnen Paaren. Nicht wenige bleiben den ganzen Winter bei uns.

67. *Acanthis carduelis* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel. Im Jahre 1822 wurde in einem Garten zu Windsheim ein blendend weisser Stieglitz aus dem Neste genommen. Die Augen waren roth, der Kopf orangegelb und in jedem Flügel befanden sich 3 schwefelgelbe Schwungfedern.

68. *Acanthis linaria* L. Die „Meerzeisige, Meerzeislein, Zitscher, Zitscherle“ kommen nur auf dem Striche im Oktober und November und zwar periodisch, in manchen Jahren gar nicht oder in geringer Zahl, in andern Jahrgängen (1822, 1836, 1847/48, 1852/53, 1855/56) massenhaft zu uns, bleiben in kleinen und grösseren Flügen — die Hauptmasse zieht südlicher — den ganzen Winter bei uns und gehen erst im März, manche noch später nach Norden zurück. Im Jahre 1856 blieben sie in hiesiger Gegend auf der Wartei Arberg bis zum 18. April, zu welcher Zeit

bereits Kuckucke, Wiedehöfpe, Wendehälse, Meisenmünche und Trauerfliegenfänger angekommen, von nordischen Gästen aber noch Rothdrosseln und Bergfinken (Gägler) vorhanden waren. Landbeck sah und hörte ein Männchen dieses Zeisigs sogar noch im Mai 1848 in einem Tannenwäldchen bei Klingenbad in Schwaben singen.

69. *Fringilla cannabina* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel. „Hänfling“, die jährigen Männchen nennt man bei Nürnberg „das Lerchengeschoss.“

70. *Fringilla flavirostris* L. In Jahren, in welchen viele Meerzeisige zu uns kommen, pflegt sich auch dieser Hänfling im Spätherbst und Winter bei uns einzustellen, wahrscheinlich häufiger, als diese bisher beobachtet worden ist; denn jedenfalls ist er mit *Fring. linaria* und *cannabina* vielfach verwechselt worden. Bei Nürnberg wird er von den Vogelfängern „Steinhänfling, Greinerlein“ genannt und nicht gar selten gefangen. Wolf erhielt ein Exemplar im Februar 1809, die Herren DD. Sturm bekamen ihn am 26. Februar 1826 und in den zwei darauf folgenden Wintern mehrere Male und im Winter 1847/48 wurden 3 Stücke, 2 Weibchen und ein altes Männchen, auf den Nürnberger Vogelmarkt gebracht, wovon ich das letztere bis in den Sommer 1851 lebend im Käfig erhielt. Im Winter 1859/60 zeigten sich abermals kleine Flügel und wurden mehrere Stücke auf dem Vogelheerde im Schmausengarten gefangen. Nach der Behauptung unserer Vogelfänger kommt er früher als *Fring. linaria* bei uns an.

71. *Chlorospiza citrinella* L. Wolf erhielt einen lebenden Zitronenzeisig am 3. Oktober 1798, der auf einem Vogelheerde bei Nürnberg gefangen wurde; in der Folge bekam er noch 2 lebende Exemplare und erwähnt ein viertes Stück, welches ebenfalls bei Nürnberg gefangen wurde.

72. *Chlorospiza chloris* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel. „Grünling, Grünfink, Wonitz.“

73. *Pyrgita petronia* L. Der Steinsperling ist einer unserer seltensten Vögel, wurde aber in der Gegend von Nürnberg (Mögeldorf etc.) schon etliche Male auf dem Striche oder im Win-

ter gefangen. Wolf kaufte am 14. und 24. Oktober 1806 je ein, am 17. Januar 1808 zwei und am 13. März 1821 ein Exemplar lebend auf dem Vogelmarkte, auch die Herren DD. Sturm erhielten ihn von da mehrmals lebend, ein Männchen am 2. November 1836. Wenn man ihn fangen will, schreit er fast wie die Kohlmeise unter ähnlichen Umständen, sein gewöhnlicher Lockton aber lautet wie der des Gäglers (*Fring. montifringilla*). Zwei Gefangene, zugleich in den Käfig gesetzt, fingen bald an, Hanf zu fressen, betrugten sich gut mit einander, liefen und hüpften munter herum und waren nicht sehr wild. In der Sonne machten sie mit den Kopffedern öfters eine Haube, auch schnellten sie manchmal mit dem Schwanze.

74. *Fringilla coelebs* L. Ein gemeiner Zugvogel; einzelne Männchen bleiben den ganzen Winter über bei uns, die Weibchen aber ziehen alle weg, zur Zugzeit oft in grossen Massen. Bei Eichstädt wurde ein ganz weisser Fink gefangen.

75. *Fringilla montifringilla* L. Der „Gäglers“ kommt regelmässig alle Jahre in den ersten Tagen des Octobers zu uns, in manchen Jahren, wie 1796, 1818/19, in ungeheuren Schaaren. Die Hauptmassen ziehen gewöhnlich noch südlicher; es bleiben aber auch Tausende den ganzen Winter über bei uns und verlassen uns diese Vögel im März, einzelne kleine Flüge und Exemplare erst in der Zeit vom 12. bis 23. April. Im Wolfszahn bei Augsburg wurde sogar am 11. Juni 1856 ein Männchen im Hochzeitkleide geschossen.

76. *Coccothraustes vulgaris* Pall. Als Stand-, vielmehr Brütevogel nur in einigen Strichen Mittelfrankens, auf dem Striche in den Buchenwäldungen, wenn die Buchelmost gerathen ist, in grosser Menge, viele während des ganzen Winters. „Kirschenknipper, Kirschenknöller, Kernbeisser.“

77. *Loxia pytiopsittacus* Bechst. Der Föhrenkreuzschnabel findet sich nur periodisch in unseren Wäldungen ein, ist in manchen Jahren, wie z. B. um das Jahr 1808 im Nürnberger Reichswalde, häufig, während er in anderen Jahren nicht beobachtet wird. Sein Nomadenleben ist durch das Gedeihen des Nadelholzsaemens bedingt. Wolf erhielt ein Nest aus dem Reichswald

am 28. März und Dr. Sturm ein auf dem Glaishammer gefangenes Männchen am 14. Juni 1846. Im Winter 1839/40 zeigte sich dieser Vogel einzeln bei Neustadt a. A. und in neuester Zeit nicht selten im Sommer und Winter auf der Revier Dormitz bei Erlangen.

78. *Loxia curvirostra* L. Bewohnt als der gemeinste Vogel dieser Gattung und, wie der vorige, ein zigeunerartiges Leben führend, unsere Nadelholzwälder den Sommer und Winter hindurch. 1808, 1839/40, 1849/50, 1853/54 waren sie im Reichswalde, im Ansbachischen und anderwärts ungemein häufig. „Krummschnabel, Kreuzschnabel, Kreuzvogel.“

79. *Loxia leucoptera* Gml. Dieser Vogel ist erst zweimal bei Nürnberg beobachtet worden, nämlich in dem durch den Besuch dieser Fremdlinge in Deutschland merkwürdigen Jahre 1826 und am 29. Januar 1831, wo die Herren DD. Sturm auf dem Nürnberger Vogelmarkte ein schönes Exemplar für ihre Sammlung erwarben.

80. *Mecistura caudata* L. Stiel-, Schwanz-, Schnee-Meise, Pfannenstiel. Ein gewöhnlicher Standvogel.

81. *Parus cyanus* Pall. Eine Lasurmeise wurde Ende December 1852 nahe an Nürnberg in einem Garten von Steinbühl auf dem Striche zuverlässig beobachtet.

82. *Parus coeruleus* L. „Blöbling, Blobmeise.“ Gemeiner Standvogel.

83. *Parus major* L. „Meise, Kohlmeise.“ Gemeiner Standvogel.

84. *Parus ater* L. „Tomeise.“ Der Meisenfang war zu Reichsstadt-Zeiten bis zu Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts ein Lieblingsvergnügen der Bürger zu Nürnberg. 1538 führten sie mit dem Markgrafen Georg von Ansbach den Meisen-, auch Kraut- und Rübenkrieg, spottweise so genannt, weil der Markgraf die nürnbergischen Vogelheerde und Meisenhütten einreissen liess seine Soldaten Heldenthaten an den Krautköpfen verrichteten und die weissen Rüben sich schmecken liessen. Die Meisenhütten waren auf dem Reichswalde im leidenschaftlichen Betrieb von Bartholomäi an bis Ende September und wurden auf mancher Hütte

in wenigen Tagen 1000 bis 1600 Stücke Meisen gefangen, um — verspeist zu werden. Im Herbst 1854 fand ich bei einem Vogelfänger 118 auf Leimruthen gefangene und sogleich getödtete Meisen.

85. *Parus palustris* L. „Pimeise, Piepmeise.“ Nicht ungewöhnlicher Standvogel, in manchen Gegenden nur auf dem Striche.

86. *Parus cristatus* L. „Koppenmeise, Struwelmeise.“ Standvogel.

87. *Sitta europaea* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel.

88. *Bombycilla garrula* L. Die Seidenschwänze, auch „Böhmer, böhmische Finken“ genannt, kommen nicht regelmässig alle Jahre, sondern zu unregelmässigen Zeiten, der Sage nach alle 6 bis 7 Jahre, und dann gewöhnlich massenhaft zu uns.

89. *Garrulus glandarius* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel. Ein weisser Nusshäher, an welchem die Schwung- und Schmuckfedern wie gewöhnlich gefärbt sind, wurde bei Eichstädt geschossen. „Nusshäher, Holzhäher, Holzschreier.“

90. *Nucifraga caryocatactes* L. Als Standvogel findet sich der „schwarze Häher“, auch „Schwarz-, Stein-, Tannenhäher“ genannt, nur im nürnbergischen Gebirgslande östlich von der Stadt. Am 30. April 1799 erhielt Wolf aus dem Gebirge bei Hersbruck einen eben seine Federn erhaltenden Jungen, an dessen Befiederung noch die Wollhaare waren. In einzelnen Jahren, so in den Herbst 1802, 1803, 1804, 1807, 1814, 1821/22, 1835/36, 1844, 1849/50 überschwemmten sie in erstaunlicher Menge den ganzen Kreis, 1851 und 1854 waren sie wieder vorhanden, doch in viel geringerer Anzahl, seitdem in erheblicher Anzahl nicht mehr.

91. *Pica caudata* L. „Hätz, Hätzel, Hatzel, Gäckerhätzel“. Gemeiner Standvogel. Bei Roth a. S. wurde vor etwa 25 Jahren ein Geheck ganz weisser Elstern ausgebrütet, eine weisse Elster, bei der alles Schwarz durch ein mehr minder dunkles, schmutziges Braungelb vertreten war, wurde vor Kurzem bei Ansbach, eine gelblichweisse bei Rothenburg o. T. geschossen.

92. *Corvus monedula* L. Ein gemeiner Vogel, der auf Kirchthürmen und hohen Gebäuden in Städten und Dörfern, im Mauerwerke alter Schlösser und Ruinen, in Felsenlöchern und hohlen Bäumen nistet, entweder als Standvogel Jahr aus Jahr ein an seinen Wohnorten verbleibt, wie die in grossen Städten nistenden Dohlen oder, wie die Mehrzahl thut, sich bereits zu Ende des Monats Juli mit seinesgleichen und Saatraben zu grossen Flügen zusammenschlägt und in fruchtbaren Getraide-Gegenden, in Wäldern und auf Wiesengründen sich Monate lang umhertreibt, bis er uns im October, November und, die letzten, im December verlässt, um schon sehr frühzeitig im Januar, Februar und spätestens März wieder zurückzukehren. Im kalten Winter 1844/45 flüchteten sich einige Dohlen sogar in die Taubenschläge. „Dähle, Dalle, Dallig, Dagerle, Duhle.“

93. *Corvus corone* Lath. Gemeiner Standvogel. Ganz weisse Ausartungen sind nicht sehr selten. „Krähe, Kroah, Krack, Krapp.“

Die Farbenvarietät *Cornix cornix* L., die Nebelkrähe, kommt zu uns auf dem Striche, selten schon in der zweiten Hälfte des Octobers, gewöhnlich erst später und in den eigentlichen Wintermonaten und verlässt uns wieder bis Ende März. Wagler fand einmal nahe an Nürnberg und schoss am Nest ein Krähenpaar, von welchem das Männchen ein Nebelrabe, das Weibchen aber eine gewöhnliche schwarze Krähe war. Auch bei Hersbruck hat man beide Varietäten schon verpaart gefunden.

94. *Corvus corax* L. Standvogel, doch sparsam vorhanden, in einzelnen Paaren in der Gegend von Neustadt a. A., Windsheim, Uffenheim, Rothenburg o. T., Ansbach, selbst hie und da einmal im Reichswalde horstend. Im Winter streift er umher und wird alsdann, doch immer nur sehr selten, auch in Gegenden gesehen und geschossen, wo er nicht brütet, gerne in der Nähe von Fallhäusern. „Kolk-, Gold-, Aasrabe.“

95. *Corvus frugilegus* L. Die Saatkrähe ist ein gemeiner Stand-, Strich- und auch Zugvogel, brütet kolonienweise in Feldhölzern und grösseren Waldungen, wechselt aber diese ihre Wohnplätze, insgemein Krähenhölzchen geheissen, entweder in

Folge des Forstbetriebes oder heftiger, Jahre lang fortgesetzter Verfolgungen und Metzeleien, die zur Zeit des baldigen Abfliegens der noch nicht ganz flüggen Jungen vorgenommen zu werden pflegen, nothgedrungen vielmals. So waren die „Rügen“ einst in der Gegend von Gunzenhausen im Mönchswalde als Brutvögel sehr häufig, wurden aber von den markgräflichen Wildmeistern als sehr verderblich für den Obst- und Feldbau bezeichnet und demgemäss an manchen Tagen zwei bis dreihundert junge Rügen — auf einzelnen Föhren standen 15—20 Nester — herabgeschossen und von armen Leuten, nachdem sie den Krähen die Haut abgezogen und dieselben in Essig gebeizt hatten, begierig verspeist. Jetzt horstet dieser Vogel im Mönchswalde nicht mehr. Auch im Layer-Wäldchen zwischen Nürnberg und Fürth war früher eine Brutkolonie; die Nester standen auf den höchsten Föhren, öfters 3 auf einem Baum. Wolf schoss daselbst in den Jahren 1799 und 1800 Junge und Alte. In zahlreichen Gesellschaften brüten sie noch jetzt in der Gegend von Uffenheim (Seenheim), Windsheim (Oberntief), Rothenburg o. T. (Reichelshofen), auch bei Weissenburg (Syburg). Zur Zeit des Waizenschnittes kommen sie in grossen Schaaren, mit Dohlen untermischt, in die Altmühlgegenden, fallen auf den geschnittenen Waizen und eine Zeit lang auf die abgeärrteten Felder, dann auf die gemähten Wiesen, kehren z. B. bei Sommersdorf jeden Abend in das Espachhölzlein, in den Triessdorfer Park und den Mönchswald zurück und fliegen regelmässig am frühen Morgen dem obern Altmühlgrunde zu. Sehr viele bleiben den ganzen Winter über da, im October und November ziehen aber auch grosse Schaaren an schönen Tagen himmelhohen Fluges und unter lautem Geschrei Kreise beschreibend in westlicher Richtung von uns weg und kommen in ebenso grossen Schaaren im Februar, spätestens anfangs März wieder zu uns.

96. *Sturnus vulgaris* L. Der Staar kommt manchmal schon in den letzten Tagen des Januars, gewöhnlich anfangs bis Mitte Februars zu uns, brütet in hohlen Bäumen unserer Gärten und Wälder und zu Tausenden in den überall für ihn aufgehängten Staarenkobeln und verlässt uns wieder zu Ende des Octobers und anfangs November. Einzelne oder kleine Gesellschaften blei-

ben in gelinden, sogar in sehr kalten und schneereichen Wintern ganz bei uns. In meinem Garten brütete ein Pärchen in einer hohlen Eiche einen Schuh hoch über der Erde, ein Pärchen seit 3 Jahren über dem Faller meines Taubenschlags. Weisse Staaren werden nicht sehr selten erlegt. Er ahmt die Töne des *Falco buteo*, *Corvus monedula* und *pica*, *Oriolus galbula*, *Perdix cinerea*, *Ortygion coturnix*, *Totanus ochropus* und *calidris*, *Scolopax gallinago*, *Vanellus cristatus*, *Fulica atra*, ja sogar den Begattungsruf des braunen Grasfrosches (*Rana temporaria*), viele dieser Töne bis zur vollendeten Täuschung nach.

97. *Merula rosea* Briss. Ein altes Rosenamsel-Männchen der Sturm'schen Sammlung wurde am 29. Juni 1832 in einem Garten an der Plattners-Anlage bei Nürnberg geschossen, wo es mit Staaren herumflog. Ich selbst erhielt ein Männchen, welches in der Gegend von Fürth am 7. October 1853 von einem Hollunderstrauche an der Zirndorfer Mühle herabgeschossen wurde.

98. *Troglodytes parvulus* Koch. Allgemein bekannter Stand- und Strichvogel.

99. *Certhia familiaris* L. Gemeiner Stand- und Strichvogel. „Baumbäcker, Baumkleberer, Baumläuferlein, Baumrutscher.“

100. *Tichodroma muraria* L. Erscheint im Frühjahr und Winter, das Donauthal heraufkommend, in den Felsen des Altmühlthales, in den Steinbrüchen der Umgebungen von Solenhofen und bei Eichstädt an altem Gemäuer auf dem Striche gar nicht selten. Die leuchtenberg'sche Sammlung besass 3 Stücke, welche in der Nähe von Eichstädt, sogar in der Stadt selbst erlegt wurden. Im Winter 1831 schoss nämlich der herzogliche Oberjäger Maul einen Mauerläufer an einem Thurm der Stadtmauer in der Nähe des Buchthaler Thores. Im Frühjahr 1834 wurde ein solcher Vogel an den Mauern der Festung Wülzburg, ein anderer zu Ende der 40er Jahre am Schlosse zu Cadolzburg von dem kgl. Landrichter Freiherrn von Ausin beobachtet. Das letzterwähnte Exemplar trieb sich im Frühjahr längere Zeit, gar nicht scheu und den Beobachter nahe aushaltend, im Zwinger an der nordöstlichen Schlossmauer umher. Am 22. November 1850

endlich wurde in den Vormittagsstunden an der Stadtmauer von Nürnberg am Lauferthore ein Stück gesehen.

101. *Cinclus aquaticus* Briss. Stand- und auch Strichvogel, im nürnbergischen Gebirgslande, im Schwarzachthale bei Feucht (Gsteinach) und an den forellenreichen Nebenbächen der Altmühl brütend. „Bachamsel, Wasserstaar.“

102. *Anthus spinoletta* L. Nur auf dem Striche im Winter bei uns, z. B. an der Pegnitz bei Nürnberg und Fürth, am Abflusse des Teiches bei Glaishammer, an der Biebert und anderwärts.

103. *Anthus pratensis* L. Ein gemeiner Brut- und Zugvogel, in gelinden Wintern überwintert er. „Schnitzer, Schnitzerlein.“

104. *Anthus arboreus* Bechst. Ein gewöhnlicher Brutvogel, kommt selten schon anfangs, meist erst in der Mitte des Monats April und verlässt uns im October wieder. „Krautvogel.“

105. *Anthus campestris* Bechst. Brütet regelmässig bei uns, kommt im letzten Drittel des April und anfangs Mai bei uns an und verlässt uns anfangs October.

106. *Motacilla alba*. Gemeiner Brutvogel, kommt im letzten Drittel des Februar oder anfangs bis Mitte, selten erst Ende des März zu uns und verlässt uns im October und anfangs November. In der Mitte Novembers sieht man nur noch höchst selten eine verspätete Bachstelze, eine überwinternde aber niemals.

107. *Motacilla boarula* Penn. Brütet im nürnberg'schen Gebirgslande, einzeln im Stadtgraben von Nürnberg, und sieht man sie den Sommer über an den kleinen Fischweihern bei St. Peter, bei Gleishammer und selbst in der Stadt an der Pegnitz und auf deren Inselchen. An den Forellenbächen, welche in die Altmühl einmünden, brütet sie zahlreicher, einzeln an der Schwarzach bei Gsteinach u. s. w. Im Winter bleiben selbst bei grosser Kälte nicht wenige bei uns.

108. *Budytes flava* L. Kommt im April, selten schon in den ersten Tagen, gewöhnlich erst von Mitte bis Ende des Mo-

nats zu uns, ist in vielen Gegenden ein häufiger Brütevogel und verlässt uns wieder im September und October.

109. *Oriolus galbula* L. Kommt zu uns in den ersten Tagen des Mai, brütet und verlässt uns wieder im August. „Goldamsel, Pirol, Kirschpirol, Kirschvogel.“

110. *Petrocichla saxatilis* L. In früherer Zeit hat der „Steinröthel“ auf der Wilibaldsburg bei Eichstädt gebrütet und wurde dort von Vogelfängern oftmals ausgenommen. Auch die Festungen Wülzburg und Rothenberg bewohnte er früher, letztere noch in den Jahren 1849 und 1850 und brütete in Ritzen und schadhaften Stellen des Mauermantels. Diess wird wohl auf dem Rothenberg auch jetzt noch der Fall seyn. Auf dem Striche im Frühjahr und Herbst wird manchmal im Reichswalde in den Dohnen oder auf Vogelheerden ein Stück gefangen. So ging am 11. September 1854 im Schmausengarten bei Nürnberg ein Steinröthel zugleich mit 77 Ringelspatzen in das Garn und wurde aus Unkenntniss mit seinen plebejischen Mitgefangenen getödtet. Das Exemplar steht in der Sturm'schen Sammlung.

111. *Turdus iliacus* L. Die Rothdrossel kommt in unsern Waldungen nur in den beiden Strichperioden um die Mitte Octobers, zieht bis in den December in grossen Schaaren bei uns durch, kehrt anfangs bis Ende März wiederum schaarenweise bei uns ein und verlässt uns manchmal erst in den Tagen vom 13. bis 18. April, zu einer Zeit, wo unsere Wälder vom Gesang und den Locktönen unserer meisten Sommervögel widerhallen. Der Drosselfang in Dohnen und auf Heerden wird nur noch da und dort und wurde früher viel häufiger betrieben. Auf dem Vogelheerde zu Feucht im Forstamt St. Laurenzi wurden 1797 gefangen: 145 Mistler, 340 Weiss-, 155 Rothdrosseln, 135 Krametsvögel, 277 Spieslein, (5 Stücke) Gägler, Emmerlinge, Wornitzen u. s. w., 9 Meisenmünche und 10 Grasmücken.

112. *Turdus musicus* L. Kommt bei uns im Februar und März an und zieht den ganzen Monat hindurch häufig nach Norden durch. Den Gesang der bei uns brütenden Weissdrosseln vernimmt man selten schon im Februar, gewöhnlich erst bis Mitte März. Im October beginnt der Herbststrich und dauert bis in

den December hinein; die letzten Nachzügler verschwinden erst um Weihnachten.

113. *Turdus torquatus* L. Die Ringdrossel erscheint nur auf dem Striche bei uns, sehr selten bei Nürnberg, wo die Herren DD. Sturm am 8. November 1822 auf dem Vogelmarkte ein Exemplar für ihre Sammlung erwarben. Sie folgt auf ihrem Striche mehr den Höhenzügen und den von ihnen eingeschlossenen Flusstälern, wird desshalb auf der fränkischen Höhe in der Gegend von Rothenburg (auf der Wartei Wettringen wurden einmal in einem Striche 9 „Meeramseln“ erbeutet), bei Burgbernheim, am Hahnenkamm und im Altmühlthale bei Eichstädt, woselbst sie nicht selten den Schlossgarten besucht, öfters gefangen.

114. *Turdus pilaris* L. Der „Krammetsvogel, Krammeter“ kommt auf dem Striche in der zweiten Hälfte des Octobers und im November zu uns, manchmal in ungeheurer Anzahl, zieht der Hauptmasse nach weiter nach Süden, bleibt aber auch den ganzen Winter in mehr minder grosser Anzahl bei uns und verlässt uns wieder mit den von Süden herauf nach Norden heimkehrenden Schaaren im März. Manchmal bleiben sehr viele bis tief in den April und Herr Forstwart Jägerhuber zu Arberg traf in den Waldungen seiner Wartei einen Flug von 30 Krammetsvögeln noch vom 7. bis 10. Mai 1861 alltäglich an. In den genannten Waldungen waren im December 1858 wegen der damals vorzüglich gerathenen *Sorbus torminalis*-Beeren ungemein viele Krammetsvögel vorhanden und gegenwärtig (Januar und Februar 1864) bedecken sie noch viel zahlreicher, als diess im Februar 1862 der Fall war, zu Tausenden die Altmühlwiesen. Im Sommer 1848 blieben Einige in der Gegend bei Burgbernheim und sollen da gebrütet haben.

115. *Turdus viscivorus* L. Der „Mistler“ ist ein nirgends seltener Zug-, Stand- und Strichvogel. Er verlässt uns im October, überwintert aber auch zahlreich und singt schon im Februar und anfangs März wieder an seinen Standorten. Die im Herbst zuvor nach Süden Gewanderten werden noch den ganzen März hindurch auf dem Rückstriche gesehen.

116. *Turdus merula* L. Gemeiner Stand- und Strich-

vogel. Eine ganz weisse Amsel wurde am 18. August 1831 im Nürnberger Reichswalde geschossen. „Amschl, Amsel, Schwarzamsel.“

117. *Accentor modularis* L. Die „Braunelle“ ist nicht eben selten, kommt im März und April bei uns an, brütet (Nürnberger Reichswald, Eichstädt etc.) und verstreicht bis zum Ende des Monats October. Es bleiben auch nicht wenige dieser Vögel in gelinden Wintern bei uns, halten sich dann meistens in Gärten auf und nähern sich bei vielem Schnee und Kälte den menschlichen Wohnungen. Selbst in dem kalten Winter 1845 waren Einzelne dageblieben.

118. *Salicaria turdoides* Meyer. Sehr selten auf dem Zuge. Ich besass eine Rohrdrossel, welche im September 1851 im Nürnberger Stadtgraben gefangen wurde.

119. *Salicaria arundinacea* Briss. An unsern Flüssen und Teichen gar nicht selten brütend, kommt im Mai und verlässt uns im August und September wieder, einzeln erst anfangs October. „Schlotengatzter.“

120. *Salicaria locustella* Penn. Wolf erhielt am 13. Mai 1805 ein Männchen, im Mai 1815 ein Weibchen und am 7. September 1815 ein Männchen, alle drei bei Nürnberg gefangen, und hatte sie längere Zeit im Käfig.

121. *Salicaria phragmitis* Bechst. Auf dem Frühjahr- und Herbstzuge im April und Mai und wiederum im August und September wurde er bei Nürnberg und Eichstädt gefangen. Wolf erhielt am 12. Mai 1805 und am 21. April 1822 mehrere aus den Umgebungen von Nürnberg (Stein), die Herren DD. Sturm am 14. April 1852 ein Männchen von der Dullnau bei Wöhrd.

122. *Salicaria aquatica* Lath. Auf dem Frühjahr- und Herbstzuge im April und Mai und wieder im August und September an Fluss- und Teichufern, an Bächen und Wassergräben bei Nürnberg, Fürth, Eichstädt und anderwärts beobachtet. Wolf erlegte 3 solche Rohrsänger am 15. September 1801 am Dutzendteich, andere erhielt er am 10. Mai 1805, am 18. April und 3. Mai 1806.

123. *Regulus ignicapillus* Brehm. Ein Zugvogel; kommt im März und April, brütet bei Eichstädt, wo dieses liebe Vögelchen „Feuerhähnchen“ genannt wird, in der Gegend von Ansbach (in der Feuchtlach etc.) und in Junghölzern bei Arberg zahlreich und verlässt uns wieder im September und October, einzeln erst im November. In der Gegend von Erlangen (Dormitz) und Nürnberg (Reichswald) sieht man es nur selten; die Herren DD. Sturm erhielten ein Exemplar am 19. September 1852 von der Dullnau.

124. *Regulus cristatus* Koch. Gemeiner Stand- und Strichvogel.

125. *Ficedula hypoleis* L. In Gärten, Anlagen um Städte und Dörfer, selbst in baumreichen Gärten innerhalb der Städte, ein ziemlich zahlreicher Brüttevogel, vom Mai bis Ende August bei uns verweilend. „Spötter, grosser Wistling.“

126. *Ficedula sibilatrix* Bechst. In unsern Laub- und gemischten Waldungen von Mitte April bis Ende August und anfangs September nicht ungewöhnlich, in allen geeigneten Lagen brütend.

127. *Ficedula trochilus* L. Gemeiner Zugvogel; manchmal schon im März, gewöhnlich erst im April ankommend, verlässt er uns im August und September wieder. „Muckenvogel, Wistling.“

128. *Ficedula rufa* Lath. Gemeiner Brut- und Zugvogel; kommt im März und verlässt uns im September und October wieder. „Muckenvogel, Wistling.“

129. *Sylvia curruca* Lath. Kommt selten schon anfangs, gewöhnlich erst in der zweiten Hälfte des April zu uns, zieht noch im Mai, brütet allerwärts und verlässt uns im September wieder. „Heckenschlupfer, Liedler.“ Ein Albino wurde bei Eichstädt erlegt.

130. *Sylvia atricapilla* Briss. Vom April und Mai bis September und October in Gärten und Wäldern, nicht im reinen Nadelwald, an vielen Orten gemein. „Meisenmönch, Schwarzplättlein.“

131. *Sylvia cinerea* Briss. Von der zweiten Hälfte des

April bis August und Ende September in geeigneten Lagen ziemlich gemein. „Deutsche Grasmücke, Heckenschmatzer, Staudenschmatzer, Heckenschlupfer.“

132. *Sylvia hortensis* Penn. Von Ende April und anfangs Mai bis September und Anfang des Octobers nicht ungewöhnlich, doch nicht gemein. „Welsche Grasmücke“; die Herbstvögel werden „Beervögel“ genannt.

133. *Sylvia nisoria* Bechst. Die Sperbergrasmücke wurde schon zweimal bei Nürnberg gefangen. Wolf erhielt am 21. August 1823 einen nahe der Stadt am Wasser gefangenen jungen Vogel.

134. *Lusciola philomela* Bechst. Der Sprosser wurde bei Nürnberg erst etliche Male auf dem Frühjahrszuge, ein Männchen 1849 in einer Hecke bei Weigelshof gefangen.

135. *Lusciola luscinia* L. Auf dem Frühjahrszuge wird die Nachtigall wohl nirgends vermisst, brütend dagegen findet sich nur hie und da ein einzelnes Pärchen in Gärten bei Uffenheim. Im Jahre 1853 brüteten in genannter Gegend 2 Paare in dem buschreichen Graben der Kirche von Gollachostheim.

136. *Cyanecula suecica* L. In den beiden Zugperioden im März und April bis in den Mai hinein und wieder im September und den ganzen October hindurch zahlreich, nach Graf von der Mühle im Altmühlthale bei Eichstädt brütend. Am 18. Mai 1803 sah Wolf bei Nürnberg ein altes Männchen, das einen rostbraunen Stern hatte. Am Kopfe der Blaukehlchen findet man nicht selten einzelne, auch mehrere linsengrosse Zecken.

137. *Erithacus rubecula* L. Ein recht gemeiner Zugvogel; kommt im März, brütet und zieht den ganzen October hindurch von uns weg. Einzelne bleiben bis tief in den November und December oder überwintern ganz. Solchen ergeht es bei tiefem Schnee und grosser Kälte so übel, dass sie sich in Häuser flüchten, meistens aber vor Frost und Hunger umkommen. Im Frühjahr 1848 wurde bei Nürnberg ein Männchen gefangen, welches eine ganz weisse Brust hatte, der Stirnstreif aber war, wie gewöhnlich, roth. „Rothkelchen, Rothbrüstlein.“

138. *Ruticilla phoenicurus* L. Kommt im April zu

uns, brütet und verlässt uns im September und anfangs October.
„Saulocker, Waldrothschwanz, Waldblässlein.“

139. *Ruticilla tithys* Scop. Ueberall ein gemeiner Brüte- und Zugvogel; kommt im März und verlässt uns wieder im October. Am 25. Dezember 1801 sah Wolf noch ein Weibchen im Stadtgraben zu Nürnberg zu einer Zeit, wo schon mehrere Wochen tiefer Schnee lag und die Woche vor Weihnachten sehr kalt war. Solche Fälle sind sehr selten und möge die Anführung hier gestattet seyn, dass sich zu Kloster Ebrach in Oberfranken ein Männchen während des gegenwärtigen Winters gehalten hat. „Wistling.“

140. *Pratincola rubetra* L. Ein ziemlich seltener Zugvogel, der in der zweiten Hälfte des April und anfangs Mai zu uns kommt und im August und September wieder wegzieht. „Braunkehlchen.“

141. *Pratincola rubicola* L. Zahlreicher als der vorige und gleichfalls Zugvogel, in manchen Gegenden, wie im Steinbachgründlein bei Ammerndorf, ein ganz gewöhnlicher Brüttevogel. Er kommt im März zu uns und verstreicht im August und September, einzeln noch im October. „Schwarzkehlchen.“

142. *Saxicola oenanthe* L. Während der beiden Strichperioden im April und abermals im August und September bei uns als ein gewöhnlicher Vogel durchwandernd. Einzelne Durchzügler verspäten sich bis in die ersten Tagen des Octobers. Brütend kommt er selten bei uns vor, am 15. Juni 1855 aber schoss Herr Jägerhuber Junge bei Arberg. „Steinelster, Schrollenhupfer, Steinbeisser.“

143. *Lanius excubitor* L. Standvogel. „Schätterhätz, Welcherhoden.“

144. *Lanius minor* Gml. L. Bei Nürnberg (Judenbühl, Erlenstegen, Hammer, Unterbürg) brütet er nicht selten und findet sich auch bei Erlangen, Schwabach, Cadolzburg, Neustadt a. A., Uffenheim, Gollachostheim. Kommt im Mai und zieht im September weg.

145. *Lanius collurio* L. Kommt im Mai, brütet und zieht im August und anfangs September weg. Gemein.

146. *Lanius rufus* Briss. Ein gemeiner Zugvogel, kommt in der letzten Hälfte des April oder anfangs Mai in die obstbaureichen Umgebungen unserer Ortschaften, brütet und verlässt uns wieder im September, die letzten im ersten Drittel des Octobers.

147. *Muscicapa grisola* L. Gemeiner Zugvogel; kommt sehr selten schon im April, gewöhnlich erst anfangs Mai zu uns, brütet und verstreicht im August und September.

148. *Muscicapa parva* Bechst. Wurde erst ein einziges Mal in Mittelfranken und zwar im Herbst 1819 ein Männchen bei Brunn in der Nähe von Neustadt a. A. geschossen. Ich habe ziemlich verlässige Nachricht, dass dieses höchst seltene Vögelchen in der Nähe von Schwabach bei Kammerstein brütet.

149. *Muscicapa atricapilla* L. Bei Nürnberg findet sich der schwarze Fliegenschnäpper nur auf dem Striche im Herbst und Frühjahr. Wolf erhielt mehrere im August 1802 und im Mai 1803 und 1806, Sturm im Mai 1861, ich selbst sah verschiedene im Schmausengarten bei Nürnberg gefangene Frühlings- und Herbstvögel. Bei Rothenburg o. T., Burgbernheim, Arberg und Eichstädt nistet er. Im Frühjahr 1853 waren sie auf dem Zuge bei Ansbach ungemein zahlreich.

150. *Muscicapa albicollis* Temm. Ein seltener Zugvogel, bei Neustadt a. A. brütend, sonst nur auf dem Striche beobachtet.

151. *Chelidon urbica* L. Gemeiner Zugvogel; kommt manchmal schon in der Mitte Aprils, gewöhnlich erst zu Ende dieses Monats, öfters auch erst anfangs oder gar erst um die Mitte des Mai zu uns, brütet und verlässt uns im September und October wieder. In manchen regnerischen und kühlen Jahren gehen viele Spätbruten durch Hunger und Kälte zu Grunde. In den Jahren 1822 bis 1828 konnte man fast alljährlich mehrere ganz weisse Schwalben von der Fleischbrücke in Nürnberg über der Pegnitz und an den dortigen Gebäuden umherfliegen sehen. „Steuerling.“

152. *Hirundo rustica* L. Gemeiner Zugvogel. Sie kommt sehr selten in einzelnen Exemplaren oder Paaren schon im März, gewöhnlich erst im April zu uns, manchmal aber verzögert sich

die Ankunft unserer Brutvögel bis zum zweiten Drittel des Mai. Im September und October ziehen die „Rauchschwalben“ wieder weg. Weisse Varietäten sind nicht sehr selten. Ich sah einst in einem Reichswalddorfe ein Nest dieser Schwalbe in der Wirthsstube auf einer Schwarzwälder-Uhr, woselbst die Jungen aufkamen.

153. *Cotyle riparia* L. In den meisten Gegenden nur auf dem Zuge im April und Mai und wieder im August und September an unsern Flüssen, Weihern und am Donau-Main-Kanale, auf dem Dutzendteich bei Nürnberg manchmal in grosser Anzahl, in einigen Gegenden, wie bei Eichstädt, an der Biebert bei Ammerndorf, früher auch bei Erlangen an der Haderheim brütend.

154. *Columba palumbus* L. Ein nahezu gemeiner Zugvogel; kommt manchmal schon im Februar, gewöhnlich erst im März bei uns an, brütet und zieht im September und October wieder weg, einzelne bleiben sogar bis zum zweiten Drittel des Novembers. „Pfundtaube, grosse Ringeltaube.“

155. *Columba oenas* Gm. L. Nicht seltener Zugvogel; kommt im letzten Drittel des Februar oder anfangs März zu uns, brütet und verstreicht in grossen Flügen im September und October. Im Juli 1859 sah Herr Dr. J. W. Sturm Lochtauben auf dem Dutzendteiche bei Nürnberg auf die Blätter der Seerosen tief in einem der Weiher sich niederlassen und trinken. „Holz-Hohltaube.“

156. *Peristera turtur* L. Nirgends gemeiner, aber auch gar nicht seltener Zugvogel; kommt in den letzten Tagen des April oder anfangs Mai, brütet und verlässt uns im August und September.

157. *Tetrao urogallus* L. Das Auerwild, einst in Mittelfranken über mehrere grössere, sogar über kleinere Waldungen verbreitet (denn es wurden noch im Jahre 1680 in hiesiger Gegend in der v. Crailsheim'schen Wildfuhr bei Thann ein Auerhahn und eine Henne erlegt), ist jetzt auf den Reichswald bei Nürnberg beschränkt, woselbst es ruhige Dickungen bewohnt, in denen es viele Waldbeeren und Ameisenhaufen gibt. Seine hauptsächlichsten Aufenthaltsorte hat es im Laurenzi Walde, wo sich im-

mer noch ein sehr guter, 1858 von dem Könige Max II. besucht und in Folge allerhöchster Verfügungen sorgfältig gehegter Auerwildstand befindet. Trotzdem aber will sich dieses edle Geflügel nicht in der erwarteten Weise vermehren, woran wohl hauptsächlich die vielen Füchse, die Unruhe und Störung der Waldung durch das Leseholz und Schwarz- und Rothbeeren sammelnde Proletariat und die auffallende Sorglosigkeit der Auerhühner Schuld seyn mag, welche ihre Nester oftmals an Orten anlegen, wo die Eier zu Grunde gehen müssen. So erinnere ich mich eines Nestes, welches auf einem frischen Gehau neben einem Asthaufen stand, so dass die stark angebrüteten Eier bei der Holzabfuhr zu Grunde gingen. Auch das Vieh zertritt manches Gelege und zarte Küchlein finden ihren Tod in Wassergräben. Noch eine auffallende Erscheinung sey hier erwähnt, dass nämlich manche Hühner unbefruchtet bleiben, lautere (unbefruchtete) Eier legen und blinde Bruten machen, über denen sogar manchmal eine Henne zu Grunde geht. So fand Herr Forstgehülfe Donle auf der Revier Behringersdorf ein Nest mit 5 lauterer Eiern, ein anderer mir befreundeter Forstmann auf der Revier Forsthof eine ganz abgemagerte todte Henne, die er oftmals von den Eiern gejagt hatte, nicht weit von dem nun leeren Neste. Es ist diess darum um so auffallender, weil im Reichswalde sehr viel Birkwild lebt, aber noch kein Forstmann Auerhennen auf den Falzplätzen des Birkgeflügels angetroffen oder einen Bastard von Auer- und Birkwild, einen sogenannten Rackelhahn, im Reichswalde gesehen oder geschossen hat. Auerhennen, und zwar jedenfalls solche, deren Brunst keine Befriedigung gefunden, streifen und suchen oft weit umher, legen ihr menscheuscheues Wesen ab und kommen, ähnlich den abgekämpften jungen Auerhähnen, manchmal ganz von Sinnen. Eine solche Henne wurde nahe an Nürnberg dicht an der Landstrasse vor einem Wirthshause am Judenbühl von einer hohen Linde, eine andere am 21. April 1854 von einem Schlote der im grossartigsten Betriebe stehenden Zeltner'schen Ultramarin-Fabrik am Spittlerthore zu Nürnberg herabgeschossen. Sie trieb sich schon Tags zuvor in einem benachbarten Garten von Steinbühl umher. Im Sebaldi Walde findet sich nur wenig

Auerwild in den Revieren Beringersdorf und Erlenstegen und seit einigen Jahren an der Grenze der Reviere Heroldsberg und Herrnhütte auf der Revier Kraftshof, ferner auf den Revieren Tennenlohe, Puckenhof und Dormitz. Zu Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts überfiel in einem ansbach'schen Forste ein Auerhahn in der Balzzeit 2 sägende Holzhauer, schlug und biss sie mit Schnabel und Flügeln und setzte diess mehrere Morgen nach einander und so lange fort, bis er von den hievon benachrichtigten Jägern während eines solchen Anfalles gefangen wurde.

158. *Tetrao tetrix* L. Ein in ganz Mittelfranken verbreiteter Standvogel. Das meiste Birkwild besitzt der Nürnberger Reichswald, doch wechseln hier, wie überall, die Aufenthaltsorte desselben in mannichfacher Weise. Sobald weite Krüppelholzflächen aufgeforstet und in die Höhe gekommen sind, verschwindet das vorher zahlreich dagewesene Birkwild, wo aber etwa durch Raupenfrass, Waldbrand etc. weite Flächen devastirt werden und anfangen, sich wieder allmählich zu bestocken, wo in kümmernden, gelbnadeligen Beständen, deren der Reichswald noch so viele hat, Haidekraut und Schwarz- und Rothbeeren den ausgesogenen dünnen Sandboden überwuchern, und einzelne hohe Bäume sich über das Buschwerk erheben, da siedelt sich dieses Geflügel gerne an.

159. *Tetrastes bonasia* L. Das Haselhuhn war vor 200 Jahren und früher in Mittelfranken noch in verschiedenen Forsten Standwild. 1661 sind in dem Verzeichnisse dessen, was am markgräflisch ansbachischen Hofe consumirt wurde, 274 Stück Haselhühner à 8 kr. aufgeführt. Dass dieselben nicht von auswärts bezogen, sondern im Lande gefangen wurden, geht aus einer Austheilung des zur Hofküche von den Wildmeistern einzusendenden Wildes vom Jahre 1669 hervor, wornach die Wildmeister zu Ansbach, Triessdorf, Hennenbach, Weißenzell, Unternbibert, Dachstetten, Hirschbronn und Merkendorf und der Förster zu Ansbach wöchentlich, so lange der Strich dauerte, 2 Haselhühner oder Schnepfen liefern mussten. „Weil es,“ sagt die Austheilung, „nicht allerorten Haselhühner gibt, müssen Haselhühner und Schnepfen unter einander gerechnet werden. Noch 1682 war im

Botenträgerlohn-Tarif von einem Haselhuhn 2 Pfennige festgesetzt. Auch in der v. Crailsheim'schen Waldung bei Thann in der Gegend von Herrieden gab es ehemals Haselhühner. Um 1654 lieferte der Thannische Jäger 2 Stück und 1667 war das Schussgeld von einem dergleichen Huhn 4 Kreuzer. Als Standwild sind sie jetzt in allen Theilen des Kreises völlig ausgerottet und selbst auf dem Striche kommt nur äusserst selten ein verirrtes Exemplar im Reichswalde vor. Ein solches wurde ganz abgemagert im Herbst 1845 auf der Revier Engelthal gefangen, ein anderes, Weibchen, am 17. December 1860 auf dem Sebaldi Walde in der Revier Heroldsberg geschossen. Anfangs der 20er Jahre traf Herr Dr. J. W. Sturm auf der Unterbürg ein Haselhuhn an.

160. *Phasianus colchicus* L. Der Fasan hat in Mittelfranken eigentlich nie wild gelebt; denn auch die Fasane, welche ehemals in der Gegend von Weidenbach brüteten, waren Flüchtlinge aus der markgräfllich ansbachischen Fasanerie in Triessdorf. Von dort verflohen sich jährlich viele in die Jagden der Umgebung, bis Irrebach, Sommersdorf und Thann, so dass manchmal der v. Crailsheim'sche Jäger zu Sommersdorf an Einem Tage 4 Fasane schoss. Unter der preussischen Regierung ging die Fasanerie ein und verschwanden deren Insassen nach dem Jahre 1796 allmählich auch aus der Umgegend. Flüchtlinge aus den Fasanerien der Fürsten Wrede zu Ellingen und Oettingen-Wallerstein wurden einer im Jahre 1835 auf der Reichswald-Revier Prunn, ein anderer auf der Revier Lellenfeld bei Gunzenhausen in den 40er Jahren erlegt.

161. *Sterna cinerea* Briss. Gemeiner Standvogel. Weisse oder mit viel Weiss gescheckte Exemplare sind nicht sehr selten.

162. *Ortygion coturnix* L. Ein in manchen Gegenden Mittelfrankens, so z. B. bei Gunzenhausen, Triessdorf u. s. w. jedem Kinde bekannter, in andern Gegenden viel seltenerer Zugvogel. 1862 kam die erste Wachtel in hiesiger Gegend ungewöhnlich frühe, schon am 27. April an, gewöhnlich erscheint sie erst Mitte Mai, auch noch später, brütet und zieht im September

wieder weg. Eine einzelne Verspätete sieht man hie und da noch spät im October. Herr Forstwart Jägerhuber schoss sogar noch am 17. November 1855 eine Wachtel bei Arberg. Wenn sie nach ihrer Ankunft bei uns ihren Schlag anhaltend hören lässt, so bedeutet es ein schlechtes Kornjahr oder gar Theuerung; wenn sie aber nur wenige Daktylen hinter einander schlägt, so ruft sie „6 Paar Weck“ und es bedeutet ein gutes Jahr.“ Bemerkenswerth dürfte sein, dass der Wachtelschlag zwar zu manch sinnigem Gedichte Veranlassung gegeben hat, aber auch zu den Spottliedern auf die Kipper und Wipper des 30jährigen Krieges. Eines der verbreitetsten der letzteren Gattung war der „Wachtelgesang, d. i. wahrhaftige, gründliche und eigentliche Namensabbildung, wie nämlich etc. das schändliche heillose Gesindlein der guten Münz-Ausspäher und Verfälscher, welche der Teufel etc. ausgebrütet hat, in dem Wachtelschlag namhaft gemacht werden.“ Eine neue Ausgabe davon erschien mit dem Titel: „Kippediwig oder Wachtelgesang“ 1621. Eigenthümlich: der Protestant versinnlicht den Wachtelschlag etwa mit den Worten: „Fürchte Gott, liebe Gott, lobe Gott!“, der Katholik mit: „Bitt für uns!“ Dem Faulen sagt man, sie rufe: „Bück' den Rück!“ dem Schüler: „Die cur hic?“ Der Verehrer einer guten Prise Lotzbeck freut sich innig, dass die Wachtel so deutlich „Schnupftabak“, der Liebhaber der Tafelfreunden, dass sie „Pickenick“ sagt.

163. *Otis tarda* L. Der Trappe soll früher in der Gegend von Burgbernheim gebrütet haben, jetzt kommt er nur selten in manchen Jahren in der Gegend von Windsheim (Illesheim), Uffenheim (Geckenheim, Gollachostheim), seltener bei Nürnberg (Almoshof) und Altdorf (Unterferrieden) vor. Ich besitze eine Anzahl alter Kupferstiche, welche im Nürnberg'schen erlegte seltene Vögel darstellen. Auf einem derselben ist ein weiblicher Trappe abgebildet mit der Bemerkung: Anno 1652 den 2. Decembris ist ein solcher Vogel, Träppin genannt, auf dem „Spitelberg“ in dem Feld geschossen und also abgemalt worden. Mitte Januar 1850 liessen sich bei grossem Schnee zwei Trappen nahe an Nürnberg bei den Gärten hinter der Veste sehen und hielten sich, fruchtlos viel beschossen, 5 bis 6 Tage auf den Feldern auf,

wo sie sich von Kohl nährten. Bei starkem Schneefall wurde am Abend des 19. Januar wiederum auf sie gefeuert, worauf sie wegstrichen und ein leicht verwundetes Weibchen in einem Garten einfiel, welcher an die Wirthschaft zum Täubchen auf dem Webersplatze in Nürnberg stösst, und ergriffen wurde.

164. *Otis tetrax* L. Höchst selten, nur auf dem Striche. Zwei Zwergtrappen wurden bei Roth a. S. angetroffen und an Weihnachten 1848 ein Weibchen spät am Abend auf einem Felde bei Windsheim, wo es mehrere Male vor dem Schützen aufgestanden war und sich endlich in den Schnee gedrückt hatte, ganz nahe an den Mauerwällen geschossen.

165. *Crex pratensis* Bechst. Der Wachtelkönig kommt sehr spät, erst im letzten Drittel des Mai, oft sogar erst am 20. Juni zu uns, brütet und verlässt uns wieder im September und October. „Mäher, Mäher, Mäherhex, Knecht-mäh!, Sensenwetter, Schneedsgern, Nachtschreier, Wiesenschnarrer, Wiesenschnarcher.“

166. *Ortygometra porzana* L. Zugvogel, kommt im April, gewöhnlich in den ersten Tagen bis Mitte des Monats, nur selten später, brütet und verlässt uns wieder im September und October, einzelne Verspätete erst in der ersten Woche des Novembers. „Geperltes Rohrhuhn.“

167. *Ortygometra minuta* Pall. Die Herren DD. Sturm erhielten ein solches Sumpfhuhn Mitte April 1822.

168. *Ortygometra pygmaea* Naum. In Mittelfranken selbst hat man es noch nicht beobachtet, doch kommt es nahe der Kreisgränze bei Erlangen auf den Weihern bei Neuhaus in der Gegend von Höchstädt a. A. vor und muss Mittelfranken passieren, wenn es im Frühjahr dorthin zieht.

169. *Rallus aquaticus* L. Zugvogel, kommt im März und April, brütet und verlässt uns im October und November. Nicht wenige bleiben den ganzen Winter bei uns. Wachtelkönige, Sumpfhühner und Rallen verunglücken häufig an den Telegraphendrähten.

170. *Gallinula chloropus* L. Zugvogel, kommt manchmal schon Mitte März, gewöhnlich aber erst Mitte April bis Anfangs Mai, brütet, zieht im September und October, bleibt manch-

mal — es sind diess Junge verspäteter Bruten — bis in den November und überwintert sogar hie und da. Wolf erhielt ein grünfüssiges Rohrhuhn am 23. Januar 1803, welches in einem Graben auf der Dullnau gefangen wurde. Es war zu jener Zeit seit 3 Wochen kalt und alle Weiher zugefroren, lag aber wenig Schnee.

171. *Fulica atra* L. Nur in sehr seltenen Fällen kommt die „Blasse“ schon in dem letzten Drittel des Februar, gewöhnlich erst im zweiten Drittel des März, ist im April oft massenhaft auf grossen Teichen zu finden, verbleibt zum Theil auf solchen, um zu brüten, sammelt sich im August und September wiederum zu grossen Schaaren an und verlässt uns im October, die letzten erst gegen Mitte Novembers.

172. *Gruscinerea* Bechst. Im Jahre 1740 zeigten sich viele Kraniche bei Roth a. S. Am 2. April 1837 fanden sich in der Gegend von Cadolzburg auf einem Weiher bei Seukendorf zwei Flüge ein, der eine aus 5, der andere aus 12 Stücken bestehend, hielten sich eine Woche lang auf und wurde ein Männchen davon erlegt. Auch bei Altenfurth, Wilhermsdorf (1848), bei Feuchtwangen (Dentlein am Forst) und bei Erlangen (ein junges Männchen am 29. Juli 1848 bei Frauenaaurach) wurden Kraniche geschossen.

173. *Oedicnemus crepitans* Temm. Wurde schon hie und da auf sandigen dünnen Schlägen und ähnlichen Localitäten bei Eichstädt, Gunzenhausen (Absberg), bei Windsheim (Wiebelsheim) und Neustadt a. A., öfters auch schon bei Nürnberg geschossen. Wolf erhielt einen Triel am 8. Merz 1799; am 12. April 1828 traf Herr Dr. J. W. Sturm auf dem Espan hinter Grossreuth zwei Stücke an und am 1. November 1862 wurde eines bei Wendelstein geschossen.

174. *Vanellus cristatus* Meyer u. Wolf. Sehr häufiger Zugvogel. Er kommt öfters schon in der Mitte oder gegen das Ende des Monats Februar, häufiger anfangs bis spätestens Mitte März, brütet und zieht im October und November wieder weg. Viele halten die ersten Winterfröste aus, streifen in grossen Schaaren in gefischten Weihern, auf Feldern und Wiesen umher, ein-

zelle bleiben sogar bis Weihnachten, und am 15. Januar 1840 wurde bei Sugenheim ein junger Kiebitz bei einer Temperatur von Morgens — 12°, Mittags — 5,3° und Abends — 15,9° R. geschossen.

175. *Squatarola helvetica* Briss. Sehr selten nur auf dem Striche im September und October. Ein mittelfränkisches junges Männchen der Sturm'schen Sammlung wurde am 12. October 1826 im Altmühlgrund, wenn ich nicht irre, geschossen.

176. *Chanadrius pluvialis* L. Das „Brachhuhn“ kommt während der beiden Strichperioden im März und April und wiederum im October und November, einzeln noch im December auf besamten Feldern, Hutungen, auf Wiesen, an Flussumfern und im Weiherlande überall in kleineren, auch manchmal grösseren Flügen vor. Ein Männchen im Sommerkleide erhielten die Herren DD. Sturm am 25. April 1846 von Maiach bei Nürnberg.

177. *Eudromias morinellus* L. In den 40er Jahren wurden im Aischgrunde bei Neustadt von Dr. Brandt 3 Stücke unter Kiebitzen und Staaren auf dem Frühlingszuge gesehen. Ein Exemplar der leuchtenbergischen Sammlung wurde bei Eichstädt geschossen.

178. *Aegialites curonicus* Beseke. Er kommt im April, brütet an der Rednitz und Regnitz, streift schon im Juli an Flüssen und Weihern umher und verlässt uns im August und September wieder.

179. *Aegialites hiaticula* L. Wurde bisher nur auf dem Herbststriche im September und October beobachtet. Wolf und die Herren DD. Sturm erhielten verschiedene junge Exemplare von dem Dutzendteich bei Nürnberg.

180. *Recurvirostra avocetta* L. Herr Dr. J. W. Sturm traf im März 1827 bei der Bekassinenjagd auf dem Espan bei Ziegelstein eine Avosette an, wahrscheinlich dasselbe Stück, welches kurz darauf in der Gegend von Erlangen bei Frauenaarach geschossen wurde.

181. *Hypsibates himantopus* L. Diesen prächtigen seltenen Fremdling sah ich in den Weihern bei Neuhaus in den Jahren 1858 und 1859 in einzelnen Stücken und Paaren, auch in

einer Gesellschaft von 5 Exemplaren beisammen. Ganz zur nämlichen Zeit, wie ich im Jahre 1858, beobachtete Herr Dr. J. W. Sturm auf dem Dutzendteiche mehrere solche Vögel. Mein verehrter Freund schrieb mir damals Folgendes: „Am 8. Mai spät Abends sah ich das erste Pärchen am grossen Dutzendteich. Ich traute meinen Augen kaum, als ich die Vögel in Gesellschaft mehrerer Totanus bis an den Bauch im Wasser herumspazieren sah. Es war diess an einer Landzunge, an und auf welcher auch eine Truppe von ohngefähr 20 *Larus ridibundus* und 8 *Sterna nigra* ihr munteres Wesen trieben. Am 9. Mai Morgens 5 Uhr traf ich die seltenen Gäste ziemlich an derselben Stelle, wie Abends vorher. In den Nachmittagsstunden beobachtete ich in Gesellschaft meines Bruders Friedrich diese lieblichen Sumpfvögel noch einmal und jetzt entdeckten wir auch ein zweites Pärchen und ein einzelnes Stück. Mit guten Fernröhren versehen, sahen wir dem Treiben derselben länger zu, während welcher Zeit ein Paar den coitus vollzog, worauf sich zuerst der Mann und hernach das Weib mehrmals badeten. Der kalte Tag (+ 9° R.), der heftige Ostwind und öfterer Regenschauer mussten den Vögeln unlieb sein, denn sie verbargen sich hinter den Kufen. Auch ein Pärchen der *Larus ritibundus* schnäbelte sich mehrmals am Lande und vollzog später den coitus. Am 10. Mai regnete es Vormittags; der Abend war sonnig und windstill, weswegen die Totanus sehr munter waren und laut schreiend viel umherstrichen. Ein Strandreuter-Pärchen war mitten unter ihnen, blieb jedoch auf der Landzunge zurück, wenn die Wasserläufer wegstrichen. Als es schon zu dunkeln anfang, sassen sie wieder in einer Gesellschaft von 12 Wasserläufern und wahrscheinlich übernachteten sie auch an dieser Stelle. Am 11. Mai waren sie abgezogen.“ Ich traf die oben erwähnten Stücke bei Neuhaus ganz zu derselben Zeit: am 3., 4. und 8. Mai je ein Paar, am 9. ej. m. ein Stück, am 10. ej. m. 5 Strandreuter, 4 Alte und einen Jungen, am 11. Mai ein einzelnes altes, Tags zuvor angeschossenes und nunmehr vollends erbeutetes Männchen. Es waren also die von mir und die von den Herren DD. Sturm beobachteten Strandreuter verschiedene Vögel und haben sich in jenen Jahren ungewöhnlich

viele solcher Bewohner des Südens in unser Franken verflohen. Im Jahre 1859, das sich durch tropische Sommerhitze auszeichnete und bei Neuhaus eine ziemliche Menge von Wanderheuschrecken (*Acridium migratorium*) zur Entwicklung brachte, hoffte ich auf eine noch zahlreichere Einkehr der mehrgenannten Vögel, täuschte mich aber; denn es kam nur ein Pärchen an die ein Jahr zuvor durch sie so anziehend gewordenen Weiher. Im Sommer 1851 wurde auf dem Markte zu Erlangen für die dortige zoologische Sammlung ein Exemplar erworben, welches in der Gegend, aber jedenfalls in der oberfränkischen Nachbarschaft, erlegt wurde.

182. *Totanus glottis* L. Nur auf dem Striche im Mai und wieder im August und September an Flüssen und Weihern. 1861 hörte ich ihn schon am 2. August an der Altmühl. Einzelne streichen noch im Juni und Juli und im October und November.

183. *Totanus fuscus* Briss. Nur auf dem Striche im April und Mai und wieder im September und October, einzeln bis Mitte November. Altmühl, Dutzendteich etc. in kleinen Flügen.

184. *Totanus calidris* L. Nur auf dem Striche vom März bis zum Mai und wieder im August und September an unsern Flüssen, an der Altmühl etc.

185. *Totanus glareola* L. Auf dem Frühjahr- und Herbststrich an unsern Flüssen (Aisch, Altmühl etc.) und Weihern (Dutzendteich etc.).

186. *Totanus ochropus* L. Nur auf dem Striche, selten schon Ende März, gewöhnlich anfangs bis Mitte April und noch bis Ende Mai, dann wiederum im Juli bis Ende September, Einzelne traf ich an der Altmühl bei Sommersdorf noch am 4. und 22. October 1863. Hier kommt er manchmal am Mühlgraben, der in die Altmühl fließt, bis in den Pfarrgarten so nahe an meine Wohnung, dass ich ihn am 26. August 1861 durch behutsames Oeffnen eines Fensters aufscheuchte.

187. *Actitis hypoleucos* L. Wandert zweimal, im April und Mai und wieder im Juli, August und anfangs September durch unsere Gegenden. „Pfeiferle.“

188. *Limosa aegocephala* L. Wurde schon etliche Male

auf dem Striche bei Erlangen, Langenzenn und anderwärts beobachtet und geschossen.

189. *Limosa rufa* Briss. Wurde einmal, und zwar eine sogenannte *L. Meyeri*, im oberen Aischgrunde bei Markt Dachsbach, ein anderes Exemplar am 5. September 1851 bei Erlangen geschossen.

190. *Machetes pugnax* L. Der Kampfhahn kommt bei uns nur auf dem Striche ziemlich selten vor. Wolf erhielt ihn am 30. April 1803 von Lauf; die Sturm'sche Sammlung besitzt ein sehr schönes altes Männchen mit völlig ausgebildetem Kragen, welches am 15. Mai 1832 bei Cadolzburg am Seukendorfer Weiher geschossen wurde; ich selbst sah kleine Flüge am 2. und 3. Mai 1861 an der Altmühl bei Sommersdorf und Kampfstrandläufer, welche am 16. September 1861 bei Triessdorf auf dem Hirschlach-Moose, andere, welche bei Herrieden erlegt wurden. In den Weihern bei Neuhaus, 3 Stunden seitwärts von Erlangen, sah ich diese Vögel alljährlich in grossen Schaaren.

191. *Calidris arenaria* L. Im Herbst 1850 wurde ein Exemplar bei Fürth erlegt.

192. *Tringa cinclus* L. Die Herren DD. Sturm erhielten ein Männchen vom Dutzendteich am 13. October 1828; am 13. September 1863 schoss Herr Dr. Julius Müller in Triessdorf ein Stück auf dem Moose bei Hirschlach; bei Herrieden an der Altmühl Erlegte sah ich in einer dortigen kleinen Sammlung.

193. *Tringa Temminckii* Leisl. Wolf erhielt vom Dutzendteiche bei Nürnberg am 4. September 1803 drei solche Vögel, welche in Gesellschaft mehrerer sich befanden.

194. *Ascalopax gallinula* L. Auf dem Striche im März und April und wieder im October, auch noch im November im Ganzen seltener als die Bekassine, in manchen Jahren aber doch häufig genug. Herr Forstgehilfe Wilhelm Donle in Dormitz bei Erlangen hat dieses Schnepfchen brütend bei uns entdeckt. Ende April 1862 wurden nämlich auf der zum Forstamt Sebaldi in Nürnberg gehörenden Revier Dormitz von Holzhauern bei dem Reinigen von Gräben in ziemlich tiefer, nordöstlicher Lage nächst

den sogenannten Kreuzweihern auf einer früher versumpften, mit Erlen bestockt gewesenen, jetzt aber entwässerten, mit Fichten bepflanzten und an beständig nasse Wiesen gränzenden Fläche 3 Nester gefunden, welche sämmtlich in ziemlich hohem Grase am Rande der Gräben in Vertiefungen standen, welche wahrscheinlich durch den Tritt des früher dort zur Weide getriebenen Viehes entstanden und nur leicht mit dürrer Grase und etwas Erlenlaub ausgekleidet, bloß dem scharfen Auge bemerklich waren. In diesen 3 Nestern fand Herr Donle je 4 Eier, in einem vierten Neste dagegen, welches er in einer Vertiefung an einem Erlenstocke entdeckte, lagen nur 3 Stücke. Um bezüglich des Vogels ganz sicher zu sein, erlegte er eines der brütenden, aus dem Neste gejagten Schnepfchen und zwei andere, deren Nester jedenfalls zerstört worden waren, am Kreuzweiher. Die Eier, von denen mir Herr Donle eines zur Ansicht sandte, wurden durch den bekannten Oologen, Herren Dr. Eduard Baldamus zu Osternienburg bei Köthen, als ächt bestätigt. Bisher wurde die kleine Bekassine in Bayern noch nicht und erst ein einziges Mal in Deutschland, im Münsterlande von dem Pfarrer Bolsmann in Gimble, brütend gefunden.

195. *Ascalopax gallinago* L. Während der beiden Zugperioden alljährlich, oftmals sehr häufig, in geeigneten Lagen an vielen Orten nicht selten brütend. An offenen Quellen überwintert manche Bekassine.

196. *Ascalopax major* J. Fr. Gm. Die „Doppelbekassine“ wird hie und da auf der Bekassinen- oder Hühnerjagd bei uns geschossen. Die Sturm'sche Sammlung besitzt zwei Exemplare, von denen das eine bei Poppenreuth von Dr. J. W. Sturm, das andere ebendasselbst von einem seiner Bekannten am 14. September 1831 in einem Kartoffelacker erlegt wurde. Herr Dr. Julius Müller in Triessdorf schoss sie schon zu verschiedenen Malen auf dem Moose bei Hirschlach, so 3 Stücke, welche ich durch seine Güte erhielt, am 12. August 1861 und am 5. März und 29. October 1862. Ein Exemplar der leuchtenbergischen Sammlung wurde 1832 auf dem Moor bei Nassenfels erbeutet.

197. *Scolopax rusticula* L. Die Waldschnepfe kommt

manchmal schon in den letzten Tagen des Februar und anfangs März, gewöhnlich erst um die Mitte des Monats zu uns, brütet gar nicht selten bei Altdorf und Hersbruck, im Laurenzi- und Sebaldi-Forste auf den Revieren Prunn, Fischbach, Feucht, Heroldsberg, Beringersdorf, bei Schwabach, Cadolzburg, Ansbach, Arberg, Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Neustadt a. A. und auf den Ausläufern des Steigerwaldes bei Scheinfeld u. s. w. und verstreicht im September und October, Einzelne erst tief im November. Nicht wenige überwintern ganz bei uns und wurden dergleichen „Lagerschnepfen“ bei Dormitz, Cadolzburg (31. December 1824, 22. December 1825 und 17. December 1836), bei Aurach, Dürrwangen, Kloster Sulz, Grimschwinden und anderwärts geschossen. Mitte Januar 1862 erhielt ich eine sehr abgemagerte verhungerte Schnepfe von Weidenbach bei Triessdorf.

198. *Numenius phaeopus* L. Am 19. December 1861 sah und hörte Herr Jägerhuber in Arberg einen solchen „Bracher“ über sich hinwegstreichen.

199. *Numenius arquata* L. Ein Zugvogel, der Ende März und anfangs April bei uns ankommt, in der Gegend zwischen Triessdorf und Gunzenhausen auf den Wiesen des weit ausgedehnten Altmühlgrundes bei Gern, Mörsach und Altenmuhr brütet, im August und September umherstreicht und im October gewöhnlich wegzieht. Einzelne bleiben bis in den November und December. So wurde bei Sommersdorf ein „Brachschnepf“ am 19. November 1846 geschossen und am 20. December 1851 erhielt ich ein bei Thalmessingen erlegtes Stück, welches sehr wohlgenährt war. Am 7. September 1854 traf Herr Jägerhuber in der Gegend von Arberg auf einem Hutwasen bei Schöna 30 dieser stattlichen Schnepfenvögel auf einem Haufen an. Gemein waren sie in hiesiger Gegend während des Augusts und Septembers 1863, wo man sie fast täglich in kleineren Truppen zu 4 bis 7 Stücken den Altmühlgrund auf- und abstreichen sah und ihre herrlichen Flöten-töne weithin vernahm. Die Gegend bei Triessdorf ausgenommen kommen sie im ganzen übrigen Kreise nur auf dem Striche, nirgends sonderlich selten vor. Sehr häufig sieht sie alljährlich der

Aischgrund, die Gegend von Nürnberg nur wenige, doch erhielt Wolf einige Stücke von Lauf, Schweinau etc.

200. *Numenius tenuirostris* Vieill. Nach Herrn Dr. Küster (Nürnberg's Vorzeit und Gegenwart von Professor Dr. Georg Wolfg. Karl Lochner, Erinnerungsgabe der 23. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, gewidmet von der Stadt Nürnberg, 1845, Seite 362) wurden 2 Exemplare in der Gegend von Erlangen erlegt, dem nördlichsten bis jetzt bekannten Fundorte dieser Vögel.

201. *Ibis falcinellus* L. Ein junger Ibis der herzoglich leuchtenberg'schen Sammlung wurde im Jahre 1833 im Kauerlacher Weiher bei Burggriesbach, ein ebenfalls junger Vogel von dem jetzigen Revierförster Model zu Markt Bergel, damals Forstaktuar in Gunzenhausen, am 20. October 1854 in dem grossen, etwa 70 Tagwerk Fläche haltenden, abgelassenen Gräfensteinberger Weiher zwischen den Orten Brand und Laubenzedel, eine Stunde von Gunzenhausen, geschossen.

202. *Ardea purpurea*. Sehr selten; erst zweimal in der Gegend von Cadolzburg und Ansbach erlegt.

203. *Ardea cinerea* L. Zugvogel; kommt Ende Februar und anfangs März bei uns an, brütet nur sehr vereinzelt, sehr selten kolonienweise und verlässt uns im October und November. Nicht wenige Reiher überwintern alljährlich bei uns, selbst in sehr kalten Wintern. Solchen ergeht es aber oft erbärmlich schlecht. In eiskaltem Wasser und auf dem Eise Stunden lang stehend und auf kärgliche Nahrung lauernd, erfriert er oft die Zehen und verliert dadurch an mehreren oder an allen Zehen mehrere Glieder. So erhielt Wolf einen Reiher, dem an den 3 Vorderzehen des rechten Fusses die letzten, an der mittleren Zehe sogar 2 Glieder, an der äusseren Zehe des linken Fusses das letzte Glied fehlte. Wenn bei grosser Kälte alle Gewässer zufrieren, so greifen manche dieser Vögel zu den widernatürlichsten Nahrungsmitteln und kommen endlich so sehr herunter, dass sie sich mit den Händen fangen lassen. Erst im gegenwärtigen Winter, am 16. Januar 1864, wurde mitten in einem meiner Parochialdörfer ein ganz ermatteter Reiher, am Eise des Baches sitzend und nicht

mehr im Staⁿde, sich durch Laufen oder Fliegen zu retten, von Knaben ergriffen und am 6. December 1844 ein zum Gerippe abgemagerter, bei Erlangen gleichfalls lebendig Gefangener mir gebracht, der nach wenigen Stunden starb und ausser einigen Froschknöchelchen viel kleines Gesäme, 5 Samenkerne vom Schneeballen-Strauch (*Viburnum opulus*) und Insektenreste (*Cimex*, *Crabro*, *Otiorhynchus*) im Magen hatte. Professor Wolf erhielt am 22. Januar 1823 bei grosser Kälte einen Reiher, welcher lebendig auf dem Eise gefangen wurde und seinen Schnabel in einem Mausloch stecken hatte. Dagegen fand ich sogar in dem grimmig kalten und schneereichen Winter 1844/45 mehrere Exemplare so fett, dass ich Mühe mit dem Abbälgen hatte. Ihre Mägen waren mit Fischen (*Perca fluviatilis*, *Cottus gobio*, *Cobitis barbatula*) mit Mäusen und Spitzmäusen (*Arvicola arvalis* und *Sorex fodiens*) und Wasserinsekten (*Dytiscus marginalis* etc.) angefüllt. Auch Wolf fand einen am 22. Januar 1799 von Windsbach erhaltenen Reiher sehr wohlgenährt und in seinem Magen ausser Krebssechsen und Schwänzen und einem *Dytiscus marginalis* eine ganze Wasserratte (*Arvicola amphibius*), in einem anderen, am 10. Januar 1800 am Kugelhammer bei Wendelstein geschossenen Stücke einen 9½ Zoll langen Hecht. Im Schossbach bei Windsheim brütet noch eine bedeutende Reiherkolonie. Wolf und ich erhielten junge, in der Nähe des Dutzendteiches ausgebrütete Reiher im Dunenkleide. Der Reiherstand im ehemaligen Reiherholze, jetzt Wannenholze, bei Triessdorf, sowie die ansehnliche Kolonie, welche früher bei Markt Erlbach zwischen den Dörfern Hirschneuses und Neudorf sich befand, sind jetzt beide, letztere wegen Abtrieb der Waldung, verschwunden.

204. *Egretta alba* L. Ende October 1854 wurde ein junger Vogel bei Erlangen geschossen und am 25. October 1856 am Dutzendteich bei Nürnberg ein Silberreiher von Herrn Dr. J. W. Sturm beobachtet.

205. *Buphus comata* Pall. Am 6. Juni 1856 zeigten sich mehrere Rallenreiher bei Pappenheim an der Altmühl und wurde ein altes Männchen davon erlegt. Im Sommer 1861 er-

hielt Herr Pfarrer Alt in Oberndorf ein Exemplar vom Kauerlacher Weiher bei Burggriesbach.

206. *Ardeola minuta* L. Die kleine Rohrdommel ist vom Mai an bis in den October hinein in jedem Monat so oft und in allen Gegenden des Kreises geschossen worden, dass angenommen werden muss, dass sie bei uns brütet; ein Nest hat man indess noch nicht gefunden. Am 6. August 1857 erhielt ich von Bayersdorf ein schönes Exemplar, welches mit 3 anderen streichend am Telegraphendraht den Flügel gebrochen hatte.

207. *Botaurus stellaris* L. Die Rohrdommel wird im Frühjahr im März und April und im Herbst vom September an den ganzen October hindurch, sogar noch im November auf dem Striche nicht ungewöhnlich beobachtet und ist schon in allen Gegenden des Kreises nachweislich erlegt worden.

208. *Scotaeus nycticorax* L. Der Nachtreiher wurde schon bei Neustadt a. A., auf der Rosenau bei Nürnberg und im Jahre 1844 ein Weibchen im zweiten Jahreskleide im herzoglichen Hofgarten zu Eichstädt nahe am Cabinets-Gebäude geschossen.

209. *Ciconia nigra* L. Der schwarze Storch wurde in den beiden Strichperioden im März und wieder im August und September bei Neustadt a. A., in der Gegend von Nürnberg (1655 den 16. September bei Mögeldorf, bei Fohlenhof, im Frühjahr 1861 auf der Revier Herrnhütte an der Heroldsberger Strasse), Fürth, Stadeln, Vach (26. September 1829), bei Erlangen (5. August 1851 und September 1862), Dormitz (März 1862), Feuchtwangen (am Grimschwinder Weiher mehrmals, bei Dentlein im Forst am 23. August 1853), endlich bei Dinkelsbühl (September 1858), Windsbach, Cadolzburg und Wilhermsdorf so vielfach erlegt, dass dieser Vogel nicht, wie gewöhnlich geschieht, zu den Seltenheiten unseres Kreises gerechnet werden kann.

210. *Ciconia alba* Briss. Ein jedem Kinde bekannter Zugvogel, kommt manchmal schon im letzten Drittel des Februar, gewöhnlich erst in der ersten Hälfte des März bei uns an, brütet allerwärts und verlässt uns im August wieder. Herr Jägerhuber traf am 11. December 1861 im Altmühlgrunde bei Wald noch ei-

nen Storch an. Im ehemaligen Fünferhause zu Nürnberg haben die Sänftenträger die Ankunft der Störche vom Jahre 1764 bis 1788 an der Wand notirt, woraus hervorgeht, dass in dieser Zeit der früheste Ankunftsstermin der 4. März, der späteste der 28. April war. 1799 fanden sich die Störche zwischen dem 12. und 21. Mai, nachdem sie seit 7 Jahren von der Stadt abwesend waren, in Nürnberg wieder ein.

211. *Platalea leucorodius* L. Im letzten Drittel des Monats Mai 1863 erschienen auf dem beiläufig 100 Tagwerk grossen Kauerlacher Weiher bei Burggriessbach 33 Löffelreiher, hielten sich 3 Tage lang auf und zogen, nachdem 2 alte Vögel waren erbeutet worden, nach Nordwesten weiter. 14 Tage darnach zeigten sich auf einem anderen Weiher bei Burggriessbach abermals 6 Stücke, hielten sich aber nur kurze Zeit auf, worauf in den ersten Tagen des Juli noch ein einzelner junger Vogel geschossen wurde.

212. *Cygnus musicus* Bechst. Der Schwan erscheint hie und da einzeln oder in Flügen auf unsern Gewässern. In dem kalten Winter 1740 zeigten sich viele Schwane bei Roth a. S. und Uffenheim. Ein 12 Pfd. schweres Exemplar in der Sammlung der Gewerbschule in Nürnberg wurde am 1. März 1855 bei Uffenheim geschossen. Auch auf der Aisch bei Windsheim, Neustadt etc., auf der Pegnitz bei Hersbruck und Artelshofen erscheinen manchmal Flüge (ein sehr schönes 14 $\frac{1}{2}$ Pfd. schweres Weibchen der Sturm'schen Sammlung wurde bei Reichenschwand am 25. December 1823), desgleichen auf der Altmühl bei Altenmuhr, Gunzenhausen (ein im December 1805 daselbst erlegter, 13 Pfd. schwerer, männlicher Singschwan trieb sich dort einige Zeit allein umher, wollte sich den daselbst häufig befindlichen wilden Gänsen beigesellen, wurde aber abgebissen), bei Kipfenberg (1832 zwei Schwäne, bei Kinding, 1838 neun, wovon 3 erlegt wurden, bei Böming), bei Eichstädt, bei Dorf Kemmathen am Hesselberg (6 Stück im März 1855 auf einem Weiher, wovon eines erlegt) und auf der Schmutter bei Nassenfels. Ein altes im untern Aischgrund erlegtes Männchen, welches ich im März 1855 erhielt, wog 21 bayerische Pfunde.

213. *Cygnus minor* Pall. *melanorhinus* Naum. Ein solcher Schwan wurde am 17. Februar 1820 auf der Altmühl bei Altenmühr erlegt. Seine Länge war 4' 5²/₃“, wovon der Schwanz 8¹/₃“ betrug, seine Breite 6' 9¹/₂“.

214. *Anser albifrons* Penn. Diese schöne Gans wurde von Wolf in der Gegend von Nürnberg mehrere Male beobachtet, junge Vögel und alte Männchen mit schwarzen Flecken auf dem Unterleibe erhielt er von der Altmühl bei Gunzenhausen am 29. November 1806 und am 18. December 1817. Ebendasselbst wurde am 5. December 1853 eine Blässengans erlegt.

215. *Anser segetum* J. Fr. Gm. Die Saatgänse, gewöhnlich „Schneegänse“ genannt, kommen gewöhnlich im November, selten früher an, gehen noch weiter nach Süden, bleiben zum Theil auch den Winter über da, kommen wieder im Februar aus südlicheren Gegenden schaarenweise zu uns und verstreichen im März. Berühmt waren bis auf die neuere Zeit die Altmühlgegenden, auf deren fetten Saaten und Wiesen im Spätjahr und Winter ehemals Tausende von Gänsen lagen. Jetzt klagen Jäger und Entenfänger, wie überall, über die auffallende Abnahme dieses Federwildes. Nur in sehr einzelnen Jahrgängen und langen Zwischenräumen, wie vor beiläufig 10 Jahren, sieht man einmal wieder bei Hirschlach, Altenmühr, Gunzenhausen und Windsfeld die Gänse nach Hunderten, sogar Tausenden. Anfangs der 20er Jahre fiel einmal Nachts ein Flug Wildgänse in der Stadt Nürnberg im Burghofe auf der Veste am Heidenthurm ein und schnatterte dermassen, dass sich ein Anwohner die Ruhestörer durch Werfen und Geschrei vom Halse zu schaffen genöthigt war. Kobell erzählt in seinem Wildanger von einer seltsamen, bei Nürnberg im Jahre 1820 vorgekommenen Gänsejagd. Es war am 18. Januar der Wiesgrund am Weiler Weigerholz¹⁾ unter Wasser und fanden sich da viele Wildgänse ein. Am 24. bemerkte man, dass eine Schaar derselben unter grossem Geschrei sich vergebens bemühte, aufzufiegen. Man erkannte, dass sie wohl mit den Ständern angefroren sein müssten

¹⁾ Ein Weiler dieses Namens existirt in der Gegend von Nürnberg nicht.

und so war es auch; nun lief viel Volk herzu und wurden 167 solcher Gänse mit Knitteln erschlagen.

216. *Vulpanser tadorna* L. Ein schönes Männchen, früher im Besitze des Kaufmanns Fürnhaber, jetzt (so viel ich weiss) in der Sammlung des naturhistorischen Vereins in Augsburg stehend, wurde bei Nürnberg geschossen.

217. *Mareca penelope* L. Auf unsern Flüssen und Teichen während der beiden Strichperioden vom September bis tief in den December hinein und wieder im März und April eine unserer gewöhnlichsten Enten. Einzelne Paare oder kleine Flüge bleiben bis in den Mai. Die Entenfänger des Altmühlgrundes heissen sie „Schmia“, eine Bezeichnung, welche den Lockruf dieser Ente versinnlichen soll, und rechnen sie zu den $\frac{3}{4}$ Enten oder Schmalvögeln. Zur Zeit bestehen noch 4 „Entenpfähle“ (Entenfänge) bei Altenmühr, wovon jedoch nur 2 in gutem Betriebe sind, nämlich 2 zu Neuenmühr, einer zu Laubenzedel und einer bei Windsfeld, welche von Altenmühr aus begangen werden. Vor 30 bis 40 Jahren waren diese Entenfänge viel ergiebiger, denn jetzt. Die Gänse haben, wie schon erwähnt, auffallend abgenommen; Enten gibt es, wenigstens in manchen Jahren, noch immer viele, man fängt sie aber mit dem Garne nur noch in nassen Spätherbsten und Vorwintern, wenn der Strich gut ist. Gewöhnlich werden sie von den Hütten aus geschossen. Acht bis vierzehn Tage nach Martini kommen die „fremden“, d. h.: allerlei Gattungen im Norden wohnender, nun nach Süden ziehender Enten und bleiben bis gegen Weihnachten, von Mitte Februar an kehren sie wieder und bleiben 3 bis 4 Wochen. Der Fang auf diesen Entenpfählen wird seit Jahrhunderten betrieben und beruhte auf katastrirten Rechten, welche aber durch die neueste Jagdgesetzgebung aufgehoben worden sind. Gegenwärtig wird das Fangen und Schiessen missbräuchlich, aber im Einverständnisse mit den betreffenden Jagdpächtern gegen einen Tribut an dieselben noch alljährlich betrieben. Man unterscheidet 4 Kategorieen Enten:

- 1) grosse Enten (*Anas boschas*);
- 2) $\frac{3}{4}$ Enten oder Schmalvögel. So heissen alle Süsswasser-

Enten, welche kleiner sind als die grosse oder Stockente, und grösser, als die Kriekente;

- 3) Halbenten, von denen es 2 Sorten gibt, nämlich Weissmergle (*Anas querquedula*) und Schwarzmergle (*Anas crecca*);
- 4) Tigel und Shecken, worunter die Tauchenten verstanden werden, zu deren näherer Bezeichnung die Farbe ihres Gefieders dient.

218. *Cyanopterus querquedula* L. Auf dem Striche im Frühjahre und Herbst gemein, da und dort (Nürnberg, Hirschlach bei Triessdorf) auch brütend. Das „Weissmergle, Ratscherle“ der Altmühl-Entenfänger.

219. *Chauliodes strepera* L. Auf dem Striche im Frühjahr und Herbst selten. Wolf erhielt am 14. November 1805 und am 20. December 1811 Schnatterenten, welche auf der Altmühl erlegt wurden, eine bei Altenmühl gefangene sah ich in einer kleinen Sammlung zu Herrieden.

220. *Dafile acuta* L. Auf dem Frühjahrstriche zu Ende Februars, im März und einzeln noch im April, dann wieder im October und November oftmals in grossen Flügen auf der Altmühl, Aisch u. s. w. Herr Dr. J. W. Sturm traf sie noch am 7. April 1861 auf dem Dutzendteich. „Spitzzakel“ der Altmühl-Entenfänger.

221. *Anas boschas* L. Brütet auf grossen Weihern und Weiherkomplexen und zieht im Frühjahr und Herbst in grossen Schaaren durch. Einzelne bleiben auch den ganzen Winter über bei uns.

222. *Anas crecca* L. Auf dem Frühjahr- und Herbststrich gemein. „Mergle, Schwarzmergle, Pfeiferle“ der Altmühl-Entenfänger.

223. *Rhynchaspis clypeata* L. Auf dem Frühjahr- und Herbststrich nicht selten, doch nicht gemein. Herr Dr. J. W. Sturm traf in verschiedenen Jahren auf dem Dutzendteich bei Nürnberg den ganzen April hindurch 3 bis 4, einzelne Paare bis Mitte Mai an. „Löffelente, Breitschnabel“ der Altmühl-Entenfänger.

224. *Somateria mollissima* L. Im Herbst 1834 wurde

ein sehr altes Männchen dieser Ente von einem Bauern bei Dürnfarnbach, Landgerichts Cadolzburg, und etwa 25 Jahre früher 2 dergleichen Enten in der nämlichen Gegend auf den Weihern bei Veitsbrunn geschossen.

225. *Oidemia fusca* L. Alte Männchen dieser Ente wurden bei Nürnberg (Mögeldorf im Februar 1830, ein anderes auf dem Dutzendteich im März 1838), bei Erlangen (Bayersdorf), auf der Regnitz, junge Vögel oder Weibchen bei Eichstädt 1846 und bei Gunzenhausen im März 1848 auf der Altmühl erlegt.

226. *Glaucion clangula* L. In den Wintermonaten vom November bis März nicht selten bei uns durchwandernd, verbleibt diese Ente manchmal bis zu den ersten Tagen des April. Auf dem Dutzendteich von Wolf und den Herren DD. Sturm wiederholt im November und März beobachtet.

227. *Harelda glacialis* L. Im Januar 1821 wurde ein altes Männchen der Eisente auf der Altmühl bei Gunzenhausen, ein anderes im December 1826 auf der Aisch erlegt.

228. *Fuligula marila* L. Selten. Im December 1848 schoss der jetzige Revierförster Henke zu Wustviel auf einem Weiher bei Kammerstein in der Gegend von Schwabach 4 Stücke. Auch bei Erlangen (Dormitz) und auf der Altmühl bei Eichstädt (1844 ein Pärchen) wurde sie erlegt und Wolf erhielt am 29. November 1816 zwei Männchen von Gunzenhausen.

229. *Fuligula cristata* L. Auf dem Striche im Frühjahr und Herbst in Flügen bis zu 12 Stücken auf unsern Flüssen und Teichen. Wolf erhielt sie vom Dutzendteich und vom Rosenau-Weiher. Die Altmühl-Entenfänger nennen die alten Männchen „Porzellanschecken“, die jungen Vögel und Weibchen „Schwarztigel.“

230. *Fuligula nyroca* Guld. Gleichfalls nur auf dem Striche in kleinen Flügen auf unsern Gewässern. Der „Brauntigel“ der Altmühl-Entenfänger.

231. *Fuligula ferina* L. Auf dem Striche in kleinen Flügen auf unsern Gewässern nicht selten. Herr Jägerhuber in Arberg beobachtete Tafelenten auf dem Weiher bei Röttenbach noch am 1. Mai 1861, Herr Dr. J. W. Sturm auf dem Dutzend-

teich noch am 12. Mai 1858 und ebendasselbst Professor Wolf am 25. Juli 1809. Da nun diese Enten auf den Weihern bei Neuhaus ganz bestimmt alljährlich in einzelnen, auch mehreren Paaren brüten, so ist zu vermuthen, dass diess auch auf dem Dutzendteich manchmal der Fall sei. Der „Kohltigel“ der Altmühl-Entenfänger.

232. *Merganser castor* L. In den Wintermonaten auf unsern Flüssen und deren Seitenflüsschen einzeln, häufiger paarweise und in Flügen zu 9 und mehr Stücken gar nicht selten. So wurde er auf der Altmühl bei Gunzenhausen, Laubenzedel, Eichstädt, auf dem Dutzendteich, auf der Pegnitz, Rednitz und Regnitz, bei Nürnberg, Hammer, Fürth, Erlangen, Bayersdorf, auf der Roth bei Roth a. S. (am 15. Januar 1848 ein Flug von 9 Stücken), bei Weickershof auf der Bibert (Januar 1645), auf der Rezat bei Ansbach vielfach beobachtet und geschossen. Wolf fand in einem am 4. März 1819 auf der Altmühl erlegten Exemplar eine 9 Zoll lange Aalruppe. Unsere Entenfänger nennen ihn „Sägente“.

233. *Merganser serrator* L. Ist viel seltener, als der vorige. Wolf erhielt ihn am 14. December 1820 von der Altmühl, wo auch im Winter 1848 bei Gunzenhausen ein solcher Säger geschossen wurde. Auch bei Erlangen hat man ihn schon erlegt und Mitte April 1858 beobachtete Herr Dr. J. W. Sturm ein sehr altes Männchen im Hochzeitkleide auf dem Dutzendteich, welches sich mehrere Tage ganz allein, entfernt von den Enten, umhertrieb.

234. *Mergus albellus* L. Kommt in jedem Winter in einzelnen Pärchen und kleinen Gesellschaften auf unsere Teiche (Dutzendteich etc.) und Flüsse. Auf der Altmühl und Rednitz ist er gar nicht selten.

235. *Phalacrocorax carbo* L. „Anno 1650. in der Charwochen ist bey dem Dutschenteich ein solcher Vogel, Scherben oder Seerab genant, vom Würth daselbst geschossen, und also abgemahlt worden“. So sagt ein alter Kupferstich in meinem Besitz. Im April 1860 stellten sich auf dem Dutzendteiche (Dutschenteich) 2 Kormorane ein, von welchen der eine am 23. Juni

1860 von dem Forstgehilfen Herrn Sturm zu Forsthof von einer Eiche herabgeschossen wurde. Im Frühjahr 1837 erschienen auf dem frischbesetzten Seukendorfer Weiher im Landgerichte Cadolzburg 9 Scharben und thaten, weil die Setzlinge wegen des Wasserwechsels in den ersten Tagen etwas matt waren, an den Fischen sehr empfindlichen Schaden. Am 26. März wurden davon 2 alte Weibchen erlegt. Ein Exemplar des Erlanger Museums wurde am 2. Januar 1829 von dem Fabrikanten Gächter zu Bruck auf der Regnitz und ein junges Weibchen im October 1862 bei der Cavallerie-Kaserne in Ansbach von einer hohen Pappel herabgeschossen.

236. *Sylbeocyclus minor* Lath. Gemeiner Zugvogel; er kommt frühzeitig im März zu uns, brütet auf Teichen und verlässt uns im October und November wieder. Einzelne traf ich mitten im Winter auf unseren Flüssen an offenen Stellen. „Duckerle, Weiherduckerlein, Duckentlein.“

237. *Podiceps auritus* Briss. Wurde schon etliche Male auf der Pegnitz und auf Weihern bei Nürnberg, Fürth und Erlangen erlegt. Auf einem Weiher bei Kloster Sulz wurde im Sommer ein junges Exemplar angeschossen und erst im Herbst bei dem Fischen lebendig gefangen.

238. *Podiceps cornutus* Lath. Ein junger Vogel wurde in der Gegend von Neustadt a. A. geschossen.

239. *Podiceps cristatus* L. Er kommt im März und April, brütet nur selten auf grossen Teichen, wie bei Nürnberg auf dem Dutzendteich, und verlässt uns im September und October wieder. Am 6. December 1849 wurde bei hohem Schnee an einem, $\frac{1}{4}$ Stunde von Pappenheim entfernten, ganz zugefrorenen Weiher ein Männchen, einige Stunden darnach ein Weibchen ganz in der Nähe jenes Weihers in dem Garten des dortigen Forsthauses und am 10. December wieder ein Weibchen in einem Hause nahe der Bleiche bei Wassertrüdungen lebendig mit den Händen ergriffen. Ich erhielt sie sämmtlich; es waren junge Vögel. In den meisten Gegenden Mittelfrankens ist er nur auf dem Striche selten zu finden.

240. *Colymbus arcticus* L. Wurde schon etliche Male

im Herbst und Winter auf unsern Flüssen, einer Ende October an der Brücke bei Bayersdorf auf der Regnitz, ein anderer im Winter 1860 von dem Revierförster Herrn Landmann in Triessdorf bei tiefem Schnee in der Nähe von Nehdorf geschossen.

241. *Colymbus torquatus* Brunn. Wolf erhielt ihn zweimal, am 22. October 1804 vom Dutzendteich und am 4. December 1806 nahe an der Stadt, wo der Vogel von einem Hühnerhund in einem Schanzgraben gefangen wurde.

242. *Colymbus septentrionalis*. Selten im Winter auf unsern Flüssen. Ein Exemplar der leuchtenberg'schen Sammlung wurde bei Eichstädt erlegt.

243. *Lestris pomarinus* Temm. Wurde einmal auf einer Wiese bei Nürnberg beobachtet.

244. *Lestris cephus* Brunn. Wolf erhielt ein Exemplar, welches am 10. September 1818 bei Nürnberg geschossen wurde.

245. *Lestris parasita* Brunn. Diese Raubmöve wurde schon öfters bei uns erlegt, eine im Herbst 1842 bei Markt Scheinfeld in der Nähe von Schwarzenberg, eine zweite in der Gegend bei Rothenburg o. T. auf einem Felde bei Mittelstetten, eine dritte schon früher bei dieser Stadt, eine vierte ebenda auf dem Burgstall-Hof. Letztere wurde am 25. September 1862 von einem Schäfer auf freiem Felde mit der Schippe erworfen. Herr Dr. Brandt erhielt ein lebendiges Exemplar, welches ermattet auf dem Felde bei Cadolzburg ergriffen worden war; ich ausser dem erwähnten todt geworfenen Stücke ein sehr schönes junges Männchen im ersten Herbstkleide am 21. September 1848 in einem Steinbruch (Fischleinsberg) bei Wendelstein. Es war sehr ermattet, krank und abgezehrt, liess sich bald an Wasserlachen, bald auf dem Felde nieder und wurde von dem Dache der Schmiede herabgeschossen.

246. *Larus minutus* Pall. Die Zwergmöve wurde in Mittelfranken nur sehr selten beobachtet. Die Herren DD. Sturm sahen sie schon in früheren Jahren auf dem Dutzendteich zu gleicher Zeit mit *Falco rufipes* und *Sterna leucoptera*, neuerdings ebenda im Juni 1850 und am 15. Mai 1857. Ein am 27. No-

vember 1827 zu Grünsberg bei Altdorf erlegtes Exemplar erhielten sie für ihre Sammlung.

247. *Larus ridibundus* L. Die Lachmöve kommt auf dem Striche als ein ziemlich gewöhnlicher Vogel alljährlich, manchmal auch in grossen Schaaren zu uns; selbst in der Brütezeit sieht man einzelne dieser Vögel, sie brüten aber in Mittelfranken nirgends mehr. Früher thaten sie diess am Lindleinsee bei Rothenburg o. T. in grosser Anzahl, seit 1842 aber, wo der See zum grössten Theile trocken gelegt wurde, verschwanden sie als Brütévögel und kommen nur noch auf dem Striche dahin. Am 24. Juli 1810 erhielt Wolf eine Junge von Muggenhof; ein Bauer, welcher seine Pferde in das Wasser der Pegnitz ritt, hieb mit der Peitsche nach ihr, als sie sich in das Rohr versteckte, und erhaschte sie. Damals scheinen also Lachmöven wenigstens in einzelnen Paaren in der Nähe von Nürnberg gebrütet zu haben.

248. *Larus tridactylus* L. Die Dreizehen-Möve kommt in manchen Jahren in grossen Schaaren zu uns. So waren sie im Frühling 1845 im Regnitzgrunde sehr zahlreich, am 7. October 1848 in einem Fluge von mindestens 150 Stücken auf dem Dutzendteich, überhaupt in dem Winter 1848/49 in ganz Mittelfranken, im Altmühl-, Rednitz-, Aisch- und Bibertgrunde etc., auch längs des Donau-Main-Kanales ausserordentlich zahlreich vorhanden und wurden damals nicht nur sehr viele erlegt, sondern noch mehrere halbtodt ergriffen oder verhungert gefunden. Bei Gutzberg (15. April 1855), bei Kalchreuth (1861), endlich auch bei Eichstädt hat man sie erbeutet.

249. *Larus canus* L. Wolf erhielt aus der Nürnberger Gegend 3 Sturmmöven, ein Weibchen am 4. September 1800 vom Dutzendteich, ein desgleichen am 10. December 1812, auf den Wöhrder Wiesen erlegt, ein Männchen am 3. Februar 1815.

250. *Larus argentatus* Bränn. Die Silbermöve wurde erst ein einziges Mal auf dem Kauerlacher Weiher bei Burggriesbach geschossen. Ich sah das Exemplar in der leuchtenberg'schen Sammlung.

251. *Larus fuscus* L. Wolf erhielt sie mehrmals aus der Gegend von Nürnberg (1. October 1804 und 28. October 1808),

ich von der Altmühl. Auch auf der Aisch bei Neustadt, auf der Aurach bei Emskirchen und auf der Regnitz bei Erlangen (October 1854) wurden meistens junge Vögel erlegt.

252. *Sterna hirundo* L. Kommt im Strich auf unsere Flüsse (Rednitz, Regnitz, Pegnitz, Altmühl, Sulzach etc.) anfangs Mai und noch im Juni und wiederum Ende Juli. Bei Sommersdorf sah ich sie alljährlich, doch nur paarweise, einmal einen Flug von 7 Stücken auf der Altmühl fischen.

253. *Sterna minuta* L. Herr Jägerhuber traf sie in der Gegend von Arberg am 30. April und am 6. Mai 1861 an. Herr Pfarrer Alt in Oberndorf besitzt eine solche Seeschwalbe, welche 1829 auf dem Bischofsweiher bei Erlangen geschossen wurde.

254. *Sterna anglica* Mont. Eine Lachseeschwalbe schoss der Posthalter Schirmer in Windsheim auf einem Teiche in der Nähe von Oberntief im Jahre 1857, während es auf den Blättern von Seerosen sass.

255. *Sterna hybrida* Pall. *leucopareia* Natt. Die weissbärtige Seeschwalbe beobachteten die Herren DD. Sturm während des Frühjahrstriches mehrfach auf dem Dutzendteich, 2 Pärchen am 27. Mai 1858.

256. *Sterna leucoptera* Meissn. und Schinz. Diese Seeschwalbe beobachteten die Herren DD. Sturm zu gleicher Zeit mit *Falco rufipes* und *Larus minutus* auf dem Dutzendteich und stehen sowohl in der Sturm'schen, als auch in der ehemals Ziegler'schen Sammlung Exemplare, welche Professor Wagler auf genanntem Teiche geschossen hat. *Sterna leucopareia* und *leucoptera* brüten in manchen Jahrgängen in einzelnen Pärchen auf den Weihern bei Neuhaus, auf dem Strittweiher und den Poppenwinder Weihern, wo ich Alte, Junge und Eier erhalten und ihr Brutgeschäft vielfach beobachtet habe.

257. *Sterna nigra* Briss. Im Mai und Juni und wieder im August auf dem Striche auf unsern Flüssen und Teichen nicht gerade selten.

Nachtrag.

Milvus niger Briss. Am 11. März sah ich hier einen schwarzen Milan bei Seeligendorf, am 29. März 1864 ein Paar nahe an Sommersdorf über der Altmühl kreisen.

Machetes pugnax L. Einen Flug von etwa 25 Kampfstrandläufern traf ich am 8. April 1864 auf dem beiläufig 142 Tagwerk grossen Moose bei Hirschlach in der Gegend von Triessdorf an.

Die europäischen Arten der Arachnidengattung **Cheiracanthium**

von

Dr. L. Koch.

(Aus einer Monographie der Drassiden vorläufig mitgetheilt.)

Die Gattung *Cheiracanthium* wurde zuerst von C. Koch (Die Arachniden. Bd. VI. p. 11) aufgestellt, nachdem die bis dahin bekannten Arten unter den Clubionen aufgeführt worden waren. C. Koch hatte schon vordem in seiner „Uebersicht des Arachnidensystems“ das *Cheiracanthium Nutrix* von den Clubionen getrennt und zur Gattung *Anypaena* gezogen. Blackwall rechnet die beiden in England vorkommenden Arten von *Cheiracanthium* noch zu den Clubionen, während Westring die Koch'sche Gattung beibehält und deren Charaktere in gewohnter gründlicher Weise darstellt.

In ihrer Lebensweise, der Augenstellung, der Form der Mandibeln und Maxillen haben die *Cheiracanthien* grosse Aehnlichkeit mit den Clubionen, sie besitzen wie diese eine ungezähnte Tasterkralle; dagegen ist bei der Gattung *Cheiracanthium* das erste Beinpaar das längste, eine eigentliche Scopula fehlt, ebenso die Mittelritze des Cephalothorax, die Form, besonders des Kopftheils des letzteren, die Bildung der Tasterdecke und die Bestachelung der Beine sind ganz anders als bei den Clubionen.

Gattungscharakter.

Der Cephalothorax länger als breit, mit stark hervorgewölbtem Kopftheile, von diesem nach hinten sanft abfallend, ohne Mittelritze, statt dieser ein Eindruck oder ein längliches Grübchen.

Acht Augen in zwei Reihen, von denen die vordere kürzer und gerade, die hintere breiter und über die vordere gebogen ist, die Mittelaugen der hintern Reihe weiter von einander entfernt, als die der vorderen.

Die Mandibeln merklich dicker als die Vorderschenkel, beim Weibchen kürzer und kräftiger, beim Männchen länger und dünner.

Die Maxillen vorn breiter als an der Basis, an der Aussen-
seite ausgerandet, am Aussenwinkel gerundet, innen schräg ab-
geschnitten. Die Lippe aus schmaler Basis sich erweiternd, nach
vorn aber wieder verschmälert, um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen.

Das Abdomen mit kurzen anliegenden Haaren und einge-
streuten Borsten bekleidet. — Sechs Spinnenwarzen, die obersten
cylindrisch, die untersten conisch.

Die weiblichen Taster dünngliederig, das dritte Glied kür-
zer als das vierte. Die Tasterkralle kurz, ohne Zähnchen.

Die Tasterdecke des Mannes geht an der Aussenseite der
Basis in einen kürzeren oder längeren, rückwärts gerichteten, nach
unten gebogenen Sporn über.

Von den Beinen ist das erste Paar das längste, nach die-
sem das vierte, dann das zweite, das dritte ist das kürzeste¹⁾,
die Schenkel sind dünn. Die Bestachelung der Beine ist sehr
unbeständig; constant ist nur das Fehlen der Stacheln an der
Oberseite der Schenkel und Tibien und an den Patellen aller
Beine, an der Hinterseite der Tibien des ersten und zweiten Paa-
res. Die Scopula fehlt.

Ihre Lebensweise ist wie jene der Clubionen; sie halten sich
ebenso gern auf Bäumen auf, wo man sie zwischen zusammenge-
rollten Blättern in ihrem Gewebe findet, und wo sie ihre Eier
bewachen, als auch in trockenem Moose, besonders den Cladonien.

¹⁾ Die Längenverhältnisse der einzelnen Beinglieder zu einander
sind so wechselnd, dass sie für die Bestimmung der Art fast
ganz werthlos erscheinen; so ist bei einzelnen Exemplaren von
Cheiracanthium nutrix die Tibia $2\frac{1}{2}$ mal so lang, als die Pa-
tella, bei andern $3\frac{1}{2}$ mal, bei *Cheiracanthium Seidlitzii* schwankt
dieses Verhältniss zwischen $3\frac{1}{2}$ und 5 mal.

Bei nachfolgender analytischer Zusammenstellung konnten nur die Männchen berücksichtigt werden, da ich bei zwei Arten nicht ganz sicher bin, ob die dorthin gezogenen Weibchen wirklich zu den betreffenden Männchen gehören.

- | | | | |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | { | das dritte Beinpaar mehr als $\frac{1}{2}$ mal | |
| | | so lang als das erste | 2. |
| | | das dritte Beinpaar nicht halb so lang | |
| | | als das erste | 3. |
| 2. | { | der Sporn der Tasterdecke so lang als | |
| | | das vierte Glied der Taster | Cheir. nutrix. |
| | | der Sporn der Tasterdecke kürzer als | |
| | | das vierte Glied der Taster | Cheir. Mildei. |
| 3. | { | die Mandibeln innen an der Basis mit | |
| | | einem Zahne | 4. |
| | | die Mandibeln innen an der Basis ohne | |
| | | Zahn | Cheir. carnifex. |
| 4. | { | Am Klauenfalze der Mandibeln zwei | |
| | | grössere Zähne | Cheir. Seidlitzii. |
| | | Am Klauenfalze der Mandibeln eine | |
| | | Reihe kleiner, gleich grosser Zähne . | Cheir. pelasgicum. |

Cheiracanthium Nutrix Walck.

Aranea nutrix Walck. F. par. II. p. 220. *Clubiona Nutrix* Walck. Apt. I. p. 601. *Clubiona virescens* Sund. in Svenska Spindlarnes Beskrifning in kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar. 1832. p. 267.

Drassus maxillosus Wider Mus. Senckenb. I. p. 209. T. XIV. f. 8.
(gehört wenigstens nach der Stellung der Augen der vordern Reihe sicher hierher).

Cheiracanthium nutrix C. Koch. Die Arachniden VI. p. 9. T. 182. f. 434—435.

Clubiona nutrix Blackwall a history of the spiders of Great Britain and Ireland p. 134. P. VIII. f. 85.

Cheiracanthium Nutrix Westring Aran. suec. p. 378.

Länge: Weibchen: $8\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ mm. Cephalothorax 4—5 mm.

Männchen. 10 mm. Cephalothorax 4 mm.

Femina:

Der Cephalothorax so lang als Patella und Tibia des letzten Beinpaars zusammen, zwischen dem 2. und 3. Beinpaare am breitesten, in den Seiten schwach gerundet, über der Einlenkung des ersten Beinpaars verschmälert, vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem 2. und 3. Beinpaare schräg ansteigend, und von da in starker Wölbung nach vorne niedersinkend; in die Seiten steil abfallend, glänzend, licht mit anliegenden einfachen Haaren, zwischen welchem auf dem Kopftheil abstehende Borsten sich befinden, bedeckt; statt der Mittelritze an der hintern Abdachung ein längliches Grübchen.

Die vordere Augenreihe gerade, in Augenbreite vom Kopfrande entfernt, die Mittelaugen in der Breite ihres Durchmessers von einander, von den Seitenaugen aber in doppelter Breite desselben entfernt. Die hintere Augenreihe breiter, etwas über die vordere gebogen, die Mittelaugen merklich weiter von einander, als die vorderen entfernt, von den vorderen etwas weiter als diese vom Kopfrande, die hinteren Seitenaugen noch weiter seitwärts als die vorderen liegend, von diesen nicht in Augenbreite entfernt. Die Seitenaugen liegen auf einer gemeinschaftlichen Hervorwölbung. Alle Augen rund, die vorderen Mittelaugen am grössten, die anderen kleiner und unter sich gleich gross.

Der Cephalothorax braungelb, jedes Auge in einem schwarzen Ringe; die vorderen Mittelaugen rauchig trüb, die übrigen weiss mit gelblichem Schimmer. Die Behaarung des Cephalothorax gelblichweiss.

Die Mandibeln an der Basalhälfte rothbraun, an der andern Hälfte schwarzbraun, etwas länger als der Tarsus des ersten Beinpaars, an der Basis viel dicker als die Vorderschenkel, vorn an der Basis hervorgewölbt, dann senkrecht abfallend, innen etwas divergirend, im letzten Dritttheil rund ausgeschnitten, am Aussenrande oben mit einem leichten Eindruck; sehr glänzend, in der untern Hälfte mit feinen Querfurchen; spärlich mit feinen Borsten

besetzt; die Krallen sehr kräftig, lang, im ersten Drittheil etwas verdickt.

Die Maxillen über der Basis verschmälert, nach vorn sehr breit, vorn mit gerundetem Aussen- und Vorderrand, innen kurz schräg abgeschnitten, glänzend, sehr gewölbt, mit kurzen und längeren Borsten besetzt, die Lippe von der Basis bis zum Ende des ersten Drittheils ihrer Länge breiter werdend, von da nach vorn beiderseits schräg abgeschnitten, daher vorn schmal, der Vorderrand gerade. Lippe und Maxillen rothbraun, erstere am Vorderrande, diese am Innenabschnitte bräunlichgelb.

Das Sternum gelbbraun, in der Mitte mit einem ovalen bräunlichgelben Flecken, herzförmig, flach, in den Seiten mit deutlichen Eindrücken nach der Insertion der Hüften, glänzend, ziemlich dicht mit langen nach innen gerichteten Haaren besetzt.

Das Abdomen (des trächtigen Weibchens) hochgewölbt, vorn gerundet, im ersten Drittheil am breitesten, nach hinten ziemlich spitz zulaufend, glanzlos, licht mit anliegenden, kurzen, einfachen Haaren und eingestreuten Borsten besetzt.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten gleichlang, jene cylindrisch, diese conisch.

Das Abdomen oben und unten olivenfarben, oben zieht von der Basis beginnend ein vorn und hinten spitz auslaufender rothbrauner Längsstreif nicht ganz bis zur Mitte der Körperlänge, hinter diesem ein, an seinen Seiten verwischtes rothbraunes Längsband bis zu den Spinnwarzen. Die Rückenstigmen rothbraun; zuweilen gehen von dem rothbraunen Längsfleck gleichfarbige Striche zu den Stigmen. — Die Behaarung des Abdomen graugelb.

Die Epigyne rothbraun, eine grosse, vorn runde, nach hinten etwas verschmälerte Oeffnung darstellend; im Hintergrunde derselben befinden sich zwei andere, durch eine Scheidewand getrennte Oeffnungen.

Die Taster dünnghiederig, das zweite Glied hellbräunlich gelb nach Innen gebogen, an beiden Enden etwas verdickt, ohne Stacheln, das zweite und dritte Glied ebenfalls hellbräunlich gelb, jenes sehr kurz, dieses noch einmal so lang, das Endglied rothbraun, gegen die Spitze schwarzbraun, so lang als die beiden vor-

hergehenden, gegen die Spitze etwas verdickt. Die Endkrallen sehr klein, zahnlos, knieartig gebogen.

Die Beine hellbräunlich gelb, die Tarsen dunkler mit schwärzlicher Spitze. Eine eigentliche Scopula ist nicht vorhanden, nur an den Tarsen des letzten Beinpaars sind Spuren davon zu bemerken; sonst sind die Tarsen der übrigen Beine dichter mit kurzen Borstchen besetzt.

Das erste Paar das längste, um seinen Metatarsus länger als das vierte, dieses fast um seine Tibia länger als das zweite, das dritte mehr als halb so lang als das erste. Die Tibia des ersten Paares $2\frac{1}{2}$ mal so lang als die Patella.

Die Bestachelung sehr wechselnd:

I. Beinpaar.

femur ohne Stacheln, dergleichen die Patella.

tibia unten 2 in der Mitte, auch 1. 2. 1. 1., auch ohne Stacheln.

Metatarsus 2 an der Basis unten.

II. Beinpaar.

Femur und Patella ohne Stacheln,

Tibia vorn am Ende 1, auch fehlend,

Metatarsus 2 an der Basis unten.

III. Beinpaar.

Femur und Patella ohne Stacheln,

Tibia vorne und hinten am Ende 1, auch fehlend,

Metatarsus unten 2 an der Basis, 1 am Ende.

IV. Beinpaar.

Femur und Patella ohne Stacheln,

Tibia vorn und hinten 1 am Ende,

Metatarsus unregelmässig bestachelt.

Mas.

Die Männchen sind beträchtlich kleiner, haben aber viel längere Beine. Der Cephalothorax so lang als die Tibia des dritten Beinpaars, der Kopftheil noch stärker gewölbt als beim Weibchen, die Seiten mehr gerundet. Die Augenstellung dieselbe wie beim Weibchen. Die Mandibeln so lang wie der Tarsus des

ersten Beinpaars, vorn nicht hervorgewölbt, vom Kopfrande senkrecht abfallend, am Seitenrand bis zum letzten Drittheil herab etwas geschwungen, im letzten Drittheil nach aussen kugelig aufgetrieben; der äussern Hervortreibung entsprechend, innen rund ausgeschnitten, glänzend, mit dichten feinen Querfurchen, besonders vorn und innen. Die Kralle sehr lang, im ersten Drittheil aufgetrieben. Die Maxillen, Lippe und das Sternum wie beim Weibe.

Das Abdomen vorn abgestutzt, in der Mitte am breitesten, hinten spitz zulaufend. Die Behaarung und die Spinnwarzen wie beim Weibchen.

Das zweite Glied der Taster nach Innen und unten gebogen, gegen das Ende verdickt, ohne Stacheln, mit anliegenden kurzen Härchen, oben mit einzelnen sehr langen aufrechten Borsten. Das dritte Glied kurz, das vierte dreimal so lang als das vorhergehende, am Ende aussen sich in einen innenwärts gebogenen, am Ende abgestutzten, nicht gespaltenen kurzen Fortsatz verlängernd, aussen und unten dicht mit Haaren besetzt, welche fast so lange als das Glied selbst sind.

Die Tasterdecke so lang als das vorhergehende Glied, gewölbt, aus schmaler Basis sich sehr verbreiternd, im letzten Drittheil aber in einen etwas aufwärts gedrückten Schnabel verschmälert, am Aussenrande vor dem Uebergang in das schnabelförmige Ende eine vorstehende Ecke. An der Basis geht von der Tasterdecke über dem Fortsatze des vorhergehenden Gliedes ein feiner, stark gebogener Sporn nach rückwärts, welcher so lang als das vierte Glied ist.

Die eigentlichen Tasterorgane bestehen aus einer flach gewölbten Scheibe, an welcher vorn ein winkliges Stück ausgeschnitten erscheint, von dem Winkel geht ein an seiner Spitze gebogener feiner Fortsatz ab, der bis zum Hinterrande des Schnabels der Tasterdecke reicht. Hinter der Scheibe, vorn und innen beginnend, zieht ein kräftiger Sporn längs der Aussenseite der Scheibe bis zur Basis des Gliedes.

Die Beine sind bedeutend länger als beim Weibe; bei diesem ist das Vorderpaar etwa $3\frac{1}{2}$ mal länger als der Cephalotho-

rax, beim Männchen mehr als sechsmal so lang als der Cephalothorax. Das erste Paar ist das längste, dann das vierte, nach diesem das zweite, das dritte ist mehr als halb so lang als das erste. Die Tibia des ersten Beinpaares $3\frac{1}{2}$ mal so lang als die Patella.

In Farbe und Zeichnung ist das Männchen dem Weibchen fast gleich, nur geht an den Mandibeln die rothbraune Färbung der obern Hälfte allmählig in das Schwarzbraune über, während beim Weibchen beide Farben scharf geschieden sind.

Vorkommen: Durch ganz Europa verbreitet, im hohen Norden wie im tiefen Süden.

In der letzten Hälfte des Mai findet man beide Geschlechter vollkommen entwickelt, Mitte Juni die Weibchen bei den Eiersäcken.

Im Süden Europas (Italien, Frankreich, südliches Russland) kommt ein zu bedeutender Grösse entwickeltes *Cheiracanthium* vor; ich habe ein Exemplar vor mir, dessen Körperlänge 15^{mm}. (Cephalothorax 7^{mm}., Abdomen 8^{mm}.) misst. Siehe Walck. Hist. nat. des Ins. Apt. T. I. p. 601.

Leider ist mir noch kein dahin gehörendes Männchen vorgekommen, bei der grossen Aehnlichkeit aller Weibchen der verschiedenen Arten dieser Gattung muss vorläufig dahingestellt bleiben, ob diese Thiere als Varietät von *Cheir. Nutrix* oder als neue Art zu betrachten sind. Sie unterscheiden sich aber auch noch von den nördlicher vorkommenden darin, dass die Längenverhältnisse der Beinglieder und die Bestachlung der Beine anders sind. (I. und II. Beinpaar. Femur vorn 1. 1.—III. Beinpaar. Femur vorn 1. 1. hinten 1. 1.—IV. Beinpaar. Femur vorn 1. hinten 1.).

***Cheiracanthium Mildei* n. spec.**

Männchen:

Länge: $8\frac{1}{2}$ ^{mm}. Cephalothorax 4 ^{mm}.

Weibchen:

Länge: 10 ^{mm}. Cephalothorax $3\frac{1}{2}$ ^{mm}.

Mas.

Der Cephalothorax so lang als die Tibia des letzten Bein-

paars und fast ebenso breit, vom ersten Beinpaar an in den Seiten und hinten stark gerundet, am Kopftheil vorn sehr schmal; vom Hinterrande kurz steil ansteigend, oben und in den Seiten gewölbt; etwas glänzend, leicht mit kurzen anliegenden Haaren bekleidet; an der Stelle, wo bei den Clubionen die Mittelritze sich findet, nicht an der hintern Abdachung des Cephalothorax, eine lange, schmale Furche; die Seitenfurchen sehr deutlich.

Die vordere Augenreihe gerade, die Mittelaugen dem Kopfrande merklich näher als den Mittelaugen der hintern Reihe, die Seitenaugen nur wenig weiter von den Mittelaugen als diese von einander entfernt. Die hintere Augenreihe breiter, über die vordere gebogen; die Augen dieser Reihe fast in gleicher Entfernung von einander, die Mittelaugen weiter als die vorderen von einander entfernt. Die Seitenaugen auf einer kleinen Erhöhung sitzend, nicht in der Breite ihres Durchmessers von einander entfernt. Die vorderen Mittelaugen am grössten, die übrigen ziemlich gleich gross; die vorderen Seitenaugen oval, die anderen rund.

Der Cephalothorax blassbräunlichgelb, mit dunkleren Seitenfurchen, jedes Auge in einem schwarzen Ringe. Die vorderen Mittelaugen trübe, die übrigen hellbernsteingelb.

Die Mandibeln braungelb, an der Spitze schwarzbraun, nicht länger als die Patellen des ersten Beinpaars, nicht dicker als die Vorderschenkel, vorn nicht hervorgewölbt, daher senkrecht vom Kopfrande abfallend, in den Aussenseiten gerade, innen vor der Spitze kurz schräg abgeschnitten, glänzend, vorn von der Basis bis zur Spitze mit sehr feinen Querfurchen, mit auf Knötchen sitzenden Borstchen spärlich besetzt. Die Krallen kurz.

Die Maxillen über der Basis etwas verengt, am Aussenrande buchtig ausgeschnitten, am Aussenwinkel und am Vorderrande gerundet, innen kaum bemerkbar abgeschnitten. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als der Cephalothorax, aus breiter Basis nach vorn verschmälert, der Vorderrand gerade. Lippe und Maxillen graugelb.

Das Sternum blassbräunlichgelb, mit schmalem schwarzbraunem Randsaume, herzförmig, sehr glänzend, mit nach innen gerichteten Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen vorn abgestutzt, ziemlich gleich breit, in der

Mitte nur wenig breiter, hinten gerundet, glanzlos, mit anliegenden kurzen Haaren und abstehenden Borstchen nicht sehr dicht besetzt.

Sechs Spinnwarzen, die obersten cylindrisch, die untersten conisch. Das Abdomen heller oder dunkler braungelb, die Behaarung grauweiss. Die Spinnwarzen bräunlichgelb.

Das zweite Glied der Taster nach innen gebogen, gleich dick, ohne Stacheln, das vierte kaum noch einmal so lang als das dritte, aussen und unten mit langen abstehenden Borsten, am vordern Ende oben ein aufrechter, an der Spitze hackenförmiger, aussen ein nach innen gebogener Fortsatz.

Die Tasterdecke länger als die beiden vorhergehenden Glieder, gewölbt, im letzten Dritttheil in einen etwas nach innen gekrümmten, mit der Spitze abwärts gedrückten Schnabel verlängert, an dem Aussenrande, wo der Schnabel beginnt, eine vorspringende Ecke. An der Basis aussen ist die Tasterdecke in einen kurzen, kräftigen, zwischen den zwei Fortsätzen des vierten Gliedes sich bewegenden Sporn verlängert. Dieser Sporn ist kaum halb so lang als das vierte Glied.

Die eigentlichen Tasterorgane sind wie bei den übrigen Arten dieser Gattung gebildet, nur ist bei dieser Art statt des mittleren, an der Spitze hackenförmig gebogenen Fortsatzes ein nach vorn breiter werdender, am Vorderrande rund ausgeschnittener Anhang.

Das 2., 3. und 4. Glied der Taster weisslichgelb, die Tasterdecke gelbbraun, die Fortsätze schwarzbraun.

Die Beine blassbräunlichgelb, die Spitzen der Tarsen schwarz.

Das vierte Beinpaar um seine Tibia kürzer als das erste, dieses $5\frac{1}{2}$ mal so lang als der Cephalothorax, um seine Tibia länger als das zweite Beinpaar, nicht noch einmal so lang als das vierte. Die Tibia des ersten Beinpaars $4\frac{1}{2}$ mal so lang als die Patella. Das dritte Beinpaar mehr als $\frac{1}{2}$ mal so lang als das erste.

Bestachelung:

I. Beinpaar:

Femur vorn 1. 1., hinten 1. 1.,

Tibia unten 1. 1. 1. 1., vorn 1. 1. 1. 1.,

Metatarsus unten 2 an der Basis, 1 in der Mitte, 1 am
Ende,

II. Beinpaar:

Femur vorn 1. 1., hinten 1. 1.,

Tibia unten 1. 2., vorn 1. 1.,

Metatarsus unten 2 an der Basis.

III. Beinpaar:

Femur vorn 1. 1., hinten 1. 1.,

Tibia vorn 1. 1., hinten 1. 1.

IV. Beinpaar:

Femur vorn 1. 1., hinten 1. 1.,

Tibia unten 2 an der Basis, vorn 1. 1., hinten 1. 1.

Femina:

Ich bezweifle zwar, dass das nachfolgend beschriebene Weibchen hieher gehört, indem sowohl die Gestalt des Cephalothorax, als die Bestachlung der Beine von jener des Männchens sehr abweicht. Doch erhielt ich dieses Weibchen gleichzeitig mit dem Männchen durch Herrn Dr. J. Milde aus Meran, und muss es um so mehr für möglich halten, dass beide zusammengehören, weil auch bei den übrigen Arten dieser Gattung zwischen Männchen und Weibchen so wesentliche Verschiedenheiten beobachtet werden.

Der Cephalothorax so lang als die Tibia des letzten Beinpaars, vom ersten Beinpaar an in den Seiten gerundet, vorn breiter als beim Männchen; vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem zweiten Beinpaare allmählig ansteigend, oben gewölbt, gegen die Augen rasch niedergesenkt, am Kopftheil in den Seiten gewölbt, glänzend, mit anliegenden Härchen leicht bedeckt.

Die vordere Augenreihe gerade, die Mittelaugen näher am Kopfrande als den hintern Mittelaugen, einander deutlich näher als den Seitenaugen. Die hintere Augenreihe gerade, über die vordere gebogen, die Mittelaugen viel weiter von einander entfernt als die vordern, von den seitlichen etwas weiter als von einander entfernt. Die Seitenaugen auf einer niedern Erhöhung

sitzend, nicht in der Breite ihres Durchmessers von einander entfernt.

Die vordern Mittelaugen am grössten, die übrigen gleich gross. Die vordern Seitenaugen oval, die übrigen rund.

Der Brustschild des Cephalothorax dunkelgraubraun, der Kopftheil braungelb, die Behaarung grauweiss, um jedes Auge ein schwarzer Ring; die vordern Mittelaugen rauchig trüb, die übrigen dunkelbernsteinfarben.

Die Mandibeln gelbbraun, an der unteren Hälfte allmählig ins Schwarzbraune übergehend, so lang als die Patellen des ersten Beinpaars, dicker als die Vorderschenkel, vorn und an der Aussenseite von der Basis bis zur Mitte der Länge etwas gewölbt, innen vor der Spitze rundlich ausgeschnitten; sehr glänzend, innen mit weitschichtigen feinen Querfurchen; mit auf Knötchen sitzenden Borsten ziemlich reichlich besetzt. Die Krallen kräftig und lang.

Maxillen und Lippe wie beim Manne.

Das Sternum graugelb, in den Seiten ins Schwärzliche übergehend, herzförmig, etwas gewölbt, in den Seiten mit deutlichen Eindrücken nach der Insertion der Hüften, sehr glänzend, licht mit nach der Mitte gerichteten Haaren besetzt.

Das Abdomen oben hochgewölbt, vor der Mitte am breitesten, hinten spitz zulaufend, etwas mattglänzend; so weit es sich erkennen lässt, licht mit kurzen einfachen Haaren und elngestreuten Borsten bekleidet.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten gleich lang, jene cylindrisch, diese conisch.

Die Grundfarbe des Abdomen graubraun, mit zahlreichen gelblichen Punktflecken gemischt, oben von der Basis bis zur Mitte ein hinten spitz auslaufender, heller gesäumter Längsfleck. Die Spinnwarzen bräunlichgelb.

Die Epigyne von jener der übrigen Arten dieser Gattung verschieden gebildet; in der stark hervorgewölbten schwarzbraunen Area befindet sich etwas vor deren Mitte ein tiefer Quereindruck.

Das zweite Glied der Taster nach innen gebogen, oben ohne Stacheln, das vierte noch einmal so lang als das dritte, das

fünfte so lang als die beiden vorhergehenden zusammen, gegen das Ende verdickt. Das 2., 3. und 4. Glied weisslich gelb, das Endglied graubraun. Die Hüften und die Grundhälfte der Schenkel dunkelgraubraun, die andere Hälfte der Schenkel, sowie die übrigen Beinglieder hellbräunlich gelb; die Spitzen der Tarsen schwarz.

Das erste Beinpaar $4\frac{1}{2}$ mal so lang als der Cephalothorax, um seinen Tarsus länger als das 4., um seinen Metatarsus länger als das 2., bei weitem nicht noch einmal so lang als das dritte, sondern nur um seinen Metatarsus und Tarsus länger als dieses. Die Tibia des ersten Beinpaars dreimal so lang als die Patella.

Bestachelung:

I. Beinpaar:

Femur vorn 1,
Tibia unten 2 in der Mitte,
Metatarsus unten 2 an der Basis.

II. Beinpaar:

Femur vorn 1,
Tibia ohne Stacheln,
Metatarsus 2 an der Basis.

III. Beinpaar:

Femur vorn 1, hinten 1,
Tibia vorn 1, hinten 1,

IV. Beinpaar:

Femur hinten 1,
Tibia vorn 1, hinten 1.

Vorkommen: im südlichen Tirol (Meran), in Dalmatien (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling).

***Cheiracanthium carnifex*. Fabr.**

Aranea carnifex Fabr. Ent. Syst. II. p. 420. nr. 49.

Aranea erratica Walck. Fn. par. II. p. 219. nr. 64.

Clubiona erratica Walck. Tabl. d. aran. 43. 8.

Clubiona erratica Walck. Apt. I. p. 602. nr. 13.?

Clubiona dumetorum Hahn. Monogr. fasc. 7. T. 1. f. 6.

Cheir. Carnifex Koch, die Arachn. Bd. VI. T. 184. f. 438 u. 439.

Bolyphantes equestris Koch. Uebers. d. Ar. Syst. Heft 1. p. 9.

Clubiona erratica Blackw. Linn. Trans. vol. XIX. p. 115.

Clubiona erratica Blackw. Ann. and Mag. of N. Hist. second series vol. VIII. p. 96.

Clubiona erratica Blackw. a hist. of the spiders of Great. Brit. and Irel. p. 135.

Männchen: Länge 5^{mm}, Cephalothorax 2^{mm}.

Weibchen: Länge 10^{mm}, Cephalothorax 3¹/₄^{mm}.

Mas.

Der Cephalothorax so lang als die Tibia des letzten Beinpaars, am breitesten zwischen dem 2. und 3. Beinpaare, in den Seiten bis über der Insertion des ersten Beinpaars gerundet, vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem dritten Beinpaare steil ansteigend, oben gerade und erst in der Linie zwischen dem ersten Beinpaar zu den Augen niedergewölbt, in die Seiten mässig steil abfallend, glänzend, licht mit anliegenden feinen Haaren bedeckt. Keine Mittelritze, dagegen ein breiter Eindruck an der hintern Abdachung des Cephalothorax.

Die vordere Augenreihe gerade, die Augen in gleicher Entfernung von einander, vom Kopfrande weniger als von den Mittelaugen entfernt; die hintere Augenreihe breiter als die vordere, schwach über diese gebogen, die Mittelaugen etwas weiter von einander entfernt als die vorderen, von den Seitenaugen nur wenig weiter als von einander entfernt; die Seitenaugen nicht in der Breite ihres Durchmessers von einander entfernt. Alle Augen rund, die vordern Mittelaugen die grössten, die übrigen unter sich ziemlich gleich gross.

Der Cephalothorax gelbbraun, mit schmaler weisser Einfassung der Seiten, die Behaarung weiss. Jedes Auge in einem schwarzen Ringe, die vordern Mittelaugen rauchig trübe, die übrigen gelblichweiss.

Die Mandibeln kürzer als der Tarsus des ersten Beinpaars, länger als die Patellen desselben, dicker als die Vorderschenkel, gelbbraun, im letzten Dritttheil schwarzbraun, vorn bis zur Hälfte der Länge hervorgewölbt, etwas vorwärts gerichtet, am Aussenrande etwas geschwungen, innen von der Basis an divergirend;

von der Spitze bis zur Hälfte der Länge herauf bogig abgeschnitten, glänzend, innen und vorn mit schwachen Querfurchen, mit zerstreuten auf Knötchen sitzenden Borstchen. Die Kralle lang, im ersten Dritttheil etwas verdickt, die Ränder des Klauenfalzes ohne Zähne.

Die Maxillen über der Basis schmaler, vorn breiter werdend, am Aussenwinkel und Vorderrande gerundet, innen kurz schräg abgeschnitten, mit feinen Borsten reichlich besetzt. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Mandibeln, von der Basis bis zum Ende des ersten Drittteils der Länge breiter werdend, von da an nach vorn wieder verschmälert, der Vorderrand gerade. Die Maxillen hellgelbbraun, der Vorderrand und der Aussenrand schwarz gesäumt, der Innenabschnitt gelblichweiss; die Lippe dunkelgelbbraun mit gelblichweissem Vorderrande.

Das Sternum herzförmig, hinten spitz, bräunlichgelb, dunkelbraun gesäumt, etwas gewölbt, mit schwachen Eindrücken nach der Insertion der Hüften, mit feinen, nach der Mitte gerichteten Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen vorn abgestutzt, etwas vor der Mitte am breitesten, nach hinten verschmälert; mattglänzend, mit kurzen anliegenden einfachen Haaren und eingestreuten Borstchen leicht bekleidet.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten gleich lang, jene cylindrisch, diese conisch.

Das Abdomen braungelb, mit einem leichten grünlichen Anfluge, von der Basis bis zu den Spinnwarzen zieht ein nach hinten breiteres, aussen weiss gesäumtes Band; die Unterseite braungelb mit zwei weissen Längsstreifen.

Das zweite Glied der Taster nach innen gebogen, seitlich zusammengedrückt, nach vorn etwas verdickt, ohne Stacheln, das vierte Glied nur noch einmal so lang als das dritte, innen, aussen und unten mit langen abstehenden Haaren besetzt, am vordern Ende aussen in einen nach innen gebogenen, kurzen, an der Spitze gespaltenen Fortsatz verlängert.

Die Tasterdecke so lang als die beiden vorhergehenden Glieder zusammen, gewölbt, von der Basis bis zum letzten Dritttheil

der Länge breit, dort in einen abwärts gedrückten Schnabel übergehend, der Aussenrand am Beginne des Schnabels mit einer vorspringenden Ecke. Von der Basis der Tasterdecke geht an der Aussenseite ein gebogener Sporn nach rückwärts, der jedoch merklich kürzer als das vierte Tasterglied ist.

Die Bildung der eigentlichen Organe der Taster ist von jener bei *Cheiracanthium Nutrix* nicht verschieden, doch in allen Theilen kleiner und zierlicher.

Die Beine schmutzig hellgrün, die Hüften, die Wurzel der Schenkel und übrigen Glieder, sowie die Patellen gelb. Keine Scopula.

Das erste Paar das längste, siebenmal so lang als der Cephalothorax, mehr als noch einmal so lang als das dritte, um seine Tibia länger als das vierte, letzteres um seinen Tarsus länger als das zweite. Die Tibia des ersten Beinpaars viermal so lang als die Patella.

Bestachelung:

I. Beinpaar:

Femur vorn 1 Stachel,
Tibia 2 oder 1 unten in der Mitte,
Metatarsus unten 2 an der Basis.

II. Beinpaar:

Femur
Patella } ohne Stacheln,
Tibia }
Metatarsus unten 2 an der Basis, 1 am Ende.

III. Beinpaar:

Femur
Patella } ohne Stacheln,
Tibia vorn und hinten am Ende 1.

IV. Beinpaar:

Femur
Patella } ohne Stacheln,
Tibia hinten 1 am Ende.

Femina:

Der Cephalothorax so lang als Patella und Tibia des letzten Beinpaars zusammen, am breitesten zwischen dem 2. und 3. Beinpaare, in den Seiten von der Insertion des ersten Beinpaars an gerundet, vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem zweiten Beinpaare schräg ansteigend, dann aber nach starker Wölbung rasch gegen die Augen abfallend; glänzend, leicht mit anliegenden feinen Haaren bedeckt. An der hintern Abdachung ein länglicher Eindruck. Die Augenstellung wie beim Manne,

Der Cephalothorax gelbbraun, an der hintern Abdachung ein grosser schwarzbrauner Flecken, welcher an den Seiten und am Hinterrande nur eine schmale Einfassung der Grundfarbe übrig lässt. Dieser Fleck verlängert sich beiderseits nach vorn bis zu den hintern Seitenaugen, in der Mittellinie als schmaler Streifen bis zu den hintern Mittelaugen. Die Behaarung des Abdomen grauweiss. Die Mandibeln so lang als der Tarsus des ersten Beinpaars, dicker als die Vorderschenkel, vorn an der Basis etwas hervorgewölbt, auch in den Aussenseiten etwas gewölbt, innen von der Basis an divergirend, über der Spitze rund ausgeschnitten, sehr glänzend, vorn und innen mit feinen Querfalten, vorn mit zerstreuten, auf Knötchen sitzenden dünnen Borsten. Die Krallen lang, gleich über der Basis stark nach innen gebogen, beide Ränder des Klauenfalzes ungezahnt. Die Mandibeln rothbraun, die untere Hälfte und zwei Längsstriche an den Aussenseiten schwarzbraun.

Das Abdomen (des trächtigen Weibchens) oben hochgewölbt, vorn gerundet, in der Mitte am breitesten, hinten spitz zulaufend.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten gleich lang, jene cylindrisch, diese conisch.

Das Abdomen oben und unten olivenfarbig, oben in der Mittellinie ein von der Basis bis zu den Spinnwarzen durchlaufendes, hinten breiteres Längsband, rothbraun, beiderseits weisslich gesäumt. Die Spinnwarzen braungelb.

Die Area der Epigyne sehr gewölbt, schwarz, vorn mit ei-

nem winkligen Ausschnitt. Die Oeffnung klein, vorn, aussen und innen mit einer buchtigen Erweiterung.

Das zweite Glied der Taster nach innen und etwas nach unten gebogen, oben ohne Stacheln, aber mit einzelnen starken Borsten. Das vierte Glied etwa noch einmal so lang als das dritte, das fünfte gegen das Ende verdickt, so lang als die beiden vorhergehenden zusammen.

Das 2., 3. und 4. Glied hellbräunlichgelb, das 5. zur Hälfte ebenso, die andere Hälfte nach der Spitze zu schwarzbraun, die Beine hellbräunlichgelb mit schwarzer Spitze der Tarsen. Keine Scapula. Der Längenunterschied der Beine zwischen Männchen und Weibchen nicht so bedeutend, wie bei *Cheiracanthium nutrix*. Das 1. Paar über noch einmal so lang als das dritte, um seinen Metatarsus länger als das vierte, um Tibia und Patella länger als das zweite. Die Tibia des ersten Beinpaars dreimal so lang als die Patella.

Vorkommen: Diese Art scheint im südlichen Europa zu fehlen, dagegen im nördlichen ebenso verbreitet zu sein, als *Cheiracanthium nutrix*. In hiesiger Gegend ist sie sogar gemeiner als dieses.

***Cheiracanthium Seidlitzii* n. spec.**

Diese Art ist dem *Cheir. pelagicum* C. Koch sehr ähnlich, unterscheidet sich aber sehr leicht von diesem darin, dass an dem hintern Rande des Klauenfalzes der Mandibeln zwei grössere Zähne vorhanden sind, während bei *Cheir. pelagicum* eine Reihe kleiner Zähnchen bemerkt wird.

Männchen: Länge: $10\frac{1}{2}$ mm., Cephalothorax 5 mm.

Weibchen: Länge: $9\frac{1}{2}$ mm., Cephalothorax $3\frac{1}{2}$ mm.

Mas.

Der Cephalothorax etwas kürzer als Patella und Tibia des letzten Beinpaars zusammen, am breitesten in der Linie zwischen dem zweiten Beinpaare, in den Seiten vom ersten Beinpaar an schwach gerundet, nach hinten mehr als nach vorn verschmälert, vom Hinterrande sanft bis in die Linie zwischen dem 2. Beinpaare ansteigend, von da nach schwacher Wölbung gegen die Au-

gen abfallend; der Kopftheil in den Seiten gewölbt. Keine Mittelritze, dafür ein schwacher Eindruck an der hintern Abdachung des Cephalothorax. Die Fläche glänzend, leicht mit anliegenden Haaren bedeckt.

Die vordere Augenreihe gerade, die Mittelaugen einander merklich näher als den seitlichen; vom Kopfrande weniger als von den hintern Mittelaugen entfernt. Die hintere Augenreihe breiter, schwach über die vordere gebogen, die mittleren weiter von einander entfernt als die vorderen Mittelaugen, die seitlichen nur wenig weiter von den Mittelaugen als diese von einander entfernt. Die Seitenaugen in ihrem Durchmesser von einander entfernt. Die beiden vordern Mittelaugen, sowie die Seitenaugen je auf einem niedern Hügelchen. Alle Augen rund, die vordern Mittelaugen am grössten, die übrigen gleich gross.

Der Cephalothorax gelbbraun, der Kopftheil oben heller; die Behaarung grauweiss. Jedes Auge in einem schwarzen Ringe. Die Mandibeln gelbbraun, an der Spitze schwarzbraun, um $\frac{1}{3}$ länger als der Tarsus des ersten Beinpaars, bedeutend dicker als die Vorderschenkel, von der Basis an sehr stark divergirend, an der Innenseite dicht über der Basis mit einem derben nach innen gerichteten spitzen Zahne, glänzend, mit feinen Querfurchen, vorn, besonders gegen die Spitze zu mit Borsten besetzt.

Die Kralle fast so lang als die Mandibeln, sensenförmig, fast $\frac{2}{3}$ der Länge schwarz, erst im letzten Dritttheil durchscheinend rothbraun. Am hintern Rande des Klauenfalzes zwei etwas entfernt stehende grössere Zähne; neben dem oberen dieser beiden mehrere kleinere Zähnen.

Die Maxillen über der Basis etwas eingezogen, vorn breiter werdend, am Anssenwinkel und am Vorderrande gerundet, innen kurz schräg abgeschnitten, mit zahlreichen kräftigen Borsten besetzt; am Innenrande längs der Lippe mit einem scharfen Kiele: die Lippe $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, gewölbt, aus breiter Basis nach vorn verschmälert, am Vorderrande ausgeschnitten. Lippe und Maxillen gelbbraun.

Das Sternum bräunlichgelb, mit schwarzbraunem schmalem Randsaume, länglich herzförmig, glänzend, in den Seiten mit

deutlichen Eindrücken hinter der Insertion der Hüften, ziemlich dicht behaart, die Haare nach der Mitte gerichtet.

Das Abdomen vorn abgestutzt, vor der Mitte am breitesten, nach hinten sehr verschmälert, mattglänzend, licht mit anliegenden feinen Haaren und eingestreuten abstehenden Borsten besetzt.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten fast gleichlang, jene cylindrisch, diese conisch.

Das Abdomen oben und unten olivenfarbig, oben von der Basis bis zu den Spinnwarzen ein hinten breiter werdendes rothbraunes, neben diesem auf jeder Seite ein gelbes Band. An der Unterseite des Abdomen zwei gelbe Längsstreifen. Die Spinnwarzen gelblich.

Das zweite Glied der Taster nach Innen und Unten gekrümmt, oben im letzten Dritttheil ein Stachel. Das vierte Glied mehr als doppelt so lang als das dritte, oben, aussen und unten mit langen abstehenden Haaren besetzt, vorn und aussen mit einem nach innen gebogenen, an der Spitze gespaltenen kurzen Fortsatz. Die Tasterdecke so lang als die beiden vorhergehenden Glieder zusammen, etwas gewölbt, im letzten Dritttheil zu einem Schnabel verschmälert, dessen Spitze nach abwärts gedrückt ist, am Aussenrande, wo der Schnabel beginnt, eine stumpfe Ecke. Hinten verlängert sich die Tasterdecke in der Aussenseite, in einen sehr feinen Sporn, der so lang als das vierte Tasterglied ist. Die eigentlichen Tasterorgane sind wie bei den übrigen Arten dieser Gattung gebildet.

Die Beine grünlich hellgelb mit schwarzen Spitzen der Tarsen. Keine Scopula.

Das erste Paar um seinen Metatarsus länger als das vierte; dieses um die doppelte Länge seines Tarsus länger als das zweite, das dritte nicht halb so lang als das erste. Die Tibia des ersten Beinpaars $3\frac{1}{2}$ mal so lang als die Patella.

Bestachelung:

I. Beinpaar:

Femur vorn 1,

Tibia unten in der Mitte 1, vorn in der Mitte 1,

Metatarsus unten 2 an der Basis.

II. Beinpaar:

Femur vorn 1,

Tibia ohne Stacheln,

Metatarsus unten 2 an der Basis.

III. Beinpaar:

Femur vorn 1., hinten 1.,

Tibia vorn 1., hinten 1.

IV. Beinpaar:

Femur vorn 1., hinten 1.,

Tibia vorn 1., hinten 1.

Femina:

Der Cephalothorax so lang als Tibia und Patella des letzten Beinpaars zusammen, vom ersten Beinpaare an in den Seiten gerundet, am breitesten zwischen dem 2. und 3., vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem 1. und 2. Beinpaare sanft ansteigend, von da an gegen die Augen abfallend, der Kopftheil in den Seiten etwas gewölbt. Statt der Mittelritze ein leichter Eindruck an der hintern Abdachung des Cephalothorax. Die Fläche sehr glänzend, leicht mit anliegenden Haaren bedeckt. Die Augenstellung wie beim Manne.

Der Cephalothorax braungelb, die Behaarung weiss.

Die Mandibeln so lang als die Tarsen des ersten Beinpaars, viel dicker als die Vorderschenkel; gelbbraun, an der Spitze mehr ins Rothbraune übergehend; von der Basis an vorn und in den Aussenseiten etwas hervorgewölbt, sehr glänzend, in der untern Hälfte vorn und innen mit feinen Querfurchen, spärlich mit kurzen dünnen Borsten besetzt. Die Krallen lang, gleich über der Basis einwärts gebogen.

Maxillen und Lippe, sowie das Sternum wie beim Manne. Das Abdomen von der Basis an oben hochgewölbt. Die Zeichnung und Farbe wie beim Manne.

Die Epigyne in ihrer Bildung nicht von jener bei *Cheiracanthium carnifex* verschieden.

Das zweite Glied der Taster stark nach innen gebogen, oben ohne Stacheln, aber mit einzelnen aufrechten Borsten; das vierte

Glied zweimal so lang als das dritte, das Endglied so lang als die beiden vorhergehenden zusammen, gegen die Spitze verdickt. Die ganzen Taster weisslichgelb, die Endhälfte des fünften Gliedes dunkelbraun.

Die Beine bräunlichgelb, die Spitzen der Tarsen schwarz.

Das erste Paar mehr als noch einmal so lang als das dritte, um seinen Metatarsus länger als das vierte, das zweite um seinen Metatarsus länger als das dritte. Die Tibia des ersten Beinpaars $3\frac{1}{2}$ mal so lang als die Patella.

Vaterland: Italien (Umgegend von Rom), durch Herrn Dr. Seidlitz mir gefälligst mitgetheilt.

Eine constante Varietät erhielt ich durch Herrn Dr. J. Milde aus Meran. Diese ist viel kleiner (Länge 8^{mm}) und in der Farbe und Zeichnung von den südlicher vorkommenden Thieren sehr verschieden. Der Cephalothorax heller gefärbt, keine Nuancirung in der Farbe zwischen Kopf und Brusttheil bemerkbar. Das Sternum ebenfalls viel heller, der dunkle Randsaum sehr schmal. Das Abdomen unten und in den Seiten olivenfarben, oben zwei breite Bänder von der Basis bis zu den Spinnwarzen gelb, zwischen beiden ein Längsstreif der Grundfarbe.

Cheiracanthium pelagicum C. Koch.

C. Koch. Die Arachniden. B. VI. p. 12. Tab. CLXXXIII. p. 436—437.

Länge: Männchen 8^{mm}, Cephalothorax $3\frac{1}{2}$ ^{mm}.

Weibchen 9^{mm}, Cephalothorax 3^{mm}.

Ich besitze von Cheir. pelagicum nur einige in ihrer Färbung sehr veränderte Exemplare, welche jedoch die Originale zu Kochs Beschreibung sind, und dieser musste ich daher bezüglich der Farbe und Zeichnung das Nöthige entnehmen.

Mas.

Der Cephalothorax so lang als Patella und Tibia des letzten Beinpaars zusammen, am breitesten zwischen dem 2. und 3. Beinpaare, über dem ersten Beinpaare beginnend in den Seiten gerundet, vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem zweiten

Beinpaare allmählig ansteigend, oben gewölbt, gegen die Augen rasch abfallend, der Kopftheil in den Seiten etwas gewölbt, sehr hoch. An der hintern Abdachung des Cephalothorax ein schwacher Eindruck. Die Fläche sehr glänzend, leicht mit anliegenden Härchen bedeckt.

Die Augen der vordern Reihe in gerader Linie, die mittleren einander näher als den seitlichen, in gleicher Entfernung vom Kopfrande wie von den hintern Mittelaugen; die hintere Reihe etwas breiter und leicht über die vordere gebogen, die Mittelaugen etwas weiter von einander entfernt als von den vordern. Die Seitenaugen auf einem Hügelchen gemeinschaftlich sitzend, nicht in Augenbreite von einander entfernt. Alle Augen rund; die vorderen Mittelaugen sind die grössten, die vordern Seiten- und hintern Mittelaugen etwas kleiner, die hintern Seitenaugen am kleinsten.

Die Mandibeln um $\frac{1}{3}$ länger als die Tarsen des ersten Beinpaars, dicker als die Vorderschenkel, an der Aussenseite bis zur Hälfte der Länge herab etwas gewölbt, innen an der Basis mit zwei stumpfen zahnartigen, einwärts gerichteten Höckern, sehr stark divergirend, von der Spitze bis zu den Höckern bogig ausgeschnitten, sehr glänzend, an der Innenseite mit sehr feinen Querschnitten, vorn mit auf Knötchen sitzenden Borsten. Die Krallen sehr lang, sensenförmig, der hintere Rand des Klauenfalzes mit einer Reihe von 7—8 gleich langen kurzen Zähnen besetzt.

Die Maxillen aussen buchtig, am Vorderwinkel und Vorderande gerundet, innen breit schräg abgeschnitten, längs der Lippe innen mit einer vorspringenden Leiste; die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, nach vorn verschmälert, mit geradem Vorderande.

Das Sternum länglich herzförmig, glänzend, in den Seiten mit schwachen Eindrücken, reichlich mit nach der Mitte gerichteten Haaren besetzt.

Das Abdomen vorn abgestutzt, im letzten Drittheil am breitesten, hinten gerundet, leicht mit anliegenden kurzen und abstehenden langen Borsten bekleidet.

Sechs Spinnwarzen, die obersten und untersten gleich lang, jene cylindrisch, diese conisch.

Das zweite Glied der Taster nach innen und unten gekrümmt, oben zu Anfang des letzten Dritttheils mit einem kräftigen Stachel, das vierte Glied kaum um $\frac{1}{3}$ länger als das dritte, am vordern Ende aussen in einen kurzen, stark gekrümmten, an der Spitze gespaltenen Fortsatz verlängert; die Tasterdecke so lang als die beiden vorhergehenden Glieder zusammen, wenig gewölbt, breit, im letzten Dritttheil in einen schmalen Schnabel mit abwärts gedrückter Spitze übergehend; am Aussenrande, wo der Schnabel beginnt, eine stumpfe Ecke.

Die Tasterdecke hinten an der Aussenseite mit einem nach rückwärts gerichteten, stark gekrümmten Sporn, der zwar von der Länge des vierten Gliedes ist, aber bei der Kürze des letztern viel kürzer als bei *Cheiracanthium carnifex*, *Nutrix* und *Seidlitzii* erscheint.

Die eigentlichen Tasterorgane wie bei den übrigen Arten dieser Gattung.

Das erste Beinpaar fünfmal so lang als der Cephalothorax, um seinen Metatarsus länger als das vierte, um seine Tibia und Patella zusammen länger als das zweite, mehr als noch einmal so lang als das vierte. Die Tibia des ersten Beinpaars dreimal so lang als die Patella.

Bestachelung:

I. Beinpaar:

Femur ohne Stacheln,

Tibia vorn 1.,

Metatarsus unten 1 an der Basis, 1 am Ende

II. Beinpaar:

Femur vorn 1.,

Tibia vorn 1.,

Metatarsus unten 2 an der Basis, 1 am Ende, vorn 1
in der Mitte.

III. Beinpaar:

Femur hinten 1.,

Tibia vorn 1 am Ende, hinten 1 am Ende.

IV. Beinpaar:

Femur hinten 1.,

Tibia vorn 1, hinten 1.

Femina:

Der Cephalothorax so lang als Patella und Tibia zusammen, am breitesten zwischen dem 2. und 3. Beinpaare, in den Seiten vom ersten Beinpaare an gerundet, vom Hinterrande steiler ansteigend als beim Männchen, am Kopftheile sehr stark gewölbt; an der hintern Abdachung mit einem leichten Eindruck; sehr glänzend, leicht mit kurzen anliegenden Haaren bekleidet. Die Augenstellung wie beim Manne.

Die Mandibeln so lang als der Tarsus des ersten Beinpaars, dicker als die Vorderschenkel, etwas vorwärts gerichtet, von der Basis an bis zur Mitte der Länge herab vorn und an der Aussenseite etwas hervorgewölbt, an der Innenseite schwach divergierend, über der Spitze innen rund ausgeschnitten, sehr glänzend, vorn und innen mit feinen Querfurchen. Die Klaue kräftig, von mässiger Länge; an den Rändern des Falzes keine Zähne.

Lippe, Maxillen und Sternum wie beim Manne.

Das Abdomen oben sehr gewölbt, vorn gerundet, in der Mitte am breitesten, hinten etwas spitz zulaufend. Junges Weibchen, daher die Epigyne noch nicht entwickelt.

Das zweite Glied der Taster nach innen gebogen, oben ohne Stacheln, nur an der Spitze eine lange, starke Borste; das vierte Glied höchstens $1\frac{1}{2}$ mal so lang als das dritte, das fünfte so lang als die beiden vorhergehenden zusammen, etwas gekrümmt, gegen das Ende leicht verdickt.

Das erste Beinpaar $3\frac{1}{2}$ mal so lang als der Cephalothorax, um seinen Metatarsus länger als das vierte, um seine Patella mit Tibia länger als das zweite, nicht noch einmal so lang als das dritte. Die Tibia des ersten Beinpaars dreimal so lang als die Patella.

Es ist sehr zu bezweifeln, ob das von C. Koch zu dieser Art gezogene Weibchen wirklich hierher gehört, indem das dritte Beinpaar länger als die Hälfte des ersten ist; bei allen andern

Cheiracanthien sind nämlich die Längenverhältnisse der Beine in beiden Geschlechtern gleich.

Farbe und Zeichnung nach C. Koch. l. c. p. 12.

Fem.:

Kopf und Brustrücken rostgelb, letzterer an den Seitenkanten hin verloren heller; auf dem Kopfe ein Längsstreif, die Seiten des Kopfes und auf dem Thorax strahlige Querstriche braun, der Längsstreif auf dem Kopfe der Länge nach durch eine sehr feine hellere Linie getheilt; auch die Fläche zwischen den Augen bräunlich. Die Brust olivengelb, am Rande ins Bräunliche vertrieben. Die Fresszangen dunkelrothbraun, an der Spitze verloren schwarz; der Nagel roth. Der Hinterleib olivenbraun, auf dem Rücken ins Olivengelbe vertrieben, vorn am spindelförmigen Längsfleck dunkelbraun, etwas aufs Röthliche ziehend, bis zur Hälfte des Hinterleibs reichend, zuweilen als eine schmale Linie oder als Fleckchen bis zu den Spinnwarzen fortsetzend; der Bauch olivengelb mit einem olivenbraunen Längsstreif. Die Beine hell olivengelb oder hell ockergelb, die Tarsen an der Spitze schwärzlich. Bei dem einzigen Männchen, das ich vor mir habe, ist die braune Zeichnung des Vorderleibes viel schwächer als beim Weibe; der Hinterleib zieht sich an den Seiten aufs Braunrothe, doch mit olivenfarbigem Anstrich; der spindelförmige Rückenleck ist breiter und dessen Umgebung hellgelb; auf der Hinterhälfte beiderseits der schmalen Fortsetzung des Rückenleckes schiefliegende braune Strichleckchen, an jeder Seite vier und hinter diesen noch ein braunes Bogenstrichchen. Die Spinnwarzen wie beim Weibe rothbraun. Taster und Beine ockergelb, die Genitalien mit dem Sporn rothbraun.

Vorkommen: Griechenland.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Nürnberg im Jahre 1863

von

Dr. Küttlinger,

k. Bezirksarzt.

Da zur Bestimmung des Witterungs-Charakters eines einzigen Jahres der Vergleich mit Mittelwerthen nothwendig ist, welche aus einer möglichst grossen Zahl von Jahren gewonnen wurden, so benützte ich hiezu die Aufschreibungen der Herren Forst-rath Winkler und Bezirkgerichtsarzt Eichhorn, die sich in ununterbrochener Folge auf nahe 30 Jahre (29 Jahre und 5 Monate) erstrecken. Es muss jedoch vor Allem bemerkt werden, dass diese beiden Herren sowie ich selbst ihre Beobachtungen in der Mitte der Stadt anstellten, wodurch sich namentlich in Bezug auf die Temperatur ein wesentlicher Unterschied von den ganz im Freien angestellten Beobachtungen, nämlich eine um ziemlich einen ganzen Grad höhere Mittel-Temperatur ergibt. Wird sich daher der Meteorolog *μετεωρολογος* damit nicht befriedigt finden, so genügten sie doch dem von mir beabsichtigten Zwecke, zu erforschen, welchen Einfluss die Witterung auf die Gesundheits-Verhältnisse der Stadt ausübt.

In dieser Beziehung ist das Jahr 1863 im Allgemeinen als ein sehr günstiges, sich besonders durch seine milde Temperatur auszeichnendes Jahr zu bezeichnen.

Der mittlere Barometerstand des Jahres 1863 übertraf das allgemeine Mittel von 325,51''' nur um 0,38'''. Die Schwan-

kungen waren in den meisten Monaten gering, am stärksten im Januar und dann im December. In ersterem kam die grösste Differenz vor ($15,80''$), welche sich der des ganzen Jahres ($16,30''$) bis auf eine halbe Linie näherte. Der stärkste Luftdruck obiger 29 Jahre betrug am 9. Januar 1859 $334,61''$, der schwächste am 26. December 1856 $311,91''$.

Die Temperatur blieb durchschnittlich, namentlich im Winter, eine sehr gemässigte und erreichte nur im August eine extreme Höhe. Das Jahresmittel von $8,52^{\circ}$ übertraf das allgemeine von $7,18^{\circ}$ R. um $1,34^{\circ}$, eine seltene Erscheinung; denn vom Jahre 1830 bis 1859 waren die höchsten Mittel

$8,34^{\circ}$ im Jahre 1836,

$8,33^{\circ}$ im Jahre 1837,

$8,03^{\circ}$ im Jahre 1841.

Der Dunstdruck mit $3,05''$ kam dagegen dem allgemeinen, freilich hier nur aus 8 Jahren berechneten Mittel von $3,22''$ sehr nahe.

Die Windrichtungen folgten ihrer Häufigkeit nach in absteigender Linie also: W. SW. NO. NW. S. O. S.O. N. Die Aequatorial-Luftströmungen überwiegen bedeutend die Polar-Luftströmungen, letztere verhielten sich zu ersteren wie $1:2,18$, während das allgemeine Verhältniss $1:1,5$ ist. Die Tage mit gänzlicher Windstille und Tage mit stark bewegter Luft kamen sich ziemlich gleich.

Die Himmelsschau ergab keine bemerkenswerthen Abweichungen. Um so auffallender war die geringe Zahl der Regen- und Schneetage, obschon die Westwinde so sehr präponderirten und lässt sich nur dadurch erklären, dass durch die häufigen Winde oft die Niederschläge verhindert wurden. Aus 17 Jahren ergaben diese nämlich im Durchschnitt $113,4$ Regen- und $28,9$ Schneetage, während diesmal nur 77 und 14 gezählt wurden.

Die 38 Nebel waren meistens nur Morgennebel, besonders im Herbst.

Das Jahr 1863 ist demnach für wärmer und trockner als gewöhnlich zu erklären.

Von den Jahreszeiten ist zu bemerken:

1. Die Wintermonate December 1862 bis Februar 1863 hatten eine mittlere Temperatur von $+ 1,56^{\circ}$, welche das allgemeine Mittel von $- 0,34^{\circ}$ um $1,90^{\circ}$ übertraf. Das Maximum der Temperatur betrug $+ 8,4^{\circ}$ am 7. Januar, das Minimum nur $- 8^{\circ}$ am 5. December. Eis hatten nur 37 Tage, und mittlere Temperatur auf oder unter 0° 17 Tage. Der mittlere Dunstdruck war $1,86'''$, demnach dem allgemeinen Mittel für den Winter ($1,89'''$) fast ganz gleich. Im December fiel abwechselnd Schnee und Regen, auch stürmte es häufig.

Ähnlich verhielt sich der sehr milde Januar, welcher am 20. Abends das seltene Schauspiel eines sehr heftigen Gewitters mit starken Blitzen und Donnerschlägen unter gleichzeitigem dichten Hagel und Schnee-Gestöber und gewaltigen Sturm darbot. Desgleichen trat auch im Februar bei abwechselnd mässigem Regen und Schneefall keine stärkere Kälte ein. Der Winter muss daher als ungewöhnlich mild mit wenig Schnee und Feuchtigkeit überhaupt bezeichnet werden.

2. Der Frühling hatte die ziemlich hohe Mittel-Temperatur von $8,55^{\circ}$, während das allgemeine Frühlings-Mittel für Nürnberg nur $6,87^{\circ}$ beträgt. Der Dunstdruck von $2,66'''$ näherte sich wieder dem allgemeinen Mittel des Frühlings von $2,81'''$. Einem mässig feuchtem März folgte ein vorherrschend trockner April und Mai, in welchem letztern schon einige Tage hohe Sommer-temperatur herrschte und 2 Gewitter sich entluden. Die Polarluftströmungen verhielten sich zu den Aequatorialluftströmungen wie 3 : 4.

3. Die Sommer-Temperatur ($+ 15,30^{\circ}$) überschritt gleichfalls das allgemeine Mittel für den Sommer ($14,98^{\circ}$), dagegen blieb der Dunstdruck ($4,4'''$) unter demselben ($4,93'''$). Sehr feucht bei vorherrschend stürmischen Westwinden und öfteren Gewittern war der Juni, der feuchteste aller Monate, trockener bei mässiger Sonnenwärme der Juli, sehr heiss, doch öfters durch Gewitter abgekühlt, der August. An 34 Tagen des Sommers erreichte die Temperatur, im August dreimal die mittlere Tages-Temperatur, $+ 20^{\circ}$ R. und darüber. (In Folge dieser grossen Hitze ereigneten

sich im August viele Todesfälle an Brechruhr und Diarrhoe unter den kleinen Kindern.)

4. Der Herbst (September, October, November) ergab eine Mitteltemperatur von $8,35^{\circ}$, wiederum um mehr als einen Grad über dem allgemeinen Mittel von $7,23^{\circ}$. Der Dunstdruck ($3,13'''$) kam dagegen dem allgemeinen Mittel für den Herbst ($3,28'''$) ziemlich nahe. Der September war ziemlich feucht und stürmisch, der October nebelig, mässig feucht, der November feucht und sehr trüb, daher Feuchtigkeit und bewölkter Himmel vor trockenen und heiteren Tagen am meisten in diesem Herbst vorherrschten; dergleichen die westlichen Winde, die sich zu den östlichen wie $1,74 : 1$ verhielten.

Eine Ueberschwemmung kam in diesem Jahre gar nicht vor, doch war gegen Ende Juni in Folge des reichlichen Regens in diesem Monat die Pegnitz dem Austreten nahe.

Zu Seite 166

Monat.

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli

Der Graphit und seine wichtigsten Anwendungen.

Von

Dr. Heinrich Weger.

Ingenio reddit, terra sublata Graphites,
Munera pro studiis, artibus atque suis.

Weger.

Graphit (von *γράφω*, schreiben, wegen seiner Anwendung), Graphite, Graphites, Aschblei, Potelot (zusammengesetzt aus pote und lot; pote ist ein altes französisches Adjectiv und heisst dick, lot heisst Theil, demnach Dicktheil), Pottloth, Ofenfarbe, Reissblei (wegen der bleigrauen Farbe und der Benützung zum Reissen oder Zeichnen), früher fälschlich auch Wasserblei oder Molybdaen (von *Μόλυβδος*, Blei oder bleiartige Masse) genannt; von den Engländern noch heute Plumbago (Bleischweif) genannt; Plumbagine; fer carburé; Crayon noir; Black Lead; Carbo mineralis; Graphitglimmer.

Gleichwie die Geschichte und Kenntniss der Völker, der Geschlechter und der Individuen, welche in irgend einer Zeitperiode eine dominirende Stellung eingenommen oder eine hervorragende Rolle gespielt haben, ein verhältnissmässig mehr oder minder hohes Interesse in Anspruch nimmt; so dürfte auch eine genaue Kenntniss (in natürlicher und geschichtlicher Hinsicht) gewisser Stoffe, wie Eisen, Stein- und Braunkohlen, Zucker, Kaffee, Thee, Branntwein, Graphit u. s. w., welche für die Entwicklung der Kultur und Industrie von einem namhaften Einflusse gewesen

oder es noch sind, ebenfalls eines besondern Interesses nicht entbehren. Unter jenen Stoffen behauptet für unser Industrie- und Kulturleben nicht den letzten Rang der Graphit.

Ob der Graphit oder das Reissblei, dieses durch ihre Eigenschaften ungemein ausgezeichnete und um der mannigfachen Anwendung willen sehr wichtige Mineral, schon im Alterthum bekannt war oder nicht, ist mit Bestimmtheit wohl kaum zu entscheiden. Denn es bleibt ungewiss, ob die Alten mit einer der Benennungen, welche bei ihnen für metallisch aussehende abfärbende Substanzen gebraucht sind, wie *plumbago*, *molybdaena*, *molybdoides* u. a., das Reissblei oder den Graphit besonders bezeichnet haben, oder ob er ihnen überhaupt nur bekannt war. Die ersten zuverlässigen Angaben über die Bekanntschaft mit diesem Mineral leiten sich aus den Schriftstellern ab, welche unzweideutig der Bleistifte erwähnen, welche letztere unmittelbar nach der Auffindung (zwischen 1540 und 1560) der berühmten Graphitgrube zu Borrowdale in Cumberland zuerst in England entdeckt und fabricirt wurden. Zum erstenmale geschieht dieses durch Conrad Gessner (geb. 1516 zu Zürich, gest. 1565 das.), welcher in seinem Buche *de omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metallis etc.*, Tiguri, 1565—66 einen solchen Bleistift abbilden liess und dazu bemerkt: *Stylus inferius depictus ad scribendum factus est, plumbi cujusdam (factitii puto, quod aliquos stimmi Anglicum vocare audio) genere, in mucronem derasi, in manubrium ligneum inserti*. Der Engländer Pettus, welcher 1683 ein Werk: *The laws of art and nature* herausgab, beschreibt diese Bleistifte schon genauer und sagt, sie werden in Tannen- oder Cedernholz gefasst. Genauer beschreibt das Reissblei der berühmte Botaniker und Professor der Medicin, Andreas Caesalpinus (geb. 1519 zu Arezzo, gest. 1603 zu Rom) in seiner Schrift: *de metallicis* (*Libri tres*, Romae 1596): *Puto molybdoidem esse lapidem quendam in nigro splendentem colore plumbeo, tactu adeo lubrico, ut perunctus videatur, manusque tangentium inficit, colore cinereo, non sine aliquo splendore plumbeo*.

Noch ausführlicher beschrieb Ferrante Imperato das

Reissblei in seiner Schrift: dell' historia naturale libri XXVIII (Napoli 1599) unter dem Namen grafio piombino. „Es sei zum Zeichnen viel bequemer als Tinte und Feder, weil sich die Schrift nicht nur auf weissem Grunde, sondern wegen ihres Glanzes auch auf schwarzem zeige, und weil sie sich nach Belieben erhalten und auslöschen lasse, und weil man über dieselbe dennoch mit der Feder wegschreiben und zeichnen könne, was eine mit Blei oder Kohle gemachte Zeichnung nicht erlaube. Das Mineral sei glatt, fettig anzufassen, bleifarbig, färbe ab und zwar mit einem metallischen Glanze; zuweilen komme es schuppig vor und lasse sich ganz in Schuppen zerbröckeln, zuweilen dichter und fester, und dann würden daraus Stifte zum Schreiben gemacht; die erste Art würde mit Thon vermischt und daraus sehr feuerfeste Tigel verfertigt.“

Seit jener Zeit ist das Reissblei oder der Graphit bekannt; allein seine chemische Natur wurde erst viel später entdeckt. Man hielt denselben Anfangs für eine dem Talk verwandte Substanz wegen der Aehnlichkeit, die es mit diesem in der Weichheit und bei dem Anfühlen auch hinsichtlich der Feuerbeständigkeit hat; schon 1599 verglich der bereits erwähnte Italiener Imperato das Mineral mit Talk und noch Johann Gottschalk Wallerius ordnete das Reissblei um 1760 dem Talke zu; später setzt Leonhard den Graphit wegen seines Eisengehalts geradezu in die Gruppe Eisen, Mohs zählt ihn zu den Glimmerarten, Oken zu den Kiesbrenzen und Naumann in neuerer Zeit zur Familie der Anthracide. Allgemein war auch in jener Zeit die Ansicht verbreitet, das Reissblei enthalte Blei, indem der Strich desselben auf Papier oder Pergament grau war und wenn derselbe schärfer geführt wurde, Metallglanz hatte. Ebendies konnte wohl auf die Vermuthung führen, dass in dem Reissblei oder Graphit sich Blei von eigenthümlicher Beschaffenheit finde, ein Blei, welches nicht so schwer als das eigentliche und nicht schmelzbar sei; darauf hin deuten die Namen Plumbago und Reissblei, deren letzterer aus der italienischen Bezeichnung grafio piombino entstanden zu sein scheint, welche, wie bereits angeführt, schon im 16. Jahrhundert in Imperato's Historia naturale (1599) vorkommt. Wie

die beiden letztern Benennungen auf den Gebrauch des Minerals hindeuten, so thut dies auch das Wort Graphit, welchen Namen dasselbe von dem berühmten Mineralogen Abraham Gottlob Werner (geb. 1750 zu Wehrau in der Oberlausitz, gest. 1817 zu Dresden) erhalten hat.

Der Chemiker Johann Heinrich Pott (geb. 1692 zu Halberstadt, gest. 1777 zu Berlin) zeigte nun im Jahre 1740, dass Wasserblei oder Plumbago kein Blei enthalte; aber seine Untersuchung ist der Art, dass sich kaum mit Sicherheit annehmen lässt, ob er Graphit oder Wasserblei (Schwefelmolybdän), welche beide Mineralien damals stets noch verwechselt wurden, vor sich gehabt hat. Die Confusion in dieser Beziehung dauerte fort, bis endlich der berühmte Chemiker Carl Wilhelm Scheele (geb. 1742 zu Stralsund, gest. 1786 zu Köping in Schweden) die wahre Constitution des Wasserbleis oder Molybdaens (1778) und des Graphits oder Reissbleis (1779) kennen lehrte. Von dem Graphit zeigte Scheele, dass er bei dem Verbrennen mit Salpeter sich ganz in Kohlensäure verwandle; er schloss daraus, dass der Graphit eine Art mineralische Kohle sei, welche viele fixe Luft (Kohlensäure) und Phlogiston enthalte. Das Eisen, welches er gleichfalls in dem Graphit wahrgenommen hatte, erklärte er für einen unwesentlichen Bestandtheil desselben; endlich bemerkte Scheele noch, auch in dem Gusseisen sei Graphit enthalten¹⁾.

So hatte man bereits Jahrhunderte lang ein Mineral gekannt und gebraucht, ohne zu wissen, was es eigentlich war und welches seine chemische Zusammensetzung ist. Bei dem niedern Stande, auf dem in jener Zeit die Chemie sich befand, war dies allerdings um so weniger zu verwundern, als die äusseren Eigenschaften dieses Minerals wenig an den Körper, aus welchem der Graphit der Hauptmasse nach besteht, erinnerten. Jetzt weiss man mit Bestimmtheit, dass der Graphit Kohlenstoff, mit mehr oder weniger anderen fremden Substanzen vermengt ist, und zwar

¹⁾ Kopp, Geschichte der Chemie. Bd. III. S. 289.

stellt sich uns der dimorphe¹⁾ Kohlenstoff im Graphit in seiner hexagonalen Form dar, während er als Diamant in tesseraler Form auftritt.

Tschermack²⁾ hält Diamant und Graphit für zwei polymere Körper. Uebrigens kam B. C. Brodie³⁾ durch eine Reihe von Versuchen zu der Schlussfolgerung, dass der Graphit eine von allen bekannten Kohlenverbindungen abweichende eigenthümliche Verbindungsgruppe ausmache, die durch gewisse Oxydationsprozesse in Kohlensäure verwandelt werden könne, aber ein bestimmtes, vom Kohlenstoff verschiedenes Atomgewicht besitze. Durch fortgesetzte Oxydation kann der Graphit in eine deutlich krystallinische blassgelbe Substanz umgewandelt werden, welche aus $C_{12}H_4O_4$ besteht. Sie scheint in der Kohlenstoffgruppe dasselbe zu sein, was in der Siliciumgruppe das graphitähnliche Silicium Wöhler's $Si_4H_4O_4$ ist. Diess angenommen, so kommt man auf eine der letzteren ganz entsprechende Formel, wenn man das Gewicht von 22 Atomen C (132) durch 4 dividirt, d. h. es würde in jener Verbindung der Kohlenstoff als Graphit das Atomgewicht 33 besitzen und man hätte dann $C_{gr}H_4O_4$. Das Atomgewicht 33 stimmt auf bemerkenswerthe Weise mit dem Gesetz Regnault's über den Zusammenhang der specifischen Wärme mit dem Atomgewicht überein, welchem sich bis jetzt der Kohlenstoff in keiner

¹⁾ Dimorphismus ist die Fähigkeit einer und derselben (einfachen oder zusammengesetzten) Substanz, in den Formen zweierlei wesentlich verschiedener Krystallreihen zu krystallisiren. Mit dieser Verschiedenheit des morphologischen Charakters tritt aber auch zugleich eine Verschiedenheit der physischen Eigenschaften ein, so dass das ganze Wesen ein durchaus verschiedenes Gepräge zeigt, und man ebenso gut sagen könnte, der Dimorphismus sei die Fähigkeit einer und derselben Substanz, zweierlei wesentlich verschiedene Körper darzustellen, wodurch die amorphen Vorkommnisse zugleich mit erfasst werden. So liefert der Kohlenstoff als Diamant und Graphit, der kohlen-saure Kalk als Kalkspath und Aragonit, das Eisenbisulphuret als Pyrit und Markasit zwei ganz verschiedene Körper.

²⁾ Abhandlungen der k. k. Akademie d. Wissenschaften in Wien. 1861.

³⁾ Chem. Gaz. Nr. 404. p. 319, u. Erdmann, Journ. f. pr. Chemie. Bd. 79. S. 124.

seiner Modificationen hat fügen wollen, mochte man das Atomgewicht desselben 12 oder 6 nehmen. Bekanntlich ist im Allgemeinen das Produkt der specifischen Wärme in das Atom- oder Mischungs-Gewicht bei den einfachen Körpern entweder 3,3 oder 6,6. Die specifische Wärme des Graphits ist 0,20187; multiplicirt man diese Zahl mit 33, so ergibt sich 6,63. Brodie vermuthet diesem nach im Graphit ein neues Element und sucht den Kohlenstoff desselben unter dem Namen Graphon mit einem anderen Atomgewichte einzuführen.

Man unterscheidet natürlichen und künstlich dargestellten Graphit, doch hat bis jetzt nur der erste vorzugsweise Anwendung gefunden.

Der natürliche Graphit kommt meistens derb oder auch selten krystallisirt vor. Derselbe krystallisirt in hexagonalen Tafeln der Combination des Pinakoids mit dem hexagonalen Prisma (OP. ∞ P.) mit stark blättriger Endfläche, wornach er ein glimmerartiges Aussehen bekommt. Mohs gibt als Krystallform die hexagonale Pyramide an. Nordenskiöld¹⁾ fand bei Pargas (Ersby, Storgård) in Finnland messbare Krystalle mit vielen Flächen, die er monoklinoëdrisch erklärt. Wahrscheinlich wird es auch hier wie beim Glimmer sein: das Sechsgliedrige ist durch ungleiche Ausdehnung der Flächen versteckt. Krystalle kommen übrigens sehr selten und nur unvollkommen ausgebildet vor in Geschieben von Grönland mit Granat, Quarz und Adular; im labrosirenden Feldspath von Friedrichswärn, auf dem Magnetisenlager des Gneises von Arendal in Norwegen. Ausserdem kommt der Graphit meist derb, in blättrigen, strahligen, schuppigen bis dichten und erdigen Aggregaten vor; auch eingesprengt und als Gemengtheil mancher, besonders der primitiven, Gesteine. Derselbe besitzt ausgezeichnete Spaltbarkeit, daher sind die Spaltungsflächen sehr deutlich und parallel den Endflächen OP. Milde, in dünnen Blättchen biegsam, abfärbend und schreibend. Der Graphit verhält sich sehr fett im Anfühlen und legt sich beim Rei-

¹⁾ Poggend. Ann. d. Phys. Bd. 96. S. 110.

ben zwischen den Fingern an die Haut in einer eigenthümlichen Weise an, wie es bei nur wenig anderen Stoffen der Fall ist, z. B. bei Schwefelmolybdän und Eisenglimmer; Strich schwarz, Bruch uneben bis muschelrig. Er ist metallglänzend, undurchsichtig, stahlgrau bis eisenschwarz. Der Graphit besitzt eine nahezu zehnmal geringere Härte als der Diamant, ist sonach sehr weich, seine Härte beträgt nur 0,8—1,0. Das specifische Gewicht desselben schwankt zwischen 1,810—2,419, welche Abweichung von der grösseren oder geringeren Quantität seiner fremden Bestandtheile, sowie von inneren Luftblasen herrührt. Der Graphit ist ein sehr guter Leiter der Electricität (deshalb seine Anwendung in der Galvanoplastik) und leitet die Wärme besser als Diamant; durch Reiben wird er negativ-electrisch. Die specifische Wärme desselben ist grösser als die des Diamants, sie ist nämlich nach Regnault 0,20187.

Ebenso wenig als der Diamant zeigt der Graphit eine Neigung zu schmelzen oder sich zu verflüchtigen; seine Entstehung im Eisenschmelzofen lässt schon seine grosse Feuerbeständigkeit erkennen; er verbrennt selbst im Sauerstoffgas schwieriger als der Diamant zu Kohlensäure mit Hinterlassung einer gelben oder braunen Asche, welche Eisenoxyd, Thonerde etc. enthält. Mit Salpeter im Platintiegel erhitzt, zeigt er nur theilweise ein schwaches Verpuffen und ist in keinem Flussmittel löslich. In Säuren, wie überhaupt in allen bekannten Lösungsmitteln, ist der Graphit gänzlich unauflöslich; erstere lösen nur die fremdartigen Erden und Metalloxyde auf. Die Gebrüder Rogers haben, wie den Diamant, so auch den Graphit auf nassem Wege in Kohlensäure umgewandelt, indem sie denselben im fein gepulverten Zustande mit Schwefelsäure und chromsaurem Kali erhitzen, wobei der Sauerstoff der Chromsäure den Graphit zu Kohlensäure oxydirt.

Uebrigens hat Schafhäutl schon viel früher Graphit auf nassem Wege in Kohlensäure übergeführt.

Wie bereits angeführt, so ist der natürliche Graphit ein bestimmter allotropischer Zustand des Kohlenstoffs, aber niemals ganz reiner Kohlenstoff, sondern stets mehr oder weniger durch

fremde Substanzen verunreinigt, welche beim Verbrennen desselben als Asche zurückbleiben. Die reinsten Graphitsorten von Borrowdale in Cumberland, Barreros in Brasilien, Wunsiedel (nach Fuchs nur 0,33 Proc. Asche) in Bayern u. s. w. hinterlassen $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ Procent Asche; im krystallisirten Graphit von Ceylon fand Prinsep 1,2 Proc. Asche. Graphitsorten, welche etwa 5 Proc. Asche hinterlassen, gehören schon zu den reineren; es gibt deren, welche bis gegen 20 und mehr Procent fremde Stoffe enthalten. Als Bestandtheile der Asche des Graphits hat man gefunden: Kieselerde, Thonerde, Kalkerde, Eisenoxyd, Titanoxyd (Schrader fand dieses Metalloxyd im englischen Graphit), Chromoxyd; weniger bestimmt wurden darin nachgewiesen: Kupferoxyd, Nickeloxyd und Manganoxyd. Von diesen Bestandtheilen finden sich in der Asche eines und desselben Graphits oft nur wenige beisammen, so z. B. enthalten manche Graphite nur Kieselerde, andere nur Eisenoxyd, noch andere nach Prinsep Thonerde und Kalkerde. Plattner erhielt beim Einäschern eines — wahrscheinlich englischen — Graphites bedeutenden Rückstand von Chromoxyd (4,9 Proc. metallischem Chrom entsprechend) mit etwas Eisenoxyd verunreinigt. Ferner fand man in mehreren Graphitsorten einen kleinen Gehalt an Ammoniak. Nach Morveau, H. Davy, Gay-Lussac und Thénard soll der Graphit ein wenig Wasserstoff enthalten, nach Allen, Pepys und Saussure aber nicht. Früher glaubte man, dass das im Graphite so häufig auftretende Eisen nicht mit Sauerstoff zu Oxyd, sondern mit Kohlenstoff zu einem Kohlenstoffeisen verbunden sei. Karsten¹⁾ hat diese Ansicht widerlegt und Sefström²⁾ die Richtigkeit der Karsten'schen Versuche bestätigt, indem der mit Salzsäure digerirte Graphit keine Spur von Wasserstoffgas entwickelt und die Säure das ausgezogene Eisen im Zustande von Oxydoxydul enthält.

Nachstehende Tabelle gibt die Zusammensetzung von verschiedenen Graphitsorten näher an.

¹⁾ Karsten, Arch. f. Bergb. u. Hüttenk. Bd. XII. S. 91.

²⁾ Pogg. Ann. d. Phys. Bd. XVI. S. 168.

Fundort.	Verbrennungs-		Analytiker
	Rückstand oder Asche.	Verlust oder Kohlenst.	
Graphit von Borrowdale in Cumberland	13,3	86,7	Karsten ¹⁾
Graphit v. England	46,6	53,4	Prinsep
„ „ Ceylon, krystallisirt . . .	1,2 – 6,0	94,0—98,8	Prinsep ²⁾
„ „ „ etwas gereinigt . . .	18,5	81,5	„
„ „ „ roh	37,2	62,8	„
„ „ „ krystallisirt	3,9	96,1	Knapp ³⁾
„ „ Indien, am Himaleh.	28,4	72,6	Prinsep
„ „ Bustletown	4,6	95,4	Vanuxem ⁴⁾
„ „ Sibirien v. Aliberts-Berg . .	3,4	96,6	Wagner
„ „ „ „ „	3,8	96,2	„
„ „ „ „ „	8,5	91,5	„
„ „ „ v. d. feinsten Sorte . . .	3,9	96,1	Weger
„ „ Schwarzbach in Böhmen, I. Sorte	12,5	87,5	Ragsky ⁵⁾
„ „ Hafnerluden in Mähren . . .	57,0	43,0	„
„ „ Rana in N.-Oestr., roh . . .	41,3	58,7	„
„ „ „ „ „ geschlämmt	51,1	48,9	„
„ „ „ „ „ gestampft	49,5	50,5	„
„ „ „ roher zu Schmelztiegel . .	73,7	26,3	„
„ „ „ geschlämmt v. Wildberg . .	63,1	36,9	„
„ „ Raabs, Nr. 1.	61,7	38,3	Thalecz ⁶⁾
„ „ „ Nr. 2.	44,4	55,6	„
„ „ „ Nr. 3.	32,5	67,5	„
„ „ „ Nr. 4.	55,2	44,8	„
„ „ Kaisersberg in Steiermark . .	57,8	42,2	v. Forstel ⁷⁾
„ „ „ zu Graphittiegeln	35,6	64,4	„
„ „ Hafnerzell bei Passau	58,0	42,0	Ragsky
„ „ „ „ „	65,1	34,9	Berthier ⁸⁾
„ „ „ „ „	52,9	47,1	Knapp
„ „ Wunsiedel, Bayern	0,33	99,77	Fuchs

¹⁾ Arch. f. Bergbau u. Hüttenk. Bd. XII. S. 91.

²⁾ Edingb. New Philos. Journ. Vol. VII. p. 346.

³⁾ Wick, illustr. Gewerbezeit. Nov. 1861.

⁴⁾ Sillim. Amer. Journ. V. X. p. 102.

⁵⁾ Jahrb. d. geolog. Reichsanstalt in Wien. Bd. IV. S. 829.

⁶⁾ Desgl. Bd. V. S. 461.

⁷⁾ Desgl. Bd. V. S. 368.

⁸⁾ Traité des Essais. T. I. p. 50.

Die folgende Tabelle enthält die näheren Bestandtheile verschiedener Graphitaschen.

Asche des	Kiesel- erde.	Thon- erde.	Eisen- oxyd.	Kalk.	Bitter- erde.	Man- gan- oxyd.
Graphits v. Borrowdale	4,8	3,5	2,4	Spur	0,3	0,2
„ „ Ceylon	21,6	9,3	5,4	0,2	0,1	—
„ „ Schwarzbach	5,1	6,1	1,2	0,1	Spur	—
„ „ Hafnerluden	49,2	7,0	0,8	—	—	—
„ „ Hafnerzell . . .	41,2	14,7	—	1,0	—	—
„ „ „	26,4	25,1	6,5	—	—	—

Der Graphit von Borrowdale enthält noch Titanoxyd (1,9) und Spuren von Chromoxyd; der von Hafnerzell Schwefeleisen. Die Asche des Graphits von Wunsiedel enthält Kali, Kieselerde und Eisenoxyd und die von Himaleh Kieselerde, Thonerde und Eisenoxyd.

Am seltensten kommt zu Bleistiften brauchbarer Graphit vor, der ausgezeichnetste früher zu Borrowdale in Cumberland, jetzt in Sibirien, welcher deshalb sehr hoch im Preise steht. Der Werth dieses Graphites beruht übrigens weniger in seiner Reinheit, sondern vielmehr in seinem Korn und Gefüge; denn der ungleich reinere Ceylon-Graphit ist zu Bleistiften unbrauchbar, und zugleich niedriger im Preise. Zu Bleistiften taugt nur ein derber, fein körniger Graphit, während zu Schmelztiegeln gerade der mulmige lose Graphit in glimmerartigen Blättern und Schuppen der geeignete ist.

Die Werthbestimmung der unreinen Graphitsorten, wie sie an verschiedenen Orten gewonnen werden, kann sich wesentlich nur auf den Gehalt an unverbrennlichen Theilen und reinem Graphit beziehen. Will man den Graphit durch Ausbrennen entfernen, so gelingt diess nur schwierig, selbst beim starken Erhitzen in einem Sauerstoffstrome, unvollständig. Eine sehr einfache Methode der Analyse ist dagegen die, dass man eine abgewogene Menge Graphit mit überflüssigem Bleioxyd in einem Schmelztiegel mischt, den letzteren gut bedeckt und nun zum Schmelzen des Bleioxyds erhitzt. Nach dem Erkalten findet man am Boden des

Tiegels einen Bleiregelus, dessen Gewicht man bestimmt. Auf 207 Theil Blei rechnet man 6 Theile reinen Graphit (oder 34,5 Theile Blei auf 1 Theil Kohlenstoff). Wie man sieht, so schliesst sich diese Bestimmung an die Berthier'sche Methode, den Heizwerth der Brennmaterialien zu bestimmen, an. Sie gibt ungemein genaue Resultate, weil der Graphit keine flüchtigen Theile enthält und nur durch Berührung mit dem schmelzenden Bleioxyd verbrannt wird.

Um den Graphit von seinen Beimengungen zu befreien, schmilzt man ihn, nach Dümas und Stass, mit kaustischem Kali zusammen, wäscht die Masse mit Wasser aus, behandelt das zurückbleibende Pulver erst mit Salpetersäure und dann mit Königswasser und erhitzt es darauf stundenlang in Chlorgas bis fast zur Weissglühhitze. Erdmann und Marschand fanden, dass das Erhitzen in Chlorgas nicht nothwendig sei. Beim Verbrennen eines nach dieser abgekürzten Methode gereinigten Graphites (von Ceylon) in Sauerstoffgas blieb etwa $\frac{1}{2}$ Procent Kieselerde in Gestalt von weissen wolligen Flocken zurück. Sehr häufig ist der Graphit mit Sand, Thon, Pflanzenwurzeln etc. verunreinigt, von denen man ihn durch Schlämmen befreien kann.

Da die Bleistiftfabrikation von der Erlangung eines geeigneten Graphits abhängig ist, so verdient an dieser Stelle der von B. C. Brodie in London ausgestellte präparirte Graphit Erwähnung. Das Verfahren seiner Darstellung ist folgendes: Das rohe Graphitpulver wird in einem eisernen Gefässe mit dem zweifachen Gewichte käuflicher Schwefelsäure und 7 Procent chlorsauren Kalis gemischt und in einem Wasserbade so lange erhitzt, bis keine chlorige Säure mehr entweicht. Durch diese Behandlung werden Eisen, Thonerde und Kalk zum grössten Theile gelöst; hierauf wird etwas Fluornatrium der Masse beigelegt, um die vorhandene Kieselerde als Fluorsilicium zu entfernen. Die Masse wird dann sorgfältig ausgewaschen, getrocknet und bis zur Rothgluth erhitzt. Das Glühen bewirkt ein Aufblättern der Graphitkörner; die Masse schwillt sehr merklich auf und geht in einen sehr fein zertheilten Zustand über; sie wird dann geschlämmt und kann so ohne Weiteres zur Bleistiftfabrikation verwendet werden.

Der Graphit findet sich in verschiedenen Theilen der Welt als Begleiter der primitiven Gesteine und zwar meist in Gneiss, Glimmerschiefer, Diorit und Thonschiefer als Lager vor, die nicht selten sehr regelmässig sind, eingesprengt, in Nestern, Putzen und Stockwerken im Granit und Phorphyr und auf Magneteisen-Lagerstätten. Im Gneiss bei Passau vertritt er die Stelle des Glimmers. Derselbe kommt ferner auch sehr häufig im körnigen Kalk, und darin nicht selten mit Mineralien, welche Silicate von Eisenoxyden enthalten, Hornblende, Augit u. s. w. vor.

Wie eben erwähnt, findet sich der Graphit überaus häufig als Gemengtheil der Gneisse und Glimmerschiefer, indem er die Stelle des Glimmers oft vollständig vertritt, wodurch dieselben in Graphitschiefer übergehen. Es häuft sich in solchen Graphitschiefern der Graphit oft zu Nestern und grösseren Lagen an, die nicht selten mit Kalkstein-Lagern in Verbindung stehen. Auch Kaolin-Lager erscheinen zuweilen in der Nähe von Graphit-Vorkommnissen, z. B. bei Passau u. a. O. So führt der Gneiss des Eulengebirges in Schlesien, nach Zobel und v. Carnal¹⁾, bei Tannhausen und Bärsdorf Lager von unreinem Graphit. Hisinger²⁾ erwähnt, dass in Westmanland in Schweden, sowohl bei Gillermarksberg als bei Löfvsved Graphit vorkommt, welcher zu technischen Zwecken verwendet wird. Im Gneisse des Thales von Strath-Tarrar in Nordschottland finden sich nach Jameson Graphitstücke, welche eine Zeit lang bebaut worden sind; der graphithaltige Gneiss der Vogesen bei Markirchen, Fraize und Wissenbach zeigt stellenweise den Graphit in förmlichen Schichten concentrirt, welche sogar Versuche auf Steinkohlen veranlasst haben. Auch bei Kumnock in Ayrshire ist Graphit auf Steinkohlenflötzen vorgekommen. Aus Nordamerika erwähnen wir den Graphit von Sturbridge in Massachusetts, welcher nach Hitchcock ein ganz regelmässiges bis 2 Fuss mächtiges Lager im Gneisse bildet, ein vortreffliches Material liefert und daher stellenweise

¹⁾ Karsten, Archiv für Bergbau u. Hüttenkunde. Bd. III. S. 50.

²⁾ Versuch einer mineral. Geographie. S. 151.

60—70 Fuss tief angebaut worden ist. Andere dem Gneisse untergeordnete Graphitlager finden sich in demselben Staate bei Brimfield und North-Brookfield, wie dann auch in Connecticut, Vermont u. a. Staaten dergleichen bekannt sind.¹⁾ Der seit ungefähr 1827 in den Handel kommende Graphit von der Insel Ceylon liegt gleichfalls nesterweise im Gneiss; derselbe steht in hohem Ansehen und ist krystallinisch-blättrig. Ferner finden sich mächtige Lager von theilweise vorzüglichem Graphit im Gneisse von Böhmen, Mähren, Bayern (s. w. u.) und an vielen anderen Orten. Man hat diesen Graphit für eine Pseudomorphose nach Glimmer erklären wollen, wie es scheint, um auch in diesem Falle die organische Abstammung des Kohlenstoffs geltend zu machen. Unser ausgezeichnete Geognost W. Gumbel²⁾, welcher die graphithaltigen Gneisse des bayerischen Waldgebirges sehr genau studirt hat, erklärt sich aber entschieden gegen eine solche Deutung.

Hier und da kommen Schichten von Glimmerschiefer vor welche mehr oder weniger reichlich mit Graphit imprägnirt sind, was zuweilen so weit gehen kann, dass das Gestein als ein förmlicher Graphitglimmerschiefer (körnig schiefriges Gemeng aus Quarz und Graphit) erscheint, wie bei Elterlein und Schwarzenbach in Sachsen, Grossklenau und Höfen bei Tirschenreuth, wo nach Hugo Müller der Glimmerschiefer in vollkommenen Graphitglimmerschiefer übergeht, ferner bei Afritz und Radenthein in Kärnthen, bei Gistainthal in den Pyrenäen, wo nach Charpentier ein nur aus Glimmer und Graphit bestehendes Gestein ansteht.

Wie im Gneiss so auch bei Granit ist vorzugsweise, nur weniger häufig, ganz oder zum Theil der Glimmer durch Graphit (Graphit-Granit) vertreten; so bei Seidenbach im Odenwald, bei Mendionde, Lekhurrum und Maccayn in den Pyrenäen. Die in neuerer Zeit entdeckten vorzüglichen und reichen Graphitlager in Ost-Sibirien finden sich zwischen Granit und Syenit eingelagert und werden meistens von Kalkspath begleitet.

¹⁾ Naumann, Lehrb. d. Geognosie. 2. Aufl. Bd. II. S. 90.

²⁾ Neues Jahrb. f. Mineral. 1855. S. 125.

Ferner ist Graphit in manchen körnigen Kalksteinen (Ur-kalkstein, Marmor z. Th.) ein häufiger vorkommender Gemengtheil; ja, es scheint, dass viele dunkelgraue Kalksteine ihre Farbe lediglich einer innigen Beimengung von Graphit zu verdanken haben, so zu Wunsiedel in Bayern, Pargas in Finnland u. a. O.

Wir haben bereits schon oben ein ähnliches Auftreten des Graphites bei den im Gneisse eingelagerten Kalksteinen (Mähren, Nordamerika etc.) kennen gelernt, und es rechtfertigt sich wohl die Ansicht, dass die Bildung des Graphites und überhaupt die Ausscheidung des Kohlenstoffs mit dem Dasein des Kalksteins in irgend einem nothwendigen Causalzusammenhange gestanden habe.

Endlich findet sich auch Graphit in manchen Thonschiefern der Urschieferformation mehr oder weniger reich beigemengt, so dass sie endlich in förmliche Graphitschiefer von zum Theil bauwürdiger Beschaffenheit übergehen; so nach v. Morlot zu Kaisersberg, Mautern, Leoben und Bruck in Steiermark. Die früher so hoch berühmten Graphitgruben von Borrowdale in Cumberland in England finden sich im Thonschiefer des Uebergangsgebirgs. Bei Elbingerode findet sich der Graphit in Feldspathphorphür eingelagert.

Die Meteoriten, welche am 15. März 1806 zu Alais¹⁾, 15. April 1857 zu Kaba²⁾ in Ungarn, zu Kakova im Temeser Banat und am 13. Oktober 1838 im Bokkeveld³⁾ bei der Capstadt gefallen sind, enthalten kosmischen Kohlenstoff, sowie das Eisen von Tennessee Graphit.

Die älteste Mine auf Graphit ist bekanntlich die in Cumberland. — Die Entdeckung des Graphits und dessen Verwendung zur Bleistiftfabrikation, welche sowohl für das praktische Leben als für die Kunst und Industrie von den wohlthätigsten Folgen war, wurde in England gemacht, wo zwischen 1540—1560

¹⁾ Berzelius, Pogg. Anal. d. Phys. Bd. XXXIII. S. 121.

²⁾ Sitzungsber. d. k. Akademie d. Wissensch. zu Wien. Bd. XXXIII. S. 205.

³⁾ Desgleichen v. 3. März 1859.

die berühmte Graphitgrube zu Borrowdale bei Keswick in der Grafschaft Cumberland aufgefunden wurde.

Mit der Eröffnung dieser Grube waren die Vorbedingungen erfüllt, welche die Entwicklung einer bedeutenden Bleistift-Industrie auf englischem Boden möglich machten. Der Graphit kommt daselbst, wie bereits erwähnt, im Uebergangsthonschiefer in dichten und früher auch in bedeutenden Massen vor. Der Berg, in welchem sich dieser berühmte Graphit findet, hat eine Höhe von 2000 Fuss, und ungefähr in der Hälfte dieser Höhe befindet sich der Eingang zu dem Bergwerk. Vor etwa hundert Jahren fanden wegen der Gewinnung dieses so werthvollen Minerals häufige Räubereien statt, so dass viele in der Nachbarschaft lebende Personen allein durch den Graphitraub sehr reich geworden sein sollen; die von den Eigenthümern angestellte Wache hatte die Grube nicht zu schützen vermocht. So hatte eine Anzahl von Bergleuten einen förmlichen Angriff auf die Grube gemacht, sie erobert und auf eine geraume Zeit im Besitze behalten, bis selbige endlich durch eine Abtheilung Soldaten wieder vertrieben wurde. Seit jener Zeit suchten die Besitzer ihr Eigenthum durch ein festungsartig mit 5 Fuss dicken Mauern, Schiessscharten und vergitterten Fenstern gebautes Haus zu schützen, welches im Erdgeschosse vier Zimmer hatte, deren eines zu der mit einer Fallthüre verdeckten Grube führte. In diesem Zimmer kleideten sich die Bergleute um, legten ihre Grubenkittel an, und kehrten, nachdem sie ihre sechsstündige Schicht gearbeitet hatten, aus der Grube zurück, wobei sie in Gegenwart eines Aufsehers ihre Grubenkleider wieder ablegen mussten, um auch nicht die kleinste Menge von Graphit entwenden zu können. In einem andern der vier Zimmer befanden sich zwei Männer an einem grossen Tisch, die den Graphit sortirten und reinigten; dieselben blieben während dem eingeschlossen und wurden von einem Aufseher, der sich in einem Nebenzimmer befand und mit zwei geladenen Gewehren bewaffnet war, beaufsichtigt. Nur durch solche Massregeln war es möglich geworden, den Anfeindungen der räuberischen Bergbewohner die Spitze zu bieten.

Diese Grube wurde jährlich bloß 6 Wochen geöffnet, und

dennoch soll sich der Werth des in dieser kurzen Zeit gewonnenen Graphits jedes Mal auf 30—40000 Pfund Sterling oder 100000 Francs belaufen haben.

Der reingemachte Graphit wurde in starken eisernen Kisten gepackt, deren jede 1 Zentner fasste, und so nach London in das Magazin der Besitzer transportirt, wo monatliche Auktionen damit abgehalten wurden. Der Preis war durchschnittlich 40—50 Francs per engl. Pfund. Der Werth des guten Cumberland-Graphits belief sich nach Dufrénoy sogar auf 400 Francs per Kilogramm.

In Cumberland führt der Graphit den Namen Wad, welches eigentlich ein durchaus anderes, aus Mangansuperoxyd, Manganoxydul und etwas Eisenoxyd bestehendes Mineral ist.

Von welcher Bedeutung diese Grube und die damit verbundene Bleistift-Fabrikation für England war, beweist die Thatsache, dass es die englische Regierung seiner Zeit für nothwendig hielt, den Export von Graphit in einer anderen Form als der von Bleistiften aufs strengste zu verbieten. Trotzdem aber, dass die Grube nur 6 Wochen im Jahre geöffnet und kein Graphit aus derselben exportirt werden durfte, konnte es doch nicht ausbleiben, dass in Folge der durch Jahrhunderte fortgesetzten Ausbeutung die Ergiebigkeit der Grube abnahm und zuletzt fast nichts mehr übrig blieb, als unreiner Abfall, der nicht mehr wie früher im Naturzustande zur Bleistiftfabrikation benützt werden konnte.

In neuerer Zeit liefert Ostsibirien einen ausgezeichnet reinen Graphit und zwar (was von besonderer Bedeutung ist) in sehr bedeutender Menge. Der Entdecker dieser Minen ist der Kaufmann J. P. Alibert von Tawathus in Sibirien. Derselbe kam auf einer Geschäftsreise im Osten Sibiriens in die dortige Gebirgs-Gegend, theilweise in der Absicht, Gold aufzusuchen; während er nun an den Ufern der Flüsse Oka, Belloi, Kitri und Irkut den Sand durchforschte, stiess er zufällig in der Nähe von Irkutsk in einer der Gebirgsschluchten dieser Gegenden auf Fragmente von reinem Graphit. Alibert kannte die Wichtigkeit und

Bedeutung eines solchen Materials und stellte deshalb mit Hilfe eines Eingebornen genaue Untersuchungen an, bis er nach vieler Mühe und Arbeit endlich im Jahre 1847 die Ueberzeugung gewann, dass in einem Zweig der Gebirgskette von Sajan, auf der Höhe des Felsengebirgs Batougol in einer Erhebung von 7000 Fuss über dem Meere und 400 Werst westlich von der Stadt Irkutsk, nahe an der Grenze von China, ein primitives Lager von Graphit vorhanden sein müsse. Er machte sich sofort an die Arbeit, eine Mine anzulegen; nachdem er zuerst Massen von schlechtem Graphit (der sich mit dem Abfall des Cumberland-Graphits vergleichen lässt) und mehr als 300 Tonnen Granit weggeräumt hatte, so öffnete sich ihm ein Lager von ausgezeichnetem, reinem Graphit, aus welchem Stücke gewonnen wurden, von denen einige bis zu 80 Pfund wogen. Der Berg, welcher diesen Schatz enthält, ist nach dem Entdecker und jetzigen Besitzer, Herrn Alibert, der Alibertsberg genannt worden.

Der Weg nach den Graphitgruben, die im Gebiete der noch heidnischen Sojoten liegen, führt über weite moorige Hochebenen (Tundras), die allmählig sich immer mehr erheben. Anfänglich, in den verhältnissmässig niederen Regionen, tragen dieselben ausser Moos und Flechten noch ziemlich häufig mancherlei Sträucher, welche die Einförmigkeit und trostlose Oede weniger grell hervortreten lassen. Höher hinauf aber, bei immer mehr abnehmender Luftwärme, vermag der kalte Moorboden keine höhere Vegetation hervorzubringen, nur spärliche Moose und Flechten bedecken den Boden; kein hervorragender Gegenstand unterbricht das traurige Eierlei der wüsten Flächen, hier und dort nur erhebt in weiten Zwischenräumen sich ein hölzernes Kreuz, das zur Bezeichnung des Weges nach dem Bergwerke aufgerichtet ist. Endlich erreicht der Reisende eine Hütte, die ihm Unterkommen gewährt; von da führt ein nur klafterbreiter Weg durch Gehölz von Zirbelkiefern nach dem noch 12 Werste entfernten Graphitwerk.

Die Hauptader des Graphits hat eine Mächtigkeit von ungefähr 6 Fuss, zwischen Syenit- und Granitgestein, fällt sie fast senkrecht in die Tiefe, nach unten zu sowohl an Mächtigkeit als

an Güte des Minerals zunehmend. Noch gibt es mehrere andere Adern von geringerer Ausdehnung. Der aus denselben gebrochene Graphit zeigt besonders in der Nachbarschaft des begleitenden Gesteines einen muscheligen Bruch und perlmutterartigen Glanz, was ein Zeichen geringerer Güte ist. Syenit und Kalkspath werden als die besten Gangarten betrachtet und ihnen deswegen vorzugsweise nachgearbeitet, indem man das Gestein mit Pulver sprengt. Ausser dem Vorkommen in zusammenhängenden Massen findet sich der Graphit auch in krystallinischen Kalksteinen eingesprengt und häufig von vorzüglicher Güte.

Die Masse des allein in der Hauptader enthaltenen Graphits ist auf mehrere hunderttausend Pud (à 40 Pfd.) geschätzt, und somit auch für den Abgang des englischen von Borrowdale reicher Ersatz gefunden. Der grösste Uebelstand ist nur die weite Entfernung von Europa und die Schwierigkeit des Transportes. Nur im Winter ist dieser zu bewerkstelligen, wenn der Frost die moorigen Tundra fest gemacht und der Schnee überall einen fahrbaren Weg geschaffen hat.

Der Graphit wird nach seiner Güte sortirt, wobei man die geringere Schwere der Stücke und eine regelmässige feinwellige Längsstreifung, welche an die Struktur des Holzes erinnert, vornehmlich berücksichtigt. Alsdann wird er zu 5—6 $\frac{1}{2}$ Pud in Kisten aus Zirbelkiefernholz verpackt und versendet. Bis die Waare von Ort und Stelle nach Deutschland gelangt, vergeht ein halbes Jahr.

Bis jetzt benützt diesen in allen Beziehungen ausgezeichneten Graphit, welcher den früher so hoch berühmten von Cumberland an Güte und Beschaffenheit ganz gleich kommt, die schon seit hundert Jahren bestehende und weltberühmte Bleistiftfabrik von A. W. Faber (gegenwärtiger Besitzer derselben Lothar von Faber) in Stein bei Nürnberg, in Gemässheit eines Vertrages, welchen dieselbe mit Alibert 1856 abgeschlossen hat, demzufolge aller Graphit, der in den Alibert'schen Gruben gewonnen wird, jetzt und für alle Zeiten an die Faber'sche Fabrik mit Genehmigung der russischen Regierung geliefert werden darf. Der

Centner von der feinsten Sorte dieses Alibert-Graphits kommt auf 1000 fl. loco Stein zu stehen.

Der sibirische Graphit bildete auf der letzten Industrie-Ausstellung zu London eine Hauptzierde der gesammten Mineral-Ausstellung und hat für manche Beschauer wohl eben so viel Interesse gewährt, als die ausgestellten Diamanten. Die ausgelegten Graphitproben haben an Massigkeit und Reinheit Alles übertroffen, was bisher von diesem werthvollen Material in Sammlungen aufzuweisen sein dürfte; auch die künstliche Behandlung (es war unter anderem eine Büste des russischen Kaisers und verschiedene grosse Medaillons in Graphit ausgestellt) wie die geschmackvolle Anordnung des vorhandenen Materials hatten dasselbe zu einem der anziehendsten Theile der Ausstellung gemacht. Ebenso waren vom Ceylon-Graphit, welcher in bedeutender Menge nach England gebracht und vorzugsweise zur Tiegelfabrikation benutzt wird, schöne Proben in der Ausstellung zu finden.

Weitere Fundorte ausser dem oben angegebenen sind für den sibirischen Graphit noch: Sernopol, Semipalatin-Distrikt; Mamontof und Tooroochansk Circ. Yenisseck, Gouw. Ost-Sibirien.

Spanien liefert feinen schiefrigen Graphit. Er wird bei Ronda in Granada, wenige Meilen vom Meere gefunden, und geht nach Holland und den Hansestädten, wo er gemahlen als Pottloth verkauft wird. Das Pfund kostet ungefähr 4 Sgr. Bleistiftmacher von Nürnberg haben während der Continentsperre spanischen Graphit mit unverhältnissmässig grossen Kosten bezogen, weil man das dortige Material für unentbehrlich hielt, in Folge dessen der Rohstoff unnützerweise vertheuert wurde. In Frankreich findet man Graphit in den Departements des Arriège und der hohen Alpen. Ausserdem wurden Graphitgruben auf Grönland, St. John in Neubraunschweig und in Californien aufgefunden.

Sehr wichtig ist die Entdeckung reicher und vorzüglicher Graphit-Lager von Pakawau in der Provinz Nelson auf Neu-Seeland 1861 durch die Gebrüder Curtis. Dieses Land hat übr-

gens wegen seines grossen Reichthums an werthvollen Mineral-Substanzen (wie Stein- und Braunkohlen, Eisen- und Chromerze) und an ausgedehnten Goldlagern eine bedeutende Zukunft, wornach es in industrieller Beziehung ein Neu-England zu werden verspricht.

Ausserdem sind Graphit-Lager in vielen Gegenden Deutschlands vorhanden. Sehr reich an solchen ist die österreichische Monarchie. Nach Franz von Hauer und F. Fötterle¹⁾ findet sich an sehr vielen Stellen in dem böhmisch-mährischen Gebirge Graphit in den krystallinischen Schiefern, meist im Gneiss, und zwar gewöhnlich in der Nähe von Lagern krystallinischen Kalksteines, oft auch in diesen selbst. Die Art des Vorkommens ist verschieden. Bald ersetzt der Graphit den Glimmer im Gneiss, so dass das ganze Gestein von diesem Minerale imprägnirt erscheint, bald findet es sich rein ausgeschieden in einzelnen Lagern oder in stockförmigen Massen, die aber oft wieder von einzelnen Feldspathparthien durchsetzt werden.

Baue bestehen zu Thumwitz und Wolfersdorf, Dapach und Marein, Brunn am Wald (wo der Graphit vorzüglich rein vorkommt), Geiereck und Amstall und Fürholz. Alle diese Werke lieferten im Jahre 1853 5864 Centner Graphit, während die gegenwärtige Gewinnung mindestens aufs Doppelte sich belaufen dürfte.

Die wichtigsten Baue in Mähren sind zu Hafnerluden und Pomíř. Die Graphitlager sind hier im Gneiss eingeschlossen und werden von krystallinischem Kalk begleitet; sie sind bei 1½ Fuss mächtig und bis zu einer Tiefe von 36 Fuss aufgedeckt. Die Decke derselben bildet meist zersetzter Gneiss, der mit zersetzter Hornblende durchzogen ist. Die Baue von Hafnerluden sind die ausgedehnteren und liefern jährlich über 4000 Centner Graphit. Ausserdem kommen reiche Baue in der Gegend von

¹⁾ Geologische Uebersicht der Bergbaue der österreichischen Monarchie. Wien, 1855.

Altstadt vor, so zu Schlägelsdorf, südöstlich von Altstadt, wo die jährliche Erzeugung nahe an 5000 Centner beträgt. Ferner finden sich Graphitlager zu Gross- und Klein-Würben, zu Holdenstein und namentlich zu Schweine, nordöstlich von Muglitz. Der Graphit ist am letzteren Orte in Begleitung von krystallinischem Kalk im Gneiss und Thonschiefer eingelagert, und von sehr guter Beschaffenheit; es werden jährlich über 8000 Centner gewonnen.

Vorzügliche Graphit-Lager finden sich bei Krumau in Böhmen. In dieser Gegend, namentlich in der den Olschbach aufnehmenden Erweiterung des Moldauthales, bildet der Graphit lange Lagerzüge im Gneiss, häufig in Verbindung mit Lagern von krystallinischem Kalk und Hornblendeschiefern. Die Graphitlager ändern sehr rasch ihre Mächtigkeit, so dass sie oft in einem Werke von einigen Fuss bis zu 7 Klafter anschwellen; die mittlere Mächtigkeit beträgt bei zwei Klafter. Eine 3—6 Fuss mächtige Torfablagerung erfüllt die ganze Thalmulde des Olschbaches und bedeckt eine ebenso mächtige Lehmschichte. Unter dieser kommt zuerst eine 2—4 Fuss mächtige Schichte eines graphitischen Gneisses, dann 6 Fuss geschichteter theils fester, theils ganz aufgelöster Gneiss mit Hornblende, endlich unmittelbar über dem Graphitlager ein geschichtetes glimmerfreies, in braune bröckliche Masse umgewandeltes Feldspath-Gestein, an mehreren Orten ein bis 5 Fuss mächtiges Kalklager; die Anzahl der durch ein Zwischenmittel von zersetztem Gneiss getrennten Graphitlager ist nicht bekannt.

Der Graphit ist vorherrschend unrein, dicht bis grobblättrig, dabei bisweilen fest, schiefrig, oft durch Quarz, Kaolin und Eisenkies verunreinigt; nur selten in ansehnlichen Massen rein, meist so gemischt, dass durch eine sorgfältige Auskuttung die Sorten geschieden werden müssen. Es werden drei Sorten unterschieden, wovon zwei sammt einem Raffinat in Handel gebracht werden. Die vorzüglichsten Baue auf Graphit bestehen zu Schwarzbach, Mugrau, Stuben. Vor mehreren Jahren kostete der Centner Graphit von Stuben 4 fl. und gingen jährlich 600—800

Centner über Passau nach Frankfurt a. M. Seit 1810 wird er auch in der Harmuth'schen Graphitstiftfabrik zu Wien und seit mehreren Jahren auch in der zu Krumau selbst errichteten verwendet. Südwestlich von Krumau finden sich die Baue zu Tattern, Eggetschlag und Rindles. Ueberdiess bestehen auf der weiteren nördlichen Fortsetzung der vorher erwähnten Graphitlager kleinere unbedeutende Versuchbaue bei Zichlern, Hubene, Reichetschlag, Hossenschlag, Reith, Kirchschlag, Passern, Podesdorf, Weisslowitz, Hoschlowitz, Pohlen, Kabschowitz und Unterbreitenstein. 1862 entdeckte der Bergbau-Besitzer Anton Merkel in Swojanow in Böhmen ein ergiebiges Graphitlager.

Ausserdem findet sich Graphit bei Kaisersberg in Steiermark und zwar im Glimmerschiefer, der in Gneiss übergeht und scheint darin den Glimmer zu ersetzen, findet sich aber auch in reineren Putzen und Massen. Er dient hauptsächlich zur Anfertigung von feuerfesten Ziegeln und von Tiegeln; zur Bleistiftfabrikation ist er zu unrein. Im Jahre 1853 wurden 1100 Centner erzeugt.

Endlich findet sich noch Graphit bei Klarnberg in Kärnten. Ein kleiner Graphitlagerzug geht am östlichen Thalgehänge in einem häufig mit Amphibolschiefer wechselnden Glimmerschiefer zu Tage. Kalksteine finden sich in der Nähe nicht vor. Der Graphit ist meist unrein, enthält viele linsenförmige Quarzmugeln und kleine Putzen von Kaolin. Die grösste Mächtigkeit, die das Lager aber nur auf kurze Strecken erreicht, beträgt 3 Fuss. Der Graphit wird meist zur Erzeugung feuerfester Ziegel verwendet. Die gegenwärtige Graphit-Produktion in Oesterreich dürfte sich auf 40—50000 Centner jährlich belaufen.

In Norddeutschland wird zu Friedrichsrode, drei Stunden von Gotha, Graphit oder Pottloth gegraben, der vorzüglich nach Hamburg geht.

Längst bekannt und schon seit Jahrhunderten im Betriebe sind die Graphitlager der Gegend von Passau. Der Graphit kommt

dort neben Porzellanerde vorzugsweise in der jüngern oder hercynischen Gneissformation (graue Gneissformation) vor. Diese zwei wichtigen Mineralstoffe sind es, welche im Passauischen durch ihre Gewinnung der Gegenstand eines sehr wichtigen und weit verbreiteten Bergbaues sind und vielen Menschen Beschäftigung gewähren, zugleich durch ihre weitere Verarbeitung (Passauer- oder Graphit-Tiegelfabriken zu Griesbach und Hafnerzell, Porzellanfabrik zu Passau) und durch ihre Versendung Industrie und Handel des Unterlandes sichtbar beleben. Der Graphit, welcher häufig als Gemengtheil neben Glimmer im Gneisse auftritt, bildet meist mit Hornblendegestein in Verbindung linsenförmige Lager und Putzen, während die Porzellanerde als Zersetzungsprodukt eines eigenthümlichen feinkörnigen granitischen Lagergesteins, dessen Feldspath — vielleicht meist Porzellanspath — besonders leicht der Umwandlung in Porzellanerde fähig ist, in dem Graphit benachbarter Lagerzüge sich vorfindet¹⁾. Das bedeutendste Graphitlager erstreckt sich von Oedhof und Kropfmühl über Pfaffenreut von Westen nach Osten in einer Länge von $\frac{3}{4}$ Stunden. Der Graphit liegt hier 48—130 Fuss tief unter der Erdoberfläche; er bildet kein ununterbrochenes Lager, sondern abwechselnde, öfters sich auskeilende oder plötzlich abbrechende Lagen von verschiedener Mächtigkeit — von einigen Zollen bis zu mehreren Fussen — auch oft in Putzen, Nestern und Nieren. Diese Lagen sind selten horizonatal; sie fallen meist unter Winkeln von 30—40° gegen N. oder gegen N.O. Ein eigenthümlicher dichter Graphit bildet die Sahlbänder; er zeigt häufig Rutschflächen. Die wichtigsten Gewinnungs-Orte sind: bei Leitzesberg (hier schon seit 4—500 Jahren), zu Pfaffenreut (wo seit ungefähr 1730 Graphit gegraben wird), zu Germansdorf (seit 1550), zu Haasdorf (seit 1780), zu Haar (seit 1791), zu Hierzing, Ratzing, Etzdorf, Pötzöd u. s. w. Die Eigenthümer der Gruben sind gewöhnlich Bauern, welche den Graphit Dagl oder auch Tachel nennen.

¹⁾ W. Gümbel, die geogn. Verhältnisse des ost-bayerischen Grenzgebirges. Bavaria. Bd. II. Abschn. 1. München, 1862.

Der bei Passau vorkommende Graphit ersetzt, wie bereits angeführt, den Glimmer eines eigenthümlichen dort brechenden Gneisses, der bis in bedeutende Tiefen durch und durch verwittert und dadurch aufgelockert ist, dass er gegraben werden kann. Was man in der dortigen Gegend unter Graphit versteht, ist ein verwitterter, bald an wahren Graphit sehr armer, bald mehr reicher Gneiss. Im Handel und in der Tiegelfabrikation verwendet man nur Sorten, die hinreichend Graphit enthalten, um die erdigen Beimengungen zu maskiren, so dass das Ganze braunschwarz, meist tiefglänzend schwarz aussieht. Der Graphit kommt daselbst in zwei wesentlich verschiedenen Sorten vor: 1) als schuppiger Graphit, der aus kleinern oder grössern glimmerartigen Blättchen besteht, welche meist zu derben, mitunter schiefrigen Massen zusammengehäuft und gewöhnlich nur locker verbunden sind, und 2) als dichter Graphit in derben, erdigen Massen, der auf dem Bruch matt, grob- oder feinkörnig ist, aber durch gelindes Reiben mit den Fingern Metallglanz bekommt. Der erdige Graphit findet sich in der Passauer Gegend von nicht besonderer Güte und wird derselbe unter dem Namen Pottloth von Böhmen eingeführt, wo er dann er als Transitgut weiter geht, theils zu Regensburg und Nürnberg zur Bleistiftfabrikation verwendet wird, wozu der schuppige durchaus unbrauchbar ist. Der bei dem Weiler Harsch schon seit langer Zeit gegrabene erdige Graphit ist nicht so fein, dass man ihn zu Bleistiften gebrauchen könnte, man versendet ihn desshalb weit, wie nach Köln u. a. O. zur Maschinenschmiere zu Formen für die Messinggiesserei u. s. w.

Der schuppige Graphit ist selten ganz rein, sondern meistens durch verwitterten Feldspath, Eisenoher und Schwefelkies verunreinigt. Besonders ist Eisen der stete Begleiter des Graphits und jenes ist als Brauneisen oft in der Menge beigemischt, dass dieser unbrauchbar wird. Es gibt Stellen, wo das Brauneisen vorherrschend wird, und in reines Eisenerz übergeht, z. B. bei Leitzesberg; häufig kommt auch Schwefelkies als Begleiter vor, und man trifft bisweilen Trümmer, wo der Schwefelkies innig mit Graphit gemengt ist. Diese Beimischung ist sehr schädlich, weil der Schwefel beim schwachen Brennen der Tiegel nicht entweicht,

sondern erst beim Schmelzen, daher erfahrene Metallurgen nie gleich Silber darin schmelzen, sondern sie zuvor stark ausglühen; das Silber würde sonst ganz spröde werden. Solchen schwefelkieshaltigen Graphit darf man nur längere Zeit an der Luft liegen lassen, wo der Schwefelkies durch Verwitterung in Eisenvitriol übergeht und dann auslaugen, so wird der Graphit zur Tiegelbereitung tauglich.

Die Graphit-Produktion der Passauer Gegend betrug im Jahre 1861 in 53 Gruben gegen 12000 Centner, wobei 45 Arbeiter beschäftigt waren. Der Centner kostet dort 3—9 fl. Regensburg hat die Hauptniederlage von Graphit, Ofenfarbe und der Hafnerzeller oder Passauer Schmelztiegeln und macht damit Geschäfte nach allen Gegenden.

Der Graphit kommt ausser in Niederbayern noch in folgenden Gegenden, resp. Orten vor, jedoch im isolirten Vorkommen und desshalb von keiner technischen Bedeutung: in der Oberpfalz, und zwar zu Gross-Klenau, am Mühlbühl; bei Plössberg, Wildau und bei Wampenhof; in Oberfranken bei Arzberg, Hohenberg, Wunsiedel und Sinnathengrün; in der Rheinpfalz im Kanton Kusel zu Didelkopf und Konken, wo der Graphit in einzelnen Parthieen im Diorit eingelagert sich findet.

Was die Entstehung und Bildung des Graphits anbelangt, so herrschen darüber unter den Fachgenossen noch verschiedene Ansichten. Ein Theil der Geologen lässt denselben auf plutonischem, ein anderer auf nassem Wege zur Bildung gelangt sein. Zu Gunsten des plutonischen Ursprungs des Graphits hat man seine Bildung beim Eisenreductions-Prozesse, wo er sich aus dem geschmolzenen Eisen in grossen, unregelmässigen Blättern im Innern der Roheisenmasse und in Blasenräumen der Eisenschlacken, sowie in Höhlen der Gestellsteine in grossen Krystallen ausscheidet, angeführt. Man will bemerkt haben, dass sich der Graphit nur in den obern Theilen der Schlacken finde, und hat daraus geschlossen, dass er sich in diesen, wie auf Gängen, Klüften, Nestern und unregelmässigen Lagern oder als Gemengtheil in krystallini-

schen, metamorphischen und selbst neptunischen Gesteinen, im dampfförmigen Zustande abgesetzt (habe¹⁾). Gegen einen solchen dampfförmigen Zustand ist indess zu erinnern, dass der Kohlenstoff in seinen verschiedenen Formen zu den feuerbeständigsten Körpern gehört. Viele Geologen, namentlich G. Bischof, sind der Ansicht, dass aller Graphit Kohlenstoff organischen und insbesondere pflanzlichen Ursprungs sei, indem die Asche (Kieselerde etc.) im Graphit, sowie sein Vorkommen im körnigen Kalk, der nur auf nassem Wege gebildet sein kann, mit Gewissheit auf seinen Ursprung aus organischen Substanzen schliessen lässt, und nehmen desshalb an, dass der Graphit nichts anderes sei, als eine von ihren flüchtigen Bestandtheilen (Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff) befreite Kohle. Ebenso liefert das Vorkommen des Graphits als Pseudomorphose einen unwiderleglichen Beweis für die Bildung dieses Minerals auf nassem Wege. Partsch und W. Haidinger haben nämlich eine solche in Formen von Eisenkies in den Meteormassen von Arva gefunden. Ganz entschieden zeigt sich die letztere Bildung des Graphits in den Kohlenlagern von Karsok im Omenaks-Fjord auf den nordgrönländischen dänischen Colonien, nach den Beobachtungen von H. Rink in Copenhagen. Auch im Steinkohlengebirge bei Cumnock in Ayrshire soll der Graphit in Lagern vorkommen.

Am Col du Chandonnet bei Briançon kommt der Graphit in lagerartigen Massen vor, welche an Steinkohlenbildungen erinnern, ja sogar von Pflanzenabdrücken begleitet sind, so dass Düfrénoy sämmtlichen Graphit für durch Feuer veränderte Kohle ausieht. Endlich hat Schafhäutl²⁾ schon vor langer Zeit ebenso die Bildung, wie die Auflösung des Graphits auf nassem Wege durch Versuche dargethan, lange bevor die Gebrüder Rogers zeigten, dass auf demselben Wege der Graphit in Kohlensäure umzuwandeln sei.

Künstlichen Graphit erhält man beim Ausschmelzen des

¹⁾ Cotta, Jahrb. f. Mineral. 1834. S. 39.

²⁾ Edinb. Philos. Mag. Vol. XV. p. 419 et Vol. XVI.

Eisens aus den Erzen in den Hohöfen (Hohofengraphit), indem das Roheisen einen Theil seines beim Schmelzen aufgenommenen Kohlenstoffs, beim Erkalten, in schwarzen glänzenden, zuweilen in ziemlich grossen Blättchen oder scharf ausgebildeten Krystallen ausscheidet. Behandelt man graues Gusseisen mit Salzsäure oder einem Gemisch aus Salzsäure und Salpetersäure, so bleibt ebenfalls Graphit in Gestalt von zarten Blättchen zurück, gemengt mit Kieselerde, welche durch Kalilauge entfernt werden kann. Der künstliche Graphit, die in allen grauen Roheisen mechanisch ausgeschiedene Kohle, verändert die Eigenschaften des Eisens nicht, und stimmt in seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften mit dem natürlichen Graphit (nur ist ersterer gewöhnlich reiner) überein, daher er auch den Namen Hohofengraphit (Eisenschäum, Gaarschäum) führt. Der Kiesel- und Eisengehalt dieses Graphits ist nur als zufällige Beimengung zu betrachten, und zwar rührt derselbe bei dem durch Auflösen von Eisen enthaltenen Graphit davon her, dass ihm eine variable Menge eines von Säuren schwer zersetzbaren Siliciumeisens beigemengt bleibt, welches in dem in grösseren Blättern auf Schlacken sitzenden nicht der Fall ist. Die Bildung des Graphits findet im Hohofen nur aus dem chemisch gebundenen Kohlenstoffe durch Zersetzung des gesättigten Kohleneisens statt, und nicht durch Zersetzung von Kohlenwasserstoffgasen. Das meiste Roheisen enthält neben chemisch gebundenem Kohlenstoff grössere oder kleinere Mengen von mechanisch beigemengten Kohlenstoff oder Graphit. Das weisse Roheisen enthält 1,51 – 5,41 Proc. gebundenen und 0,50 – 1,04 Proc. mechanisch beigemengten Kohlenstoff oder Graphit, während man im grauen Roheisen 0,40 – 2,78 Proc. gebundenen und 1,80 – 2,74 Proc. mechanisch beigemengten Kohlenstoff oder Graphit findet.

Auch in den Blasenräumen der Eisenschlacken, sowie in den Höhlen der Gestellsteine scheidet sich Graphit in grossen krystallinischen Blättern oder Krystallen ab. In noch grösserer Menge aber wird der künstliche Graphit in den Gasbereitungsanstalten gewonnen. Durch Destillation der Steinkohlen, besonders in Thonretorten, setzt sich an die Wände dieser Gefässe eine im Anfange nur messerrückendick, dann allmählig fingerdick werdende

Schicht einer äusserst festen, reinen Kohle an, welche so hart ist, dass sie, abgestossen von dem Thon, woran sie haftet, klingt wie eine Metallscheibe. Dieser Graphit ist zu hart, um zu Bleistiften verwendet zu werden; allein man bedient sich dessen vorzugsweise vor allen anderen Kohlen gerne zu den Cylindern für die von Bunsen erfundenen electrischen Batterien.

Die Bildung von künstlichem Graphit als Spaltungsprodukt gewisser Cyanverbindungen (von dem Silicium- und Borgraphit ist hier selbstverständlich Umgang zu nehmen), zuerst von Pauli im Jahr 1861 ausgeführt, hat vor der Hand nur wissenschaftliches Interesse, verdient jedoch nichts destoweniger die Beachtung der Techniker. Denn wer wollte die Möglichkeit läugnen, dass es nicht gelingen werde, zur Bleistiftfabrikation geeigneten Graphit auf künstliche Weise darzustellen, und zwar ökonomisch vortheilhaft, nachdem man gegenwärtig sogar das Naphtalin und die schweren Steinkohlentheeröle mit Vortheil auf Russ verarbeitet.¹⁾

Die Verwendung²⁾ des Graphits ist eine sehr mannfaltige; am wichtigsten jedoch ist seine Anwendung zur Darstellung der Blei- oder Graphitstifte. Die erste Anfertigung derselben geschah bald nach Auffindung der Graphitgrube in Cumberland, so dass die Bleistiftfabrikation ihren Ursprung den Engländern zu verdanken hat, welche zuerst den Graphit aus der genannten Grube zu Bleistiften verwendeten. Zur Darstellung der Bleistifte gab es in früherer Zeit zwei verschiedene Methoden: nach der einen, welche die Herstellung „ächter englischer Bleistifte“ zum Zweck hatte, zerschnitt man den rohen Cumberland-Graphit mittelst einer Sägen in entsprechende Stückchen, die ohne weiteres Zuthun in Holz gefasst wurden. Diese natürlichen Cumberland-Stifte waren von ausgezeichneter Qualität und erfreuten sich eines vorzüglichen Rufes. Nach dem zweiten, weit mehr verbreiteten Ver-

¹⁾ R. Wagner, die Bleistifte auf der Londoner Ausstellung.

²⁾ Da der für die diesjährigen Abhandlungen bestimmte Raum bereits überschritten ist, so kann der über die Verwendung handelnde Abschnitt hier nur in aller Kürze gegeben werden. Es wird daher die ausführlichere Beschreibung im nächsten Bande folgen.

fahren, welches sich mit der Fabrikation „künstlicher Bleistifte“ abgab, verarbeitete man theils die Abfälle der achten Bleistifte, theils auch den in Deutschland an verschiedenen Orten sich findenden erdigen und staubförmigen Graphit. Entweder machte man daraus unter Zusatz eines Bindemittels grössere dichte Massen, welche nach dem Trocknen ebenso wie der natürliche Graphit in Stifte zerschnitten wurden; oder man formte, was leichter und bequemer war, die Stifte unmittelbar aus der noch weichen Masse. Die Hauptschwierigkeit in der Verfertigung derartiger künstlicher Bleistifte lag immer darin, ein solches Bindemittel zu finden, welches den Graphit in eine dichte Masse verwandelte, ohne die Eigenschaft des Abfärbens zu nehmen. Als Bindemittel verwendete man Schwefel, graues Schwefelantimon, Colophonium, Leim und arabisches Gummi. Alle diese Compositionen lieferten aber wenig brauchbare Stifte. Endlich machte 1795 der Franzose Nicolas Jacques Conté (geb. den 4. Aug. 1755 zu St. Cénéri, bei Séz, Normandie, gest. den 6. Dec. 1806 zu Paris), welcher früher Porträtmaler, dann Mechaniker, später Direktor der aërostatischen Schule zu Meudon war, und mit seinem Schwiegersohn Humblot in Paris eine Bleistiftfabrik leitete, eine Erfindung, die der Bleistiftfabrikation in kurzer Zeit eine neue Gestalt und einen neuen grossartigen Aufschwung geben sollte, wodurch alle früheren Darstellungs-Methoden verdrängt wurden.

Die wichtige Erfindung bestand darin, durch Zusatz von Thon zum Graphit und geeignetes Ausglühen der geformten Stengel nicht nur eine wesentliche Ermässigung des Preises, sondern auch eine allen Anforderungen des Bedarfs entsprechende Mannigfaltigkeit der Sorten nach Härte und Färbung zu erzielen. Auf Grund dieser Methode hat sich jetzt die Bleistiftfabrikation zu einem der bedeutendsten Gewerbs-Zweige entfaltet, in welchem die Nürnberger Industrie, vertreten durch die allgemein und rühmlichst bekannten Firmen: A. W. Faber, Städler, Grossberger u. Kurz, Gutknecht, Fröscheis u. s. w. einen hervorragenden Platz einnimmt.

Wegen seiner Unschmelzbarkeit ist der Graphit besonders

geeignet zur Herstellung der bekannten schwarzen Passauer Schmelztiegel, sowie von Muffeln, Windröhren, Sandbadschalen, feuerfesten Ziegeln, Kochgeschirren, Waschkesseln, Sparrheerden, Ofenplatten, ja selbst Stubenöfen. Derselbe dient ferner in seinen geringeren Sorten als rostschtzender Anstrich für eiserne Oefen (Ofenschwärze), sowie als dauerhafte Anstrichfarbe für Holz, Thon etc. Mit dem feinsten Graphitstaub färbt man Backenbärte oder man wendet ihn als Schminke an; auch in der Medicin findet solcher Anwendung. Durch Zusammenreiben von auf's feinste gepulvertem Graphit zu 6 Theilen, von zu feinem Pulver gelöschtem Kalk zu 3 Theilen, und von gemahlenem Schwerspath zu 8 Theilen mit gekochtem Leinöl zu 3 Theilen erhält man einen ausgezeichneten, luftdichten Graphitkitt für Dampfkessel und Gasröhren. Was die Passauer oder Hafnerzeller Schmelztiegel anbelangt, so werden diese vorzugsweise zu Hafnerzell bei Passau aus einem Gemenge von Thon und Graphit auf der Töpferscheibe verfertigt und von da aus in alle Theile der Welt versendet. In neuerer Zeit werden dieselben jedoch auch an verschiedenen Orten Böhmens, in Nürnberg und besonders in England dargestellt. Die Passauer Tiegel sind schon seit den ältesten Zeiten bekannt, und deren Feuerbeständigkeit wird schon von Georg Agricola (eigentlich Bauer, 1490—1555) gerühmt. Die Vorzüge dieser Tiegel bestehen darin, dass sie den grössten und schroffsten Temperaturwechsel, ohne zu reissen, ertragen können; sie lassen sich wiederholt und zwar so oft gebrauchen, bis sie durch Wegbrennen des Graphits zu schwach geworden sind, um den Griff der Zange und das Gewicht des Metalls zu ertragen. Diese Tiegel sind auch bei weitem dichter als die besten hessischen, und werden desshalb auch beim Gold- und Silberschmelzen fast ausschliesslich angewendet, weil man durch ihre geringe Porosität nicht so viel Metall verliert.

Ferner wird der Graphit benutzt zur Verminderung der Reibung an Maschinen etc., wobei er entweder als sehr feines Pulver oder mit Fett angerührt in Anwendung kommt. Der Graphit lässt sich sogar im fein geschlämmten Zustande, statt des Oels, für die Zapfen feiner Uhren, selbst Chronometer anwenden.

Endlich findet der Graphit eine ausgedehnte Anwendung in der Galvanoplastik. Wichtig war in dieser Beziehung die im Jahre 1840 von John Murray gemachte Beobachtung, dass man das Kupfer auch auf nicht leitende Substanzen niederschlagen könne, wenn man sie vorher mit Graphit überzieht und so für den galvanischen Strom leitend macht. Hierdurch konnte die Galvanoplastik die verschiedenartigsten und ausgedehntesten Anwendungen erhalten, da man die Formen aus mancherlei Substanzen, wie Stearin, Wachs, Gyps, Guttapercha etc. zu verfertigen vermochte. Charles Walkes wendet den Graphit zur Darstellung von platinisirten Graphit-Batterien an, und es werden diese schon seit längerer Zeit mit grossem Erfolg und vielem Vorthail, besonders für den electrischen Telegraphen der engl. südöstlichen Eisenbahn-Compagnie, benutzt.

U. E. Sebald'sche Buchdruckerei in Nürnberg.

ABHANDLUNGEN
der
NATURHISTORISCHEN
GESELLSCHAFT
zu
NÜRNBERG.

III. B a n d. II. H ä l f t e.

NÜRNBERG.
Wilhelm Schmid.
Sm 1866.

Druck von Bieling (J. P. W. Dietz) in Nürnberg.

VORWORT.

Die Kriegsfackel, die in diesem Jahre unser Vaterland durchzog, und manches Leben und manche Hoffnung zu Grabe gebracht hat, war auch in soferne nicht ohne Rückwirkung auf unsere Gesellschaft geblieben, als die Herausgabe des vorliegenden Heftes „Abhandlungen“ eine Verzögerung erfuhr. Hierzu kam noch die Anfertigung der beigegebenen Tafeln, die ebenfalls eine etwas längere Zeit in Anspruch nahm, so dass wir dasselbe, statt, wie früher üblich, im Sommer, erst jetzt zur Versendung bringen können.

Der Mitgliederstand der Gesellschaft hat in den letzten 2 Jahren nur unwesentliche Schwankungen erfahren. Derselbe zählt gegenwärtig 45 Ehrenmitglieder, 64 correspondirende und 212 ordentliche Mitglieder, die in nachstehendem Verzeichnisse namentlich aufgeführt sind. Es fanden innerhalb dieser Zeit, resp. in den beiden Winterhalbjahren, 57 Versammlungen statt, und wurden 28 wissenschaftliche

IV

Vorträge gehalten. Da die Gesellschaft allwöchentliche Zusammenkünfte hat, so wurden jene Abende, an denen kein selbstständiger Vortrag stattfand, durch Discussionen über naturwissenschaftliche Gegenstände ausgefüllt, zu welchen der in der Gesellschaft eingeführte Fragekasten meist reiches Material bot. —

Nürnberg im November 1866.

Dr. med. Baierlacher.

Verzeichniss
der
Mitglieder der naturhistorischen Gesellschaft
zu Nürnberg
im April 1866.

Direktorium der Gesellschaft.

- Direktor: Dr. med. Ed. Balerlacher, praktischer Arzt.
I. Sekretär: Dr. med. Wilhelm Merkel, praktischer Arzt.
II. Sekretär: Dr. med. Wilh. Fuchs, praktischer Arzt.
Bibliothekar: Dr. H. Weger, Professor an der k. Kreisgewerbsschule.
Conservator: C. Clauss, Kaufmann.
Cassier: C. H. Klinger, Kaufmann.
-

Ehrenmitglieder.

- Se. Königliche Hoheit Maximilian, Herzog in Bayern.
Se. Durchlaucht Maximilian, Prinz von Wied-Neuwied.
-

- Herr Dr. A. Bello. Rektor der Akademie an der Universität zu Santiago de Chile.
„ Dr. C. G. C. Bischof, k. preuss. Geh. Bergrath und ord. Professor der Chemie und Technologie etc. in Bonn.
„ Dr. A. Braun, Professor der Botanik an der Universität und Direktor des k. botan. Gartens und des k. Herbariums zu Berlin.
„ B. S. Castellanos, Direktor der k. archäolog. Akademie und General-Direktor der Normal-Schulen des Königreichs Spanien zu Madrid.

VI

Herr Dr. **J. Domeyko**, Professor zu Santiago in Chile.

- „ **J. Duval Jouve**, Inspektor der Akademie zu Strassburg und Mitglied der botanischen Gesellschaft von Frankreich.
- „ **Dr. L. J. Fitzinger**, Direktor des zoolog. Gartens in München.
- „ **Dr. F. Flügel**, Privatgelehrter in Leipzig.
- „ **Dr. H. R. Göppert**, k. preuss. Geh. Medicinalrath, Professor der Medicin und Botanik, Präses der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur zu Breslau.
- „ **Dr. F. E. Guérin-Meneville**, Professor u. Direktor der Cuvier'schen Gesellschaft zu Paris.
- „ **Dr. W. Haidinger**, k. k. Hofrath und Direktor der k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien.
- „ **Dr. L. Ritter von Henfler**, k. k. wirklicher Kämmerer, Verwaltungsrath beim Staatsministerium, Vicepräsident des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien.
- „ **A. J. Jäckel**, k. Pfarrer in Sommersdorf.
- „ **Dr. J. R. L. Comte de Kerkhove**, dit van der Varent, Präsident der Archäolog. Akademie Belgiens und Vicepräsident der k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Antwerpen.
- „ **Dr. F. von Kobell**, Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates und Professor der Mineralogie an der k. Universität zu München.
- „ **F. Lambrecht**, k. holl. Hauptmann in Sumatra.
- „ **Professor Dr. Freiherr J. von Liebig**, Vorstand der k. Akademie der Wissenschaft etc. zu München.
- „ **Dr. Lindermeyer**, Leibarzt Sr. Maj. des Königs von Griechenland.
- „ **Dr. C. F. P. von Martius**, k. b. Geh. Rath, Präsident der k. bayer. botan. Gesellschaft zu Regensburg etc. zu München.
- „ **Dr. Mettenius**, Professor der Botanik und Direktor des k. botan. Gartens zu Leipzig.
- „ **Dr. H. von Mohl**, Professor der Medicin und Botanik an der k. Universität und Direktor des botan. Gartens zu Tübingen.
- „ **Dr. J. G. Morris**, Pastor zu Baltimore.
- „ **Dr. J. W. Freiherr von Müller**, Privatgelehrter zu Paris, ehem. k. k. österr. General-Consul für Central-Afrika.
- „ **Dr. K. Müller**, Privatgelehrter zu Neustadt an der Saale.
- „ **Dr. R. A. Philippl**, Professor an der Akademie zu Santiago de Chile.
- „ **Dr. E. Pöppig**, Professor der Zoologie und Direktor des naturhistor. Museums an der k. Universität zu Leipzig.

VII

- Herr Dr. J. G. L. Reichenbach**, k. sächs. Hofrath, Professor der Botanik, Direktor des k. zoolog. und mineralog. Museums und des botan. Gartens zu Dresden.
- „ **Dr. Carl von Renard**, k. russischer Staatsrath, Sekretär der kais. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau.
- „ **Dr. J. A. Ried**, praktischer Arzt zu Valparaiso in Chile.
- „ **Dr. F. F. Runge**, Professor der Gewerbkunde zu Oranienburg.
- „ **Dr. P. Savi**, Professor zu Pisa.
- „ **Dr. A. von Schauss-Kempfenhausen**, k. griechischer Consul in München.
- „ **Dr. H. Freiherr von Schlagintweit**, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ **Dr. R. Freiherr von Schlagintweit**, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ **Dr. M. J. Schleiden**, grossherzogl. Sachsen-Weimar'scher Hofrath, Professor der Botanik zu Dorpat.
- „ **Dr. A. Schnizlein**, Professor der Botanik und Direktor des botan. Gartens an der k. Universität zu Erlangen.
- „ **A. Senoner**, Bibliothekscustos der k. k. zoologischen Reichsanstalt zu Wien.
- „ **Dr. C. T. E. von Siebold**, Professor der Zoologie an der k. Universität und 1. Conservator der zoolog.-anatom. Sammlungen des Staates zu München.
- „ **Dr. C. A. Steinhell**, k. bayer. Ministerialrath, Conservator der mathemat.-physical. Sammlungen des Staates und Professor der Mathematik an der Universität zu München.
- „ **Dr. W. F. R. Suringer**, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens zu Leyden.
- „ **Dr. C. M. Tallavania** zu Laibach.
- „ **K. Freiherr von Zu-Rhein**, k. bayer. Reichsrath und Regierungs-Präsident von Oberbayern zu München.
- „ **B. L. F. von Voltz**, Exc., k. bayer. wirkl. Staatsrath etc. zu München.

Correspondirende Mitglieder.

- Herr A. D. Bache**, Professor und Superintendent United Staats Coast, Survey in Washington.
- „ **Dr. Spencer F. Baird**, Professor und Secretär am Smithsonian-Institut zu Washington.

VIII

- Herr Dr. **A. Besnard**, k. Regiments- und prakt. Arzt zu München.
- „ Dr. **B. Boll** in Neubrandenburg.
- „ **J. F. Caffisch**, ehemal. Sekretär des naturhistorischen Vereins in Augsburg.
- „ Dr. **Calvi**, Professor in Genua.
- „ Dr. **Stephan della Chiaje**, prakt. Arzt und Professor der Medicin an der Universität zu Neapel.
- „ **José Maria Latino Coelho**, Sekretär der k. Academie der Wissenschaften in Lissabon.
- „ Dr. **H. Döbner**, Herzogl. Sachs.-Meining. Medicinalrath und Hofmedicus in Meiningen.
- „ Dr. **O. Döpping**, Chemiker zu Moskau.
- „ Dr. **Th. Domplerré**, k. bayer. Regimentsarzt.
- „ **L. Dufour** zu S. Sever.
- „ Dr. **J. Dumas**, Professor der Medicin an der Universität zu Montpellier.
- „ **K. Ehrlich**, Ausschussmitglied und Custos des Museum Franzisko-Carolinum in Linz.
- „ Dr. **F. Emmert**, k. Pfarrer zu Schweinfurt.
- „ Dr. **J. A. A. Erlenmeyer**, prakt. Arzt, Direktor und Oberarzt der Privat-Heilanstalt für Gehirn- und Nervenkrankheiten zu Bendorf bei Coblenz.
- „ Dr. **A. L. A. Fée**, Professor der Botanik und Pharmacie an der medic. Facultät, Director des botan. Gartens zu Strassburg.
- „ **J. G. Fehr**, Lehrer in Gunzenhausen.
- „ Dr. **A. Fischer von Waldheim**, wirkl. kaiserl. russ. Staatsrath und Vice-Präsident der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau.
- „ **Franz Foetterle**, k. k. Bergrath, erster Sekretär der k. k. geograph. Gesellschaft zu Wien.
- „ **Georg Ritter von Frauenfeld**, erster Sekretär der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien.
- „ Dr. **S. Friedmann**, quiesc. k. niederländ. Militärarzt und prakt. Arzt in München.
- „ **L. Frischmann**, k. zweiter Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates zu München.
- „ **K. Fuss**, Professor zu Hermannstadt in Siebenbürgen.
- „ Dr. **S. S. Haldemann**, Professor zu Columbia in Pensylvanien.
- „ **J. Hall**, Staatsgeolog von Iowa und Paläontolog für die Staaten New-York, Albany etc.
- „ **F. Ritter von Hauer**, k. k. Bergrath und erster Reichsgeolog bei

IX

der k. k. geolog. Reichsanstalt, Vice-Präsident des zoolog. botanischen Vereins zu Wien.

Herr Dr. Th. von Heldreich.

- „ **Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer**, k. Stadtgerichtsarzt und Director des zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg.
- „ **Dr. med. Heidenschreider**, prakt. Arzt in Herrieden.
- „ **Dr. J. Hoffmann**, Verlagsbuchhändler zu Stuttgart.
- „ **A. le Jolis**, Botaniker, Stifter, Präsident und beständiger Sekretär der kaiserl. naturwissenschaftl. Gesellschaft zu Cherbourg.
- „ **H. Koch**, Director des zoologischen Museums zu Triest
- „ **Dr. C. R. König**, Lehrer an der Realschule und Adjunct am I. Univers.-Laboratorium zu Leipzig.
- „ **Dr. E. Kratzmann**, prakt. Arzt zu Marienbad.
- „ **Dr. H. C. Klüster**, Vorstand des k. Telegraphenamtes zu Bamberg.
- „ **Dr. W. Lachmann**, Professor zu Braunschweig.
- „ **Dr. C. B. F. Merklein**, Professor zu Schaffhausen.
- „ **Dr. J. Milde**, ordentl. Lehrer der Naturwissenschaften und Botanik an der zweiten höhern Bürger- und Realschule zu Breslau.
- „ **Dr. J. Müller**, fürstl. waldeckischer Medicinalrath, Vice-Director des norddeutschen Apotheker-Vereins zu Berlin
- „ **Dr. W. Müller**, ordentl. Professor an der Universität Jena.
- „ **Dr. A. Mousson**, Präsident der naturhist. Gesellschaft zu Zürich.
- „ **Dr. G. D. Nardo**, Director der k. k. Findelhäuser in Venedig.
- „ **J. Natterer**, Kustos am k. k. Hof-Naturalienkabinet zu Wien.
- „ **Dr. A. A. von Pallardi**, fürstl. reuss.-schleiz. Medicinalrath und Badearzt zu Kaiser-Franzenbad in Böhmen.
- „ **Dr. Rehm**, prakt. Arzt zu Markt Sugenheim.
- „ **V. B. Rosales**, chilenischer General-Consul zu Hamburg.
- „ **Dr. P. Savi**, Professor, Director des Museums zu Pisa.
- „ **Dr. C. H. Schauenburg**, prakt. Arzt und Privatdocent an der k. Universität zu Bonn.
- „ **Dr. A. Schenk**, Prof. der Botanik an der Universität zu Würzburg.
- „ **Dr. A. Schilling**, prakt. Arzt in München.
- „ **Dr. C. F. Schimper**, Privatgelehrter zu Schwetzingen.
- „ **Dr. F. Schlegel**, prakt. Arzt zu Altenburg.
- „ **F. J. Schmidt**, Privatier zu Schischka bei Laibach.
- „ **Dr. C. H. Schultz**, Bipontinus, Hospitalarzt und Director der naturf. Gesellschaft „Polichia“ zu Deidesheim.
- „ **Dr. Karlos Segeth**, zu Santiago in Chilo.
- „ **Dr. A. Skovitz**, Herausgeber der österr. Wochenschrift in Wien.

X

Herr **Fr. Tempsky**, Buchhändler in Prag.

- „ **V. Graf von Trevisan**, Privatgelehrter zu Padua
 - „ **Dr. med. Ullersperger**, herzogl. leuchtenbergischer Leibarzt und prakt. Arzt in München.
 - „ **Dr. P. J. Vallez**, Direktor des ophthalmischen Instituts zu Brüssel.
 - „ **Dr. R. Wagner**, Professor an der k. Universität zu Würzburg.
 - „ **F. Winkler**, k. Regierungs- und Kreisforstrath in Ansbach.
 - „ **G. C. Wittstein**, Professor in München.
-

Ordentliche Mitglieder.

Herr **Dr. med. Ed. Baierlacher**, prakt. Arzt.

- „ **J. A. G. Bäumler**, Kaufmann.
- „ **Dr. med. Ad. Barthelmess**, prakt. Arzt.
- „ **J. F. Bauer**, Oberlehrer.
- „ **C. F. Beck**, privatisirender Apotheker.
- „ **A. Beckh**, Kaufmann.
- „ **Dr. med. W. Beckh**, prakt. Arzt.
- „ **Dr. Beeg**, kgl. Gewerbskommissär.
- „ **H. Benker**, Fabrikant.
- „ **O. Berger**, Kaufmann.
- „ **Dr. med. et philos. E. Freiherr von Bibra**, Gutsherr auf Schwebheim in Unterfranken.
- „ **Dr. med. J. M. Birkmeyer**, prakt. Arzt.
- „ **Fr. Bleicher**, Kaufmann.
- „ **C. A. Braun**, Besitzer der Joh. Phil. Raw'schen Buchhandlung.
- „ **A. von Bressensdorf**, k. Bahnbeamter.
- „ **Chr. Burger**, k. geistlicher Rath und Stadtpfarrer.
- „ **J. Campe**, Besitzer der Apotheke zur goldenen Kugel
- „ **C. Clauss**, Kaufmann.
- „ **Edm. Clauss**, Kaufmann.
- „ **J. C. Clericus**, Kaufmann.
- „ **P. Cnopf**, Banquier.
- „ **G. Demmler**, Kaufmann.
- „ **L. Dengler**, Lehrer an der k. Kreisgewerbschule.
- „ **J. P. W. Dietz**, Buchdruckereibesitzer.
- „ **C. Drexel**, k. Rechtsanwalt.
- „ **G. Drittl**, k. Bankhauptbuchhalter.

XI

Herr J. Eberhard, Inspektor am germanischen Museum.

- „ **Dr. philos. Ed. Ebermayer, Chemiker.**
- „ **W. F. Echt, Flaschnermeister**
- „ **E. Eckart, Besitzer der Apotheke zum heiligen Geist.**
- „ **S. K. Th. Eisen, qu. k. Revierförster.**
- „ **C. Engel, Verwalter am landwirthschaftl. Institut zu Lichtenhof.**
- „ **C. Engelhard, Rechtsrath.**
- „ **C. J. F. A. Engelhard, Privatier.**
- „ **Fr. Erb, Kaufmann.**
- „ **A. Ertheller, Kaufmann.**
- „ **W. Ewald, k. Forstgehilfe.**
- „ **J. Falk, Fabrikbesitzer.**
- „ **A. Falke, k. Forstamtsaktuar.**
- „ **Dr. L. Feuerbach, Privatgelehrter.**
- „ **E. Feuerlein, Kaufmann.**
- „ **A. Firsching, Professor an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule**
- „ **A. Förderreuther, Buchhalter.**
- „ **J. Förderreuther, Kaufmann.**
- „ **R. Förster, Privatier.**
- „ **Chr. von Forster, Kaufmann.**
- „ **Freytag, k. Handelsappellationsgerichtsath.**
- „ **F. Friedrich, Besitzer der Apotheke zu St. Johannis.**
- „ **Chr. Fuchs, Kaufmann.**
- „ **P. Chr. Fuchs, Fabrikbesitzer.**
- „ **Dr. med. W. Fuchs, prakt. Arzt.**
- „ **J. Fuchs, Kaufmann.**
- „ **G. Gagstetter, Kaufmann.**
- „ **J. Gallimbertl, Hotelbesitzer.**
- „ **H. Gebhardt, Fabrikbesitzer.**
- „ **L. Gebhardt, Kaufmann.**
- „ **C. von Gemming, pens. k. Obrist.**
- „ **P. Gessner, Kaufmann.**
- „ **L. Göschel, Apotheker.**
- „ **G. F. Gonnermann, Kaufmann.**
- „ **F. M. Gürster, Kaufmann.**
- „ **Dr. R. Hagen, Fabrikbesitzer.**
- „ **J. Hahn, Fabrikbesitzer.**
- „ **K. Hammerschmidt.**
- „ **C. Ritter von Haubner, Rittergutsbesitzer.**
- „ **Dr. A. Fr. Hauck, k. Professor am Realgymnasium.**

- Herr Dr. H. Hauck, Lehrer an der Handelsschule.
- „ J. G. Haenpler, Lehrer.
 - „ A. Heerdegen, Kaufmann.
 - „ E. W. Hektor, Sekretär am germanischen Museum.
 - „ J. Fr. Heller, Mechaniker.
 - „ G. Herforth, Kaufmann.
 - „ Ch. W. Hergenröder, Fabrikant.
 - „ Dr. Fr. Herold, k. Gymnasialprofessor.
 - „ Fr. Hertel, Kaufmann.
 - „ L. Hessenauer, Besitzer der Paradiesapothek.
 - „ Hirscheider, Kunstgärtner.
 - „ N. Hoffmann, Mechaniker.
 - „ J. H. Hofmann, Privatier.
 - „ K. Hofmann, k. Professor an der Kreisgewerbschule.
 - „ C. S. Freiherr von Holzschuher, k. k. Hauptmann.
 - „ G. Huber, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
 - „ H. Jungmann, Kaufmann.
 - „ Kaussler, Direktor des Gaswerks.
 - „ A. A. Keerl, Kaufmann.
 - „ Dr. philos. J. Kern, Chemiker.
 - „ Kellein, k. Forstamtsaktuar.
 - „ Dr. J. C. Kellermann, k. Rektor an der Kreis-Landwirthschaftsschule.
 - „ Dr. J. G. Kellermann, k. Professor an der Kreis-Landwirthschaftsschule.
 - „ H. F. E. Kieser, herzogl. leuchtenberg. Bergmeister.
 - „ Dr. philos. H. Kleemann, Besitzer der Marienapothek.
 - „ C. H. Klinger, Kaufmann.
 - „ Fr. Knapp, Kaufmann.
 - „ Dr. med. L. C. Koch, prakt. Arzt.
 - „ Ad. Köllner, Buchhändler.
 - „ A. Kohn, Banquier.
 - „ J. Kohn, Banquier.
 - „ Dr. A. R. J. König, quiesc. Lehrer an der Handelsschule.
 - „ Th. Krafft, k. Studienlehrer.
 - „ A. Krage, Mechaniker.
 - „ G. Kröner, Lehrer am k. landwirthschaftl. Institut zu Lichtenhof.
 - „ Dr. med. A. Küttlinger, k. Bezirksarzt.
 - „ W. Lamprecht, Fabrikbesitzer.
 - „ J. A. Langhans, Seiden- und Damastweber.

- Herr Dr. med. **Leupoldt**, prakt. Arzt.
- „ **C. Leydel**, k. Betriebs-Ingenieur.
 - „ **J. Leykam**, Kaufmann.
 - „ **Fr. Freiherr von Löffelholz**, k. Revierförster zu Lichtenhof.
 - „ **J. L. Lotzbeck**, Buchhändler.
 - „ Dr. med. **M. Maas**, prakt. Arzt.
 - „ **K. Mahla**, Fabrikbesitzer.
 - „ **K. Mandel**, Kaufmann.
 - „ **Th. Martin**, Techniker.
 - „ **F. C. Meyer**, k. Professor an der Kunstschule.
 - „ **W. Merck**, Kaufmann.
 - „ **C. S. Merkel**, Besitzer der Apotheke zum Mohren.
 - „ Dr. med. **Gottl. Merkel**, prakt. Arzt.
 - „ **G. Merkel**, Fabrikbesitzer.
 - „ Dr. med. **Wilh. Merkel**, prakt. Arzt.
 - „ **L. Merklein**, Lebküchner.
 - „ **Th. Merz**, Chemiker.
 - „ **J. F. Methsieder**, Lehrer.
 - „ **F. Minnerow**, Privatier.
 - „ **E. Model**, Privatier.
 - „ **A. Nar**, Gutsbesitzer in Zirndorf.
 - „ **P. Nar**, Gutsbesitzer in Zirndorf.
 - „ **A. zur Nedden**, Zahnarzt.
 - „ Dr. philos. **J. Neger**, Fabrikbesitzer.
 - „ **J. G. Nudinger**, Kaufmann.
 - „ Dr. philos. **Th. Oppler**, Fabrikbesitzer.
 - „ **R. Pabst**, Fabrikbesitzer.
 - „ **C. Paraviso**, Kaufmann.
 - „ **G. A. von Pattberg**, k. Forstwart zu Mögeldorf.
 - „ Dr. med. **H. Freiherr von Pechmann**, prakt. Arzt.
 - „ **M. G. Pfann**, Lehrer.
 - „ **C. Pfeiffer**, Kaufmann.
 - „ **J. H. Pfeiffen**, Kaufmann.
 - „ **H. Pretscher**, Optikus.
 - „ **C. Probst**, Photograph.
 - „ **C. Puscher**, Privatier.
 - „ **W. Puscher**, Privatier, Marktsadjunkt und Handelsappellationsgerichts-Assessor.
 - „ Dr. philos. **G. Bauhenzahner**.
 - „ **A. Raum**, Kaufmann.

Herr **J. Reissig**, Kaufmann.

- „ **Reissinger**, k. Bezirke-Ingenieur.
- „ **Dr. med. H. Reuter**, k. Bezirksgerichtsarzt.
- „ **J. M. M. Richter**, Kaufmann.
- „ **Fr. Riemann**, Privatier und Gutsbesitzer.
- „ **Ritter**, Besitzer der Apotheke in Gostenhof.
- „ **C. H. Römhild**, Kaufmann.
- „ **M. Rosenschon**, Professor an der k. Kreisgewerbschule.
- „ **Th. Rüll**, Buch- und Kunsthändler.
- „ **L. Schäffer**, Oberlehrer.
- „ **N. Schaptag**, Feingoldschlagler.
- „ **J. H. Scharrer**, Kaufmann.
- „ **Scheldemandel**, privatis. Apotheker.
- „ **J. Schaitberger**, Kunstdrechsler.
- „ **A. Schilling**, Kaufmann.
- „ **W. Schmid**, Buchhändler.
- „ **Chr. Schmidmer**, Kaufmann.
- „ **L. Schmidmer**, Kaufmann.
- „ **A. Schmidt**, Zahnarzt.
- „ **E. Schmidt**, Landgerichtsthierarzt.
- „ **F. Schmidt**, Kaufmann in Cadolzburg.
- „ **J. Schmidt**, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ **Dr. juris W. Schmidt**, Privatier.
- „ **Schüberlein**, Fabrikdirektor.
- „ **Cand. theolog. F. Schönberg**, Lehrer an der Handelsschule.
- „ **E. A. von Schorn**, Privatier.
- „ **H. Schrag**, Buchhändler.
- „ **Th. Schröder**, Lehrer der Mathematik am k. Gymnasium.
- „ **E. J. G. Schrodt**, k. Regierungsrath und Stadtkommisär.
- „ **J. C. D. von Schwarz**, Kaufmann.
- „ **K. Schwarz**, städtischer und Bezirks-Thierarzt.
- „ **L. von Schwarz**, Kaufmann.
- „ **U. E. Sebold**, Buchdruckereibesitzer.
- „ **Dr. G. Seelhorst**, Lehrer an der Handelsschule.
- „ **G. Seitz**, Fabrikbesitzer.
- „ **Seufferheld**, Kunstgärtner.
- „ **H. von Sicherer**, Chemiker.
- „ **Dr. med. Solger**, prakt. Arzt.
- „ **A. Solger**, Kaufmann.
- „ **J. Stief**, Spielwaarenfabrikant.

Herr Dr. C. Stölzel, Professor an der k. Kreisgewerbsschule.

- „ E. von Stromer, Oekonom.
- „ E. Ph. Thiess, Kaufmann.
- „ C. Tölke, Kunstgärtner.
- „ M. Völkel, Oberlehrer.
- „ C. Voit, Chemiker.
- „ E. Vollrath, Kaufmann.
- „ Wagemann, k. hannov. Steuerinspector.
- „ Dr. med. Th. Weber, prakt. und Kurarzt in Streitberg.
- „ Dr. H. Weger, Professor an der k. Kreisgewerbsschule.
- „ J. A. Weiss, Kaufmann.
- „ M. Weiss, Fabrikbesitzer.
- „ Fr. Weigel, Commis.
- „ G. L. Weigel, Kaufmann.
- „ C. J. G. Freiherr von Welser, Rittergutsbesitzer.
- „ J. E. Weltrich, freiherrl. von Tucher'scher Administrator.
- „ G. Wheeler, Consul der vereinigten Staaten von Nordamerika.
- „ J. Werther, Fabrikbesitzer.
- „ J. F. Weyssel, Besitzer der Apotheke zum goldnen Stern.
- „ Dr. med. Winkler, k. Bezirksarzt.
- „ A. Wolf, Oberlehrer.
- „ L. K. Wucherer, k. Bezirks-Maschinenmeister.
- „ J. B. Wünsch, Kaufmann.
- „ K. Wünsch, Commis.
- „ E. Zahn, Kaufmann.
- „ J. Zeltner, Fabrikbesitzer.
- „ J. Zeltner jun., Kaufmann.
- „ H. Zeltner, Fabrikbesitzer.
- „ Fr. Zöblisch, Chemiker.
- „ A. Zöllner, Kaufmann.

I n h a l t.

	Seite
Die Algenflora des mittleren Theiles von Franken (des Keupergebietes mit den angrenzenden Partien des jurassischen Gebietes) enthaltend die bis jetzt vom Autor in diesem Gebiete beobachteten Süßwasseralgen und die Diagnosen und Abbildungen von 51 vom Autor in diesem Gebiete entdeckten neuen Arten und drei neuen Gattungen. Von Paul Reinsch	1
Beiträge zu der Lehre von der thierischen anomalen Mannweiblichkeit (Gynandro-Morphismus). Von Andreas Johannes Jäckel, k. Pfarrer in Sommersdorf	239
Resultate der meteorologischen Beobachtungen in Nürnberg in den Jahren 1864 und 1865. Von Dr. Küttlinger, k. Bezirksarzt	269

Die Algenflora

des

mittleren Theiles von Franken

(des Keupergebietes mit den angrenzenden Partien des jurassischen Gebietes)

enthaltend die vom Autor

bis jetzt in diesen Gebieten beobachteten Süßwasseralgen

und die

Diagnosen und Abbildungen von ein und fünfzig vom Autor in diesem Gebiete
entdeckten neuen Arten und drei neuen Gattungen

von

Paul Reinsch,

der kaiserl. russischen Akademie der Naturforscher in Moskau, der königl. bayer.
botanischen Gesellschaft in Regensburg, der schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft, der physikalisch-medizinischen Gesellschaft in Würzburg, der natur-
historischen Gesellschaften in Nürnberg, Bamberg, Freiburg i. Br., Altenburg i. S.,
Basel etc. wirkl., aktivem oder Ehrenmitglieder.

Mit 13 Tafeln.

Verzeichniss

der in dieser Algenflora von Franken beschriebenen und abgebildeten im Gebiete entdeckten neuen und unbeschriebenen Arten und Gattungen.

	Seite
Diatomaceae.	
Nitschia franconia. P. Reinsch. Taf. I. Fig. I.....	26
Melosira Pfaffiana. P. Reinsch. Taf. I. Fig. II.....	11
Achnanthidium naviculoides. P. Reinsch. Taf. I. Fig. VII.....	16
Chroococcaceae.	
Gloeocapsa conspicua. P. Reinsch. Taf. I. Fig. IV.....	33
Tetrapedia Crux Michaeli. P. Reinsch (n. g.) Taf. I. Fig. VI.....	38
Tetrapedia gothica. P. Reinsch. Taf. II. Fig. I.....	37
Nostochaceae.	
Anabaina gelatinosa. P. Reinsch. Taf. I. Fig. V.....	41
Scytonemaceae.	
Calothrix synplocoides. P. Reinsch.....	51
Tolypothrix rhyzomatoidea. P. Reinsch. Taf. I. Fig. III.....	52
Palmelleae.	
Pleurococcus vestitus. P. Reinsch. Taf. III. Fig. IV.....	56
Selenastrum Bibraianum. P. Reinsch (n. gen.) Taf. IV. Fig. III..	64
Selenastrum gracile. P. Reinsch. Taf. IV. Fig. IV..	65
Cylindrocapsa involuta. P. Reinsch (n. gen.) Taf. VI. Fig. I.....	66
Cylindrocapsa nuda. P. Reinsch. Taf. VI. Fig. II.....	67
Cerasterias raphidioides. P. Reinsch (n. gen.) Taf. V. Fig. I.....	68
Raphidium biplex. P. Reinsch. Taf. VI. Fig. IV.....	63

Protococceneae.

<i>Polyedrium decussatum</i> . P. Reinsch. Taf. II. Fig. III. IV.....	79
<i>Sorastrum bidentatum</i> . P. Reinsch. Taf. IV. Fig. I.....	86
<i>Polyedrium trigonum</i> . Naegeli	
a. gracile. b. minus. c. crassum. Taf. III. Fig. I.....	75
<i>Polyedrium pentagonum</i> . P. Reinsch. Taf. III. Fig. II.....	68
<i>Polyedrium Pinacidium</i> . P. Reinsch. Taf. III. Fig. III.....	80
<i>Polyedrium tetraedricum majus</i> . P. Reinsch. Taf. V. Fig. II.....	77
<i>Polyedrium tetraedricum hastatum</i> . P. Reinsch. Taf. V. Fig. III.	77
<i>Polyedrium octaedricum acuminatum</i> . P. Reinsch. Taf. V. Fig. IV.	77
<i>Polyedrium octaedricum spinosum</i> . P. Reinsch. Taf. V. Fig. V...	78
<i>Scenedesmus radiatus</i> . P. Reinsch. Taf. VI. Fig. VI.....	81
<i>Scenedesmus alternans</i> . P. Reinsch. Taf. VI. Fig. III.....	81
<i>Pediastrum serratum</i> . P. Reinsch. Taf. VI. Fig. V.....	95
<i>Pediastrum Sturmii</i> . P. Reinsch. Taf. VII Fig. I.....	90

Volvocineae.

<i>Botryocystis pentagonalis</i> . P. Reinsch. Taf. VII. Fig. VIII.....	100
---	-----

Didymidiaceae (Desmidiaceae).

<i>Didymidium (Micrasterias) Hermanniana</i> . P. Reinsch. Taf. VIII. Fig. I	141
<i>Didym. (Eucosmium) Kützingianum</i> . P. Reinsch. Taf. VIII. Fig. III	123
<i>Didym. (Cosmarium) plicatum</i> . P. Reinsch. Taf. IX. Fig. I.....	100
<i>Didym. (Cosmarium) norimbergense</i> . P. Reinsch. Taf. IX. Fig. II	113
<i>Didym. (Cosmarium) Regnesi</i> . P. Reinsch. Taf. IX. Fig. IV.....	112
<i>Didym. (Cosmarium) trilobulatum</i> . P. Reinsch. Taf. IX. Fig. VI..	116
<i>Didym. (Cosmarium) Hammeri</i> . P. Reinsch. Taf. X. Fig. I.....	111
<i>Didym. (Cosmarium) circulare</i> . P. Reinsch. Taf. X. Fig. III.....	108
<i>Didym. (Cosmarium) Brauni</i> . P. Reinsch. Taf. X. Fig. V.....	114
<i>Didym. (Euastrum) Sendtnerianum</i> . P. Reinsch. Taf. X. Fig. II...	135
<i>Didym. (Staurastrum) Pringsheimi</i> . P. Reinsch. Taf. X. Fig. IV..	172
<i>Didym. (Staurastrum) Sancti Sebaldei</i> . P. Reinsch. Taf. XI. Fig. I.	175
<i>Didym. (Staurastrum) pseudofurcigerum</i> . P. Reinsch. Taf. XI Fig. II	169
<i>Didym. (Staurastrum) Ungerii</i> . P. Reinsch. Taf. XI. Fig. III.....	174
<i>Didym. (Staurastrum) erlangense</i> . P. Reinsch. Taf. XI. Fig. IV...	155
<i>Didym. (Staurastrum) Renardi</i> . P. Reinsch. Taf. XI. Fig. V.....	168
<i>Didym. (Staurastrum) Meriani</i> . P. Reinsch. Taf. XII. Fig. I.....	160
<i>Didym. (Staurastrum) franconicum</i> . P. Reinsch. Taf. XII. Fig. III.	158
<i>Didym. (Staurastrum) aculeatum</i> . Ehrenberg.	
b. Brauni. P. Reinsch. Taf. XII. Fig. II.....	176
<i>Didym. (Xanthidium) bicornutum</i> . P. Reinsch. Taf. IX. Fig. VII..	128
<i>Docidium maximum</i> . P. Reinsch. Taf. XII. Fig. IX.....	184

	Seite
<i>Closterium Brauni.</i> P. Reinsch. Taf. XII. Fig. V.....	198

Zygnemaceae.

<i>Staurospermum franconicum.</i> P. Reinsch. Taf. XIII. Fig. II.....	217
---	-----

Vaucheriaceae.

<i>Vaucheria pendula.</i> P. Reinsch. Taf. XIII. Fig. III.....	221
--	-----

Confervaceae.

<i>Conferva rigida.</i> P. Reinsch. Taf. XIII. Fig. V.....	226
--	-----

Auf den Tafeln noch abgebildete, schon bekannte, theilweise schon beschriebene Arten.

<i>Polyedrium lobulatum.</i> Naegeli. Taf. II. Fig. II.....	78
<i>Polyedrium enorme.</i> Ralfs. (Staur. enorme. Ralfs). Taf. II. Fig. V.	78
<i>Characium pyriforme.</i> Alex. Braun. Taf. III. Fig. V.....	71
<i>Sorastrum spinulosum.</i> Naegeli. Taf. IV. Fig. II.....	86
<i>Characium longipes.</i> Rabenhorst. Taf. VI. Fig. VII.....	73
<i>Pediastrum pertusum.</i> Kützing.	
<i>forma clathratum.</i> Alex. Braun. Taf. VII. Fig. II.....	92
<i>Pediastrum simplex.</i> Meyen. Taf. VII. Fig. IV.....	88
<i>Pediastrum gracile.</i> Alex. Braun. Taf. VII. Fig. III.....	94
<i>Pediastrum integrum.</i> Naegeli. Taf. VII. Fig. V.....	91
<i>Pediastrum vagum.</i> Kützing. Taf. VII. Fig. VI.....	96
<i>Pediastrum Boryanum.</i> Turpin (formae). Taf. VII. Fig. VII.....	96
<i>Didym. (Micrasterias) angulosa.</i> Hantsch. Taf. VIII. Fig. II....	147
<i>Didym. (Cosmarium) obsoletum.</i> Hantsch. (Arthrodesmus obsoletus Hantsch.) Taf. IX. Fig. V.....	110
<i>Didym. (Cosmarium) concinnum.</i> Rabenhorst. Taf. IX. Fig. III....	110
<i>Didym. (Staurostrum) minutissimum.</i> Auerswald. Taf. XIII. Fig. I.	153
<i>Botrydium granulatum.</i> Linné. Taf. XIII. Fig. IV.....	218

Bemerkung zu pag. 159 und Taf. XII.

Das bei der Erklärung der Abbildungen von *Staur. franconicum* Nr. III Fig. c erwähnte Individuum der Form B (ein im Verhältnisse zur Länge ein wenig breiteres Individuum als das Fig. a dargestellte der Form B) fehlt auf der Taf. XII, indem im Texte die Berichtigung der bei der Umzeichnung der Tafeln weggelassenen Fig. c, da die Tafeln erst nach dem Drucke lithographirt wurden, aus Versehen unterblieb.

Einleitung.

Seitdem die höhere Pflanzenwelt, auf der Erdoberfläche über die niedere ohne das Mikroskop dem gewöhnlichen unbewaffneten Auge ewig verschlossenen Pflanzenwelt quantitativ weit überwiegend, im Laufe der Zeit so vollständig und erschöpfend nach so vielen Richtungen hin durch die vereinten Bemühungen der Naturforscher erkannt worden ist, dass, mit Ausnahme weniger europäischer und vieler aussereuropäischer Länder die genauesten statistischen Angaben über Artenzahl, wie über Verbreitungsbezirk in horizontaler wie in vertikaler Richtung gewonnen worden sind, so lag das Bedürfniss nahe, dass dem bis dahin fast abgeschlossenen Gebiete der Wissenschaft in systematischer Hinsicht neue Gebiete sich eröffnen mochten. Wenn wir bedenken, wie seit dem Aufkommen einer neuen, nicht nach eklektischem Formalismus, abhängig von Autoritätsglauben, vielmehr nach logischer freier Gesetzmässigkeit kritisch untersuchenden Methode (Induktion, Des Cartes, Kant) nach einer in wissenschaftlicher Terminologie begründeten systematischen Methode (Linné) der Untersuchung des Gewächsreiches das Gebiet des Wissens vom Pflanzenreiche in dem — verglichen nach dem Massstabe mit früheren Perioden — in der Geschichte der Wissenschaft beispiellos kurzen Zeitraum von 100 Jahren (1754 Linné, *Systema naturae*) sich so unendlich erweitert und in's Einzelne sich verloren hat, dass in den

Grenzen des Gebietes der — nun ihrem Verfall oder ihrer Regeneration entgegengehenden — alten europäischen Welt kaum eine neue „gute“ Species mehr, vielleicht noch durch das spähende Auge des nach neuen Formen Suchenden eine schlechte verkümmerte Varietät entdeckt zu werden vermag, wenn wir bedenken, dass seit der noch nicht alten Entdeckung, dass die Gewächse über die Oberfläche des Festlandes unseres Planeten nicht willkürlich und zufällig zerstreut sind, dass die Vertheilung der Gewächse nach einem inneren Lebensprincipe nach bestimmten Naturgesetzen angeordnet sei, dass die Einzelbeobachtungen über die Verbreitung der Gewächse sich schon in bestimmte Gesetze haben formuliren lassen, wenn wir bedenken, welcher kurze Zeitraum hinter uns liegt, seitdem die ersten inductiven Beobachtungen über die Lebensverhältnisse der Gewächse angestellt worden sind, das Gebiet des Wissens aus einer Anzahl isolirter Beobachtungen über diese Vorgänge schon zur Würde einer philosophischen Wissenschaft sich erhoben hat, so erschien es nicht ungerechtfertigt, dass — nach der Eigenthümlichkeit des menschlichen Geistes — in dem Streben nach immer Neuem und Unerforschtem, in das Geheimniss des Lebens und des sinnlich Wahrnehmbaren einzudringen und die Grenzen des Gebietes des Wissens zu erweitern, dass der Blick des emsig Suchenden auf andere unerforschte Gegenstände sich lenkt. Dieses Bedürfniss fand seine Befriedigung in der Entdeckung der mikroskopischen Pflanzenwelt. Die Entdeckung der mikroskopischen Pflanzenwelt hat nicht nur den Kreis der Pflanzengestalten, d. i. die Pflanzenkunde in systematischer Hinsicht unendlich erweitert, sie hat vielmehr bedeutend mehr dadurch die Wissenschaft zu erweitern vermocht, dass über die Lebenserscheinungen der Gewächse, namentlich über deren Zeugungs- und Reproduktionsvorgänge ein bedeutend helleres Licht verbreitet wurde, als es vor dieser Entdeckung der Fall war. Gleichzeitig wie die Erforschung der mikroskopischen Pflanzenwelt für die Pflanzenphysiologie von Bedeutung war, so hat auch die morphologische Seite der

Pflanzenkunde bedeutenden Gewinn gezogen bei der Erhellung bisher dunkler Fragen, wie namentlich über das wahre Wesen der Pflanzenindividualität. Mit der Entdeckung der mikroskopischen Pflanzenwelt beginnt in der Geschichte der Wissenschaft eine neue Aera, noch liegt kaum ein Zeitraum von 12 Jahrzehnten hinter unserer Zeit, da die ersten mikroskopischen Gewächse durch das Mikroskop, das so recht als das „Teleskop“ für die irdische Natur bezeichnet werden kann, entdeckt wurden, noch sind unsere optischen Hilfsmittel kaum um viel beträchtliches von der anfänglichen Einrichtung der Mikroskope (seit C. Drebbel) vorgeschritten, noch hat sich den mikroskopischen Studien ein im Verhältnisse zu den mit den höheren Gewächsen und zunächst mit deren Systematik sich beschäftigenden Botaniker kleinerer Theil zugewendet und doch hat sich in diesem in der Geschichte der Wissenschaft so kurzen Zeitraume dieses Gebiet der Pflanzenkunde unendlich erweitert. Thatsachen, welche in der Eigenthümlichkeit der Organisation und namentlich in Bezug der Fortschritte in der pflanzlichen Physiologie und Morphologie darin begründet sind, dass der Organismus überhaupt in seinen eigenthümlichen Lebens- und Bildungserscheinungen auf einer niederen Stufe seiner Entfaltung dem menschlichen Verständniss und der menschlichen Auffassung zugänglicher ist als bei dem nach allen Richtungen vollendeten und vollkommenen Organismus und selbst bei dem die mittlere Stufe der Organisation einnehmenden Organismus. Die Ursache, weshalb in früheren Perioden der Wissenschaft nach unsern heutigen Begriffen so wenig Wahres über die Lebenserscheinungen der Gewächse und über die wahre Natur der Organisation überhaupt verbreitet war, liegt einfach in der Unkenntniss der Organisation auf der untersten Stufe ihrer Entfaltung; der Schlüssel zu dem Räthsel alles Lebens wird der menschlichen Speculation, wie Empirie, wohl ewig verschlossen bleiben, aber dem Leben in seinen Erscheinungen nachzugehen im Kreise der Organisation und die Freiheit der organischen Entwicklung auf natürliche

Gesetze zurückzuführen — nicht aber die natürlichen Gesetze auf ihren letzten Grund (Metaphysik) — das ist die Aufgabe des wahren Naturforschers, der der Abstraktion sich zu enthalten hat. — Wie sehr auch das Gebiet der mikroskopischen Pflanzenwelt unermesslich angewachsen ist, wie sehr auch das oben in Bezug der Auffindung neuer Arten in der höheren Pflanzenwelt Ausgesprochene in gleichem Masse jetzt beinahe schon für die niedere mikroskopische Pflanzenwelt zutreffend ist, so lässt sich doch nicht behaupten, dass die Grenzen des Gebietes dieser „kleinsten Welt“ jetzt schon aufgefunden seien, es erscheint vielmehr im Hinblick auf die mit der Verbesserung und Vervollkommnung unserer Mikroskope in gleichem Masse fortschreitende Vermehrung unserer Kenntnisse der mikroskopischen Pflanzenwelt die Vermuthung nicht ungerechtfertigt, dass mit neuer Vervollkommnung unserer optischen Hilfsmittel in gleichem Masse wie bisher der Einblick in die Welt des Kleinsten vorwärts dringen, und dass den systematischen Verzeichnissen der jetzt bekannten kleinsten Lebensformen ganze Reihen noch „kleinerer Lebensformen“ zugefügt werden.

Nach unsern jetzigen Kenntnissen findet in Bezug der Verbreitung der mikroskopischen Lebensformen auf der Erdoberfläche lange nicht dieselbe Abhängigkeit statt in Bezug der durch die geographische Lage, durch klimatische und physikalische Verhältnisse bedingten Umstände (Pflanzengeographische Vertheilung), wie dies bei der bei den höheren Gewächsen geltenden gesetzmässigen Verbreitung der Fall ist. Ueberall in der Natur auf der Oberfläche der Erde, wo das flüssige Element ungestört und ruhig verweilt, überall, wo überhaupt die Bedingungen zum vegetabilischen Leben gegeben sind (Luft, Licht, Wärme, Erde, Wasser), siedeln sich die mikroskopischen vegetabilischen Lebensformen an. Fast immer leben neben den vegetabilischen kleinsten Wesen auch animale solche Wesen (Infusorien), die in dieser pflanzlichen kleinsten Welt munter und frei sich umhertreiben, deren grösseren, vollkommener entwickelten und mit Kauwerkzeugen versehenen Lebensformen

die mikroskopischen Gewächse zur Nahrung dienen. Die bei sehr vielen mikroskopischen Gewächsen bemerkbaren Ortsveränderungen haben mit Unrecht zu deren Stellung in das Thierreich Veranlassung gegeben. Aus der ich möchte fast sagen — Gleichgiltigkeit der mikroskopischen Gewächse gegen geographische Lage und klimatische Umstände ergibt sich denn auch, dass ein grosser Theil der bekannten Arten kosmopolitische Bürger sind. Ein Hauptunterschied in der mikroskopischen Pflanzenwelt bezüglich ihrer Vertheilung über die Erdoberfläche liegt in der Verschiedenheit der chemischen Beschaffenheit des Wassers, dem die Algen zum Aufenthaltsorte dienen und wir haben eine ausschliessliche Flora des Salz- (Meer-) Wassers und eine fast ausschliessliche Flora des Süsswassers (Binnengewässer). Bestimmte durch Grenzen abgeschlossene kleinere Gebiete innerhalb dieser beiden grossen Gebiete haben sich bis jetzt mit Bestimmtheit, in ähnlicher Weise wie dies bei der höheren Pflanzenwelt der Fall ist, nicht abgrenzen lassen. — Die Darstellung der Algenflora eines kleineren Gebietes hat nach dieser Auseinandersetzung und nach diesen Gesichtspunkten einen fast untergeordneten und nicht denselben wissenschaftlichen Werth, welchen die Darstellung der Phanerogamenflora — wenn auch nur eines kleinen Gebietes — darbietet. Wenn derartige Algenfloren eines Lokalgebietes irgend einen wissenschaftlichen Werth haben sollen, so hat sich die Arbeit des Forschers weit mehr auf die Erforschung und die Darstellung der Lokalformen, die Vergleichung derselben mit den in anderen Gebieten beobachteten Lokalformen zu concentriren, als auf die blosse Aufzählung der Arten nach irgend einem grösseren Florenwerke sich zu beschränken, wie dies bei derartigen Verzeichnissen der Phanerogamen- oder Kryptogamenflora eines Lokalgebietes der häufigere Fall zu sein pflegt. Dass ich der ersten Anforderung in diesem ersten Verzeichnisse nur theilweise entsprechen konnte, liegt einerseits in der im Verhältnisse zu einer nach diesen Anforderungen angelegten Arbeit viel zu geringen Zeit, welche ich

bis jetzt diesen Studien zuwenden konnte, anderntheils in dem noch nicht ganz vollständigen Materiale, welches mir hiezu zu Gebote stand. Ich zögere nicht länger das von mir allein zusammengetragene Material zusammen zu stellen und ich gebe hier die Resultate der mehrjährigen Untersuchung der Algenflora des Gebietes, auf dessen Durchforschung ich seit mehreren Jahren alle meine Musestunden verwendet und in der letzten Zeit meine ganze Thätigkeit zugewendet habe. Als Belege zu diesem Verzeichnisse dienen die in meinem Herbar befindlichen Präparate, bei deren Untersuchung ich immer die in der Rabenhorst'schen europäischen Algensammlung befindlichen Präparate vergleichend zu Rathe zog. Einige der Arten habe ich aus dem Gebiete bereits in dieser letzteren Algensammlung mitgetheilt, eine ganze Reihe weiterer, wie mehrere der neuen im Gebiete entdeckten, in diesem Verzeichnisse beschrieben und abgebildeten Arten werden in den nächsten Dekaden mitgetheilt werden.

Das seit mehreren Jahren fast ununterbrochen durchforschte Gebiet kann als ein der Entwicklung einer Algenflora sehr günstiges bezeichnet werden. Dasselbe nimmt einen Theil des mittelfränkischen Keuperplateau's ein, denjenigen Theil, welcher von den Flussthälern der Regnitz, der Schwabach, der Aurach, der Wiesent und Aisch durchfurcht ist. Im westlichen, links der Regnitz sich ausdehnenden Theil, erstrecken sich viele Weiher und Teiche, öfters von grösserer Ausdehnung (Bischoffssee, Kosbacher Weiher) mit angrenzenden kleineren und grösseren Sümpfen und morastigen Gräben, der östlichere, nördlichere und südlichere Theil bietet in mehreren grossen Waldpartien (Reichsforst zwischen Erlangen, Lauf, Nürnberg und jenseits Nürnberg zwischen dem Moritzberge, Lauf, Altorf, Nürnberg, der Hauptsmoorwald zwischen Hirschaid und Bamberg, die Markwaldung zwischen Kosbach, Dechsendorf, Röttenbach, Weissendorf und Burk) der Entwicklung von Algen sichere Zufluchtsorte in Waldgräben, kleineren Mooren und Wald-sümpfen, welche letztere aber den in neuerer Zeit immer

weiter um sich greifenden Waldkulturen zum Schrecken des Algologen allmählig durch Austrocknung zum Opfer fallen. Zahlreiche Gräben an dem Donau-Main-Kanale, in dem Wiesgrunde im Regnitzthale, wie mehrere Altwässer der Regnitz zwischen Erlangen und Forchheim sind ebenfalls der ungestörten Entwicklung einer reichen Algenflora zuträgliche Lokalitäten. Der Rand des Jura's, sowie die in das Keupergebiet ausmündenden Thäler bieten ausser den Jurakalkblöcken (mit *Chroolepus*) und den klaren von den Jurabergen herabfliessenden Bächlein (mit *Cladophoren*) wenige der Entwicklung der Algen günstige Lokalitäten. Feuchte, schattige Wände der dolomitischen Massen im Wiesenthale bieten *Pleurococcus*, *Gloocacapsen*, *Chroococcen* einigen Aufenthalt, einige kalte Quellbächlein bergen mancherlei Diatomeen. Die *Diatomaceen* finden sich im Gebiete vorzüglich in den Gräben der Waldungen, in den stagnirenden Gewässern, die *Desmidiaceen*, an denen das Gebiet sehr reich ist, die in diesem Verzeichnisse aus dem unten im Verzeichnisse bei der Familie angeführten Grunde reichlicher ausgefallen ist, leben in den Waldgräben mit humoser Unterlage, in den offenen und frei liegenden kleinen Sümpfen und in den stehenden ruhigen Gewässern (Altwässern) im Regnitzthale, die *Zygnemeen* (*Spirogyra*, *Mesocarpus*, *Mougeotia*, *Zygnema*) in den Teichen im westlichen Theile und in den Wassergräben im ganzen Gebiete, die *Cladophoren* in den schnellfliessenden Bächen, sowohl des Keuper- als des Kalkgebietes.

Die Standorte für die Algen (insbesondere der kleineren freischwimmenden) sind — wie jeder Beobachter bei der Beobachtung der Algen eines Lokalgebietes in kurzer Zeit wahrnimmt — ausserordentlich veränderlich und es sind daher die Angaben über die Lokalitäten, zunächst für den Forscher im Gebiete von untergeordnetem Werthe, da sie — nicht analog, wie bei den Gefässpflanzen — höchstens nur für eine kurze Reihe von Jahren unveränderlich bleiben. Diese Veränderlichkeit hängt einestheils von der Veränderlichkeit der

Lokalitäten selbst ab, da Gräben und kleinere stagnirende Gewässer theils willkürlicher und absichtlicher Veränderung, theils natürlicher Austrocknung unterworfen sind, anderntheils aber von Umständen, welche uns zur Zeit noch Räthsel sind. Von Erscheinungen, welche diese letzteren begleiten, kann als Beispiel erinnert werden an das plötzliche massenhafte Auftreten und ebenso schnelles Wiederverschwinden vieler Algen — ich erinnere nur an *Hydrodictyon*, *Draparnaldia* und viele andere Conferven — an Lokalitäten, an denen dieselben früher nicht vorkamen. Für einzelne Lokalitäten kann der Fall eintreten, dass der Charakter der Algenflora binnen einer einzigen Vegetationsperiode sich 2 — 3 Mal ändern kann, d. h. dass einzelne massenhaft auftretende Arten nach völliger Verschwindung durch andere gleichfalls massenhaft auftretende Arten nach völliger Verschwindung durch andere gleichfalls massenhaft auftretende Arten ersetzt werden können. Die in der Natur in vereinzelt freischwimmenden Individuen vorkommenden kleineren Algen (wie die meisten Desmidiaceen, sämtliche bei uns vorkommenden Diatomaceen) und sehr viele Fadenalgen (Zygnemaceen, Confervaceen) unterliegen namentlich diesen Veränderungen, diesen unterworfen sind am wenigsten die in grösseren Teichen lebenden festwurzelnden Characeen, wie auch andere grossere, auch freischwimmende Algen, in stehenden wie ausgetrockneten Wässern. Für ein Lokalgebiet angegebene bestimmte Standorte für Algen haben daher nach diesem bei weitem nicht denselben Werth wie die derartigen Standortangaben für die Gefässpflanzen eines Lokalgebietes.

Das Gebiet enthält nach meinen bisherigen Beobachtungen im Ganzen 503 Arten in 126 Gattungen*) Von diesen sind an Diatomaceen 85 Arten in 25 Gattungen, an Phykococcaceen 78 Arten in 31 Gattungen, an Chlorophyllaceen 265 Arten

*) Die Flora Cryptogamica Erlangensis von Martius vom Jahre 1817 enthält in 10 Gattungen 38 Arten, das für diese Flora eingehaltene Gebiet umfasst dasselbe in diesem Verzeichnisse eingehaltene Gebiet

in 40 Gattungen. Von der Abtheilung der Phykochromaceen enthält das Gebiet aus der Familie der Chroococcaceen 23 Arten in 11 Gattungen, aus der Familie der Oscillarieen 26 Arten in 7 Gattungen, aus der Familie der Nostochaceen 11 Arten in 4 Gattungen, aus der Familie der Rivulariaceen 5 Arten in 4 Gattungen, aus der Familie der Seytonemaceen 6 Arten in 3 Gattungen, aus der Familie der Sirosiphoniaceen 4 Arten in 2 Gattungen. Von der Unterabtheilung Palmellaceae der Abtheilung der Chlorophyllaceen enthält das Gebiet aus der Familie der Palmelleen 28 Arten in 14 Gattungen, aus der Familie der Protococceen 38 Arten in 16 Gattungen, aus der Familie der Volvocineen 5 Arten in 3 Gattungen; im Ganzen Palmellaceen: 71 Arten in 27 Gattungen. Von der Unterabtheilung Conjugaten der Abtheilung der Chlorophyllaceen enthält das Gebiet aus der Familie der Didymydiaceen (Desmidiaceen) 132 Arten in 10 Gattungen, aus der Familie der Zygnemaceen 33 Arten in 11 Gattungen; im Ganzen Conjugaten 165 Arten in 24 Gattungen. Von der Unterabtheilung Siphoneen (Schlauchalgen) enthält das Gebiet aus der Familie der Botrydineen 1 Art, aus der Familie der Vaucheriaceen 11 Arten in einer Gattung; im Ganzen an Schlauchalgen 12 Arten in 2 Gattungen. Von der Unterabtheilung Confervaceen (Fadenalgen) der Abtheilung der Chlorophyllaceen enthält das Gebiet aus der Familie der Sphäropleaceen 1 Art, aus der Familie der Glöosphäraceen ebenfalls eine Art, aus der Familie der Conserveen 40 Arten in 4 Gattungen, aus der Familie der Oedogoniaceen 6 Arten in 2 Gattungen, aus der Familie der Ulotrichaceen 20 Arten in 6 Gattungen; im Ganzen an Confervaceen 68 Arten in 14 Gattungen. Aus der Abtheilung der Rhodophyceen (Rothalgen) enthält das Gebiet eine Art, aus der Abtheilung der Characeen 5 Arten in 2 Gattungen.

Erlangen, im Dezember 1865.

Paul Reinsch.

Erste Abtheilung.

Diatomaceae, Diatomaceen.

Familie der Melosireen (Melosireae).

Melosira. Agardh.

M. varians. Agardh. (Ag. Consp. 1830. p. 64; Ralfs Ann. and Mag. T. IX. Fig. 5; Kützinger Bacill. T. II. Fig. X. 1—6; Rabenh. Süßwasserdiat. T. II. Fig. 4; Rabenh. Alg. Nr. 453. Nr. 806; Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 15; Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 40.)

Die Dimensionen der fränkischen Spec. stimmen mit schlesischen und französischen Spec. (Falaise, gefunden von Brébisson) genau überein. — Die kuglichen „Fruchtzellen“, welche Rabenhorst in den „Süßwasserdiat.“ T. II. Fig. 4 abbildet, habe ich noch nicht beobachtet. Die physiologische Bedeutung dieser, wie es scheint, nur selten zu beobachtenden, in den Fäden ohne bestimmte Ordnung zwischen den cylindrischen Zellchen vertheilten kugeligen Zellchen ist noch nicht bekannt.

Länge der Zellchen 0,0105''' rhein.

Breite der Zellchen 0,0073''' rhein.

In Wiesentümpeln, welche während des Sommers voll Wasser sind, sowie in Wiesenwässerungsgräben im Regnitzthale (verbreitet); in Gräben am Eisenbahndamme bei Eltersdorf, Baiersdorf, Forchheim (an dem mittleren Standorte gemeinschaftlich mit *Fragillaria bipunctata* dichte flockige, braungefärbte flottirende und zum Theil angewachsene Massen bildend); Reichsforst (Erlangen, Nürnberg); Solitude bei Erlangen.

N. sp. Pfaffiana. P. Reinsch. Cellulae breviter cylindraceae, filamina cylindri continui forma constituentes, esulcatae; laterum capitalium planorum margines a fronte et a latere visi dense striolati (denticulati); cellularum diameter transversalis (florum latitudo) diametro longitudinali duplo (et paulo magis et minus) longior.

diam. 0,02 ; - 0,009 mm.; 0,0305—0,0037''' rhein.

Diese Art, welche nach der planen Hauptseite zu *Orthosira* Thwaites zu stellen sein würde, stelle ich zu *Melosira* Ag., da erstere Gattung wegen des kleinen Unterschiedes der Hauptseiten und der Ränder derselben allein nicht zu trennen ist von *Melosira*. Ist der *Melosira* (*Orthosira*) *arenaria* Thwaites, welche ich im Gebiete noch nicht beobachtet habe, sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die viel kleineren Dimensionen, wie durch den Mangel des ringsum laufenden Streifens der Nebenseite. In immerwährend feuchten Waldgraben im Sebalderforste (Reichsforste) unterhalb Kalkreuth bei Erlangen. (Diese Art bildet nie längere Fäden, man findet gewöhnlich nur aus wenigen Zellchen bestehende Fäden, darunter häufig vereinzelte Zellchen.)

Erklärung der Abbildungen auf Taf. I Fig. 2.

Fig. II. a) Fragment eines längeren Fädchens, von der geringsten beobachteten Breite (Breite 0,0038''' rh.); b) Fragment eines breiteren Fädchens (Breite 0,0098''' rh.), die Länge der Zellchen im Verhältnisse zur Breite ein wenig geringer; c) ein einzelnes Zellchen von der Hauptseite betrachtet, der innerste Theil der Fläche nicht punktirt; d) dieselbe Ansicht eines andern Zellchens, der ganze innere Theil der Fläche dicht punktirt

M. distans. (Ehrenberg) Kützing. (Bacill. Taf. II. Fig. 12. Rabenh. Süßwasserdiat. Taf. II. Fig. 9. Alg. europ. Nr. 1165. Kryptog Sachs. p. 15. Fl. Europ. Alg. p. 41. Gallionella distans, Ehrenb. Ber. d. Ac. in Berlin 1836. Infus. p. 170 Taf. XXI. Fig. 4.)

Diese Art findet sich auch fossil in Schieferen der Tertiärformation Böhmens.

Familien der Euroticeen und Cymbelleen (Eunotieae und Cymbelleae).

Epithemia Brebisson.

Epith. gibbea. Ehrenberg. (*Navicula Gibbea*. Ehrenb. Infusionsth. p. 184. Taf. XIII. Fig. 19. *Epith. gibbea*. Kützing. Bacill. p. 35. Taf. IV. Fig. 23. Rabenh. Süßwasserdiat. Taf. I. Fig. 3. Fl. Europ. Alg. p. 64. *Navicula uncinata*. Ehrenb. Abh. d. Berl. Acad. 1830. p. 64.)

In Gräben und stehenden Wassern; Bayersdorf, Kosbach; unter anderen Diatomeen

Epith. turgida Ehrenberg. (*Eunotia turgida* Ehrenb. Infusionsth. p. 190. Taf. XIV. Fig. 5. *Epith. turgida* Kützing. Bacill. p. 34. Taf. V. Fig. 14. Rabenh. Süßwasserdiat. p. 18. Taf. I. Fig. 11. Fl. Europ. Alg. p. 62. *Frustulia picta*. Kütz. Linnæa. 1840. p. 16. Taf. I. Fig. 18.)

Auf den grösseren Arten der Conferven (*Conferva*, *Oedogonium*), seltener auf Fäden von *Zygnemeeen* schmarotzend. Ziemlich verbreitet.

Epith. Zebra Ehrenberg. (*Eunot. Zebra* Ehrenb. Infusionsth. p. 191. Taf. 21. Fig. 19. *Epith. Zebra* Kützing. Bacill. p. 34. Taf. V. Fig. 12b. Rabenh. Süßwasserdiat. p. 18. Taf. I. Fig. 8. *Cymbella adnata*. Hassal. Br. Fr. Alg. p. 428.)

An Confervenfäden schmarotzend; Baiersdorf, in Gräben an der Eisenbahn.

Epith. Sorex. Kützing. (Bacill. p. 33. Taf. V. Fig. 12, s. oben Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 64.)

An Confervenfäden bisweilen auch an im Wasser lebenden *Vaucherien* (*V. dichotoma*, *hamata*) schmarotzend. In Gräben bei Oberndorf und Seebach, in Gräben unter dem Schmausenbuck bei Nürnberg.

Eunotia Ehrenberg.

Eun. pectinale Dillwyn. (Rabenh. Fl. Europ. Alg p 72 Himantid. pectinale. Kütz. Bacill. Im Gebiete ziemlich verbreitet.)

Eun. monodon. Ehrenberg (Verbr. Taf IV. Fig. 10. Rabenh. Fl. Europ. Alg p. 73. Ralfs Ann. of. Nat. Hist. v. 13. Taf. XIV. Fig. 1. Kütz. Bacill Taf. 92. Fig. 42.)

B. minuta. (*Eunotia minuta*. Hilse. in Alg. Europ. Nr. 1168.)

Die Länge der fränkischen Specim. beträgt 0,015 mm. bis 0,024 mm., am leicht gekrümmten Rücken mit einem oder zwei Höckerchen, an den Polen mässig eingeschnürt. In Waldgräben im Reichsforste.

Eun. tridentula. Ehrenberg. (Verbr. p. 126. Taf. II Fig. 14. Rabenh. Fl. Europ Alg p 70. Süßwasserdia. p. 17. Taf I. Fig. 16. Alg. Sachs. Nr. 31. 50. 1022d.)

In einem Graben an der Tauber bei Rothenburg.

Eun. quaternaria. Ehrenberg. (Verbr. p 126 Taf II. Fig. 13. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 71.)

Länge 0,015 mm., der Rücken mit 4 Höckerchen versehen. In einem Waldgraben bei Tennenlohe (Reichsforst), untern Synedren und Naviceln.

Eun. Arcus Ehrenberg. (Abhandl. der Berl. Acad. 1840. p. 17. Infus Taf. 31. Fig. 22. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 71.)

In wenigen Specim. in einem Diatomeengemenge aus einem Graben am oberen Bischofssee beobachtet.

Cymbella Agardh.

Cymb. Ehrenbergii Kützinger (Bacill. p. 79 Taf IV. Fig. 11. Rabenh. Fl. Europ Alg p. 77. Süßwasserd. p 22. Taf. 7. Fig 21. *Navicula inaequalis* Ehrenberg Infus. p. 184. Taf. XIII.)

Cymb. gastroides. Kützing. (Bacill p. 73. Taf. 6. Fig. 4b. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 79. Süßwasserdiat. p. 21. Taf. 7 Fig. 2a, b. *Cymbella maxima* Nägeli in Kütz. Spec. Alg. p. 890. *Cymb. elegans* Kramer in Alg. Europ. Nr. 1441.)

Ziemlich verbreitet im Gebiete

Cymb. affinis. Kützing (Bacill p. 80. Taf. VI. Fig. 15. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 81. Süßwasserdiat. Taf. VII Fig. 13.) Länge 0,023 mm bis 0,027 mm. Breite 0,008 mm

An dem hölzernen Wassertrog eines Brunnens mit laufendem Wasser in Marloffstein bei Erlangen.

Cymbella maculata. Kützing. (Bacill. Taf. VI. Fig. 2. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 80.)

B. major. (C. *Lunula* Hilse. Alg. Europ. Nr. 1166. *Cymb. Lunula* Ehrenb. Rabenh. Süßwasserdiat. p. 23. Taf. VII Fig. 19.)

Länge 0,046 mm. Breite 0,012 mm. Unter andern Diatomeen am Bischofssee.

Cymb. rostrata. Rabenhorst. (Süßwasserdiat. p. 22. Taf. VII. Fig. 5. Fl. Europ. Alg. p. 78.)

Länge der fränkischen Specim. 0,054 mm. Breite 0,014 mm. Diese nur von Italien (in den pontinischen Sümpfen) bekannte Art beobachtete ich in einem Diatomeengemenge aus einem Waldgraben im Reichsforste (am „Peterleinswege“).

Cocconema Ehrenberg.

Coccon. lanceolatum Ehrenberg (Infusionsth. p. 224. Taf. 19. Fig. 7. Kützing. Bacill. Taf. VI. Fig. 3. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 83. Süßwasserdiat. p. 23. Taf. 7. Fig. 3. *Cocc. Bremii* Nägeli in Kütz. Spec. Alg. p. 890.)

In der Tauber bei Rothenburg; in Gräben unter dem Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Coccon cymbiforme. Ehrenberg. (Infusionth. p. 225. Taf. XIX. Fig. 7. Kützing. Bacill. Taf. VI. Fig. 12. Rabenh.

Fl. Europ. Alg. p. 83. Kryptogfl. Sachs p. 21. *Cymbella cymbiformis* Brebisson. Alg. Falaise. p. 49. Taf. 7.)

In Gräben am Bischoffssee, an der Tauber bei Rothenburg.

Encyonema Kützing.

Enc. caespitosum. Kützing. (Spec. Alg p. 61 Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 85 Kryptogfl. Sachs p. 23)

In Gräben auf Steinen an der Tauber bei Rothenburg.

Familie der Achnantheen (Achnantheae).

Achnantidium. Kützing.

Achnant. microcephalum. Kützing. (Bacill. p. 75. Taf. III Fig. 13 19. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 106.)

Unter andern Diatomeen, an mehreren Orten.

Achnant. naviculoides. P. Reinsch. Cellulae plerumque binae conjunctae a latere frontali visae ellipticae, polis rotundatis paulo productis, nodulo centrali lineisque parallelis longitudinalibus binis instructae

Longit 0,03 mm. Latit 0,015 mm.

In einem Tümpel am Donau-Main-Kanale zwischen Bruck und Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf I. Fig. 7.

Fig. 7. a) Ein Zellchen von der Hauptseite betrachtet, die beiden Mittelstreifen deutlich mit dem Centralknötchen hervortretend; b) eine zweizellige Familie von der Seite betrachtet (Stielchen an den Enden der Zellen habe ich nie beobachtet).

Achnanthes. Bory.

Achn. exilis. Kützing. (Bacill. p. 76 Taf. XXI Fig. 4. Ehrenberg. Infusionth. p. 228. Taf. XX. Fig. 4. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 109 Süßwasserdiat p. 26. Taf VIII Fig. 1.)

In Gräben zwischen Neuenhaus und Oberndorf bei Erlangen.

Cocconeis. Ehrenberg.

Coccon. Pediculus Ehrenberg (Infusionsth. p 194 Taf XXI Fig. 11. Kützing Bacill. p. 71 Taf. V. Fig. 2 Rabenh. Fl. Europ. Alg. d. 25.)

An Conferven (*Cladophora*, *Conferva*) in der Tauber. Schwabach, Rednitz.

Coccon. pumila. Kützing. (Bacill. p 71. Taf. V. Fig 9. Rabenhorst. Kryptog. Sachs p. 25. Süßwasserdia. Taf III. Fig 10.)

An *Cladophoren* in der Schwabach bei Erlangen

Familie der *Surirelleen* (*Surirelleae*.)

Surirella. Turpin.

Sur. biseriata Brebisson (Alg. Falaise Taf VII Kützing. Spec. Alg. p. 37. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 5. Süßwasserdia. p. 29. Taf III. Fig 21. *Surirella bifrons* Ehrenberg. Verbr. Taf III. Fig. 3. Kützing. Bacill. Taf VII Fig 10. *Navicula bifrons* Ehrenb. Infus. p. 1-6 Fig XIV. Fig. 2.)

In den Gräben des Reichsforstes ist diese höchst zierliche Alge ziemlich verbreitet.

Sur. splendida Ehrenberg (*Navicula splendida* Ehrenb. Infusionsth. p. 186. Taf XIV. Fig 1. *Surirella splend.* Kützing. Bacill. Taf. VII. Fig. 9. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 54. Süßwasserdia. p. 30 Taf. III. Fig. 22. Alg. Europ. Nr. 1201-1521.)

In einzelnen Exemplaren in einem Diatomeengemenge aus einem Altwasser der Regnitz („Kutscherweiher“) bei Erlangen

Sur. minuta Brebisson. (Kützing Spec. Alg. p. 38 Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 57. Süßwasserdia. p. 30 Alg. für Nr. 1490. 964.)

Unter vielen andern Diatomeen in der Tauber bei Rothenburg, in einem Graben bei Burk oberhalb Forchheim, an der inneren Wölbung der Brücke des Donau-Main-Kanales über die Schwabach.

Cymatopleura. Smith.

Cymat. Solea. Kützing. (Bacill. p. 60. Taf. III. Fig. 61. *Cymat. Solea*. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 60. Kryptogfl. Sachs. p. 27. Alg. für Nr. 983. 1029. Wartmann. Nr. 129. *Navicula Librile*. Ehrenberg. Infusionsth. p. 185. Taf. 13. Fig. 22. 1—3.)

In Gräben am Donau-Main-Kanale bei Forchheim, am „tropfenden Felsen“ im Reichsforste (mit *Cosmar. coelatum*, *pyramidatum*, *Cucumis*), in einem Graben im Reichsforste bei Puckenhof.

Cymat. elliptica. Brebisson. (Sur. elliptica. Breb. in Kützing Bacill. p. 61. Taf. XXVIII. Fig. 28. Sur. Kützingii. Perty. Kleinste Lebensf. Taf. XVII. Fig. 2. *Cymat. elliptica* Raben. Fl. Europ. Alg. 61. Pritsch. Infusor. p. 793. Taf. IX. Fig. 149. *Cymat. nobilis*. Hantsch. Hedwigia. p. 180. Taf. VI. Fig. 6. Alg. Europ. Nr. 1201.)

In einem Diatomeengemenge (*Melosira varians*, *Synedra capitata*, *Cymatopleura Solea*, *Diatoma pectinale* u. m. a.), welches auf der Oberfläche eines kleinen Teiches beim Neuenhaus bei Erlangen schwimmende Massen bildet, in vereinzelt Specim. beobachtet.

Amphora. Ehrenberg.

Amph. ovalis. Kützing. (Bacill. p. 107. Taf. V. Fig. 35. 39. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 91. Süßwasserdiat. p. 31. Taf. IX. Fig. 1. Alg. Europ. Nr. 765. Pritsch. Infus. p. 883. Taf. VII. Fig. 56. *Navicula Amphora*. Ehrenberg. Infus. p. 198. Taf. XIV. Fig. 3. *Cymbella ovalis* Brebisson. Alg. Falaise.)

In Gräben bei Forchheim.

Familie der Fragillarieen (Fragillarieae).

Denticula. Kützing.

Dentic. frigida. Kützing. (Bacill. p. 43. Taf. XXVII. Fig. 6. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 114.)

In der Solitude bei Erlangen.

Dentic. elegans. Kützing. (Bacill. p. 43. Taf. XLIII. Fig. 5. Rabenh. Fl. Europ. p. 115. Alg. Eur. Nr. 1081. Wartmann Krypt. d. Schweiz. Nr. 126. Dent. ocellata Smith. Diatom. I. p. 22.)

In Gräben im Wiesenthale bei Ebermannstadt.

Fragillaria. Lyngbye.

Fragill. virescens. Ralfs. (Ann. of Nat. Hist. v. 12. Taf. II. Fig. 6. Kütz. Bacill. Taf. XVI. Fig. 4. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 119. Alg. Eur. Nr. 35. 549. 1491. *Fragillaria pectinalis*. Ehrenb. Meteorp. Taf. II. Fig. 7. Infus. p. 206. Taf. XVI. Fig. 1.)

In Waldgräben im Reichsforste (Laurenzi- und Sebaldforst), in Gräben in der Solitude bei Erlangen, in Gräben am Donau-Main-Kanale bei Forchheim.

Fragill. capucina. Desmaz. (Cryptog. de France Nr. 453. Kützing. Bacill. p. 45. Taf. XVI. Fig. 3. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 118. *Fragill. pectinalis*. Lyngb. Hydroph. dan. Taf. LXIII. *Frag. tenuis*. Agardh. Consp. Alg. p. 63. *Frag. bipunctata*, *angulata*, *scalaris*. Ehrenberg. Infusionsth. p. 204. 205. *Frag. sepes* Ehrenb. Microgr. Taf. 38. Fig. 8.)

In der Solitude bei Erlangen, in Altwässern der Regnitz, in sehr grosser Menge in Gesellschaft der *Melos. varians* in dem zweiten Durchlass unter dem Eisenbahndamme zwischen Erlangen und Baiersdorf beobachtet, daselbst bildet die Alge im Frühling 1864 dichte, fluthende, flockige und fädige, an Steinen festsitzende Massen; von dem letzteren Standorte wird die Alge in den Alg. Europ. mitgetheilt werden.

Odontidium. Kützing.

Odont. mesodon. Ehrenberg. (Kützing. Bacill. Taf. XVII. Fig. 1. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 31. Süswasserdiat. Taf. 2. Fig. 2. Alg. Sachs. Nr. 501. 703.)

In Gräben der Wiesen im Regnitzthale, auch an den hölzernen Rinnen der Wasserleitungen in den Wiesen.

Odontid. hyemale. Lyngbye. (*Fragillaria hyemalis* Lyngb. *Hydroph. dan.* Taf. 63. *Odont. hyemale. Kütz.* *Bacill.* p. 44. Taf. 17. Fig. 4. *Rabenh. Fl. Europ. Alg.* p. 116. *Süsswasserdiat.* p. 34. Taf. 2. Fig. 5. *Pritschard. Infus.* p. 775 Taf. 13. Fig. 24. 25.)

Sehr häufig, jedoch nie in Massen, unter Diatomeengemengen, welche sowohl auf losen Steinen, wie an *Cladophoren* festsitzen, in der Tauber ober- und unterhalb Rothenburg, in der Wiesent (kaltes Gebirgswasser) bei Ebermannstadt, Streitberg.

Odontid. pinnatum. Kütz. (*Spec. Alg.* p. 13. *Fragillaria mutabilis* Grunow. *Wiener Verhandl.* 1862. p. 369. *Rabenh. Fl. Europ. Alg.* p. 118. *Odontidium striolatum. Kütz.* *Bacill.* Taf. 21. Fig. 20. *Fragillaria pinnata. Ehrenh. Abhandl. der Berl. Acad.*)

Breite der Zellchen (der Fäden) 0,023 mm. bis 0,061 mm. Das *Odontid. striolatum* Kütz. ist nur eine Form des *Od. pinn.*, wie ich aus Specim. aus der „Solitude“ bei Erlangen wahrnahm, unter welchen die bei *Rabenh. Süsswasserdiat.* Taf. 2. Fig. 3a. b. dargestellte Form (*Od. pinnatum*) in vielfachen Uebergängen zu der ebendasselbst Fig. 9. jedoch nur in der Seitenansicht dargestellten Form (*Odont. striolatum*) vorhanden war. Im Maximum verhält sich der Längendurchmesser der Zellchen zum Breitendurchmesser (Breite der Fäden) wie 1:1, im Minimum 1:6. Zwischen diesen beiden Extremen liegen die vielfachsten Uebergänge.

Diatoma. De Candolle.

Diat. vulgare. Bory. (*Diction d'hist. natur.* 1828. *Bot.* Taf. 15. 1—4. *Kütz. Bacill.* p. 47. Taf. 17. Fig. 15. 1—4. *Rabenh. Fl. Europ. Alg.* p. 121. *Süsswasserdiat.* Taf. 2. Fig. 6. *Alg. Europ.* Nr. 563. *Bacill. vulgaris Ehrenh. Infusionsth.* p. 197. Taf. 15. Fig. 2. *Diatoma fenestratum Kütz. Alg. exsicc.* Nr. 4. *Diat. floccosum Agardh Consp. Alg.* p. 53.)

In Gräben an der Seebach, Regnitz, im Reichsforste.

Diat. tenue. Agardh. (Consp. Alg. p. 52. Kütz. Bacill. p. 48. Taf. 17. Fig. 10. 6 — 14. Alg. exsicc. Nr. 26. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 122. Alg. Europ. Nr. 701. Bacill. pectin. Ehrenb. Infusionsth. p. 198. Taf. 15. Fig. 4.)

In hölzernen Wiesenwässerungsrinnen an der Regnitz unterhalb Erlangen (mit *Melos. varians*, *Synedra Ulna*, *Diat. vulgare*)

Familie der Naviculaceen (Naviculaceae).

Navicula. Bory.

Navic. cuspidata. Kützing. (Bacill. p. 90. Taf. 3. Fig. 24. 37. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 170. Alg. Europ. Nr. 1186. Kryptogfl. Sachs. p. 23).

Unter andern Diatomeen in vereinzelt Specim. eingemischt; Bischofssee, am Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Navic. rostrata. Ehrenberg. (Abhandl. d. Berl. Acad. 1840. p. 18. Kützing Bacill. p. 94. Taf. 3. Fig. 55. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 197.)

Diese nur von Ungarn und Italien, lebend und fossil bei Franzensbad in Böhmen bekannte Art, beobachtete ich in einigen sehr vereinzelt Specim. in schwimmenden Massen von *Oscillaria chalybea* und *Closterium turgidum*, in einem Graben am Donau-Main-Kanale bei Erlangen (Mai 1865).

Die Länge der fränkischen Specima beträgt 0,092 mm. bis 0,9 mm., die Breite 0,03 mm., die Specim. stimmen mit dem bei Rabenhorst. (Süßwasserdiat. Taf. 6. Fig. 57 a. b.) dargestellten Individuum genau überein. Die Breite ist jedoch im Verhältnisse zu der Länge bei den letzteren ein wenig beträchtlicher; bei der Ansicht von der Hauptseite zeigen sich die Pole abgestutzt, die Seitenränder sehr mässig nach aussen gewölbt, bei der Ansicht von der Nebenseite zeigt sich die Zelle von der Mitte an nach den Enden allmählig verschmälert, mit einem stärkeren Mittelknoten und zwei nach den Polen auslaufenden parallelen Linien versehen. Die bei Raben-

horst (Fl. Europ. Alg. p. 197) angegebenen Dimensionen ($\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{24}$ ''') stimmen mit den fränkischen Specim. überein.

Navic. lanceolata. Kützing. (Bacill. p. 94. Taf. 30. Fig. 48. Rabenh. Fl. Europ. Alg. 175. Alg. Sachs. Nr. 682 1162. *Frustulia lanceolata* Kütz. Synops. p. 14. Taf. 1. Fig. 13.)

In Gräben im Reichsforste, an manchen Orten (wie in Gräben in dem kleinen Moore neben dem Fusswege von Puckenhof nach Kalkreuth) massenhaft, ziemlich verbreitet; auch am Bischofssee und im Hauptsmoorwald bei Bamberg.

Navic. rhynchocephala. Kütz. (Bacill. Taf. 30. Fig. 35. Spec. Alg. p. 75. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 196. Alg. Sachs. Nr. 887. Pritschard Infus. p. 900. Taf. 7. Fig. 68.)

b. *Forma parva*. (Nav. dirhynchus Ehrenb. Verbr. Taf. 3. Fig. 1. 11.)

In Gräben auf dem Schmaussenbuck bei Nürnberg. Kann mit der *Synedra acicularis* verwechselt werden, unterscheidet sich aber durch die Gegenwart eines Centralknotens.

Navic. elliptica. Kützing. (Bacill. p. 98. Taf. 30. Fig. 55. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 179. Alg. Europ. Nr. 502. 785. *Navic. ovalis* Smith. Diatom. p. 48. Taf. 17. Fig. 153.)

In Gräben im Reichsforste.

Navic. Pupula. Kützing. (Bacill. p. 93. Taf. 30. Fig. 40. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 173.)

In Gräben im Reichsforste.

Navic. cryptocephala. Kützing. (Bacill. p. 95. Taf. 3. Fig. 20. 26. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 198.)

In Gräben im Reichsforste, am Bischofssee, ziemlich verbreitet.

Navic. affinis. Ehrenberg. (Verbr. p. 129. Taf. 2. Fig. 7., Taf. 4. Fig. 6. 10. Kützing. Bacill. p. 95. Taf. 28. Fig. 65. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 196. Alg. Europ. Nr. 581. 1484.)

In der „Solitude“ bei Erlangen.

Navic. dicephala. Ehrenberg. (Infus. p. 185. Kützing. Bacill. p. 96. Taf. 28. Fig. 60. 62. Grunow Wien.

Verhandl. 1860. p. 538. Taf. II. Fig. 45. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 199.) Länge 0,069 mm bis 0,076 mm. Die fränk. Specim. mit den bei Rabenh. (Süsswasserdiat. Taf. 6. Fig. 44.) abgebildeten Specim. genau übereinstimmend.

In einem Graben im Reichsforste (mit *Navic. amphioxys*, *Sphaerosoma excavatum* und anderen Desmidien).

Navic. amphioxys. Ehrenberg. (Verbr. d. 123. Taf. 1. Fig. 8. Kützing. Bacill. Taf. 28. Fig. 37. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 175.)

In einem Graben im Reichsforste.

Navic. mutica. Kützing. (Bacill. p. 93. Taf. 3. Fig. 23. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 185. Süsswasserdiat. p. 38. Taf. 6. Fig. 81. Grunow. Wien. Verhandl. 1860. p. 36. Taf. 3. Fig. 16.) Länge 0,015 mm bis 0,017 mm.

In Gräben in der „Solitude“ bei Erlangen, am Kosbacher Weiher.

Navic. pachycephala. Rabenh. (Süsswasserdiat. p. 40. Taf. 6. Fig. 60. Fl. Europ. Alg. pag. 195.) Länge 0,03 mm. bis 0,038 mm.

Die fränkischen Specim., aus einer Wiesenpfütze an der Regnitz bei Erlangen, stimmen mit den bei Rabenh. (Süsswasserdiat. Taf. 6. Fig. 40.) abgebildeten Specim. überein.

Navic. nodosa. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 179. Taf. 13. Fig. 9. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 207. Süsswasserdiat. p. 41. Taf. VI. Fig. 86.)

In der „Solitude“ bei Erlangen, in Wiesengräben an der Regnitz bei Beiersdorf.

Pinnularia. Ehrenberg.

Pinn. major. Kützing. (*Navic. major*. Kützing. Bacill. Taf. 4. Fig. 19. *Navic. viridis* Ehrenberg. Infusionsth. p. 182. Taf. 13. Fig. 16. *Pinnul. major*. Rabenh. Süsswasserdiat. p. 42. Taf. 6. Fig. 5. Fl. Europ. Alg. p. 210. Alg. Europas Nro. 621. 1485.)

Im Gebiete in den Waldgräben und in Sümpfen verbreitet.

Pinn. viridula. Kützing. (Navic. virid. Kütz. Bacill. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 214. Süßwasserdiat. Taf. 6. Fig. 39. Alg. Europ. Nr. 682.)

In Gräben im Reichsforste.

Pinn. radiosa. Kützing. (Navic. radiosa. Kützing. Bacill. Taf. 4. Fig. 23. *Pinn. radiosa*. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 214. Süßwasserdiat. p. 43. Taf. Fig. 9. Alg. Europ. Nr. 1262. 1087, 1424. *Pinn. silesiaca*. Bleisch. Alg. Europ. Nr. 954.)

In einem Graben am Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Pinn. nobilis. Ehrenberg. (Abhandl. der Berl. Ac. 1840. p. 20. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 209. Süßwasserdiat. p. 44. Taf. 6. Fig. 2. Alg. Europ. Nr. 848. 1486. Navic. nobilis Kützing. Bacill. Taf. 4. Fig. 24.)

In mehreren Specim. in einem Diatomeengemenge aus einem Altwasser der Regnitz bei Erlangen (unter andern Pinnularien, Synederen, Cymatopleura nobilis, Navicula.)

Pinn. gibba. Ehrenberg. (Verbr. Taf. 1. Fig. 8. Taf. 2. Fig. 24. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 211. Süßwasserdiat. p. 45. Taf. 6. Fig. 27. Alg. Europ. Nr. 668. 864. Navicula gibba. Kütz. Bacill. p. 98. Taf. 28. Fig. 70.)

In Gräben im Reichsforste, am Bischofssee.

Pinn. Tabellaria. Ehrenberg. (Verbr. p. 134. Taf. 2. Fig. 26. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 211. Süßwasserdiat. p. 44. Taf. 6. Fig. 24. Navicula Tabellaria. Kützing. Bacill. p. 98. Taf. 28. Fig. 79.)

In Gräben im Reichsforste.

Pleurosigma. Smith.

Pleuros. attenuatum. Kützing. (Navicula attenuata. Kütz. Bacill. p. 102. Taf. 4. Fig. 28. Gyrosigma attenuat. Rabenh. Süßwasserdiat. p. 47. Fl. Europ. Alg. p. 239. Alg. Europ. Nr. 602. 688.)

In Gräben am Bischofssee, bei Effeltrich u. a. O.

Pleuros. acuminatum. Kützing. (Frustulia acuminata. Kütz. Linnaea. 1833. Taf. 14. Fig. 39. Alg. exsicc.

Nr. 84. *Navicula Sigma*. Ehrenberg. Infusionsth. p. 181. Taf. 13. Fig. 12. *Pleurosigma acumin.* Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 239. *Gyrosigma Hassalii.* Rabenh. Süßwasserdiat. p. 47.)

In Gräben am Bischofssee, bei Möhrendorf, Altwässer der Regnitz bei Erlangen.

Pleuros. curvulum. Ehrenberg. (*Navicula Curvula.* Ehrenb. Infusionsth. p. 181. Taf. 13. Fig. 14. *Gyrosigma Curvulum* Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 241. Süßwasserdiat. p. 47. Taf. 5. Fig. 8.)

Mit der vorhergehenden.

Stauroneis. Ehrenberg.

Stauron. Phoenicenteron Nitsch. (*Bacill. Phoenicenteron* Nitsch. *Stauron. Phoenicent.* Ehrenb. Verbr. Taf. 2. Fig. 1. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 244. Süßwasserdiat. p. 47. Taf. 9. Fig. 1. Alg. Europ. Nr. 664.)

b. *Forma minor* (*Stauron. amphilepta* Ehrenb. Verbr. Taf. 1. Fig. 9. Fl. Europ. Alg. p. 245. Süßwasserdiat. Taf. 9. Fig. 7.)

Länge der grösseren Form 0,061 mm bis 0,404 mm.

Länge der kleinern Form 0,054 mm, Breite 0,016 mm.

Die grössere Form am Bischofssee, in Gräben bei Möhrendorf, die kleinere Form mit *Pinnularien*, *Naviceln*, *Synedreen*, *Cosmarium*, *Botrytis*, *Staurastr. Hystrix*, *francoicum* in einem Graben im Reichsforste.

Stauron. linearis. Ehrenberg. (Verbr. p. 135. Taf. 1. Fig. 11. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 246. Süßwasserdiat. p. 48. Taf. IX. Fig. 8. *Stauron. inanis.* Perty. Kleinste Lebensf. p. 106. Taf. 17. Fig. 7.)

Länge 0,053 mm.

In Gräben bei der Schleifmühle bei Erlangen, in Gräben im Reichsforste.

Familie der Synedreen (Synedreae).

Synedra. Ehrenberg.

Synedr. lunaris. Ehrenberg. (Abhandl. d. Berl. Acad. 1831. p. 87. Infusionsth. p. 221. Taf. 17. Fig. 4. Kütz. Bacill. Taf. 13. Fig. 1. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 128. Süßwasserdiat. p. 51. Taf. 5. Fig. 6. Alg. Europ. Nr. 784. 1384.)

Syn. radians. Kützing. (Bacill. Taf. 14. Fig. 7. 1–4. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 136. Süßwasserdiat. p. 56. Taf. IV. Fig. 40.)

An Vaucherien und Conferven, in Gräben bei Möhren-
dorf, am Schmausenbuck bei Nürnberg.

Syn. Acus. Kützing. (Bacill. p. 68. Taf. 15. Fig. 7. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 136. Süßwasserdiat. Taf. 4. Fig. 42. Alg. Europ. Nr. 623. *Synedra tenuis*. Kützing. Bacill. Taf. 14. Fig. 12. Alg. Europ. Nr. 1102.)

b. *tenuissima*. Kütz. (Bacill. Taf. 14. Fig. 6.)

c. *curvula*.

In Gräben um Erlangen.

d. *gracillima*. (Rabenhorst. Süßwasserdiat. Taf. 4. Fig. 20. d. e.)

Syn. acicularis. Smith. (Diatom. I. p. 70. Taf. 11. Fig. 86. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 131. *Syn. Smithii*. Pritschard. Infusor. p. 786.)

Länge 0,046mm bis 0,054mm, Breite 0,04mm bis 0,06mm.

In einem Brunnentroge und Brunnenstöcke in Marlostein
bei Erlangen.

Syn. amphicephala. Kützing. (Bacill. pag. 64. Taf. 3. Fig. 12. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 135. Alg. Europ. Nr. 704. Grunow. Wien. Verhandl. 1862. p. 400.)

In der „Solitude“ bei Erlangen, mit *Tabellaria ventri-*
cosa etc.

Syn. minutissima. Smith. (Diatom. Taf. 11. Fig. 87. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 132.)

In Gräben im Reichsforste und anderwärts.

Syn. *Ulna*. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 211. Taf. 17. Fig. 1 Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 133. Süsswasserdiat. Taf. 4. Fig. 4. a—d. *Bacillaria Ulna*. Nitsch Beitr. zur Infusorienk. p. 99. Taf. 5.)

In mehreren Formen sehr verbreitet im Gebiete; eine sehr grosse Form mit 0,448 mm bis 0,459 mm langen, 0,017 mm bis 0,015 mm breiten Zellen beobachtete ich in einem Graben im Reichsforste bei Temmenlohe.

Nitschia. Hassal.

Nitsch. sigmoidea. Smith. (Diatom. I. p. 38. Taf. 13. Fig. 103. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 154. Alg. Europ. Nr. 752. *Bacillaria sigmoidea*. Nitsch. Beitr. p. 104. *Navicula sigmoidea*. Ehrenberg Infusionsth. p. 182. Taf. 13. Fig. 13. *Synedra sigmoidea*. Kützing. Bacill. p. 67. Taf. 4. Fig. 36. 37. *Sigmatella Nitschii*. Kützing. Synops. Spec. Alg. p. 18. Wartmann Krypt. d. Schweiz Nr. 129. Rabenh. Süsswasserdiat. Taf. 4. Fig. 1.)

Unter andern Diatomeen in vereinzelt Specim. an mehreren Orten beobachtet. In der Schlucht hinter dem Gesundbrunnen bei Puckenhof, in einem Altwasser der Regnitz beim Neuenhaus bei Erlangen, in einem Graben im Hauptmoorwald bei Bamberg.

Nitsch. acicularis. Kütz. (*Synedra acicularis*. Bacill. p. 63. Taf. 4. Fig. 3. *Nitschia acic.* Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 164. Alg. Europ. Nr. 1187. *Ceratoneis acicularis*. Pritschard. Infusor. p. 783.)

1. In Gräben unter andern Diatomeen.

Nitsch. franconica. P. Reinsch.

Cellulae a latere laterali visae anguste lineales, sigmiformes, summa cellula rotundata, margines dupliciter conturati, sine punctulis, cellulae a latere frontali anguste lineales, lineae laterales rectae, cellulae lineis binis subconvergentibus a cellulis summis usque ad cellulae mediam partem se pertinentibus

instructae, lineae in latere exteriori punctarum serie singula instructae.

Longit. 0,168mm bis 0,152mm Latit. 0,007mm bis 0,001mm.

var. b. serpentina

Cellulae a latere laterali visae dupliciter flexuosae Nitschia Bleischii. Janisch (Alg. Europ. Nr. 1651) ist der typischen Form ähnlich, unterscheidet sich jedoch von letzterer durch höhere Längendimension, durch die nicht bis zur Mitte der Zellen sich erstreckenden, von den Spitzen nach der Mitte konvergirenden Linien, durch die an der Spitze löffelförmig erweiterten Enden.

In feuchten und zum Theil mit Wasser angefüllten Waldgräben im Reichsforste bei Neubof, zwischen Erlangen und Nürnberg. Die Alge wird in den europäischen Algen mitgetheilt werden.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. 1. Fig. 1. Fig. 1 a. Ein Individuum der typischen Form (Länge 0,16mm, Breite 0,007mm), von der Hauptseite betrachtet; b, ein Individuum der Form serpentina (Dimensionen dieselben), von der Hauptseite betrachtet; c, zwei noch zusammenhängende Tochterindividuen, von der Nebenseite betrachtet; d, der oberste Theil eines Individuums der typischen Form, von der Nebenseite betrachtet, stärker (um das doppelte) vergrößert; e, der oberste Theil eines Individuums der typischen Form, von der Hauptseite betrachtet, stärker (um das doppelte) vergrößert.

Familie der Gomphonemeen (Gomphonemeae).

Gomphonema. Agardh.

Gomphon. tenellum Kützinger. (Bacill. p. 84. Taf. 8. Fig. 8. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 283 Alg. Europ. Nr. 1163.)

Auf Vaucherien und Confervenspäden schmarotzend, in Gräben bei Möhrendorf, in Altwässern der Regnitz.

Gomphon. abbreviatum. Agardh. (Conspect. Alg. p. 34. Kützinger. Bacill. p. 84. Taf. 8. Fig. 5. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 285. Licmophora minuta. Kütz. Alg. exsicc. Nr. 23.)

b longipes. (Kützing. Bacill. Taf. 14. Fig. 12. Gomphonema rotundatum Ehrenberg. Infusionsth. p. 218. Taf. 16. Fig. 7.)

An Conferven in Gräben bei Möhrendorf, bei Erlangen, auf Steinen in der Tauber bei Rothenburg.

Gomph. curvatum. Kützing. (Bacill. Taf. 8. Fig. 1—3. Rabenh. Süßwasserdiat. Taf. 8. Fig. 20. Alg. Europ. Nr. 408. 181.)

An Conferven (Cladophoren) und auf Steinen in der Tauber bei Rothenburg, in Bächlein im fränkischen Jura.

Gomph. gracile Ehrenberg. (Infusionsth. p. 217. Taf. 18. Fig. 3. Kützing. Bacill. p. 84. Taf. Fig. 14. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 285. Alg. Eur. Nr. 1224. *Gomph. minutum*. Agardh. Consp. Alg. p. 34.)

An den Blättern der *Hottonia palustris*, in Gräben und Tümpeln bei Möhrendorf bei Erlangen.

Gomphon. acuminatum. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 217. Taf. 18. Fig. 4, Kützing. Bacill. Taf. 13. Fig. 4. Rabenh. Fl. Europ. Alg. 290. Alg. Europ. Nr. 322. 1343. *Gomphon. trigonocephalum* Ehrenberg. Microgeol. Taf. 6. Fig. 36.)

In Tümpeln am Donau-Maincanale bei Erlangen, aufgewachsen oder vereinzelt

Gomphon. coronatum Ehrenberg. (Rabenh. Süßwasserdiatom p. 60. Taf. 8. Fig. 7.)

Diese lebend nur in Nordamerika und fossil in Italien bekannte Art beobachtete ich in einem Tümpel am Donau-Mainkanale bei Erlangen; mit *Achnanthidium naviculoides*. P. Reinsch, *Cymbella gaströides* u. A.

Die fränkischen Specim. stimmen mit den bei Rabenhorst (Süßwasserdiat. Taf. 8. Fig. 7.) abgebildeten Individuen überein, das untere Ende ist weniger verdickt, am Ende etwas verschmälert, das obere Ende wie das Verhältniss des Längen zum Querdurchmesser stimmen genau überein.

Die Länge der fränkischen Specimina beträgt 0,092mm

bis 0,117 mm, die grösste Breite in der Mitte des Zellchens 0,013 mm bis 0,016 mm.

Gomph. olivacea. Lyngbye. (*Echinella olivacea* Lyngb. Hydroph. Dan. Taf. 70. Fig. 1—3. *Gomphon. olivac.* Kütz. Bacill. p. 85. Taf. 7. Fig. 13. 15. Ehrenberg. Infusionsth. p. 218. Taf. 18. Fig. 9. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 291. *Gomph. Leibleinii*. Agardh. Consp. Alg. p. 33. *Gomphonella olivacea*. Rabenh. Süsswasserdiat. Taf. 9. Fig. 1. Alg. Europ. Nr. 282. 1085.)

An Steinen in der Tauber bei Rothenburg, in Bächlein im fränkischen Jura.

Familie der Meridien (*Meridieae*).

Meridion. Agardh.

Merid. circulare. Agardh. (Consp. Alg. p. 40. Kütz. Bacill. p. 41. Taf. 7. Fig. 16. Rabenh. Süsswasserdiat. Taf. 1. Fig. 1. Fl. Europ. Alg. p. 294. Ehrenberg. Infusionsth. p. 207. Taf. 16. Fig. 2. Alg. Europ. Nr. 401.)

In grosser Menge und sehr rein trat die Alge plötzlich in einem mit Gräben in Zusammenhang stehenden Tümpel am Donau-Mainkanale auf im Frühling 1865, weniger rein aber konstant kommt die Alge an mehreren Orten im Gebiete vor; in den Gewässern im fränkischen Jura ist die Alge ebenfalls nicht selten.

Merid. constrictum. Ralfs. (Ann. of Nat. Hist. v. 12. p. 485. Taf. 18. Fig. 2. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 295. Süsswasserdiat. p. 62. Taf. 1. Fig. 2. Alg. Europ. Nr. 702. *Eumeridion constrictum*. Kütz. Bacill. Taf. 29. Fig. 81.)

In Gräben im Reichsforste, am Donau-Mainkanale.

Familie der Tabellarien (*Tabellarieae*).

Tabellaria. Ehrenberg.

Tabell. fenestrata. Lyngbye. (Kütz. Bacill. Taf. 17. Fig. 22. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 301. Alg. Europ. Nr. 1361. *Tabellaria trinodia*. Ehrenberg. Microgr.)

Im Gebiete sehr verbreitet.

Tabell. flocculosa. Roth. (*Conferva flocculosa*. Roth. Catalog. I. p. 292. Taf. 4. Tabell. floccul. Kützing. Bacillar. p. 127. Taf. 17. Fig. 21. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 301. Süßwasserdiat. p. 63. Taf. 10. Fig. 2 Pritchard. Infus. p. 807. Taf. 13. Fig. 29.)

b *ventricosa*. (Tabell. ventricosa. Kützing. Bacill. Taf. 30. Fig. 74 Pritchard. Infus. Taf. 13. Fig. 26. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 301. Alg. Europ. Nr. 1046. 1384.)

Beide Formen im Gebiete ziemlich verbreitet und manchmal untereinander gemischt, wie dies z. B. in der „Solitude“ bei Erlangen der Fall ist.

Zweite Abtheilung.

Phycochromaceae (*Phycochromhaltige Algen*).

Familie der Chroococcaceen (Chroococcaceae).

Chroococcus. Naegeli.

Chroococc. rufescens Naegeli. (Gattungen einzelt. Algen, p. 46, Taf. 1, Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 69. *Pleurococcus rufescens*, Brébiss.)

Zellehen 0,008mm bis 0,018mm im Durchmesser.

An feuchten Felswänden (Keupersandstein) in verlassenen Steinbrüchen; auf dem Schmausenbuck bei Nüruberg, in dem verlassenen Steinbruche östlich von Tennenlohe.

Chroococc. chalybeus Kützing. (*Protococcus chalybeus*, Kützing.)

Zellehen 0,007mm bis 0,009mm im Durchmesser, mit der Hülle bis 0,014mm breit, der Inhalt schön spangrün gefärbt.

In Sümpfen und stehenden kleinen Gewässern entweder in der schlammigen Erde verborgen oder unter andere Algen (Oscillarien, Diatomeen) gemischt. Am Bischofssee, bei Seebach.

Chroococc. turgidus, Naegeli. (*Pleurococcus turgidus*, Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 69. Alg. Sachs. Nr. 104.)

An feuchten Sandsteinfelsen. Im Reichsforste zwischen Tennenlohe und Kalchreuth.

Den genetischen Zusammenhang des *Chrooc. turgidus* mit *Nostoc*, welchen Hantsch (Alg. Europ. Nr. 1333 der 33. Dekade) angiebt, habe ich in der Natur noch nicht beobachten können. Den Zusammenhang, welcher in dem mitgetheilten Präparate stattfinden soll, habe ich darin nicht wahrnehmen können. Die

vereinzelt *Chroococcus* zellen haben darin mit den einzelligen Zuständen der sogenannten „Dermosphären“ Itzichsohns nichts weiter gemein als die Färbung des Zellinhaltes; der Bau der „Hüllen“ des Zellchens unterscheidet beide, während bei der *Chroococcus* zelle diese „Hülle“ aus mehreren Lagen zusammengesetzt ist, besteht dieselbe bei den einzelligen Dermosphären, die in der That den Beginn zu einer vielzelligen Nostocfamilie darstellen, aus einer einzigen homogenen Lage. Die Verschiedenheit einer Nostoc zelle von einer *Chroococcus* zelle scheint mir nur in diesem Umstande und darin nicht bloss der generelle sondern auch der familiäre Unterschied begründet zu sein. Die Verwandtschaft, von welcher Naegeli (Gattungen einzell. Alg. p. 44) spricht, scheint mir daher nur in der Uebereinstimmung des Zellinhaltes begründet zu sein. — Das obige Präparat bringt die Lösung der Frage, ob Nostoc und *Chroococcus* in eine Entwicklungsreihe gehören um keinen Schritt weiter, es beweist dasselbe vielmehr nur, dass Nostocanfänge und *Chroococcus turgidus* zugleich an ein und demselben Standorte mit einander vorkommen können. In einem Walde können sowohl Eichen als auch Buchen als auch Eichen und Buchen mit und untereinander ganz wohl vorkommen, ohne dass die Eiche in die Buche überzugehen nöthig hat.

Chroococc. aureus. Rabenhorst. (Kryptogam. Sachs. p. 70.)

Zellen 0,084 mm. bis 0,117 mm. im Durchmesser.

In Gräben unter andern Algen; Reichsforst.

Chroococc. pallidus. Naegeli. (Gattg. einzell. Alg. p. 46. Taf. I. A. Fig. 2.)

Zellchen 0,007 mm. bis 0,013 mm. im Durchmesser.

In Gräben im Reichsforste.

Gloeocapsa. Naegeli.

Gloeocapsa atrata. Kützinger. (Naegeli Gattgn. einzell. Alg. p. 50. Taf. 1. A. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 71. Alg. Sachs. Nr. 173).

Zellchen 0,001mm. bis 0,004mm. im Durchmesser.

An feuchten Keupersandsteinfelsen auf dem Schmausenbuck bei Nürnberg, früher in grosser Menge und sehr rein an dem inneren Gewölbe der Brücke des Donau-Mainkanals über den Rödelheim, daselbst eine bis fingerdicke pulverige Kruste bildend, seit der Restauration der Brücke verschwunden. Von dem letzteren Standorte wird die Pflanze in den Alg. Europ. mitgetheilt werden.

Gloeocapsa ambigua. Naegeli. (Gattgn. einzell. Alg. p. 50. Taf. 1. F. Fig. 3.)

Die Zellchen 0,001mm. im Durchmesser.

An nassen Jurakalkfelsen im Wiesenthale bei Pottenstein.

Gloeocapsa conspicua. P. Reinsch.

Thallus (familia cellularum) distinctius limitatus regulariter sphaericus aut sphaerico ellipsoidicus: cellulae regulariter sphaericae, interstitiis hyalinis aequalibus minoribus disjunctae, membrana crassiore, cytioblastmate subgranuloso, colore aurantiaco usque aurantiacorubello; familiae cellularum numerus 550 usque 600. Cellularum diameter 0,008mm. bis 0,012mm.

Familiae diameter 0,1 bis 0,166mm.

Auf der äusseren Kruste noch nicht ganz ausgetrockneten schlammigen Bodens von abgelassenen Fischteichen bei Möhrendorf, in Gesellschaft von *Botrydium granulatum*. Die Familien sind auf der Oberfläche eines abgehobenen Stückchens Bodens recht gut schon mit blossem Auge erkennbar.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. 1. Fig. 4.

Fig. 4. a. eine einzelne Familie; vergr. $\frac{35}{1}$; b. Theilchen der Oberfläche einer Familie sehr stark vergrössert Vergr. $\frac{880}{1}$. Von den Glöökapsen und von andern Chroococcaceen sind im Gebiete noch eine weit grössere Anzahl von Arten vertreten, ich gebe hier nur die in meinem Herbarium vorhandenen schon bestimmten Arten aus dem vorliegenden Materiale. Die späteren Untersuchungen müssen dieses Verzeichniss noch vervollständigen.

Aphanocapsa. Naegeli.

Aphanoc. virescens. Hassal. (*Corosporium virescens*. Hassal britt. Freshw Alg. p. 310. Taf. 38. Fig. 8. a. *Aphanoc. parietina*. Naegeli Gattgn. einzell. Alg. p. 52. Taf. 1. Fig 1. *Microhaloa virescens*. Kützing. Spec. Alg. p. 207. *Aphan. pariet.* Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 73.)

Durchmesser der schmutzig grünlichen Zellchen 0,003mm.

An feuchten Jurakalkblöcken (Streitberg im Wiesenthale.)

Polycystis. Kützing.

Polyc. aeruginosa. Kützing. (Tabul. Phyc. I. Taf. 8. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 73. Alg. Sachs. Nr. 209. *Clathrocystis aerugin.* Henfrey. Rabenh. Fl Europ. Alg. II. p 54. *Myroc. Ichthyoblabe*. Brebiss. Meneghini. Synops. Nostoch. p. 104.)

Zellchen 0,003 mm bis 0,004 mm im Durchmesser.

Auf der Oberfläche des Weiherchens zwischen Kraftshof und Almoshof bei Nürnberg als eine schön spangrüne Haut über 100 Quadratfuss Fläche überziehend (Juni 1864); weder in den vorhergehenden Jahren noch in dem nachfolgenden daselbst beobachtet.

Polyc. elabens. Brebisson. (*Micraloa elab.* Meneghini. Synops. Nostoch. p. 104 *Myrocyst. elab.* Kützing. Tabul. Phycol. I. Taf. 8. *Polyc. elabens*. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 73. Fl. Europ. Algar. p. 53).

Durchmesser der Zellchen 0,003 mm. bis 0,005 mm., einer grösseren Familie bis zu 0,084 mm.

Unter Schlamm in schlammigen Gräben am Bischofssee.

Coelosphaerium. Naegeli.

Coelosphaer. Kützingianum. Naegeli. (Gattg. einzell. Alg. p. 54. Taf. 1. C. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 75. Fl. Europ. Alg. II. p. 55.)

Zellen 0,003mm. im Durchmesser, Familien von 0,029mm. bis 0,041mm. im Durchmesser.

Die Familien schwimmen entweder frei im Wasser umher, oder sind unter Algengemengen eingestreut.

In einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf.

Gomphosphaeria. Kützing.

Gomphosph. oponina. Kützing. (Algae exsicc. Nr. 151. Tabul. Phycol. I. Taf. 31. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 56. Alg. Europ. Nr. 1497.)

Zellchen 0,003mm. bis 0,006mm. breit, Durchmesser einer grösseren Familie bis zu 0,108mm.

In einem Graben am Eisenbahndamme bei Eltersdorf unter *Conferva rigida* in zahlloser Menge; von diesem Standorte wird die Pflanze in den Alg. Europ. erscheinen.

Synechococcus. Naegeli.

Synechoc. aeruginosus. Naegeli. (Gatt. einzell. Alg. d. 56. Taf. 1. E. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 75. Fl. Europ. Alg. p. 59.)

Auf feuchtem humosen Waldboden (am Grunde von wasserlosen Gräben) im Reichsforste bei Kraftshof.

Synechoc. elongatus. Naegeli. (Gattg. einz. Alg. p. 56. Taf. 1. E. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 75. Flora Europ. Alg. p. 59.)

Auf feuchtem etwas schlammigem Grunde wasserloser Waldgräben im Reichsforste bei Tennenlohe (Brucker Lache.)

Synechoc. parvulus. Naegeli. (Gattungen einzell. Alg. p. 56. Taf. 1. E. Fig. 3. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. II. p. 59.)

Die Zellchen um die Hälfte kleiner als bei *aeruginosus*, graugrün.

Auf feuchter Walderde im Reichsforste.

Gloeothece. Naegeli.

Gloeoth. confluens. Naegeli. (Gattg. einzell. Alg. p. 58. Taf. 1. G. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 75. Fl. Europ. Alg. p. 60.)

Zwischen Moosen (*Hypnum curvatum* und *Leskea*) an feuchten schattigen Abhängen; Rathsberger Wald bei Erlangen.

Aphanothece. Naegeli.

Aphanoth. microscopica. Naegeli. Gatt. einzell. Alg. p. 53. Taf. 1. H. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 76. Fl. Europ. Alg. p. 63.)

Zellchen 0,004mm. lang, eine Familie bis zu 0,235mm. Durchmesser.

In kleinen Tümpeln ober dem grösseren Kosbacher Weiher freischwimmend oder anderen Gegenständen (Baumblättern) aufsitzend.

Merismopedia. Meyer.

Merismoped. elegans. Al. Braun. (Kützing Spec. p. 472. Rabenh. Alg. Europ. Nr. 515. Flor. Europ. Alg. p. 57.)

In einem kleinen Weiherchen bei Möhrendorf.

Merismop. convoluta. Brebisson. (Kützing. Spec. Alg. p. 472. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 77. Fl. Europ. Alg. p. 58. Alg. Sachs. Nr. 719. Alg. Europas Nr. 1355.)

Bei dieser ansehnlichsten Art, deren Familien eine Länge bis zu zwei Linien erreichen und aus Zellfamilien bis zur fünften und sechsten Ordnung zusammengesetzt sind, lässt sich, da die Individuen höchst regelmässig und symmetrisch vertheilt sind, die Anzahl der in einer ganzen Familie vorhandenen Zellindividuen leicht berechnen. Eine Zellfamilie dieser Art, welche zwei Linien lang, eine Linie breit ist, würde aus 524288 Zellindividuen zusammengesetzt sein, das ganze Täfelchen besteht aus 16 Zellfamilien 2. Ordnung, deren jede 32768 Zell-

individuen enthält, je vier Zellfamilien 2. Ordnung bilden eine Zellfamilie 1. Ordnung, die ganze Familie besteht aus 64 kleinsten Familien (3. Ordnung). (P. Reinsch, das Mikroskop.)

Die Pflanze beobachtete ich in einem Graben an dem Eisenbahndamme der Station Beiersdorf, Bubenreuth gegenüber in einzelnen frei flottirenden und unter andern Algen befindlichen Specim. Die Täfelchen zeigen sich unregelmässig gefaltet, auf einem Glastäfelchen in eine Ebene ausgebreitet zeigen dieselben regelmässigen rektangulären Umriss.

nov. Gen. *Tetrapedia*. P. Reinsch.

Planta unicellularis ad Chroococcacearum familiam pertinens; cellulae solitariae aut rarius consociatione individuorum plurium familias ex cellulis binis, quaternis aut 16is exstitutas constituentes, in sciagraphia quadraticae, cellula singula incisuris quaternis in cellulas filias quaternas dilapsa, cellulae filiae post divisionem individuas singulas se praebentes, incisurarum directio in marginum lateralium directione perpendiculari aut in angulo semirectangulo versa; cellularum interanea granulosa, colore aerugineo.

Tetrapedia gothica. P. Reinsch.

Cellulae in sciagraphia quadraticae, margines laterales in medio non profunde incisi, lobuli in medio paulo emarginati; cellulae evolutiores quadripartitae, incisurarum directio in marginum lateralium directione perpendicularis.

Latit. 0,006mm. usque 0,008mm., familiae ex quaternis cellulis extractae latit. 0,013mm., familiae ex cellulis 16is extractae latit. 0,027mm. usque 0,03mm.

Die zierliche neue Gattung entdeckte ich in dieser Art im Juni 1863 in vereinzelt Specim. in aus einem Graben am Kosbacher Weiher geschöpftem Wasser, später beobachtete ich dieselbe unter andern Desmidiaceen und Chroococcaceen aus einem Tümpel bei der Schleifmühle bei Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. II. Fig. II.

Fig. I. a) Eine vierzellige Familie, die Zellchen in der Mitte an den Ecken noch zusammenhängend, die Tiefe der Einschnitte fast von der Breite der Zellchen, die einzelnen Zellchen völlig ausgebildet, d. h. schon mit der Anlage zur Theilung zu einer neuen Zellgeneration, die Ränder der Seitenläppchen der Zellchen in der Mitte mässig ausgerandet; b) eine andere vierzellige Zellfamilie, die Einschnitte bis auf $\frac{2}{3}$ der Breite eines einzeln Zellchens sich erstreckend, die einzelnen Zellchen zeigen noch nicht die Andeutung zur Theilung zu einer neuen Familie, die nach aussen gerichteten Seitenränder der Zellchen mässig ausgeschweift, die Ecken abgerundet stumpf; c) ein Zellchen im Stadium der Theilung begriffen, die Einschnitte bis zu $\frac{1}{4}$ der Breite des Zellchens reichend; d) und e) zwei einzelne entwickelte Zellchen, deren Seitenränder die Andeutung der Theilung tragen; f) ein etwas weiter fortgeschrittenes Zellchen von etwas kleineren Dimensionen; g) ein Zellchen mit Andeutung zur Theilung, die Ecken abgerundet stumpf; h) Seitenansicht dieses Individuums; i) eine vierzellige Familie einer eigenthümlichen Form, die vielleicht eine eigene Art darstellt, die ich aber nur in einem Specimen beobachtet habe, die Zellchen kreuzförmig aus je vier halbkreisrunden Läppchen gebildet, ob die einzelnen Zellchen den entwickelten Zustand oder schon einen Zustand im Beginne zu einer neuen Theilung darstellen, wage ich nicht zu entscheiden, die Dimensionen wie bei einer vierzelligen Familie der gewöhnlichen Form; k) eine vierzellige Familie der gewöhnlichen Form, mit ebenso gestalteten Zellchen wie die der Figur b. dargestellten Familie, die Einschnitte aber tiefer sich erstreckend; das Scheibchen in der Mitte mit einem viereckigen Loche versehen; l) Seitenansicht dieser Familie; m) eine 16zellige Familie, aus vier kleineren an den entsprechenden Ecken noch zusammenhängenden Familien gebildet, alle Zellen gleichgestaltet und die Andeutung zu einer abermaligen Theilung zeigend.

Tetrapedia Crux Michaeli. P. Reinsch.

Cellulae in sciagraphia quadraticae, margines laterales

integerrimi utrimque leniter emarginati; cellulae evolutiores (in statu divisionis) quadripartitae, incisurarum directio in marginum lateralium directione angulo semirectangulo versa.

Cellularum (in statu divisionis) latitudo 0,008 mm. usque 0,012 mm.

Nur in wenigen Specim. beobachtet in einem Tümpel bei der Schwabach, und in einem einzigen Specimen in einem Tümpel an der Seebach bei Kleinseebach.

Die wenigen beobachteten Specimina zeigten nur wenig verschiedene Zustände, welcher Art die Zellchen ohne Andeutung zu einer Theilung sind, lässt sich nach den beobachteten Specim., die offenbar nur verschiedene Zustände der Theilung darstellen, nicht angeben.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. I. Fig. VI.

Fig. VI. a) Ein Individuum von denjenigen beobachteten Zuständen, welche die geringste Theilung darstellen; b) ein Individuum von dem beobachteten Zustande, welcher die am weitesten fortgeschrittene Theilung zeigte; c) Seitenansicht desselben Individuums.

Familie der Oscillarieen, Schwingalgen (Oscillarieae).

Spirulina. Link.

Spirul Jenneri. Kützing. (Tabul. Phyc. I. Taf. 31. Fig. 11. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 90. Kryptogfl. Sachs. p. 78. *Spirillum Jenneri*. Hass. br. Freschw. Alg. p. 277.)

Fäden 0,004mm. bis 0,007mm. dick.

Auf der Oberfläche des Teiches unterhalb des Geuder'schen Schlosses in Heroldsberg eine zarte spangrüne Schichte von grosser Ausdehnung bildend. Nicht in jedem Jahre sich entwickelnd.

Leptothrix. Kützing.

Leptothr. muralis. Kützing. (Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 80. *Hypheotrix calcicola*, b. *muralis* Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 78.)

An nassen Gartenmauern, an vermoderten Pfählen in Gärten.

Leptothr. fontana Kützing. (Phycol. Gener. p. 200. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 79. Kryptog. Sachs. p. 79.)

Breite der Fäden 0,006 mm. bis 0,008 mm.

Die Fäden ungegliedert.

var. *aeruginea*.

Lebhaft spangrün. In dem klaren Quellwasser, welches von dem „tropfenden Felsen“ im Reichsforste seinen Ursprung nimmt, zusammenhängende schlüpfrig anzufühlende Rasen von spangrüner Färbung bildend, die untere Seite dicht am Sande befestigt. Die oft mehrere Quadratzoll einnehmenden Rasen lassen sich ohne zu zerreißen nicht vom Boden abheben.

Diese var. ist nicht synonym mit dem *Leptothr. fontana*. Kütz. (Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 79.)

Leptothr. caespitosa Kützing. (Tab. Phyc. I. p. 59. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 74.)

An feuchten Mauern und Steinen; am Burghberg bei Erlangen.

Leptothryx lateritia Kützing (Spec. Alg. p. 268. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 84. *Hypheothrix lateritia*. Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 66. 535. *Oscillaria tapetiformis*. Zenker.)

An nassen Mauern und auf feuchter festgetretener Erde

Hypheothrix. Kützing.

Hypheothr. subtilissima Kützing. (Phycol. Gener. p. 200. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 77. Alg. Sachs. Nr. 268. Kryptog. Sachs. p. 81.)

Grünlich schleimige Ueberzüge auf feuchter festgetretener Gartenerde bildend.

Hypheothr. coriacea Kützing. (Spec. Alg. p. 267. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 81. Fl. Europ. Alg. p. 83.)

a) *turfacea*. (Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 671.)

In halb ausgetrockneten moorigen Waldgräben

b) *Meneghinii*. (Kützing. Spec. Alg. p. 268.)

An nassen Mauern (Mühlwehren, Mauern an der Schwabach)

Hypheothrix Zenkeri. Kützing. (Spec. Alg. p. 268. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 85. Alg. Sachs. Nr. 66. 535. Alg. Europ. Nr. 1633.)

Bildet an mit tropfendem Wasser überrieselten Jurakalkfelsen im fränkischen Jura zusammenhängende röthlich bis rosaroth gefärbte Schichten.

Ein an der Stützmauer des Kanaleinschnittes bei dem Burgberge bei Erlangen vorkommendes *Hypheothrix*, welches kleine Flächen (2 — 3 Quadratzoll) überzieht, scheint mir noch hierher zu gehören.

Phormidium. Kützing.

Phormid. vulgare. Kützing. (Phycol. Gener. p. 193. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 119. Kryptog. Sachs. p. 83)

a) *myochroum*, bräunliche Schichten, häufig.

b) *leptodermum*, grünliche Ueberzüge namentlich auf Holz.

c) *publicum*, spangrüne Anflüge in Winkeln im Schatten an Häusern.

Phormid. membranaceum Kützing. (Phycol. Gener. p. 194. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 120. Kryptog. Sachs. p. 83. Alg. Sachs. Nr. 179.)

An den Bretterwänden von Mühlgerinnen und Schleussen verbreitete hautartige Ueberzüge bildend; Schleifmühle, Wehr der Schwabach am „Gesundbrunnen.“

Phormid. papyraceum. Kützing. (Phycol. Gener. p. 193. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 145. Kryptogfl. Sachs. p. 83. Alg. Sachs. Nr. 265. *Oscillaria papyracea* Agardh. Systema Alg. p. 61)

Bildet schon spangrüne Ueberzüge an den Wänden von Wiesenwässerungsgräben, in welchen das Wasser langsamer oder schneller fließt, in Wiesen an der Regnitz bei Erlangen;

die Pflanze siedelt sich auch am Grunde des langsam fließenden Rödelheimbaches unterhalb der Kanalbrücke an, daselbst bildet dieselbe öfters bis Quadratfuss grosse Ueberzüge, die aber beim Herausnehmen auseinanderfallen; wenn das Wasser gestaut wird, steigen die Rasen in beträchtlichen Stücken an die Oberfläche empor. Getrocknet hat die Pflanze hautartige Textur und lässt sich in ausgetrockneten Wiesengräben im Herbste in fusslangen Stücken abziehen.

Phormid. rupestre. Kützing. (Tab. Phycol. I. p. 65. Rabenh. Fl. Alg. p. 122. Kryptogfl. Sachs. p. 82, Kützing. Alg. exsicc. Nr. 15. *Oscillaria rupestris.* Agardh. Systema. Alg. p. 63.)

An von überrieselnden Wasser nassen Kalk- und Dolomittfelsen im fränkischen Jura (Streitberg, Gössweinstein).

Phormid Corium. Agardh. (*Oscillaria Corium.* Ag. Systema Alg. p. 64. *Phorm. Corium* Kützing. Phycol. Gener. p. 193. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 426. Kryptogfl. Sachs. p. 83. Alg. Sachs. Nr. 414.)

In dem Mülhgerinne, in welchen das Wasser sehr schnell sich bewegt weit ausgedehnte an der obersten Fläche sehr schlüpfrige Ueberzüge von derber lederartiger Textur bildend. Wenn die Mülhgerinne trocken gelegt sind, so lösen sich die Ueberzüge ab und die Ränder rollen sich ein; im trockenen Zustand sind die Rasen sehr brüchig. In allen Mühlen im Schwabachgrunde hinauf. Die Pflanze wird von der Schleifmühle bei Erlangen in den Alg. Europas mitgetheilt werden.

Chthonoblastus. Kützing.

Chthonobl. lacustris. Rabenh. (Kryptogfl. Sachs. p. 83. Fl. Europ. Alg. p. 133.)

Am Bischofssee.

Chthonobl. Vaucheri. Kützing. (Phycol. Gener. p. 117. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 132. Kryptogfl. Sachs. p. 85. Alg. Sachs. Nr. 149. *Oscillaria vaginata* Vauch. Conf.

d'eau douce. p. 200. *Microcoleum terrestris* Brebisson Alg. Falaise. p. 28.)

Auf wenig betretenen Wegen in Gärten auf dem Burgberge bei Erlangen.

Oscillaria. Bosc.

Die Oscillarien finden sich im Gebiete ziemlich stark vertreten, namentlich ist es die westliche Weiher- und Sumpfgegend in welcher die Oscillarien ein stark vorwiegendes Element der Algenflora bilden, in den Nachträgen soll die Oscillarienflora noch vervollständigt werden.

Oscill. versatilis. Kütz. (Phycol. Gener. p. 184. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 85. *Beggiatoa arachnoidea*. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 94.)

Auf nassem Weihereschlamme. Am Bischoffssee.

Oscill. tenerrima. Kütz. (Tab. Phycol. Taf. 38. Fig. 8. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 96. Alg. Sachs. Nr. 329.)

In kleinen Tümpeln bei Möhrendorf.

Oscill. antliaria. Jürgens. (Alg. exsicc. Nr. 14. Kütz. Tab. Phycol. Taf. 40. Fig. 6. Brügger Bündn. Alg. p. 258. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 100. Alg. Sachs. Nr. 331.)

Auf nassem Boden um die Brunnen in Dörfern.

b) *purpureo-coerulea*. Martius. (Flora Cryptog. erlang. p. 306). Bläulich-rothe Ueberzüge in schlammigen Gräben.

Oscill. brevis. Kütz. (Linnaea VIII. p. 363. Tabul. Phycol. Taf. 39. Fig. 6. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 99. Alg. Sachs. Nr. 30.)

In Tümpeln und Pfützen am Bischoffssee.

Oscill. tenuis. Agardh. (Syst. Alg. p. 60. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 102. Kryptogfl. Sachs. p. 83.)

a) *viridis* Vaucher. (Hist. de Conf. d'eau douce. p. 95. Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 120. 1016.)

Fäden dunkelgrün schwärzlich.

b) *formosa* Bory. (Dictionn. class. Rabenh. Fl. Europ. p. 102. Alg. Sachs. Nr. 247.)

c) *sordida*. Kützing. (Tabul. Phycol. Taf. 41. Fig. 7. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 103. Alg. Sachs. Nr. 1123.)

Fäden olivenfarbig.

Oscill. limosa. Agardh. (Systema. Alg. p. 66. Kütz. Phycol. Gener. p. 187. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 102. *Conferva limosa* Roth Catalog.)

Ziemlich verbreitet in Pfützen auf Gänseangern, in kleinen Sümpfen an Weihern.

a) *aeruginea*. Kütz. (Tab. Phycol. Taf. 41. Fig. 2. Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 120.) Lebhaft spangrün.

b) *chalybea*. Kütz. (Tab. Phyc. Taf. 41. Fig. 3. Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 331.) Blauschwärzlich.

c) *subfusca*. Kütz. (Spec. Alg. p. 244.)

Oscill. nigra. Vaucher. (Hist. des Conf. d'eau douce p. 192. Kützing. Phycol. Gener. p. 189. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 107.)

In Gräben und Pfützen am Bischofssee.

Oscill. princeps. Vaucher. (Hist. des Conf. d'eau douce. p. 190. Kützing. Phycol. Gener. p. 190. Rabenhorst Kryptogfl. Sachs. p. 91. Fl. Europ. Alg. p. 112. Alg. Sachs. Nr. 238, 239.)

In Gräben und Pfützen am Bischofssee und bei Möhrendorf.

b) *maxima*. Kützing. (Phycol. Gener. p. 190. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 112.)

In kleinen Weiherchen bei Möhrendorf.

Lyngbya. Agardh.

Lyngb. cincinnata. Kützing. (Phycol. Gener. p. 226. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 136. Alg. Sachs. Nr. 557. *Calothrix lanata* Kützing. Alg. exsicc. Nr. 5. *Lyngbya discolor*. Kryptog. Bad. Nr. 463.)

Auf einem Altwasser der Regnitz nahe bei Oberndorf bei Beiersdorf verfilzte dunkelgrüne Matten bildend.

Die Fäden der Pflanze von diesem Standorte sehr konstant 0,019 mm. bis 0,021 mm. dick. Die älteren Zellen des Fadens viermal breiter als lang, spangrün oder bräunlich, die Endzellen des Fadens erreichen die Länge der Hälfte der Breite. Die „Keimzellen“ scheinen sich in folgender Weise zu entwickeln: eine einzelne Zelle des Fadens, welche sich im frühesten Zustande in den Dimensionen von den benachbarten Zellen nicht unterscheidet, welche aber durch den glashellen nicht körnigen Inhalt, der wie im späteren Zustande schon bräunlich gefärbt ist, unterschieden ist, streckt sich vorwiegend in die Länge und erlangt zuletzt eine genau kugelige Gestalt, die Membran der kugelig gewordenen Zelle zeigt sich doppelt konturirt, der Inhalt sehr fein körnig aber nicht wie bei den übrigen Zellen undurchsichtig; häufig zeigt sich im Inhalte ein einzelnes Bläschen? oder Körnchen, die der Zelle benachbarten Zellen sind meistens abgerundet; manchmal scheint auch der Raum zwischen je zwei Zellen leer zu sein.

(Die Pflanze wird von diesem Standorte in den „europäischen Algen“ mitgetheilt werden.)

Synploc. Kützing.

Synpl. minuta. Agardh. (*Scytonema minuta* Systema Alg. p. 39. *Synploc. minuta*. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 155. Kryptogff. Sachs. p. 93. Alg. Sachs. Nr. 395.)

Auf der Erde zwischen Gras auf einer Viehtriste bei Atzelsberg.

Synpl. Friesiana. Agardh. (*Oscillaria Friesii*. Systema Algar. p. 61. Synpl. Friesiana. Kützing. Phycol. German. p. 201. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 158.)

Zwischen Moosen an Abhängen im fränkischen Jura.

b) *Wallrothiana*. (Kützing. Phycol. Gener. p. 201.)

Zwischen Moosen und an schattigen etwas feuchten Bergabhängen im fränkischen Jura.

Familie der Schleimlinge (Nostochaceae).

Nostoc. Vaucher.

Nostoc. rupestre. Kützing. Spec. Alg. p. 296. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 163. Alg. Sachs. Nr. 87. Hormosiphon furfuraceus Kützing. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 98. synonym *Nostoc rupestre* Kütz.)

An feuchten Keupersandsteinfelsen auf dem Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Nost. minutissimum. Kützing. (Phycol. Gener. p. 204. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 162.)

An Moosen (*Hypnum*) in feuchten schattigen Schluchten. Atzelsberg, Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Nost. sphaericum. Vaucher. (Hist. des Conf. p. 222. Meneghini. Nostoch. p. 110. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 167. *Nostoc irregulare* Wartmann. Schweiz. Kryptog. Nr. 40)

In einer feuchten Schlucht bei Adlitz (auf Liasmergelboden).

Nost. commune. Vaucher. (Conferves d'eau douce p. 223. Meneghini. Nostoch. p. 107. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 175. Alg. Sachs. Nr. 62. 472. 644. 646. 959.)

Im ganzen Gebiete sehr verbreitet sowohl im Kalk- wie im Kieselgebiete. Im Spätsommer und Herbst nach plötzlichem Regen bei vorhergehender Dürre oft in grosser Menge weite Strecken in Föhrenwäldern, auf Heiden etc. bedeckend.

Nost. rufescens. Agardh. (Systema Alg. p. 22. Kütz. Alg. exsicc. Nr. 31. Meneghini. Nostoch. p. 112. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 179.)

Hellbräunlich bis rothbräunlich, gestaltlose schlüpfrige Gallertmassen auf der Oberfläche kleinerer mit stehendem Wasser angefüllter Gräben bildend.

b) *aeruginea.* Rabenhorst. (Fl. Europ. Alg. p. 179. *Nostoc. piscinale.* Kützing. Spec. Alg. p. 301. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 98.)

Dunkelspaugrün. In Gräben mit ruhigem Wasser am Bischoffssee.

Nosc. muscorum. Agardh. (*Systema Alg.* p. 19. Meneghini. *Nostoch.* p. 119. Rabenhorst. *Fl. Europ. Alg.* p. 173.)

Auf nakter Erde, zwischen Moosen, an einigen Stellen im Reichsforste.

Cylindrospermum. Kützing.

Cylindr. macrospermum. Kützing. (*Phycol. Germ.* p. 173. Wartmann *Kryptog. d. Schweiz.* Nr. 140. Rabenh. *Fl. Europ. Alg.* p. 186. *Kryptogfl. Sachs.* p. 98. *Alg. Sachs.* Nr. 61. 904.)

In Gräben längs der Eisenbahn vor der Station Beiersdorf.

Cylindrosp. circinale. Kützing. (*Phycol. German.* p. 173. Rabenh. *Fl. Europ. Alg.* p. 190. *Alg. Sachs.* p. 390.)

Am Bischoffssee und andern Weihern. Ist nicht selten aber nur in ganz kurzer Zeit zu beobachten, da die Pflanze sehr schnell entsteht und schnell wieder verschwindet.

Cylindrosp. riparium. Kützing. (*Phycol. Gener.* p. 212. Rabenh. *Fl. Europ. Alg.* p. 189. *Alg. Sachs.* Nr. 1013.)

In Gräben im Reichsforste, zwischen Sphagnen und andern Moosen.

Sphaerozyga. Agardh.

Sphaeroz. Carmichaelii. Harvey. (*Phycol. Britt.* Taf. 113. Rabenhorst *Fl. Europ. Alg.* p. 191. *Alg. Sachs.* Nr. 130. *Cylindrosperm. Carmichaelii.* Kütz. *Spec. et Tabul.*)

Breite der Fäden 0,005 mm. bis 0,009 mm. Breite der „Sporen“ ebenso, Länge derselben 0,021 mm. bis 0,029 mm., der Inhalt derselben fein gekörnelt, die Membran derselben doppelt konturirt, dick röthlich gefärbt.

In schlammigen Gräben im Reichsforste, am Peterleinswege, an dem Forstorte „Rehbock.“

Sphaeroz. polysperma. Rabenhorst. (Alg. Sachs. Nr. 204. Fl. Europ. Alg. p. 192. Kryptogfl. Sachs. p. 100. *Cylindroperm. polysperma*. Kütz. Spec. et Tabul. *Cylindrosp. elongatum* Kütz. *Cylindrosp. mesoleptum*. Brebisson. *Sphaerozyga Flotowiana*. Kütz.)

In Tümpeln an der Seebach.

Sphaeroz. flos aquae. Agardh. (*Oscillaria*. Agardh. Systema Alg. p. 59. *Sphaeroz. flos aquae* Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 195. Kryptogfl. Sachs. p. 100. Alg. Sachs. Nr. 246. Alg. Europ. Nr. 1463. *Limnochlide flos aquae* Kütz. Spec.)

Die Sporenzellen bis 0,061mm, lang. (Breite 0,007mm.)

Es finden sich der langen Sporenzellen bei den Specim. von einem Standorte weniger als bei den in den europ. Algen enthaltenen Specim. von Brünn. Die vegetativen Zellen sind sehr zart und mit zartgekörntem Inhalte, dieselben sind von sehr verschiedener Grösse und oft länger als die „Sporenzellen.“

In dem Bassin des Springbrunnens im Erlanger Schlossgarten, erfüllte die Pflanze das ganze etwa 80 Fuss lange Becken, war aber nur kurze Zeit bemerklich (im August — September 65), und verschwand mit dem Eintritte des Herbstes wieder.

Von einem anderen Standorte (Gräben an der Eisenbahn bei Beiersdorf) waren die Zellen im Verhältnisse zur Breite weniger lang. Die Färbung der Zellen wird durch Einwirkung von Wärme und Licht bedeutend verändert, die anfängliche Färbung kehrt aber nach einiger Zeit wieder zurück. Ein mit der schön spangrünen Pflanze bedecktes Gläschen hatte ich einige Tage der Einwirkung der Sonne (bei 26° R. im Schatten zu Mittag) ausgesetzt, wodurch die schön spangrüne Farbe in ein schmutziges Weiss übergeführt wurde; nachdem das Täfelchen über ein Jahr im Herbar gelegen hatte, fand ich zu meinem Erstaunen die Färbung der Pflanze (wobei ich bemerke, dass ich auf der Etiquette dieses Präparat diess besonders bezeichnet hatte) wieder verändert und von der ursprünglichen Färbung durchaus nicht verschieden. Es ist dies

eigenthümliche chemisch nicht gut erklärbare Phänomen ein Beweis, dass der grüne Farbstoff in den Zellen der Oscillarien durchaus nicht identisch ist mit dem Chlorophyll der Phanerogamen und der wirklich mit Chlorophyll versehenen Algen, da bekanntlich das Chlorophyll in der leblosen Zelle durch die Einwirkung des Lichtes nicht nur chemisch sondern auch optisch verändert wird.

Anabaina. Bory.

Anab. flos aquae. Lyngbye. (*Nostoc flos aquae.* Lyngb. Tent. Hydroph. Dan. Taf. 68. Fig. 2. *Anabaina flos aquae.* Kütz. Phycol Gener. p. 209. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 182. Kryptogfl. Sachs. p. 101. Alg. Sachs. Nr. 27.)

Auf der Oberfläche von Gräben mit stehendem Wasser am Eisenbahndamme bei Beiersdorf, am Bischoffssee.

Anab. gelatinosa. P. Reinsch.

Physeumatis substantia gelatinoso-lubrica, laete olivaceo-aeruginea; fila recta longiora moniliformia non intertexta; cellulae distinctius disjunctae, omnes aequales, cellulae in statu divisionis ellipsoidicae, in medio annulariter constrictae.

Filorum latitudo 0,001mm bis 0,006mm.

Von den benachbarten (*Anab. stagnalis*, *variabilis*, *nodularia*, *bullosa*) durch die Färbung und durch die gallertige Beschaffenheit des Lagers (in der Färbung der Zellchen weniger) unterschieden.

Nahe bei Erlangen in einem stehenden mit der Regnitz in Zusammenhang stehenden Wasser einen auf der Oberfläche weit ausgebreiteten gallertigen Ueberzug von 1—2 Zoll Dicke bildend. Die oliven-spangrüne Färbung des Lagers ist an dem Standorte durch etwas beigemengtes vom Grunde des Wassers aufsteigendes gelbes Eisenoxyd etwas verunreinigt. Die Pflanze wird in den „europ. Algen“ mitgetheilt werden.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. I. Fig. V.

Fig V. a) drei Fäden des gallertigen Lagers Vergr. $4\frac{0}{1}$; b) ein Faden stärker vergrößert; c) ein noch stärker vergröß-

sert gezeichneter Faden, die drei untern Zellchen im Stadium der Theilung begriffen, in der Mitte ein wenig ringförmig eingefaltet, das oberste Zellchen im entwickelten ungetheilten Zustande.

Familie der Rivulariaceen (Rivulariaceae).

Gloiotrichia. Agardh.

Gloiotr. Sprengelii. Kützing. (Rivularia Sprengel. Kütz. Phycol. Gener. p. 239. Rivularia angulosa. Sprengel. Flor. Hall. p. 560. Gloiotr. Sprengel. Rabenhorst. Fl. Europ. Alg. p. 203. Kryptogfl. Sachs. p. 101. Alg. Sachs. Nr. 793.)

An Potamogeton und Nymphaea festsitzend; im Kutscherweiher bei Erlangen, in Weihern bei Seebach.

Gloiotr. angulosa. Roth. Rivularia angulosa. Roth Catal. II. p. 50. Agardh Systema Alg. p. 25. Tremella natans. Hedwig. theoria generat. Taf. 36. Fig. 7—10. Gloiotr. angulosa. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 201. Kryptogfl. Sachs. p. 102. Alg. Sachs. Nr. 931.)

An Potamogeton, Ceratophyllum festsitzend, auch freischwimmend, in Weihern bei Seebach, in dem Altwasser der Regnitz bei Alterlangen.

Rivularia. Roth.

Rivul. Pisum. Agardh. (Syst. Alg. p. 25. Mackay. Fl. hibern. p. 235. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 206. Kryptogfl. Sachs. p. 102. Alg. Sachs. Nr. 236. 870. Rivularia lacustris. Cramer in Kryptog. der Schweiz Nr. 347. Physactis Pisum Kützing Tabul. et Species Alg.)

An Utricularia, Ceratophyllum festsitzend; am Bischoffssee, Kosbacher Weiher, in Tümpeln am Donau-Mainkanale zwischen Erlangen und Bruck.

Rivularia Pisum b. saccata. Kützing. (Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 206. Kryptogfl. Sachs. 102.)

Am Bischoffssee und in Weihern bei Möhrendorf, in manchen Jahrgängen massenhaft entwickelt.

Limnactis. Kützing.

Limn. minutula. Kützing. (Phycol. Gener. p. 237 Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 210. Kryptogfl. Sachs p. 102.)
An Nymphäen, in Gräben bei Seebach.

Schizosiphon. Kützing.

Schizosiph. rupestris. Kützing. (Schizos. apiculatus B. rupestris Kütz. Spez. Alg. p. 327. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 238.)

An nassen Felswänden (Keupersandsteinen) auf dem Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Familie der Scytonemaceen, Lederfäden (Scytonemaceae).

Scytonema. Agardh.

Scyton. tomentosum. Kützing. (Phycol. Gener. p. 217. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 248. Kryptogfl. Sachs. p. 107. Alg. Sachs. Nr. 595.)

Auf feuchtem humosen Heideboden, bisweilen in Gräben zwischen Moosen. Reichsforst bei Heroldsberg, Lauf.

Scyton. turfosum. Kützing. (Phycol. Gener. p. 216. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 255. Alg. Sachs. Nr. 696. 1176.)

Auf humosem feuchtem Haide- und Moorboden im Reichsforste. Tennenlohe, Heroldsberg.

Calothrix. Agardh.

Calothr. synplocoides. P. Reinsch.

Laete aeruginea aut amethyste viridis, fila dena usque duodena (in statu vegeto) in fascies erectos singulos congregata, fila distinctius articulata, integerrima aut rarius ramis singulis instructa, cellularum diamanter longitudinalis diametro transversali aequalis aut paulo longior, cellularum interanea (cytoblasma) indistinctius granulosa, laete aeruginea.

Filorum latitudo 0,009 mm. bis 0,012 mm.

An einem Keuperfelsen, den immerwährend tropfendes Wasser

während des ganzen Jahres feucht erhält, Moose und herabhängende Wurzeln von Laub- und Nadelbäumen mit einem dunkelspangrünen Filze überkleidend.

Beim tropfenden Felsen im Reichsforste (die Pflanze wird von da in den europ. Algen mitgetheilt werden).

Tolypothrix. Kützing.

Tolyp. tenuis. Kützing. (Phycol. Gener. p. 228. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 273. Alg. Sachs. Nr. 649.)

In Torfgräben in der Markwaldung bei Heroldsbach.

Tolyp. Aegagropila Kützing. Phycol. Gener. p. 228. Nr. 7 Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 274. Alg. Sachs. Nr. 257. *Calothrix Aegagropila* Kützing. Alg. exsicc. Nr. 7.)

In Gräben, entweder freischwimmend oder an Wasserpflanzen aufsitzend, Möhrendorf, Markwaldung, Teich bei Unterbürg bei Nürnberg.

Tolyp. rhizomatoidea. P. Reinsch.

In *Nymphaeae albae* rarius *Nupharis lutei* foliorum superficie inferiore caespites laete aerugineos minores 10 — 5 mm latos constituens; fila dimorpha, altera crassiora simplicia in rhizomatis modo in substrato repentia, altera paulo tenuiora a filorum crassiorum cellulis singulis horizontaliter excurrentia, simplicia aut ramis longioribus et brevioribus singulis secundis instructa; fila omnia distinctius articulata, cellularum singularum longitudo latitudini aequalis, cellularum interanea (cytoblasma aut.) dense subtiliter granulosa, laete aeruginea.

Filorum crassiorum crassitudo 0,009 mm bis 0,012 mm.

Filorum tenuiorum crassitudo 0,006 mm bis 0,008 mm.

In Tümpeln und kleineren mit tiefem ruhigen Wasser angefüllten Weiherchen (Altwässern der Regnitz) bei Oberndorf und Beiersdorf.

Im trockenen Zustande bildet die Pflanze grüne scharf umgrenzte Flecken; die Pflanze ist vom Sommer bis in den Spätherbst und Wintersanfang zu beobachten. Dieselbe wird in den europ. Algen mitgetheilt werden.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. I. Fig. III.

Fig. III. a) Bruchstück eines längeren rhizomartig kriechenden Fadens mit den Seitenzweigen, die meisten der Seitenfäden sind mit kürzeren und längeren Aestchen versehen, die kürzeren Aestchen sind nur zweizellig, die allerkürzesten Aestchen stellen nur Auszackungen einzelner Zellen des Fadens dar, dieselben sind die untersten am Faden, nach oben werden die Aestchen allmählig länger; b) eines der rhizomartig kriechenden Fäden stärker vergrößert, der spangrüne Inhalt ist bei den meisten Zellchen scharf umgrenzt und von der inneren Zellwandung durch einen schmäleren hyalinen Zwischenraum getrennt, nur bei einem Zellchen ist das ganze Zelllumen mit dem grünen Inhalte erfüllt.

Familie der Sirosiphoniaceen (Sirosiphoniceae).

Sirosiphon. Kützing.

Siros. ocellatus. Kützing. (Spec. Alg. p. 317. Fischer. Beitr. zur Kennt. der Nost. p. 23. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 286. *Scytonema ocillatum*. Harvey Manual. p. 153. Mougot et Nestler Stirp. cryptog. Nr. 691. *Conferva ocellata*. Dillwyn britt. Conferv.)

Auf Haideboden am Rande von Waldgräben im Reichsforste.

Siros. torulosus. Rabenhorst. (Hedwigia. I. p. 16. Fl. Europ. Alg. p. 287.)

An nassen Dolomitwänden im fränkischen Jura; Egloffstein.

Siros. pulvinatus. Brebisson. (Kützing Spec. Alg. p. 317. Tabulae Phycol. Taf. 36. Rabenh. Fl. Europ. Alg. p. 290. *Sirosiphon rugulosus*. Kütz. Spec. et Tab. *Sirosiph. secundatus* Kütz. Spec. et Tabul.)

In halb ausgetrockneten mit niedrigen Pflanzenresten erfüllten Waldgräben, modernde Baumzweige und Moose überziehend. Im Reichsforste an mehreren Orten.

Hapalosiphon. Naegeli.

Hapalos. Braunii Naegeli. (Kützing. Spec. Alg. p. 894. Fischer Beitr. zur Kenntn. der Nost. p. 22. Rabenhorst Fl. Europ. Alg. p. 283. *Tolypothrix pumila* Kützing Spec. Alg.)

An abgestorbenen Blättern von *Potamogeton natans* und *Sagittaria sagittaeifolia* in einem Weiherchen zwischen Beiersdorf und Forchheim

Dritte Abtheilung.

Chlorophyllaceae (*Chlorophyllhaltige Algen.*)

I. Ordnung der chlorophyllhaltigen Algen: **Palmellaceae** **Palmellaceen.**

Familie der Palmelleen (Palmelleae).

Pleurococcus. Meneghini.

Pl. vulgaris. Menegh. (Menegh. in Kütz. Tab. phyc. Taf. 5. Fig. 1. *Protococcus vulgaris.* Kütz. Tab. phyc. T. b. *Chlorococcum vulgare.* Grev. Scott. Krypt. Fl. IV. T. 262.)

Im ganzen Gebiete verbreitet. An der Rinde innerhalb der Stadt stehender Bäume, vorzüglich der Linden, dunkelgrüne bei der Trockniss pulverige Ueberzüge bildend.

Nürnberg (an Bäumen auf der Stadtmauer, in den Anlagen, sowie an allen Bäumen auf der Insel Schütt); Erlangen (an Bäumen im Schlossgarten etc.) An den nackten Wänden an den Eingängen zu den Höhlen im fränkischen Jura, wie auch innerhalb der Höhlen noch, soweit das Tageslicht ins Innere dringt, öfters fast sammtartige, dunkelgrüne, bei der Berührung abfärbende Ueberzüge bildend wie z. B. in der Riesenburg, am Eingange zur Sophienhöhle u. a. Die Pflanze scheint sich nur auf Dolomit, der etwas kieselhaltig ist, anzusiedeln, auf Jurakalk habe ich dieselbe noch nicht beobachtet. Um Erlangen kommt die Pflanze ebenfalls nicht selten auf Keupersandstein vor. Im Schlosse Kunreuth bildet die Pflanze

in einer beschatteten, etwas feuchten Höhlung in der inneren Schlossmauer einen fast fingerdicken Ueberzug.

Pleurococcus viridis. Kützing, welche sich nicht selten mit voriger vergesellschaftet findet, stellt kaum eine ein wenig kleinere, etwas heller gefärbte Form des vulgaris dar.

Die mit einer glashellen Hülle umgebenen Zellchen des vulgaris haben im Durchmesser 0,006 mm bis 0,008 mm.; die Zellchen des viridis 0,002 mm. bis 0,006 mm.

Pl. tectorum. Kütz. (*Protococcus tectorum*. Kützing. Rabenh. Alg. Nr 317.)

Auf Strohdächern von Scheunen in Dörfern im fränk. Jura staubige bei der Befeuchtung schleimige Ueberzüge bildend.

Pl. vestitus. P. Reinsch.

Membrana cellularum plerumque solitarium rarius in familias minores congregatorum piliculis (filis mucilaginosi) dense vestita; cellularum interanea colore aurantiaco; membrana crassiuscula.

Cellularum diam. 0,027 mm. bis 0,023 mm.

Der Inhalt der meistens vereinzelter Zellchen schön orangegelb gefärbt, mit ein oder zwei purpurrothen Oeltröpfchen versehen, die Membran ziemlich dick und doppelt konturirt, eigenthümlich durch die kurzen fadenförmigen Anhänge, welche aus Schleim gebildet sind.

Obwohl die Zellchen dieser neuen Form kein Chlorophyll enthalten, so habe ich dieselbe doch einstweilen bei *Pleurococcus* untergebracht, da eine der von Naegeli entdeckten Formen, deren Zellinhalt mennigroth gefärbt ist (*Pleuroc. miniatus*. Naeg.) ebenfalls bei *Pleurococcus* untergebracht ist. Mit diesem letzteren, welcher bis jetzt nur an den Wänden von Treibhäusern, daselbst breiige rostbraune Ueberzüge bildend, beobachtet wurde, stimmt der *vestitus* ebenfalls ausser in der Beschaffenheit des Zellinhaltes noch darin überein, dass meistens nur vereinzelter Zellindividuen seltener aus 2 oder 4 Zellen bestehende Zellfamilien vorkommen. In einem Graben (zeitweise austrocknend) an Moosen und andern Gegenständen

gelblich gefärbte Stellen bis zu 1 Zoll Breite bildend. April 1864 entdeckt.

Bis jetzt nur an einer Stelle im Reichsforste beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. 3. Fig. 4.

Fig. 4. a) Ein Zellchen von den grössten beobachteten Dimensionen (0,027 mm. Durchmesser), im Innern der Zelle zwei grössere heller als der Zellinhalt gefärbte Oeltropfen; b) ein viel kleineres Zellchen, auf dessen äusserer Hülle sich nur Rudimente von Härchen zeigen (Durchmesser 0,011 mm.).

Gloeocystis. Naegeli. (Gatt. einz. Algen.)

Gloeoc. vesiculosa. Naegeli. (Gattungen einz. Alg. p. 66. Taf 4. F. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 128. Rabenh. Alg. Nr. 707.)

An morschen über Wasser stehenden Pfählen und Brettern, die immerwährend feucht sind, schlüpfrige gallertige Ueberzüge bildend. Am Kosbacher Weiher bei Erlangen, in einem Weiher bei Schallershof nahe bei dem Markte Bruck.

Gloeoc. botryoides. Kütz (*Gloeocapsa botryoides*. Kütz. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 128.)

Die Zellchen viel kleiner als bei der *vesiculosa*, scheint eine gute Art darzustellen und ist im Gebiete verbreiteter als erstere. Findet sich ausser an Pfosten in Weihern auch an nassen alten Brettern in Holzscheunen und in Ecken in Gärten.

Eine an feuchten Juradolomitwänden in der Riesenburg, bei Gössweinstein u. a. O. im fränkischen Jura vorkommende von mir noch nicht genauer untersuchte und gemessene Form, welche gewöhnlich beim Trocknen feste bei der Befeuchtung gelatinirende Ueberzüge bildet, scheint mir nach vorläufiger Untersuchung *Gl. rupestris* Kütz. e. p. darzustellen, welche Art ich aber als noch nicht sicher für das Gebiet als noch nicht eigenthümlich aufführen kann.

Palmella. (Lynbye ex. p.) Naegeli.

Palm. mucosa. Kützinger (Phyc. Gen. Taf. 3. Fig. 1. Rabenh. Krypt. Deutschl. Nr. 4972 p. 59. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 129. Alg. Sachs. p. 287.)

Auf Steinen und auf Pfählen am Rande eines Weiherchens bei Schallershof nahe bei dem Markte Bruck.

Palm. botryoides. Lynngbye. (Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 1037. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 129.)

An Holz, Steinen am Ufer der Schwabach bei Erlangen.

Porphyridium. Naegeli.

Porphyr. cruentum. Agardh. (Naegeli.) (*Palmella cruenta*. Ag. Syst. p. 15. Græv. Scott. Fl. T. 205. Rabenh. Deutsch. Krypt. p. 59. Rabenh. Krypt. Sachs. p. 129. *Coccoloris sanguinea* Wallroth Fl. Crypt. Germ. II. p. 5. *Porphyridium cruentum* Naeg. Gattgn. einz. Alg. p. 71. Taf. 4. H.)

Bildet auf feuchter nackter Erde, unter Dachtraufen, im Schatten von Gartenmauern blasseröthliche, schleimige Ueberzüge.

Diese Form ist von Naegeli mit Recht von *Palmella* getrennt und zur eigenen Gattung erhoben worden.

Palmodactylon. Naegeli.

Palm. varium. Naegeli. (Gattgn. einz. Alg. p. 71. T. II. B. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 130.)

Unterscheidet sich von der zweiten bekannten ebenfalls im Gebiete vorkommenden Art nur durch die strahlige Anordnung der kürzeren minderzelligeren Zellfamilien.

Meist an lebenden Wasserpflanzen oder abgestorbenen Theilen solcher mit andern Algen aufsitzend.

Am Kosbacher und Dochsendorfer Weiher bei Erlangen.

Palm. subramosum. Naegeli. (Gattgn. einz. Alg. p. 71. Taf. II. B. Fig. 3.)

Zellfamilien ganz einfach, seltener am untern Ende einfach gabelig verästelt.

In einem Graben am Peterleinswege bei Puckenhof (Sebaldiforst) unter vielen Desmidiaceen und mit Desmid. aptogonium unter auf dem Wasser schwimmenden Algengemengen in Altwässern der Regnitz bei Oberndorf unterhalb Erlangen (unter Desmid. quadrangulare, Swartzii, Sirogonium sticticum, Zygnemaarten, Cosmarien, Staurastren eingemengt.)

Palmod. simplex. Naeg., welches nur eine Form des varium darzustellen scheint, habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Wegen der äusserst zarten, durchsichtigen die einzelnen Zellchen umhüllenden Schleimschichte kann die Pflanze, wenn sie sich unter andern Algen eingemischt findet, leicht übersehen oder für eine Palmella gehalten werden.

Tetraspora. Agardh.

Tetrasp. explanata. Kützinger. (Tab. Phycol. Rabenh. Alg. Nr. 24. Rabenh. Alg. Europ. Nr. 1661.)

In der Tauber bei Rothenburg kleine freischwimmende oder auch an Steinchen festsitzende meist mit Kalkschlamm und Diatomaceen (Cocconeis, Cocconemen, Cymbellen) verunreinigte Massen bis zu ein Zoll Länge bildend.

Die Zellchen sind bei dieser Art nicht so regelmässig und enge an einander gedrängt in der Gallerte gruppiert wie bei andern Arten.

Tetrasp. gelatinosa. Desvaux. (Agardh. syst. p. 188. Ag. spec. I. p. 426. Wallroth. Fl. Crypt. Germ. II. p. 8. Rabenh. Alg. Nr. 178. Rabenh. Krypt. Sachs. p. 131. Ulva gelatinosa. Vauch. Hist. des Conf. p. 244.)

In Gräbchen, die immerwährend mit Wasser gefüllt sind, am Donau-Mainkanale, Baiersdorf, Möhrendorf.)

Tetrasp. lubrica. Agardh. (Spec. p. 188. Rabenh. Kryptog. Deutschl. Nr. 4996. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 131. Solenia lubrica. Spreng. Syst. 4. p. 367. Rivularia lubrica.

Del. Fl. gall. VI. p. 1. *Ulva lubrica*. Roth. Fl. Germ. III. p. 540. *Tremella palustris*. Weber: Spicil. p. 279.)

Im Gebiete kommt diese schöne Tetraspose an mehreren Orten sehr rein und sehr reichlich vor.

In moorigen Tümpeln am „Moosbrunnlein“ im Laurenziforste wie noch an mehreren andern Stellen in Wiesengräben in den Serbachwiesen oberhalb Möhrendorf (Erlangen), in Altwässern der Regnitz bei Forchheim.

Die var. *lacunosa* (Kützing Phyc. Germ.) findet sich sehr schön und sehr reichlich in einem quelligen immerwährend mit fliessendem Wasser versehenen Waldgraben in der „Solitude“ bei Erlangen. (Die Pflanze lebt nur in kleinen Gräben mit immerwährend fliessendem klaren kalten Wasser mit etwas mooriger Unterlage.)

Die vielfach zerschlitzte und mit Löchern versehene röhrlige Zellfamilie dieser Pflanze erreicht oft eine Länge von einem Fuss. Wie unermesslich die Zahlenverhältnisse bei diesen Gewächsen auf der niedersten Stufe des Systemes anwachsen, beweist meine Berechnung der Anzahl der in einer Quadratlinie der Familie wie der Anzahl der in einer ganzen Zellfamilie von einem Fuss Länge enthaltenen einzelnen Zellindividuen, deren Zahl bei einer solchen Familie nach Millionen gezählt werden muss. (Vergl. P. Reinsch über den Vorgang der Fortpflanzung der Zellen der *Tetraspora lubrica*, in morphol. anatom. und physiol. Fragm. im Bullétin de la société Imper. de Moscou. 1865.)

Tetrasp. natans. Kützing. (Phyc. Germ. Rabenh. Alg. Nr. 407. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 131.)

Bildete im Mai 1864 auf kleinen später im Sommer vertrocknenden Pfützen an Weihern bei Effeltrich bei Erlangen eine beinahe zwei Zoll dicke schwimmende lebhaft grün gefärbte kompakte Masse; die einzelnen Zellfamilien waren von ziemlich fester Textur, häufig im Innern hohl im Umrisse deutlich begrenzt und hatten Erbsengrösse bis zu zwei Zoll Durchmesser.

Die Zellchen sind in der Familie dichter zusammenge-
drängt als bei *Tetr. lubrica* und haben ungefähr denselben
Durchmesser. Die grössten eben in der Theilung begriffenen
„Mutterzellchen“ einer neuen Familie letzter Ordnung (immer
aus je vier Zellen zusammengesetzt) haben bis 0,008 mm.
Durchmesser, die kleinsten Zellchen bis zu 0,0004 mm. Durch-
messer.

Dictyosphaerium. Naegeli.

Dictyosph. Ehrenbergianum. Naegeli. (Gattgen.
einz. Alg. p. 73. E. Rabenh. Krypt. Sachs. p. 133.)

In Gräben und kleinen Tümpeln mit stagnirendem Was-
ser; am Donau-Mainkanal bei Möhrendorf, Unterbürg bei Nürn-
berg, Kosbacher Weiher bei Erlangen.

Die elliptisch-kugeligen Zellfamilien erreichen im Maxi-
mum eine Länge bis 0,001 mm., dieselben leben immer ver-
einzelt und zerstreut unter andern Palmellaceen, Desmidiaceen
und Fadenalgen.

Stichococcus. Naegeli.

Stich. bacillaris. Naegeli. (Gattgen einz. Alg. p. 77.
Taf. 4. G. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 132.)

An einem feuchten Pfosten im Dechsendorfer Weiher,
auf feuchter Erde in der „Solitüde“ bei Erlangen (der Stand-
ort ist jetzt verschüttet), im Laurenziforste.

Die kleinere Form *Naegelis Stichoc. minor* findet sich
häufig unter *bacillaris* untergemischt und ist keine gute Art.

Hormospora. Brèbisson.

Hormosp. mutabilis. Brèbisson. (Alg. Fal., Rabenh.
Kryptog. Sachs. p. 133. Naegeli. Gatt. einz. Alg. p. 78.
Taf. 3. B.)

Die in einer Reihe hintereinander liegenden Zellchen
0,015 mm. bis 0,018 mm. dick, 0,028 mm. bis 0,036 mm lang, die
gemeinschaftliche glashelle Gallertröhre bis 0,046 mm. dick.

In einem Waldgraben, mit Desmidiaceen untermischt, in der Solitude bei Erlangen.

Horm. minor. Naegeli (Gatt. einz. Alg p. 78), welche um das Dreifache schmalere Zellchen besitzt, habe ich im Florengebiete noch nicht aufgefunden.

Nephrocytium. Naegeli.

Nephroc. Agardhianum. Naegeli. (Gattgen. einz. Alg. p. 79. Taf. 3. C. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 133.)

In kleinen stehenden Wassern unter andere Algen eingemischt, Erlangen. Ich habe nur die älteren Zustände, welche in der Abbildung bei Naegeli C. Fig. I. K darstellen, gesehen. Derartige Familien können leicht für eine *Botryocystis* gehalten werden, unterscheiden sich jedoch ausser durch den Mangel der Bewegung durch die ordnungslose Lagerung der länglichen Zellindividuen in der selten kugelrunden Familie.

Raphidium. Kützing.

Raph. fasciculatum. Kützing. (Phycol. Germ. Naeg. Gattgen. einzell. Alg p. 83 Taf. 4 C. Fig. 1. Rabenh. Alg. Sachs. Nr. 172 und 547. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 133. *Ankistrodesmus falcatus*. Corda Alman. de Carlsbad 1835. Ralfs britt. Desmid. T. XXXIV Fig. 3. *Closter. falcatum* und *gregarium* Menegh. in Synops. Desmid Linnaea.)

Die spindelförmigen schwach sichelförmig gekrümmten Zellchen sind zu 2, 4, 8, 16 oder 32 in der Mitte zu Bündeln vereinigt. Die mehrzelligen Familien sind in der Regel aus mehreren (2, 4, 8,) aus je zwei Zellindividuen bestehenden kleinern Familien zusammengesetzt. Die Länge der Zellchen beträgt 0,045mm. bis 0,073mm., die Breite von 0,004mm. bis 0,008mm. Die Zellchen sind gegen die Enden hin allmählig (aber nicht in eine haarförmige Spitze auslaufend) zugespitzt.

In Gräben und stehenden Wassern freischwimmend oder unter andern Algen zerstreut. Am Kosbacher und Dechsen-dorfer Weiher, Reichsforst, im Teich der Unterbürg bei Nürnberg.

b) *diffusum*. (*Xanthidium difforme* Ehrenberg. Infus. Nr. 172. Taf. 10. Fig. 16. *Raphid. difforme*. Rabenh. Kryptog. Deutschl. Nr. 4900.)

Die in grosser Anzahl vorhandenen Zellchen von denselben Dimensionen, aber nicht familienweise zu einer regelmässig gruppirten Familie vereinigt, sondern ohne bestimmte Ordnung und nicht nur in der Mitte allein aneinandergelagert. Die Breite eines solchen ordnungslosen Bündels beträgt von 0,061 mm. bis 0,1 mm.

In einem Altwasser der Schwabach bei der Schleifmühle bei Erlangen.

Raphid. biplex. P. Reinsch. n. sp.

Cellulae rectae, cylindricae, summis subito in apicem acutiusculum acuminatis, cellulae binae medifcae, familias minores constituentes. Familiae minores (ex binis cellulis constitut.) Gelatino hyalino disjunctae binae, quaternae, octonae familias majores in fascies parallelos congregatas constituentes.

Cellularum longitudo 0,023 mm. bis 0,03 mm.

Cellularum latitudo 0,009 mm. bis 0,012 mm.

Diese Form unterscheidet sich von dem *Raphid. duplex* durch die ganz geraden cylindrischen Zellchen, welche genau in der Mitte zu kleineren Familien vereinigt sind. Die kleineren Familien setzen grössere Familien zusammen, in welchen die Lage der kleineren eine regelmässige ist. Die kleineren Familien, welche durch hyaline Gallerte zusammengehalten werden, trennen sich später von einander und jede der Zellchen theilt sich dann in der Längenrichtung der Zelle in je zwei Tochterzellen, deren je zwei eine neue kleinere Zellfamilie darstellen. Unmittelbar nach der Theilung sind die Tochterzellen noch nahe vereinigt, später entfernen sich die zwei neuen kleineren Familien durch ausgeschiedene Gallerte allmählig von einander.

In einem Altwasser der Schwabach bei der Schleifmühle bei Erlangen. August 1864.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI. Fig. IV.

Fig. IV. Eine 8 zellige Familie, je zwei der aneinander befestigten Zellchen in gleichen Abständen, das vierte Zellpaar ist in der Zeichnung durch das mittlere Zellpaar theilweise bedeckt.

Raphid. duplex. Kützinger. (Phycol. Germ. Rabenh. Kryptog Sachs. p. 133. *Scenedesmus duplex.* Ralfs. britt. Desmid. Taf. XXXIV. Fig. 17.)

Im Basin des Springbrunnens im Schlossgarten in Erlangen

Raphid aciculare. Alex Braun. (Rabenh Alg Nr 442)

Die Länge der in ihrer Mitte zu je 2, 4, 8 vereinigten Zellchen beträgt zwischen 0,038mm. bis 0,054mm. Die grösste 0,002 mm. bis 0,004 mm. Die Zellchen sind schon von der Mitte an nach den Enden hin allmählig verjüngt, die Enden laufen in eine fast haarförmige, gewöhnlich hyaline Spitze aus.

In der Umgegend von Erlangen an mehreren Orten beobachtet.

Von den im Systeme nach zweifelhaften, von einigen Algologen bei den Palmellen untergebrachten Hydrurusarten habe ich im Keupergebiete von Erlangen und Nürnberg bis jetzt noch nichts wahrgenommen.

Selenastrum. P. Reinsch. nov. gen.

Cellulae (generationis transitoriae) semilunatae, in marginum convexorum medio accumbentes, quaternae, octonae in familias minores regulariter dispositae (propagatio incerta).

Selenastrum Bibraianum P. Reinsch.

Cellulae semilunatae, anguli porrecti aut introrsum versi, familiae minores (ex cellulis quaternis constitutis) binae, quaternae familias majores sphaericas constituentes; cellularum crassitudo angulorum distantiae dimidium aut paulo minus.

Cellularum longitudo 0,023mm. usque 0,016mm.

Cellularum latitudo maxima 0,008mm usque 0,005mm.

Familiae minoris diameter 0,031mm. usque 0,023mm.

Die genaue halbmond- bis beinahe sichelförmig gekrümmten Zellchen in der Mitte des konvexen Theiles aneinander geheftet, entweder sind die Längachsen der je vier Zellchen sämmtlich mit einander parallel, so dass dann je zwei Zellchen senkrecht zu einander und senkrecht auf die Mittelachse stehen und je zwei Zellchen in einer Ebene liegen, oder die Längachsen der sämmtlichen Zellchen sind nicht parallel, so dass dann die Längachse je eines Zellchens mit der Längachse eines benachbarten Zellchens einen spitzen Winkel macht, in ersterem Falle sind dem Beschauer in horizontaler Richtung der Längachsen der Zellen je zwei Zellen zugewendet, in vertikaler Richtung dagegen erblickt er die vier Zellen in ihrer Seitenansicht, im letzteren Falle sieht man in jeder Lage der Familie die vier Zellen. Kleinere aus acht Zellchen zusammengesetzte Familien sind selten. Der Inhalt der Zellchen ist wie bei *Raphidium* eine dicht mit Körnchen untermischte chlorophyllhaltige Flüssigkeit ohne einzelne grössere Chlorophyllkörperchen.

In einem Altwasser der Schwabach bei der Schleifmühle bei Erlangen unter andern Algen, in einem Tümpel an der Regnitzbrücke bei Erlangen unter *Bulbochaete setigera* und *Rhizoclonien*.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IV. Fig. II.

Fig II. a) Eine vierzellige Familie, deren Zellchen senkrecht aufeinander stehen (Long. 0,038 mm. Lat. 0,023 mm); b) eine aus zwei solchen kleineren Familien bestehende grössere Familie; (Long. 0,045 mm. Lat. 0,038 mm); c) eine aus vier kleineren Familien bestehende grössere Familie, die Zellen der kleineren Familien radial angeordnet (diam. 0,061 mm., diam der kleineren Familie 0,023 mm).

Selenastr. gracile. P. Reinsch.

Cellulae semilunatae usque falcatae, anguli producti porrecti, cellularum crassitudo angulorum distantiae sexta usque octava pars; familiae sphaericae ex cellulis quaternis aut octonis constitutae.

Cellularum longitudo (angulorum distantia) 0,019mm. bis 0,028mm.

Cellularum crassitudo usque 0,005mm.

Familiae diameter 0,023mm. bis 0,00mm.

Die in der Mitte der konvexen Seite aneinandergehefteten Zellen sind viel schlanker, dünner und stärker eingekrümmt als diess bei der vorigen Form der Fall ist. Aus kleineren, als aus vier Zellen bestehenden Familien, zusammengesetzte grössere Familien habe ich nicht beobachtet. Die Anordnung der Zellen ist in den achtzelligen Familien manchmal nicht ganz regelmässig. Zwei- und dreizellige Familien sind selten, die letzteren wohl nur durch Verkümmern einer Tochterzelle oder auch durch Abfallen einer fertigen Zelle entstanden.

In Gräben und Altwässern an der Regnitz bei Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IV. Fig. III.

Fig. IV. a) Eine vierzellige Familie mit sehr schlanken Zellen (Durchmesser 0,03mm); b) eine achtzellige Familie mit nicht ganz regelmässig angeordneten Zellen (Durchmesser 0,03mm).

n. g. *Cylindrocapsa*. P. Reinsch.

Cellulae sphaericae usque ellipsoidicae, membrana crassiore, aut tegumentis compluribus (3is—4is) circumvelatae aut nudaе, cellulae in serie recta in familias consociatae, in vesica tubulosa hyalina gelatinosa cylindrica inclusae; familiae filiformes; cellularum divisio in eadem spatii directione peragitur; propagatio gonidiis automobilibus adhuc incerta; cellularum interanea chlorophyllo granuloso repleta, corpusculo chlorophyllaceo sphaerico singulo instructa.

Cylindroc. involuta. P. Reinsch.

Cellulae indivisae ellipsoidicae, in statu evoluto tegumento quadruplici circumvolutae, tegumenta in cellularum polis extrorsum producta.

Cellularum latitudo 0,023mm. usque 0,03mm.

An der Brücke des Donau-Mainkanales über den Rödel-

heimbach bei Erlangen (jetzt durch Reparatur der Brücke fast verschwunden).

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI, Fig. I.

Fig. I. a) Theil eines Fadens von vier Zellen, die äussersten der Gallerthüllen begrenzen sich, bei den beiden untern Zellen haben sich die Gallerthüllen nicht nur berührt sondern auch gegenseitig abgeplattet (in Folge der Ausdehnung des Zellchens); ob die Gallertrohren, welche die sämmtlichen Zellchen umhüllt an der Entwicklung der einzelnen Zellchen d. h. während deren Theilung Antheil nimmt oder sich nur passiv verhält habe ich nicht entscheiden können, es scheint mir eher das letztere der Fall zu sein; b) eine aus vier Zellen bestehende kleinere Familie innerhalb eines längeren aus in verschiedenen Stadien der Entwicklung befindlichen Zellen zusammengesetzten Fadens; diese vier Zellen stellen die vier von einer einzigen Mutterzelle abstammenden Tochterzellen dar; die zwei inneren Zellen sind grösser als die zwei äusseren; c) eine aus drei Zellchen zusammengesetzte Familie in einem anderen Faden, alle drei Zellen stammen von einer Mutterzelle ab.

Cylindroc. nuda. P. Reinsch.

Cellulae indivisae ellipsoidicae, membrana crassiore sine tegumentis; filamentum summa interdum incrassata et cellulis compluribus (4is) repleta.

Cellularum latitudo 0,023mm usque 0,03mm.

An demselben Standorte, wie auch an der Brücke über die Schwabach beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI, Fig. II.

Fig. II. a) Theil eines Fadens mit 7 Zellen, die Zellchen berühren sich sämmtlich; b) Theil eines Fadens mit 7 Zellen, die Zellen in verschiedenen Stadien der Entwicklung, die unterste am weitesten fortgeschrittene aber eben im Begriffe sich zu theilen, jede mit zwei Chlorophyllkörperchen (?) versehen, auf diese folgen vier in der Grösse und Gestalt völlig übereinstimmende Zellchen, diese stellen eine kleinere durch

Theilung aus einer einzigen Mutterzelle hervorgegangene Zellfamilie dar, auf diese folgen wieder zwei gleichgestaltete Zellen, welche durch Theilung aus einer Mutterzelle hervorgegangen sind; c) der oberste etwas verdickte Theil eines Fadens, in dem obersten Ende vier regelmässig gruppirte Zellchen, welche sich von den übrigen Zellchen des Fadens weder in der Gestalt noch in der Grösse unterscheiden, dieselben stammen wahrscheinlich von einer Mutterzelle ab.

Der Familie der Palmellenen füge ich noch eine neue Form an, welche *Raphidium* noch am nächsten steht, die aber dadurch, dass die Zellchen nicht Familien bilden, dass die einzelnen Zellchen nicht zweipolig sondern mehrpolig sind, sich unterscheidet.

Cerasterias. P. Reinsch.

Cellulae solitariae (in familias non congregatae,) ex dentibus acuminatis aequalibus compluribus in eodem puncto interse conjunctis radialiter dispositis exstitutae, cellularum interanea chlorophyllo granuloso dense repleta; propagatio ignota.

Cerasterias raphidioides. P. Reinsch.

a) *tridens*. *Cellulae ex dentibus aequalibus ternis in planitie jacentibus, inter angulos aequales obtusos, conjunctis exstitutae.*

Cellulae longitudo (diameter) 0,021mm. usque 0,024mm.

Cellulae dentium crassit. 0,002mm. usque 0,003mm.

In einem kleinen Altwasser der Schwabach bei der Schleifmühle bei Erlangen.

b) *tetradens*. *Cellulae ex dentibus quaternis tetraetrice dispositis inter angulos aequales conjunctis exstitutae.*

Cellulae longitudo (diameter) 0,025mm. usque 0,034mm.

In Gräben und Tümpeln bei Möhrendorf bei Erlangen.

c) *octodens*. *Cellulae ex dentibus octonis (raro nonis) radialiter dispositis inter angulos aequales dispositis exstitutae.*

Cellulae longitudo (diameter) 0,023mm. usque 0,034mm.

Cellulae dentium crassit 0,002mm. usque 0,004mm.

In Gräben und Tümpeln bei Möhrendorf, in Altwässern der Schwabach.

Bei dieser Form beobachtete ich auch Zellchen mit Zacken, deren Enden stumpf sind.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. V. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Zellchen der Form a, in einer Lage in welcher die drei Zacken sichtbar sind (Breite 0,022mm); b) ein Zellchen der Form b., mit 4 Zacken, in einer Lage, in welcher alle vier Zacken gleichlang sich darstellen, (Breite 0,034mm); c) ein Zellchen derselben Form b., mit fünf Zacken, in einer Lage, in welcher der fünfte nach dem Beobachter gewendete Zacken stark verkürzt sich darstellt (Breite 0,032mm) (nur ein einziges Mal beobachtet); d) ein Zellchen der Form c., die Zacken sämtlich am Ende scharf zugespitzt (Breite 0,025mm), aus einem Tümpel bei Möhrendorf; e) ein Zellchen der Form c., mit neun Zacken, die Enden der Zacken abgerundet stumpf, nicht zugespitzt (Breite 0,031mm.), aus einem Tümpel bei Möhrendorf.

Familie der Protococceen (Protococceae).

Von der Gattung, von welcher die Familie ihren Namen hat, wie von den höchstmerkwürdigen in ihren Lebensverhältnissen genau gekannten Gattungen Chlamidococcur Al. Braun und Chlamidomonas Al. Braun habe ich bis jetzt im Gebiete noch nichts wahrgenommen.

Cystococcus. Naegeli.

Cystoc. humicola, Naegeli. (Gattg. einz. Alg. p. 85. Taf. 3. F. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 137.)

Auf horizontal liegenden, der Luft und dem Wetter längere Zeit exponirten Brettern. (Erlangen im Hof meines Wohnhauses.)

Die ältesten mehrzelligen Zellfamilien (Brutfamilien. Naegeli) bis zu 0,015mm. Durchmesser, die kleinsten noch wenig-

zelligen bis zu 0,008mm. Durchmesser, die einzelnen freige-
wordenen Zellchen bis zu 0,005mm. Durchmesser. Im April
fand ich vorwiegend die letzteren, nur selten einzelne mehr-
zellige Brutfamilien.

Ophiocytium. Naegeli.

Ophioc. apiculatum. Naegeli. (Gattgen. einz. Alg.
p. 80. Taf. 4. A. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 138.
Braun. Alg. unic. p. 54. *Spirodiscus cochlearis* Eichwald Bul-
let. de Moscou. 20. p. 285.

In stehenden Wassern und in Waldgräben unter andere
Algen gemischt (nie rein), auch alleinlebend, aber nur in ver-
einzelten Individuen, in kleinern Moorgräbchen. Verbreitet.

Ophioc. majus. Naegeli. (Gattungen einz. Alg.
p. 89. Taf. 4. A. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 138.
Al. Braun Alg. unic. p. 53.)

Von dem vorigen nur durch die um das doppelte bis
dreifache grösseren Dimensionen verschieden.

In kleinen Moorgräbchen im Reichsforste, mit dem erste-
ren untermischt.

Hydrodictyon. Roth.

Hydrodict. utriculatum. Roth. Fl. Germ. III. p. 531.
Rabenh. Kryptog. Deutschl. p. 123 Krypt. Sachs. p. 139.
Alg. Sachs. Nr. 108. A. Braun Alg. unic. p. 55. Verjüng.)

Diese merkwürdige Alge, deren richtige Stellung im Sy-
steme erst durch Alex. Braun erkannt worden ist, kommt zeit-
weise in ungeheurer Menge in dem Weiher vor, welcher um
einen Theil der Stadt Baiersdorf sich erstreckt, auch in der
Seebach wie in Altwässern der Regnitz daselbst kommt die
Pflanze zeitweise sehr häufig vor. Es scheint mir, dass —
vielleicht weniger durch zufällige äussere Umstände veranlasst
— eine gewisse Periodicität in dem Auftreten und dem Wie-
derverschwinden dieser Pflanze an diesem Standorte und viel-
leicht auch anderwärts zu liegen. Zuerst entdeckte ich die

Pflanze im Herbst 1859, dann beobachtete ich die Pflanze in ungeheurer Menge 1861, hierauf 1863, seit den letzten Jahren habe ich nur einzelne freischwimmende Netze nach langem Suchen gefunden, in den zwischen den bezeichneten Jahren liegenden war die Pflanze so gut wie verschwunden. Aehnliche Beobachtungen über das plötzliche Erscheinen und Wiederverschwinden dieser Pflanze sind schon an verschiedenen Orten gemacht worden. (Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 139.)

Dactylococcus. Naegeli.

Dactyloc. infusionum. Naegeli. (Gattgn. einz. Alg. p. 86. Taf. 3 F.)

Die einzelnen Zellen der beweglichen Zellgeneration (Schwärmzellen) 0,008 mm. bis 0,006 mm. lang, eine aus mehreren Zellen zusammengesetzte Zellfamilie (Brutfamilie) bis zu 0,017 mm. lang. Die Dimensionen der von mir beobachteten Spec. sind ein wenig niedriger als die von Naegeli angegebenen. Den Moment des Auseinanderfallens einer noch unbeweglichen Zellengeneration in die beweglich werdenden Tochterzellen (Schwärmzellen) habe ich einigemal deutlich beobachtet. Die Tochterzellen sind von keiner gemeinschaftlichen auch nach der Entwicklung der Schwärmzellen noch vorhandenen Hülle, wie dies bei *Hydrocytium*, *Hydrodictium*, *Pediastrum*, *Characium* der Fall ist, umhüllt; aus diesem Grunde würde *Dactylococcus* und *Cystococcus* eher zu den Palmellen zu stellen sein.

Ich beobachtete diese Gattung in, aus einem Graben nach Hause getragenen Wasser, welches einige Tage in einem Glase stand. Juni 1864.

Characium. Alex. Braun.

Charac. pyriforme. Alex. Braun. (Alg. unicell. p. 40. Taf. 5. B.)

Die fränkischen Specimina stimmen mit den bei Alex. Braun (Alg. unic. Tab. 5. B.) dargestellten Spec. genau überein.

Ich habe nur dieselben Zustände beobachtet, welche diese angegeb. Abbildungen darstellen. In den Fig. 1. 3. 6. ist ein einziges Chlorophyllkörperchen enthalten, welche Zustände ich auch am häufigsten gesehen habe, ausgewachsene Zellchen mit zwei Chlorophyllkörperchen habe ich öfters bemerkt, die Fig. 2. bei A. Braun stellt ein noch unausgewachsenes Zellchen dar. Die Membran erscheint im jugendlichen Zustande der schon mit einem Stielchen versehenen Zellchen einfach, im ausgewachsenen Zustande erscheint die Membran doppelt konturirt. Bei einigen Zellchen zieht sich der Inhalt von einer Membran umschlossen in den Innenraum der Zelle zurück, manchmal zeigt sich der grüne Inhalt innerhalb des Lumens dieser innern Membran (Primordialschlauch?) von letzterer theilweise durch einen Zwischenraum getrennt.

Die zwei grünen kuglichen Körperchen, welche später zu Gonidien (Schwärmosporen) zu werden scheinen, zeigten mir in einem Falle eine deutliche Bewegung im Innenraume des Zellchens, den Austritt derselben habe ich jedoch nicht beobachtet, wahrscheinlich gelangen dieselben durch Oeffnung der Spitze der Membran des Mutterzellchens nach Aussen.

Die Länge der kleinsten Zellchen beträgt 0,004 bis 0,003mm. die Länge der grössten ausgewachsenen 0,007 bis 0,009 mm.; die Länge des Stielchens beträgt die Hälfte bis $\frac{2}{3}$ der Länge des Zellchens.

An dem immerwährend mit Wasser überrieselten aufrechten Stocke eines Röhrenbrunnens mit laufendem Wasser in Sieglitzhof bei Erlangen, gemeinschaftlich mit *Characium longipes*.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. III. Fig. V.

Fig. V. a) Ein jugendliches Zellchen mit einem einzigen Chlorophyllkörperchen; b) ein ausgewachsenes Zellchen, der grüne Inhalt kuglich und von einer Membran theilweise umschlossen; c) ein ausgewachsenes Zellchen mit zwei Chlorophyllkörperchen.

Charac. Sieboldi. Alex. Braun. (Alg. unic. p. 32. Taf. 3. A.)

Die grössten ausgewachsenen mit noch nicht ausgebildeten Gonidien versehenen Mutterzellchen (letztes Stadium der Theilung des Zellinhaltes) habe ich von 0,038 mm. bis zu 0,069 mm. gefunden. Die Länge der Zellchen in dem Zustande, in welchem der Zellinhalt sich soeben getheilt hat bis zu dem vierzelligen Zustande habe ich von 0,024 mm. bis zu 0,039 mm. gefunden, die kleinsten Zellchen messen von 0,012 mm. bis 0,016 mm.

Bei wiederholter Beobachtung der Pflanze im Sommer konnte ich nicht so glücklich sein einmal den Austritt der reif gewordenen Gonidien, deren sich gewöhnlich 30—60 innerhalb einer Mutterzelle entwickeln, zu beobachten. Nach Alexander Braun verläuft der ganze Entwicklungszyklus der Pflanze vom einzelligen Zustande der Brutgeneration an bis zu dem Austritte der Gonidien innerhalb sieben Tagen. Die Bewegung der freigewordenen, schwärmenden Gonidien dauert $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ Stunde an.

Am 16. Juni 1865 beobachtet in einem kleinen nur zeitweise mit Wasser gefüllten Wiesentümpel nahe einem Altwasser der Regnitz (Kutscherweiher) unterhalb Erlangen, auf Schweinsborsten und Papier aufsitzend in Gesellschaft von einer Palmellaart, von *Microthamnium*, von Rhizoclonien und Draparnaldienanfängen.

Charac. longipes. Rabenh. (Alg. exsicc. Dec. XVIII. Nr. 171. Hedwigia Nr. 9. Taf. 9. Al. Braun Alg. unic. p. 43. Taf. 5. D. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 140.)

Von dieser Art habe ich ebenfalls nur die ganz analogen Zustände wie bei dem *Charac. pyriforme* beobachtet. In dem grünen homogenen Inhalte befindet sich ein deutlich konturirtes Chlorophyllkörperchen, seltener deren zwei. Die Länge des Stieles des ausgewachsenen Zellchens ist etwas geringer als die Länge des letzteren. Bei dem Abschaben der auf dem Substrate mit einer kleinen fussförmigen Erweiterung des Stiel-

chens fest aufsitzenden Zellchen geht das Ende des Stielchens gewöhnlich verloren, so dass man nur Exemplare wie die abgebildeten vor sich hat. Das obere Ende der Zellchen ist bei den fränkischen Specim. ein wenig länger und spitzer verschmälert als diess bei den bei Alex. Braun Taf. 5. Fig. 4—13 abgebildeten Specim. der Fall ist, ganz ähnlich wie bei dem von mir im Gebiete noch nicht beobachteten Charac. ornithocephalum. Ebenso ist die Breite des Zellchens im Verhältnisse zu seiner Länge bei den fränk. Specim. ein wenig stärker. Ob einige zugleich beobachtete Zellchen, deren oberes Ende in eine schnabelförmige, gekrümmte Spitze von der Länge des Stielchens auslief, eine Var. des Ch. longipes oder eine eigene Form darstellen, vermag ich, da ich nur wenige Specim. von demselben Entwicklungszustande mit zwar konstant gleich langem Schnabel beobachtet habe, nicht zu entscheiden.

Die Länge der ausgewachsenen Zellchen mit Ausschluss des Schnabels habe ich von 0,014 mm. bis zu 0,009 mm., die grösste Breite von 0,008 mm. bis 0,004 mm. gefunden, die Länge des Schnabels beträgt 0,008 mm. bis 0,004 mm.

An demselben Standorte des Characium pyriforme beobachtet

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI. Fig. VII.

Fig. VII. a) Ein ausgewachsenes Zellchen, der grüne Inhalt ist am obern und untern Ende des Zellchens ein wenig in den Innenraum des Zellchens gezogen; b) ein anderes Zellchen mit im ganzen Zellraum vertheiltem grünem Inhalte, der untere Theil des Stielchens ist abgebrochen (bei dem Entfernen vom Substrate); c) ein Zellchen mit zwei Chlorophyllkörperchen (Gonidien?); d) ein Zellchen mit schnabelförmig verlängertem obern Ende, der unterste Theil des gleichfalls gekrümmten Stielchens ist abgebrochen.

Von den übrigen Characiumarten, deren Alex. Braun im Ganzen 14 aufführt, sind im Gebiete wahrscheinlich noch mehrere vertreten.

Polyedrium. Naegeli.

Die hier aufgeführten Formen sind noch nicht aller Zweifel über deren wirkliches Artenrecht enthoben. Fortgesetzte eifrige Untersuchungen über diese nur selten zu beobachtenden Formen müssen uns belehren in wie weit dieselben in einem genetischen Zusammenhang stehen, wie dies vielleicht nicht mit Unrecht De Bary behauptet. Zu den von Naegeli aufgeführten, sämmtlich im Erlanger Gebiete beobachteten Formen kommen eine Anzahl weiterer neu beobachteter.

Polyedr. trigonum. (Naegeli. Gatt. einz. Alg. p. 84. Taf. 4. B. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 139. De Bary. Unters. über d. Conjug.)

In der Umgegend von Erlangen habe ich drei Formen beobachtet.

a. minus. Die Seitenränder gerade, an den Ecken allmählig in die Spitzen auslaufend; die Dicke des Plättchens kaum den sechsten Theil dessen Breite betragend. Breite 0,01—0,014mm.

In einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen; in einem Tümpel an der Seebach.

b. crassum. (Naegeli. Gattungen einzell. Alg. p. 84. Taf. IV. B. Fig. 1)

Die Seitenränder gerade, die Ecken stumpf, mit einem starken aufgesetzten Stachel versehen, die grösste Dicke des Plättchens die Hälfte der Breite des Körpers erreichend.

Breite 0,027mm. bis 0,023mm.

Dicke 0,015mm. bis 0,016mm.

In einem Altwasser der Regnitz unterhalb Erlangen.

c. gracile.

Die Seitenränder stumpfwinklich ausgerandet, die Ecken allmählig zugespitzt und in einen starken Stachel endigend.

Breite 0,023mm.

Dicke 0,008mm. bis 0,006mm.

In einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen.

Das Poleyedr. tetragonum. Naeg. (Gattg. einz. Alg. p. 84. Taf. 4. B Fig. 2) habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. III. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum der Form gracile, die Seitenränder stumpfwinklich ausgerandet, die allmählig in den starken Dorn übergehen; b) Seitenansicht desselben Individuums; c) ein Individuum der Form a. aus einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen; d) ein Individuum derselben Form aus einem Tümpel an der Seebach bei Möhrendorf; e) Seitenansicht desselben Individuums; f) ein Individuum der Form crassum, die Seitenränder ganz gerade, die stumpfen Ecken mit einem derben Stachel bewehrt; g) Seitenansicht dieses Individuums.

Polyedr. pentagonum. P. Reinsch.

Cellulae in sciagraphia pentagona, margines laterales repandi usque emarginati, anguli obtusiusculi, aculeo longiore firmo hyalino singulo armati

Diameter 0,013mm. usque 0,023mm.

a) irregulare, marginum lateralium longitudo inaequalis, anguli plus minusve acutiusculi.

b) regulare, marginum lateralium longitudo aequalis.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. III Fig. II.

Fig. II. a) Ein Individuum der Form b., von der grössten beobachteten Dicke; b) Seitenansicht desselben; c) ein Individuum der Form a., die Ecken plötzlich in ein stumpfwinkliches Spitzchen vorgezogen; d) ein Individuum der Form b. aus einem Tümpel an der Schwabach, von einer Seite zieht sich ein breiter tiefer Einschnitt bis zur Mitte des Zellchens, die Ecken mit langen Stacheln bewehrt; e) ein Individuum derselben Form von den kleinsten beobachteten Dimensionen aus einem Tümpel an der Seebach; f) ein Individuum derselben Form mit geraden Seitenrändern und mit plötzlich in lange Stacheln zugespitzten Ecken, vom Bischofssee; g) Seitenansicht desselben Individuums.

Polyedr. tetraedricum hastatum P. Reinsch.

Cellulae tetraedricae, planities laterales quaternae subcon-
cavae, anguli paullatim angustati in cornua singula hyalina
summis breviter tridentatis.

Latit. 0,023mm.

Diese Form ist nicht das Naegelische *Polyedr. tetrae-
dricum*, welches abgerundete stumpfe ein- selten zweistach-
liche Ecken besitzt.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. V. Fig. III

Fig. III. a) und b) ein Individuum in verschiedenen
Lagen gezeichnet.

Polyedr. tetraetricum majus P. Reinsch.

Cellulae tetraetricae, planities laterales quaternae planae,
anguli rotundato obtusi, spinulo acutiusculo armati.

Latit. 0,046mm. bis 0,054mm.

Diese Form hat mit dem Naegelischen *Polyedr. tetrae-
dricum* noch die meiste Aehnlichkeit, unterscheidet sich aber
sehr wesentlich von diesem durch die um mehr als das dop-
pelte höheren Dimensionen.

- Erklärung der Abbildung auf Taf. V. Fig. II.

Fig. II. Ein Individuum in einer Lage gezeichnet, in
welcher dem Beschauer die drei Ecken zugewendet sind.

Polyedr. octaedricum acuminatum P. Reinsch.

Cellulae octoedricae, planities octonae laterales subcon-
cavae, anguli acutiusculi et acuminati.

Latit. 0,01mm. usque 0,023mm.

In Gräben im Seballdiforste bei Erlangen; in Altwässern
der Regnitz.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. V. Fig. IV.

Fig IV. a) b) Ein Individuum von den grössten beobach-
teten Dimensionen, von verschiedenen Seiten dargestellt; c) d)
e) drei Individuen von den kleinsten beobachteten Dimensionen
in verschiedenen Lagen dargestellt; in Altwässern der Regnitz
bei Baiersdorf.

Polyedr. octaedricum spinosum. P. Reinsch.

Cellulae octaedricae, planities laterales octonae planae, anguli rotundato obtusi, spino singulo firmo hyalino armati.

Latit 0,038mm. usque 0,047mm.

In Gräben im Seballdiforste bei Erlangen, in einem halb ausgetrockneten Graben bei der Schleifmühle bei Erlangen (unter vielen Desmidiaceen sehr vereinzelt).

Erklärung der Abbildungen auf Taf. V. Fig. V.

Fig. V. a) Ein Individuum in der Lage mit senkrecht gestellter Hauptachse; b) ein Individuum in der Richtung der Hauptachse betrachtet

Polyedr. lobulatum. Naegeli. (Gattgen. einzell Alg. p. 84. Taf. 4. B. Fig. 4. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 139.)

Die Zellen sehr verschiedengestaltig (unregelmässig und undeutlich tetraetrisch), nicht selten bildet das Zellen ein flaches Täfelchen, nicht selten liegt eine der vier Ecken des Körperchens mit den drei andern Ecken nicht in ein und derselben Ebene, das Körperchen erscheint alsdann unregelmässig tetraedisch, die Seitenränder des Körperchens sind gerade bis tief ausgerandet und ausgeschnitten. Die vier Ecken des Körperchens zeigen sich meistens in je zwei zweihörnige Hörner auslaufend, selten in drei Hörner auslaufend noch seltener ungetheilt oder nur schwach ausgerandet.

Die Breite der Körperchen bewegt sich von 0,03 mm. bis zu 0,034mm.

In einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen, in Wiesentümpeln an der Seebach bei Baiersdorf.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. II Fig. II.

Fig. II. a) Ein Individuum der gewöhnlicheren Form mit vierhörnigen Ecken (L. 0,034mm. Br. 0,03mm); b) ein anderes Individuum mit weit stärker ausgerandeten Seitenrändern; c) ein anderes Individuum mit zwei ungetheilten Ecken; d) Seitenansicht des Fig. a. abgebildeten Individuums.

Polyedr. enorme. Ralfs. (*Staurostrum enorme* Ralfs. british Desmidiaceae Taf. 28.)

Dieses seltsame noch sehr zweifelhafte Gebilde, welches von Ralfs irrthümlicherweise als eine Desmidiacee angesehen worden ist, scheint mir ohne Zweifel eine in die Gattung *Polyedrium* gehörige Form darzustellen. In wie weit diese eigenthümliche Form mit der vorhergehenden und der nachfolgenden Form in genetischem Zusammenhange steht müssen fernere Beobachtungen ermitteln. Das Körperchen zeigt sich von einer (von der längeren) Seite betrachtet beiderseits in der Mitte ausgerandet, die obere und untere Partie in sehr viele, wie es scheint ohne bestimmte Ordnung und Reihenfolge entspringende mehrzackige Aeste gespalten, die Anzahl der einzelnen Zincken wohl an 100 bis 200.

Ein solches Körperchen habe ich nur ein einziges Mal zu beobachten Gelegenheit gehabt.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. II. Fig. V.

Fig. V. Ein Individuum der zuerst beschriebenen Form *Polyedr. decussatum*. P. Reinsch.

Cellulae a latere et a fronte visae in sciagraphia tetragonae, cellularum anguli producti octoni tri- usque pluricornuti, bini oppositi binis perpendiculariter oppositis decussati, capituliformes; margines laterales magis minusque emarginati.

Latit. 0,023 bis 0,038mm.

Das Zellehen stellt eigentlich einen Oktaeder dar, die Seitenflächen sind aber so sehr nach einwärts gebogen, dass das Körperchen aus sechs in der Mitte vereinigten Aesten zu bestehen scheint. Die Aestchen sind an der Spitze kopfförmig erweitert und 3- bis 4- bis vielhörnig.

Diese Form, welche *Pol. enorme* mit *Pol. lobulatum* zu verbinden scheint, habe ich nur ein einziges Mal zu beobachten Gelegenheit gehabt, in dem unter Nr. 1224 der 23. und 24. Dek. der *Alg. Europ.* herausg. von Rabenhorst, enthaltenen Präparate (viele Desmidiaceen enthaltend) habe ich diese Form ebenfalls beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. II. Fig. III. und IV.

Fig. III. a) Ein Individuum der Form mit dreihörnigen

Aesten in einer Lage betrachtet, in welcher die sämtlichen vier Aeste dem Beschauer sichtbar sind; b) ein Individuum in einer andern Lage gezeichnet; Fig. IV. ein Individuum der Form *multilobum*.

Polyedr. Pinacidium. P. Reinsch.

Cellulae a fronte visae in sciagraphia tetragonae, margines laterales rectae aut leniter repandi, anguli rotundato obtusi, inermes; cellulae a latere visae in sciagraphia ellipticae; cellulae crassitudo diametri transversalis dimidium.

Latit. 0,006mm. bis 0,09mm.

Crassit. 0,003mm. bis 0,006mm.

Diese kleinen Formen, deren Stellung sehr zweifelhaft ist, kommt in stehenden Wassern der Umgegend von Erlangen nicht selten vor. Die Struktur des Zellinhaltes lässt sich bei den sehr kleinen Zellchen nicht deutlich erkennen. Bei einigen Specim. zeigen sich zwei der Seitenränder stärker eingeschnitten, welche Zellchen vielleicht Anfänge zu einer Quertheilung in zwei Tochterzellen darstellen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. III. Fig. III.

Fig. III. a) Ein Individuum von den grössten beobachteten Dimensionen, alle Seitenränder mässig ausgerandet. (Breite 0,01mm. Dicke 0,005mm.); b) ein ein wenig kleineres Individuum mit etwas tiefer ausgerandeten Seitenrändern; c) Seitenansicht des Fig. a. abgebildeten Individuums; d) ein Individuum von den kleinsten beobachteten Dimensionen, zwei gegenüberliegende Seitenränder stumpfwinklich eingeschnitten (Breite 0,006mm.); e) dasselbe von der Seite betrachtet.

Scenedesmus. Meyer.

Scened. obtusus. Meyer. (Nova Acta Ac. Leop. Carol. XIV. F. XLIII. 30. 31. Naegeli Gatt. einz. Alg. p. 91. Taf. 5. A. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Deutsch. p. 56. Rabenh. Kryptog. Sachs p. 141.)

Die Familien vier- oder achtzellig, die Zellen elliptisch bis eiförmig, die Enden abgerundet stumpf. Sehr wechselnd

in der Grösse und in der Anlagerung der kleineren (vierzelligen) Familien.

Die einzelnen Zellchen einer kleineren Familie stehen immer genau übereinander in einer Linie, seltener sind dieselben ein wenig verschoben.

Länge einer vierzelligen Familie 0,02 mm. bis 0,032 mm.

Breite eines einzelnen Zellchens 0,006 mm. bis 0,04 mm.

Verbreitet im Gebiete.

Scened. alternans. P. Reinsch.

Cellulae omnes aequales late ellipticae usque avato — ellipticae, cellularum poli rotundati, cellularum diameter transversalis duae partes diametri longitudinalis; familiae plerumque ex cellulis octonis constitutae, cellulae singulae laterale accumbentes, perfecte alternantes.

Cellulae longit. 0,013 mm. usque 0,016 mm.

Cellulae latit. 0,01 mm. usque 0,013 mm.

Diese Form hat Aehnlichkeit mit der nachfolgenden, unterscheidet sich jedoch durch die konstant 8 zelligen Familien wie durch die Gleichartigkeit der Zellchen und durch die gradlinigte nicht strahlige Anordnung der Familie.

In einem kleinen moorigen Wiesentümpel beim Donau-Mainkanale bei Erlangen, in grosser Zahl.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI. Fig. III.

Fig. III. a) Eine Familie von den grössten beobachteten Dimensionen (Länge 0,058 mm. Breite 0,022 mm., Länge eines einzelnen Zellchens 0,015 mm., Breite 0,01 mm.); b) dieselbe von der Seite betrachtet.

Scened. radiatus. P. Reinsch.

Cellulae familiae minoris ex cellulis quaternis alternantibus constitutae inaequales, cellulae inferiores ternae aequales late ellipticae, polis binis rotundatis, cellula summa interioribus paulo major leviter curvata, in medio marginata, polis binis rotundatis; familiae minores ternae, quaternae in familia majore radiatim accumbentes.

Cellulae longitudo. 0,008 mm. usque 0,012 mm.

Cellulae latitudo 0,004mm. usque 0,007mm.

Familiae majores diameter usque 0,054mm.

Die Membran ist bei den älteren Familien ziemlich dick und wie bei den Pediastron meistens röthlich gefärbt. Die einzelnen Zellchen wie bei alternans genau alternirend. Das oberste Zellchen ist immer ein wenig grösser als die unteren, nach unten zu häufig ein wenig verschmälert.

In einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI, Fig. VI.

Fig. VI. a) Eine aus drei kleineren Familien zusammengesetzte grössere Familie (Durchmesser 0,046mm); b) eine kleinere vierzellige Familie.

Scened. acutus. Meyer. (Nova Acta Ac. Leop. Carol. XIV. Ehrenberg Infusionsth. Nr. 173. Taf. 10. Fig. 19. Rabenh. Kryptog. Deutschl. Nr. 4939. Naegeli Gatt. einzell. Alg. p. 91. Taf. 5. A. Fig. 3. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 141.)

Die kleineren Familien (vierzellig) haben eine Länge von 0,023 mm. Alle Zellen sind an ihren Polen zugespitzt, die oberste und die unterste Zelle unregelmässig elliptisch, während die übrigen Zellen regelmässig elliptisch sind. Je zwei kleinere Familien sind gewöhnlich seitlich zu einer grösseren Familie verbunden.

Abweichungen in der Anordnung der Zellchen von der gewöhnlichen regelmässigen sind nicht selten. Manchmal zeigen sich die zwei mittleren Zellchen so verschoben, dass die zwei mittleren Zellchen an den entsprechenden abgerundeten Polen sich berühren.

In Gräben in der Umgegend von Erlangen nicht selten.

Scened. dimorphus. Turpin. (Kütz. Synops. Desmid. Linnaea. Ralfs britt. Desmid. Taf. 31. Fig. 13. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 141. *Scenedesmus pectinatus*. Meyer. Nova Acta XIV. *Arthrodesmus pectinatus*. Ehrenb. Infus. Taf. 10. Fig. 17.)

Von dem *Scened. acutus* durch die viel schmäleren Zell-

chen unterschieden, deren Pole scharf zugespitzt sind. In je einer Familie befinden sich gewöhnlich acht Zellchen, welche in einer Reihe liegend nicht genau in der Mitte aneinander geheftet sind. Die Enden der obersten Zellchen sind mehr oder weniger stark nach aus- und aufwärts gekrümmt. Bei einzelnen Familien zeigt sich die Längachse der äussersten Zellchen mit der Längachse der in einer Ebene liegenden übrigen Zellchen nicht in einer Ebene liegend, manchmal bis zum senkrechten Abstände gedreht.

Die Länge einer ausgewachsenen vollständigen Familie beträgt 0,046mm., die Breite 0,03mm. bis 0,038mm.

Die Breite eines einzelnen Zellchens bis zu 0,008mm., die Länge bis zu 0,035mm.

In Gräben am Donau-Mainkanale, in stehenden Altwas-
sern der Regnitz.

Scened. caudatus, Corda (Alman. de Carlsbad 1839. Naegeli Gatt. einz. Alg. p. 91. Taf. 5. A. Fig. 2. Ralfs britt. Desmid. Taf. 31. Fig. 12. *Arthrodesmus caudatus*. Ehrenberg Infusionsth. Nr. 173. Taf. 10. Fig. 16. Rabenhorst Kryptogfl. Deutschl. Nr. 1938.)

Eine sehr vielgestaltige und formenreiche Art.

Ich gebe hier die von mir in der Umgegend von Erlangen beobachtete Formenreihe.

I Länge eines einzelnen Zellchens 0,03mm bis 0,038mm.
Breite 0,012mm. bis 0,015mm.

A Familien achtzellig.

1) Die Pole aller Zellchen mit einem Stachel bewehrt.
(Familien gewöhnlich 0,12mm. lang, 0,034mm. breit)
im Reichsforste bei Erlangen.

B. Familien vierzellig.

1) Die Pole der äussersten Zellchen mit je einem starken auswärts gekrümmten Stachel bewehrt.

2) Ausser den äussersten Zellchen sind je zwei alternirende Ecken des andern Zellchens bewehrt, die übrigen wehrlos.

II. Länge eines einzelnen Zellchens 0,027mm. bis 0,023mm.
Breite 0,01mm. bis 0,013mm.

A. Familien achtzellig.

1) Nur die Pole der äussersten Zellchen mit einem Stachel bewehrt, die übrigen wehrlos (die Familien haben meistens eine Länge von 0,077mm., eine Breite von 0,024mm.).

2) Die Pole der äussersten Zellchen sind je mit einem Stachel bewehrt, von den übrigen sechs Zellchen sind die Pole der einen Hälfte der Zellen auf der einen Seite mit einem einzelnen Stachel bewehrt bei der andern Hälfte die Pole auf der andern entgegengesetzten Seite.

3) Die Pole der äussersten Zellchen sind je mit einem Stachel bewehrt, von den übrigen sechs Zellchen sind die alternirenden Pole mit einem Stachel bewehrt.

B. Familien vierzellig.

1) Nur die Pole der äussersten Zellchen mit einem Stachel bewehrt (am häufigsten).

2) Ausser den Polen der äussersten Zellchen sind die alternirenden Pole der beiden andern Zellchen bewehrt.

3) Ausser den Polen der äussersten Zellchen ist ein Pol der beiden andern Zellchen bewehrt (sehr seltener Fall).

4) Alle Pole aller Zellchen sind bewehrt; die sämtlichen Stacheln sind entweder nach ein und derselben Richtung hin gewendet, oder die Stacheln der mittleren Zellchen sind horizontal auslaufend, die Stacheln der äussersten Zellchen nach auswärts gerichtet.

III. Länge eines einzelnen Zellchens 0,015mm. bis 0,02mm.
Breite 0,008mm. bis 0,01mm.

A. Familien achtzellig.

1) Nur die Pole der äussersten Zellchen mit einem Stachel bewehrt (der häufigere Fall).

Die Familien haben gewöhnlich eine Länge von 0,034mm., eine Breite von 0,01mm.

B. Familien vierzellig.

1) Nur die Pole der äussersten Zellchen bewehrt. Länge der Familien 0,024mm., Breite 0,019mm.

2) Ausser den äussersten Zellchen auch die Pole der zwei andern Zellchen mit horizontal auslaufenden Stacheln bewehrt.

C. Familien zweizellig (oder dreizellig).

1) Die Pole der beiden Zellen bewehrt; Stacheln divergirend. (Familien zweizellig.)

2) Die Pole der beiden Zellen bewehrt; Stacheln parallellaufend (Familien zwei- auch dreizellig).

IV. Länge eines einzelnen Zellchens 0,008mm. bis 0,012mm. Breite 0,004mm.

A. Familien achtzellig.

1) Nur die äussersten Zellchen bewehrt (Länge einer Familie 0,028mm., Breite 0,008mm. bis 0,006mm.).

B. Familien vierzellig.

1) Nur die äussersten Zellchen bewehrt (der häufigste Fall). (Länge einer Familie 0,016mm. bis 0,014mm. Breite 0,009mm. bis 0,006mm.).

2) Der äussere Rand der obersten Zellchen mit drei in gleichen Abständen stehenden Stacheln bewehrt. (Länge einer Familie 0,015mm. bis 0,013mm. Breite 0,009mm. bis 0,007mm.)

C. Familien zweizellig.

1) Nur die äussern Ecken der beiden Zellchen bewehrt.

2) Der äussere Rand der beiden Zellchen mit drei in gleichen Abständen stehenden Stacheln bewehrt.

α . Länge der Stacheln von der Breite eines der Zellchen.

β . Länge der Stacheln das Doppelte bis Dreifache der Breite eines Zellchens.

Sorastrum. Kützing.

Sorastr. spinulosum. Naegeli. (Gattgen. einzell. Alg. p. 91. Taf. 5. D. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 147 Rabenh. Alg. Nr 465.)

Die genau kugelige Familie ist aus 8, 16 oder 32 nach unten keilförmigen nach oben herzförmigen und an dem oberen Rande seicht ausgeschweiften Zellchen zusammengesetzt; die beiden oberen Ecken sind mit je einem Paare nebeneinanderstehender hyaliner einfacher Stacheln bewehrt. Der Durchmesser einer achtzelligen Familie beträgt 0,023mm. bis 0,027mm. der Durchmesser einer sechzehnzelligen Familie beträgt 0,046mm. bis 0,054mm.

In Gräben am Dechsendorfer und Kosbacher Weiher bei Erlangen; in einem Graben am Schmaussenbuck bei Nürnberg (Juni beob.), in einem Graben am Donau-Mainkanale bei Baiersdorf. Immer sehr vereinzelt (unter andern Algen im Wasser flottierend.)

Erklärung der Abbildung auf Taf V. Fig VI.

Fig. VI. Eine 32zellige Familie (Durchmesser 0,061mm.)

Sorastrum bidentatum. P Reinsch.

Familia perfecte sphaerica ex cellulis octonis aut denis sextenis constituta, cellulae a latere visae in sciagraphia trapezicae truncatae; margo terminalis leniter repandus usque emarginatus, anguli acutiusculi paulo producti; cellulae e vertice visae in sciagraphia ellipticae.

Diameter (familiae ex cellulis 16is constit.) 0,028 mm. usque 0,035mm.

Die Zellchen dieser Form sind in der Mitte beiderseits ein wenig erweitert, die Ecken nicht wie bei *spinulosum* abgerundet sondern in ein kurzes konisches Spitzchen auslaufend.

In einem Graben am Kosbacher Weiher bei Erlangen zuerst im Juli 1863 beobachtet, hierauf wiederholt in einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf IV Fig. I.

Fig. I a) Eine sechzehnzellige Familie von den kleinsten beobachteten Dimensionen (die Zellchen 0,01mm. breit, am obern Rand seicht ausgerandet, der Durchmesser der Familie 0,028 mm.); b) eine sechzehnzellige Familie von den grössten beobachteten Dimensionen (die Zellchen 0,012 mm. breit, am obern Rand etwas tiefer ausgerandet und im Verhältnisse zur Länge ein wenig schmaler als bei der ersteren Familie, der Durchmesser der Familie 0,035mm.).

Coelastrum. Naegeli.

Coelastr. cubicum. Naegeli. (Gattgen. einzell. Alg. p. 98. Taf. 5. C. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs p. 146. Rabenh. Alg. Nr. 465.)

In einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf bei Erlangen unter Sirogoniumrasen mit vielen Desmidiaceen.

Coelastr. sphaericum. Naegeli. (Gattgen. einzell. Alg. p. 98. Taf. 5. C. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 146. Rabenh. Alg. Nr. 1251.)

Von dieser zierlichen Art habe ich sowohl 8zellige, 16zellige wie vielzellige (bis zu 50zellige) Familien beobachtet. Bei den wenigzelligen Familien sind die Zellchen näher aneinander gedrängt und es können daher solche Familien für ein Sorastrum gehalten werden. Der mittlere Theil des Zellchens ist etwas kegelig erhaben, die Seitenränder sind (je nach der Grösse der Familie) mit drei bis sechs kurzen Fortsätzen versehen, durch welche die einzelnen Zellchen untereinander in Verbindung stehen, die leeren Zwischenräume zwischen den einzelnen Zellchen sind regelmässig drei- vier- oder fünfseitig.

Der Durchmesser einer achtzelligen Familie misst 0,019mm., der Durchmesser einer sechzehnzelligen 0,046mm., der Durchmesser einer etwa 50zelligen Familie 0,062mm.

Diese äusserst zierliche mikroskopische Alge findet sich in nur vereinzelten Specim. an mehreren Orten in der Umgegend von Erlangen. In Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf und Oberndorf, in einem Graben am Kosbacher Weiher.

Coelastr. robustum. Hantsch. (Rabenh. Alg. Europ. Decade. XXXI. und XXXII. Nr. 1407). Unterscheidet sich von dem *Coelastr. sphaericum* nur durch eine dickere Membran der Zellen, wie durch etwas grössere Dimensionen.

Eine erwachsene vielzellige Familie misst im Durchmesser bis zu 0,079mm. Bei dieser Form hat Hantsch den der Entwicklung einer neuen Tochterfamilie analogen Vorgang beobachtet; „der Inhalt der Zellen schwärmt aus, bisweilen schon im Innern der Zelle zu einer jungen Familie ausgebildet“; und es findet damit *Coelastrum* seine richtige Stellung bei den *Protococcaceen*.

In einem Graben am Kosbacher Weiher beobachtet, gemeinschaftlich mit *Coelastr. sphaericum*.

Pediastrum. Meyer.

Pediastr. simplex. Meyer. (Nova Acta Ac. Leop. Carol. XIV. p. 772. Rabenh. Kryptog Sachs. p. 143. Monactinius simplex. Corda. Alm. de Carlsbad. 1839 p. 239. Taf. 4. Fig. 22 23. Kütz. Spec. Alg. p. 191.)

Von dieser in andern Florengebiets nicht, oder nur als sehr selten beobachteten Form habe ich in der Umgegend von Erlangen an zwei verschiedenen Lokalitäten folgende hier unterschiedene Formen beobachtet. Die meisten der unterschiedenen Formen habe ich an einem jetzt leider verdorbenen Standorte beobachtet, welcher die früher schadhaft gewesene nun aber leider wieder hergestellte Brücke des Donau-Mainkanals über den Rodelheimbach bei Erlangen darstellt, an deren äusserer und innerer aus Keupersandsteinen aufgeführten Wand, über welche aus einzelnen Ritzen fortwährend Wasser herabrieselte, sich zahlreiche Algen angesiedelt hatten. Der gallertartige Ueberzug dieser Steine bestand aus einem Ge-

menge von Diatomaceen (Synedren, Naviceln, Cymbellen, Gloeocapsa atrata), einigen Desmidiaceen (Cosmarium Cucumis, Staurastrum margaritaceum u. a.) und Pediastron, darunter besonders Ped. Boryanum und simplex.

Formen.

1. Cönobium ohne Mittelzellchen, aus vier oder fünf Strahlzellen gebildet, sehr klein. Durchmesser 0,007mm. bis 0,017mm. In Gräben am Kosbacher Weiher bei Erlangen.

2 Cönobium mit einem einzelnen Mittelzellchen und 6 — 7 Strahlzellchen gebildet. Durchmesser 0,026 mm. bis 0,054mm

3. Cönobium mit einer grossen kreisrunden oder elliptischen Mittelloffnung versehen, Strahl aus 6 bis 8 Zellchen gebildet. Durchmesser 0,061mm. bis 0,076mm.

4 Das Scheibchen durch mehrere meist unregelmässige Löcher durchbohrt, die fünf Zellchen des Scheibchens meist nicht gleich und nicht regelmässig gestaltet. Der Strahl aus 11 Zellchen gebildet. Durchmesser 0,046 mm. bis 0,054 mm. In Gräben am Kosbacher Weiher und in einem Altwasser der Schwabach.

5. Das Scheibchen aus 5 bis 6 parenchymatisch verbundenen Zellchen gebildet. Der Strahl aus 10 oder 11 Zellchen gebildet.

a. Zellchen der Scheibe in zwei Reihen nebeneinander liegend, 11 oder 10 Strahlzellchen; einzelne Zellchen der Scheibe zeigen sich manchmal durch eine kleine Oeffnung getrennt. Im Umrisse meist etwas elliptisch. Länge 0,054mm. bis 0,046mm. Breite 0,046mm. bis 0,038mm.

b. Zellchen der Scheibe um ein Mittelzellchen gruppiert. Im Umrisse meist kreisrund. Durchmesser 0,061 mm bis 0,069mm.

Die Anordnung der Zellchen im Cönobium ist

$$1 + 5 + 11 = 16.$$

In Gräben am Kosbacher Weiher.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. IV.

Fig. IV. a) Ein Cönobium der Form 2 aus einem Graben am Kosbacher Weiher (Durchmesser 0,045 mm); b) ein Cönobium der Form 1. aus einem Altwasser der Schwabach bei Erlangen (Durchmesser 0,017mm.)

Pediastr Sturmi. P. Reinsch.

Cellulae radiales ovatae vel circulari-ovatae summis rotundato obtusis in aculeum hyalinum cellulae diametro longitudinali subaequantem subito productis.

Formae.

1. Coenobium sine cellula centrali, pars media perforata, cellularum radialium numerus 3 aut 4. Diameter 0,038 mm. usque 0,05mm.

2. Discus unicellularis, cellula singula polygona cum cellulis radialibus arcte conjuncta aut lacunis ternis partialiter disjuncta. Diameter 0,054mm. usque 0,076mm.

An der Wand einer beständig von Wasser überrieselten Brücke des Donau-Mainkanales über die Schwabach; in Gräben am Kosbacher Weiher bei Erlangen.

3. Discus ex cellulis quinternis arcte conjunctis, in seriebus binis parallelis dispositis exstitutus (discus interdum lacunis minoribus perforatus).

Longit. 0,054mm. usque 0,069mm.

Latit. 0,046mm. usque 0,061mm

In Gräben am Kosbacher Weiher.

Cönobien mit centralem Mittelzellehen und concentrisch angeordneten Scheibenzellehen habe ich noch nicht beobachtet.

Diese Art unterscheidet sich von *Pediastr. simplex* nur durch die Gestalt der Strahlzellehen, deren unterster Theil breit eiförmig bis beinahe kreisrund, ist deren oberstes Ende mit einem aufgesetzten derben Stachel von der Länge des Zellehens bewehrt ist, während bei *Pediastr simplex* die Strahlzellehen ganz allmählig in die lange stachelförmige Spitze verlaufen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Cönobium der Form 1., drei Strahlzellen; b) ein Individuum derselben Form mit vier Strahlzellen, die Mitte des Scheibchens wie bei den ersteren mit einer kleinen Oeffnung versehen; c) ein Cönobium der Form 2. (Durchmesser 0,062mm); d) ein Cönobium der Form 3. aus einem Graben am Kosbacher Weiher (Länge 0,061mm., Breite 0,052mm.).

Pediastr. integrum Naegeli. (Gattgen einzell. Alg. p. 97. T. 5. B. Fig. 4. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 143. Rabenh. Alg. Europ. Nr. 1705. Al Braun Alg. unicell. p. 81.)

Die bei Naegeli abgebildete Form (Fig. a. l. m. n.) mit sehr kurzen geradeaus oder wenig zur Seite gestreckten Hörnchen habe ich in der Umgegend von Erlangen noch nicht beobachtet, dagegen einige andere noch unbeschriebene dem Formenkreise des *Pediastr. integrum* angehörige Formen, deren Aufzählung hier folgt.

A. Die äussern Ecken der ungetheilten polyedrischen (sechs- bis siebenseitigen) Randzellchen mit je einem derben gerade ausgestreckten Stachel bewehrt, der Rand zwischen den Stacheln gerade, Länge der Stacheln $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{3}$ der Länge des Randzellchens.

1. Cönobium aus vier rechtwinklich vereinigten Zellchen gebildet, ohne (oder nur mit einer sehr kleinen) mittlere Oeffnung. Durchmesser 0,03mm.

2. Cönobium aus fünf Randzellen und einer Mittel-Zelle gebildet. Durchmesser 0,03mm. bis 0,038mm.

3. Cönobium aus sechs Randzellen und zwei Mittelzellen gebildet, ohne Oeffnungen. Länge 0,046mm. Breite 0,042mm.

4. Cönobium aus 10 Randzellen und sechs Mittelzellen gebildet, von denen gewöhnlich eine die Mitte des Cönobiums einnimmt. Durchmesser 0,076mm. bis 0,1mm.

Seltener sind die sechs Mittelzellen in zwei Reihen geordnet, das Cönobium hat dann elliptischen Umriss. Länge 0,117mm. bis 0,12mm., Breite 0,092mm. bis 0,108mm.

B. Die zwei äusseren Ecken der ungetheilten polyedrischen (sechs- bis siebenseitigen) Randzellchen mit je einem derben seitwärts gerichteten Stachel bewehrt, die beiden Stacheln nach auswärts divergirend, $\frac{1}{2}$ bis beinahe von der Länge der Randzellchen. Von dieser Form habe ich nur mehrzellige Cönobien beobachtet. Der Randzellchen sind 10, der Scheibenzellchen 6, welche gewöhnlich in zwei Reihen, seltener concentrisch geordnet sind. Länge eines Cönobiums 0,108mm. Breite 0,076mm.

Diese verschiedenen Formen theils untereinander theils einzeln von einem Standorte ungemischt beobachtet. In Gräben am Kosbacher Weiher, an der Kanalbrücke über die Wiesent bei Forchheim, in Gräben im Sebaldiforste.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. V.

Fig. V. a) Ein Cönobium der Form B., aus einem Graben am Kosbacher Weiher bei Erlangen, die beiden divergirenden Stacheln der Randzellchen von der halben Länge der Zellchen, die Zellchen der Scheibe in zwei parallele Reihen geordnet; b) ein Cönobium der Form A. 2. aus einem Graben im Reichsforste, der obere Rand der Randzellen $\frac{2}{3}$ der Breite der Zellchen, die Hörnchen der Ecken $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ der Länge der Zellchen, geradeaus gerichtet.

Pediastr. pertusum. Kützinger. (Phycol. Germ. p. 143. Ralfs britt. Desmid. Taf. XXVI. Fig. 6. a. b. A. Braun Alg. unicell. p. 92. *Ped. Napoleonis* Ralfs britt. Desm. Taf. XXXI. Fig. 7. c. e. *Micrast. Boryana*. Ehrenb. Infusionsth Taf. 11. Fig. 5 h. Fig. 8. b.)

Von den fünf von Alexander Braun unterschiedenen Formen dieses Kreises habe ich in der Umgegend von Erlangen nur zwei beobachtet. Von dieser formenreichen Art finden sich um Erlangen einzelne Formen, welche nicht gut einer der unterschiedenen Formen eingereiht werden können; nimmt man nur die Bildung der Randzellchen als hauptsächlich unterscheidendes Merkmal, so ergeben sich für die sämtli-

chen der von mir in der Natur beobachteten Formen folgende Gruppen.

I. Randzellehen stumpfwinklich bis rechtwinklich ausgeschnitten (oder auch nur etwas weniger als ein rechter Winkel).

1. Die Ecken der Läppchen der Randzellehen zugespitzt.

a. Cönobium vierzellig, Mittelzellehen fehlt. Durchmesser 0,023mm.

b. Cönobium achtzellig (2 + 6) oder siebenzellig (1 + 6). Durchmesser 0,046mm. bis 0,061mm.

c) Cönobium 16zellig (1 + 5 + 10). Durchmesser 0,023mm. bis 0,069mm.

d. Cönobium 32 zellig (1 + 6 + 10 + 15) oder (1 + 6 + 10 + 14 = 31) Durchmesser 0,1mm. bis 0,56mm.

Bei diesen sämtlichen Formen sind die Randzellen meistens ebenso gestaltet wie bei dem *Pediastr. serratum*, die Specim. zeigen aber das spezifische des *Ped. pertusum*, die Ausrandung aller Seiten der Zellehen des Scheibchens.

2. Die Ecken der Läppchen der Randzellen stumpf.

a. Cönobium achtzellig, die zwei inneren Zellehen meist regelmässig vierlappig. Durchmesser 0,038mm. bis 0,054mm.

b Cönobium 16zellig (1 + 5 + 10). Durchmesser 0,046mm. bis 0,061mm.

Die Spec. dieser kleinen Gruppe stellen die Form *c. brachylobum* Al. Braun dar, (*Algae unicell. p. 93* „cellulae majores, radii emarginatae vel triangulatim excisae, breviter bilobae, sublaeves, cornubus brevissimis truncatulis vel rubnullis.“), zu der auch die bei Naegeli Gattungen einzell. Alg. Taf. 5. B. 2. Fig. b und f. dargestellten Specimina (*Pediastr. Solenaea. Kützinger ex p.*) gehören.

II. Randzellehen spitzwinklich ausgeschnitten, Ausschnitt bis weniger als $\frac{1}{3}$ eines Rechten.

1. Die Läppchen der Randzellehen zugespitzt.

a. Cönobium achtzellig. Durchmesser 0,061 mm. bis 0,069mm.

b. Cönobium 52 zellig ($1+6+10+15+20=52$). Durchmesser 0,069mm.

2. Die Läppchen der Randzellchen abgestutzt oder sehr stumpf.

a. Cönobium achtzellig ($2+6$), Mittelzellchen häufig unsymmetrisch, manchmal mit strahlig angeordneten Läppchen. Durchmesser 0,03mm. bis 0,062mm.

b. Cönobium 16zellig ($1+5+10$), die Löcher des Mittelscheibchens sehr weit und häufig kreisrund bis elliptisch gestaltet, die Mittelzellchen vierstrahlig, das im Centrum gelagerte gewöhnlich fünfstrahlig. Durchmesser 0,054mm. bis 0,075mm.

c. Cönobium 32zellig (gewöhnlich nur $1+5+10+15=31$), die Zellchen und deren Anordnung wie bei a. u. b. Durchmesser 0,068mm. bis 0,083mm.

Die Specimina dieser letzteren Gruppe scheinen mir *γ. clathratum* A. Braun darzustellen (Alg unicell. p. 93. „clathratum. „Cellulae disci lacunis permagnis interrupti profundius bipartitae.“) Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 144.

Alle diese Formen finden sich vereinzelt theils in Gräben am Donau-Mainkanale unter vielen kleineren Algen, theils fanden sich einzelne unter andern Pediastron an dem jetzt verdorbenen Standorte an der Kanalbrücke über den Rödelheimbach.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X. Fig. V.

Fig. V. Ein Cönobium der Form II. 2. b. (Pediastrum pertusum clathratum, Zellchen $15=1+5+10$, die Zellchen der Scheibe regelmässig gestaltet, aus einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf.

Pediastr. gracile. Alex. Braun. (Alg. unicell. p. 92. Pediastr. simplex. Ralfs britt. Desmid. Taf. XXXIV. Fig. 15. 16.) Die unten abgebildete Form glaube ich mit dieser Art identisch halten zu müssen. „Cellulae 4 lacunem includentes, rarius medio contiguae, basi breviter conjunctae, ad medium fere bilobae, lobis ovatis, in cornua divergentia tenuissima longitudine cellulas fere aequantia acutiuscula excurrentibus.“ (Alg.

unic. p. 91.) Die Theilung geht bei diesen Specim. bis unter die Mitte des Zellchens hinab.

Durchmesser 0,038mm. bis 0,055mm.

In dem beständig von Wasser überrieselten Ueberzug an den Wänden der Brücken des Donau-Mainkanales über die Schwabach und den Rödelheimbach beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. II.

Fig. II. Ein Cönobium des gracile aus dem Ueberzuge der Wände der Canalbrücke (jetzt nicht mehr vorhanden). Die Oeffnung in der Mitte des Cönobiums kreisrund, die zugespitzten Lappen der Zellchen gerade hervorgestreckt. Durchmesser 0,048mm.

Pediastr. serratum. P. Reinsch.

Cellulae radii in sciagraphia rectangulares, obtusangule usque rectangule excisae, lobulis acutis (sed non cornubus terminatis), incisurae margines recti; cellulae radii in basi conjunctae insisuris acutangulis disjunctae; discus continuus aut lacunis minoribus (triangularibus) non regulariter dispositis pertusus; disci cellulae polygonae marginibus lateralibus rectis.

Formen.

1. Cönobium 32 zellig ($1 + 5 + 10 + 16$). Durchmesser 0,069mm. bis 0,116mm.

2. Cönobium 64 zellig ($1 + 6 + 15 + 19 + 24$ oder $2 + 8 + 13 + 18 + 23$), mit einem einzigen im Centrum gelagerten Zellchen, Umriss kreisrund.

3. Cönobium 46zellig ($2 + 10 + 19 + 25$), mit zwei im Centrum gelagerten Zellchen, Umriss elliptisch.

Diese als Art aufgestellte Form unterscheidet sich von *Ped. vagum* nur durch die verschiedene Beschaffenheit der Randzellchen.

In Gräben an verschiedenen Orten in der Umgegend von Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VI. Fig. V.

Fig. V. a) Ein Cönobium der Form 3. (Länge 0,16mm.,

Breite 0,108mm.), Anordnung der Zellchen $2+11+19+26=58$, aus einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf; b) ein Cönobium der Form 1. (Durchmesser 0,072mm.), Anordnung der Zellchen $1+5+10+16=42$, aus einem Graben am Kosbacher Weiher.

Pediastr. vagum. Kützing. (Phycol. Germ. p. 143. Alex. Braun. Alg. unicell. p. 82. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 143.)

Die Randzellchen sind bei dieser Art gekörnelt (am äusseren Rande), jedes Randzellchen ist mit zwei kurzen höckerförmigen Spitzchen versehen, der dazwischen liegende Rand ist mässig ausgerandet (bei grösseren Cönobien bis beinahe gerade). Die Zellchen sind viel grösser als bei den übrigen *Pediastr*en nemlich 0,023mm. bis 0,03mm. lang und 0,019mm. bis 0,023mm. breit, die Länge der immer elliptischen Umriss zeigenden Cönobien 0,416 mm. bis 0,345 mm., die Breite 0,269mm. bis 0,306mm.

Auf Taf. VII. Fig. V. findet sich eine Randzelle dargestellt, die mässig vorgezogenen Ecken wie der äussere Rand fein gekörnelt.

Pediastr. Boryanum. Turpin. (*Hierella Boryana*. Turpin. Mém. du Mus. XVI. p. 318. *Micraster. trieyclica*, elliptica und *Boryana* Ehrenberg. Abhandl. der Berlin. Acad. und Infusionsth. Al. Braun Alg. unicell. p. 86. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 144.)

Von dieser schon am längsten bekannten Art finden sich um Erlangen folgende Formen.

a) *brevicorne*. Alex. Braun. (Alg. unicellul. p. 86. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 144.)

Die Läppchen der Randzellchen in kürzere Hörnchen auslaufend (von kaum $\frac{1}{3}$ der Länge der Zellchen), die Hörnchen glatt, wie auch die Membran der Zellchen glatt.

b) *longicorne*. P. Reinsch.

Die Läppchen der Randzellchen in längere schlanke cylindrische am Ende gleichmässig dicke oder seltener kopf-

förmig verdickte Hörner auslaufend (von der Länge der Zellchen oder ein wenig länger), die Membran der Zellchen glatt, die Hörner hie und da fein gekörnelt.

Von dieser Form beobachtete ich 8zellige bis zu 64zellige Cönobien.

c. *granulatum* Kützing. (Phycol. German p. 134. Alex. Braun. Alg. unicell. p. 90. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 144)

Die Spitze der Läppchen der Randzellchen wie bei a. gebildet oder ein wenig verdünnter, die Membran der Zellchen wie die Hörnchen gekörnelt rauh

Von dieser Form beobachtete ich nur 8- oder 16zellige Cönobien, bei den achtzelligen sind gewöhnlich sechs Randzellchen um zwei Mittelzellchen gelagert.

a. Am häufigsten um Erlangen; b. in Gräben und Sümpfen am Kosbacher und Dechsendorfer Weiher; c. in einem Graben am Donau-Mainkanale unterhalb Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. VI.

Fig. VI. a) Ein Randzellchen der Form a.; b) ein Randzellchen der Form c. (*Pediastrum granulatum* Kützing), von einem 16zelligen Cönobium, die ganze Membran der Zellchen wie auch die Hörnchen der Randzellchen gekörnelt rauh; c) ein Randzellchen der Form b. (*longicorne* P. Reinsch), von einem 64zelligen Cönobium, die Hörner bei diesem Cönobium nicht gekörnelt.

Pediastr. Ehrenbergii. Corda. Alex. Braun. (Alex. Braun Alg. unicell. p. 97. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 145. *Asteriscium caudatum*. Corda Alm. de Carlsb. 1839. p. 138.)

Diese Art kommt um Erlangen 4zellig, 8zellig oder 16zellig vor. Bei den vierzelligen Cönobien sind die vier rechtwinklig vereinigten Zellchen spitzwinklich bis rechtwinklich eingeschnitten. Die Ecken sind entweder vorgezogen und scharf zugespitzt (zu c. *cuspidatum* A. Braun gehörig) oder spitzwinklich bis beinahe rechtwinklich gestutzt (zu a. *truncatum* A. Braun gehörig); diese Cönobien stellen die *Miscraster*.

Tetras. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 155. Taf. XI. Fig. I. dar. Bei den acht- oder häufig auch siebenzelligen Cönobien sind 6 oder 7 Randzellchen um ein Mittelzellchen gruppirt, diese stellen die *Micrasterias heptactis* Ehrenberg (Infusionsthierch. p. 156. Rabenh. Kryptog. Deutsch. p. 74) dar; die Randzellchen entweder wie bei den vierzelligen Cönobien beschaffen oder mit ausgerandeten oder mässig tief ausgeschnittenen Lappchen (zu b. excisum. Alex. Braun gehörig). Bei den 16zelligen Cönobien sind die fünf Scheibenzellchen in zwei Reihen geordnet und immer zweispaltig, die gewöhnlichen 11 Randzellchen sind gewöhnlich wie die der minderzelligen der Form b. oder a. angehörigen Cönobien beschaffen.

Breite der vierzelligen Cönobien 0,017mm. bis 0,019mm.

Durchmesser der siebenzelligen Cönobien 0,023mm bis 0,03mm.

Länge der 16 zelligen Cönobien 0,032mm bis 0,046mm. Breite 0,03mm. bis 0,038mm.

Um Erlangen sind die vier- und siebenzelligen Cönobien verbreiteter als die 16zelligen. Unter den kleineren Algen in sehr vielen Gräben im Wasser flottirend.

Pediastr. Rotula. Ehrenberg (Infusionsth. p. 158. Taf. 11. Fig. 7. Alexander Braun Alg. unicell. p. 102. Rabenhorst Kryptog. Sachs p. 145. *Pediastrum biradiatum.* Meyer Nova Acta Ac. Leop. Carol. XIV. p. 775. Fig. 21. 22.)

Diese Art, welche sich von der vorhergehenden durch die zweizahnigen Lappchen der Randzellchen unterscheidet, habe ich um Erlangen nur an einem Orte in wenigen Cönobien beobachtet und zwar nur 32 zellige (5+11+16), die fünf innersten, wie die übrigen Zellchen des Scheibchens tief zweispaltig, in zwei Reihen geordnet; Durchmesser 0,054mm. bis 0,069mm.

Familie der Volvocinen (Volvocineae.)

Volvox. Ehrenberg.

Volvox Globator. Linne. (Systema Naturae ed. X. 1758. Ehrenberg. Infusionth. p. 68. Taf. 4. Fig. 1—3.)

Dieses merkwürdige, schon am längsten bekannte zuerst durch Rösel (1751) bekannt gewordene mikroskopische Gewächs war ich bisher noch nicht so glücklich lebend und in der Natur selbst zu beobachten; nach der Angabe meines verehrten Lehrers Herrn Professor Friedrich Will dahier fanden sich in Wasser aus einem Graben der Umgegend mehrere vielzellige Familien, welche den entwickelten Zuständen (Volv. stellatus. Ehrenberg. Infus. Taf. 4. Fig. 3.) angehört haben dürften.

Botryocystis. Kützing.

Botryoc. Volvox. Kützing. (Tab. phycol. T. 9. Rabenh. Alg. Nr 326. Kryptog. Sachs. p. 148.)

Diese Art, welche mit der nachfolgenden eine Formenreihe darstellt, findet sich um Erlangen an sehr vielen Orten vor. In dem geschöpften Wasser aus mehreren Gräben ist man sicher immer viele der lebhaft sich bewegenden Familien in allen Graden der Entwicklung wahrzunehmen. Die jungen wenigzelligen (4zelligen oder 8zelligen) Familien sind kugelförmig, die Zellchen ebenfalls kugelförmig, bei den mehrzelligen Familien, die immer ellipsoidisch sind, stehen die Zellchen dichter gedrängt wodurch die Seitenflächen sich abplatteten, die Zellchen sind alsdann mehrkantig, die äussere Fläche ist jedoch immer nach aussen kugelig gewölbt. Die mehrzelligen Familien sind immer mit einer dicken hyalinen Hülle, deren Dicke bis $\frac{1}{5}$ des Querdurchmessers der Familie beträgt, umhüllt.

Der Durchmesser eines Zellchens einer 4 zelligen Familie bis 0,007 mm., die Länge einer 32 zelligen Familie 0,038 mm. bis 0,046 mm., die Breite 0,027 mm. bis 0,036 mm.

Die Bewegung der Familien dauert während des ganzen Frühlings und Sommers an, zu jeder Tageszeit; wie mir scheint hat die Entziehung des Tageslichtes keinen Einfluss auf die Bewegung.

Botryoc. Morum. Kützing. (Tab. phycol. T. 10.)

Diese Art scheint mir mit den jüngeren Zuständen (4- oder 8zellige Familien) der vorigen identisch zu sein.

Botryoc. pentagonalis. P. Reinsch.

Cellulae prismaticae, planitiebus lateralibus quinternis, planitie terminali subconvexa aut subplana, cellulae e planitie terminali visae pentagonae, angulis paulo productis; cellulae quaternae in infima parte octaetrice in familiam minorem conjunctae aut cellulae octonae sphaerice in familiam majorem conjunctae.

Diameter familiae minoris 0,015mm. usque 0,019mm.

Diameter familiae majoris 0,023mm. usque 0,027mm.

Cellulae latitudo 0,006mm. usque 0,008mm.

Cellulae longitudo 0,008mm. usque 0,011mm.

In Tümpeln an der Seebach bei Erlangen (im Frühling und Sommer 1864 beobachtet).

Die einzelnen mit einer rotirenden und zugleich vorwärts schreitenden Bewegung begabten Familien mit einer deutlich umgrenzten Schleimhülle umgeben, welche sich jedoch nicht über die äusseren Ränder der Zellchen, wie diess bei den übrigen Botryocysten der Fall ist, erstreckt. Die einzelnen Zellchen stehen genau an ihrem unteren Ende in geraden Flächen in gegenseitigem Zusammenhange. Der Längendurchmesser der Zellchen ist dem Querdurchmesser entweder gleich oder ein wenig länger. Die Terminalfläche der Zellchen ist entweder sehr stumpf kegelförmig bis beinahe fast eben oder auch in der Mitte mit einem stumpfen Höcker versehen. Die Membran der Zellchen, deren Inhalt intensiv grün gefärbt ist, ist ziemlich dick.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. VII.

Fig. VII. a) Eine vierzellige Familie, in einer Lage, in

welcher nur drei Zellchen dem Beschauer zugewendet sind, wie man sieht berühren sich je zwei Zellchen von derselben Seite betrachtet in je zwei geraden im Mittelpunkte der Familie sich durchschneidenden Durchschnittslinien. Die Familie von einer Gallerthülle umhüllt (Durchmesser 0,016mm); b) eine vierzellige Familie, in einer Lage dargestellt, in welcher die vier Zellchen dem Beschauer zugewandt sind, senkrecht auf die Terminalfläche des mittleren Zellchens und die Seitenkanten dieses Zellchens parallel mit der Sehachse. Die Gallerthülle der Familie nach aussen nicht deutlich konturirt (Durchmesser 0,016mm); c) eine achtzellige Familie, ein Zellchen (das mittlere) ist dem Beschauer in senkrechter Lage der Sehachse auf die Terminalfläche zugewandt, die Terminalflächen der Zellchen fast eben (bei den vorigen stumpf kegelförmig), die Familie von einer deutlich konturirten kugelichen Gallerthülle umhüllt (Durchmesser 0,026mm.).

Gonium. Müller.

Gonium pectorale. Müller. (Ehrenberg Infusionth. Taf. 3. Fig. 1. Rabenh. Alg. Nr. 1010.)

Die 8 oder 16zelligen Familien bestehen aus sphärischen in ein Täfelchen geordneten und durch Zwischenräume von einander getrennten Zellchen; die Zellchen sind regelmässig zu gleicher Anzahl in parallele Reihen geordnet; der Umriß eines Täfelchens ist genau quadratisch. Die Bewegung des Täfelchens erfolgt in geradlinigter Richtung indem das Täfelchen dabei fortwährend — und wie es scheint in rhythmischen Intervallen — sich abwechselnd um eine abwechselnd um die andere diametrale Achse sich umdreht.

Die Zellchen theilen sich sämmtlich in derselben Richtung durch eine Querwand in je zwei Tochterzellchen, welche sich allmählig durch abgeschiedene Gallerte von einander entfernen, es ist dann aus der 8zelligen Familie eine 16zellige entstanden; das im Umrisse rektanguläre Täfelchen zerfällt dann durch einen von aussen nach innen dringenden Einschnitt und,

indem sich in der Mitte des Täfelchens eine Oeffnung bildet in zwei 8 zellige Tochterfamilien. Einzelne 8 zellige Familien zeigen sich schon durch rechtwinklich sich durchkreuzende Wände in der Gallerte in je 4 gleich grosse Tochtertäfelchen gefeldert.

Die Breite einer grössten 16zelligen Familie habe ich zu 0,034mm. bestimmt, die Breite einer kleinsten zu 0,015mm; die Länge einer Familie, deren Zellchen sich eben getheilt hatten, betrug 0,046mm, die Breite 0,027mm. Der Durchmesser eines Zellchens beträgt durchschnittlich 0,006mm.

In Gräben im Sebaldiforste unter andern kleineren Algen zerstreut; in Gräben an der Regnitz unterhalb Forchheim.

II. Ordnung der chlorophyllhaltigen Algen: Conjugatae, Conjugaten (Copuliralgen).

Familie der Didymidiaceen (Didymidiaceae) (Desmidiaceen Desmidiaceae).

Zu dieser sehr merkwürdigen Familie mikroskopischer Algen, welche von mir zum Gegenstande einer sehr sorgfältigen und umfassenden in nächster Zeit vollendet werdenden Monographie gemacht worden ist, sind von früherer bis in die neuere Zeit sehr verschiedenartige Gewächse gebracht worden. Ausser den meisten der früher bekannt gewesenen jetzigen Palmellaceen waren denselben viele der jetzigen zweiten Familie der Conjugaten beigezählte Arten und Gattungen zugeordnet worden. Erst in der neueren und neuesten Zeit, seit welcher den Lebensvorgängen der mikroskopischen Gewächse eine vorwiegende Aufmerksamkeit zugewendet wird, wurden die höchst merkwürdigen Vorgänge der Copulation und Sporenbildung dieser Gewächse erkannt und näher untersucht,

weshalb es möglich geworden ist die Familie darnach zu durchsichten. In physiologischer Hinsicht namentlich in Bezug der letzteren Vorgänge können die Akten über diese Familie als geschlossen betrachtet werden, in systematischer Hinsicht dagegen liess die Familie noch vieles zu wünschen übrig. Bei der noch jetzt fast allgemein üblichen Methode den Dimensionsverhältnissen bei der Aufstellung der Arten bei mikroskopischen Gewächsen ein allzugrosses Gewicht beizulegen, dadurch dass die meisten dieser mikroskopischen Algen selten rein d. h. in grösserer Anzahl von Individuen gesellig bei einander lebend angetroffen werden, so dass der Misstand eintritt, dass häufig nach wenigen beobachteten Individuen die Art aufgestellt und die Diagnose entworfen wird, bei dieser Lage konnte es nicht abgewendet werden, dass allmählig eine grössere Zahl von Gattungen und Arten entstand und bis in die neueste Zeit in den beschreibenden Schriften sich fort-schleppten. Bei erfolgter genauerer Untersuchung wurden mehrere Gattungen vereinigt und aus Gattungen Untergattungen errichtet. Nach den neuesten genauen Untersuchungen und nach Vergleichung sehr vieler Specimina wurde die Zusammenziehung noch stärker, mehrere Gattungen wurden aus der Familie gestrichen und an den nach den neueren Untersuchungen unschwer zu ermittelnden Ort gestellt. Viele, die meisten der von den früheren Beobachtern (Ralfs, Naegeli) aufgestellten Arten vermochten ihren speziellen Werth zu erhalten, einige mussten als Formen einer Art zusammengezogen werden, da Formen als verbindende Glieder zwischen zwei oder mehreren als verschieden betrachteten als Arten anerkannten Formen aufgefunden wurden. Ich gebe hier die von mir beobachteten Desmidiaceen der Umgegend von Erlangen, deren Verzeichniss für das Gebiet viel vollständiger und erschöpfender aus dem oben angeführten Grunde ausgefallen ist als dies für die übrigen Algengruppen der Fall ist, nach meiner neuen systematischen natürlichen Anordnung selbst, wobei es mir Sorge war, dass von den früheren so sorgfältigen

Beobachtungen Ralfs und Naegelis wo möglichst nicht Umgang genommen werden durfte. Da eine Gattung, von welcher die Familie ihren Namen hatte, nach der natürlich genommenen Begrenzung aus der Familie entfernt werden musste (*Desmidiium*. Agardh), da ferner mehrere der schon von Nageli kontrahirten Gattungen mit noch anderen Gattungen zusammengezogen werden mussten, von welchen sämmtlichen Gattungen keiner der Gattungsnamen — nicht in philologischem Sinne — als zum neuen Gattungsbegriff verwendbar war, so musste nothwendig — und ungerne gehe ich daran alten bekannten Sachen neue Namen beizulegen — ein neuer Gattungsname für den neuen Gattungsbegriff beigelegt werden. Diese neue Collectivgattung (*Didymidium*), welche nicht weniger als sechs frühere Gattungen in sich schliesst*), nimmt daher auch als die bedeutendste und die bezeichnendste der Familie den Namen der Familie für sich in Anspruch. Die Anordnung der Familie ist ebenso natürlich als sie systematisch zweckmässig ist. Wenn wir den Grad der Theilung des Körpers der Zelle bei den verschiedenen Gattungen näher vergleichen, so ergibt sich uns innerhalb der Gattungen das Merkmal einer ganz allmählig fortschreitenden Theilung, welches Moment denn auch bei der Bildung der Gattungen zu Grund gelegt ist, den Untergattungen liegt zum unterscheidenden Momente namentlich die Bildung der Hälften zu Grunde. Ein zweites wichtiges Moment bei der Bildung der Gattungen wie der Untergattungen liegt in der Beschaffenheit der Membran der Sporen (*Zygosporen* de Bary), welche entweder glatt oder gar mannichfaltig mit Stacheln oder Borsten verziert ist; diese aber, noch nicht hinlänglich bei allen Formen gekannt, hat daher nur erst untergeordneten Werth. — Bemerkenswerth ist die, nur durch unablässige Beobachtung der Desmidiaceen eines Gebietes ermittelte Thatsache, dass auf einem kleinen wenige

*) Naegeli zog schon 1849 in den Gatt. einz. Alg. drei der damaligen Gattungen (*Euastrum*, *Cosmarium*, *Micrasterias*) in seiner Collectivgattung *Euastrum* zusammen.

Quadratstunden einnehmenden Gebiete ausser einigen wenigen neuen darin aufgefundenen fast sämmtliche der bekannten und der in dem Ralfs'schen Werke über die britischen Desmidiaceen enthaltenen Formen leben. Eine Thatsache, welche die eifrige Durchforschung jedes anderen kleineren Gebietes, welches dieselben günstigen territorialen Bedingnisse in sich vereinigt wie das Erlanger Gebiet, höchst wahrscheinlich darbietet, eine Thatsache, welche wahrnehmen lässt, dass die Familie der Desmidiaceen in ihren sämmtlichen auf der Erde lebenden Formen als verkannt betrachtet werden muss, dass die Verbreitung der Desmidiaceen und überhaupt der einfacher organisirten mikroskopischen Gewächse auf der Erdoberfläche — worauf schon oben hingewiesen worden ist — nicht denselben beschränkenden durch geographische Lage und klimatische Einflüsse bedingten Gesetzen der Verbreitung der höher organisirten Gewächse unterworfen ist. — Es ist nothwendig, dass bei der Aufzählung der Formen der Familientypus und die Gattungstypen kurz erläutert werden.

(Didymidiaceae = Desmidiaceae.)

Cellulae solitariae (raro in seriebus longitudinalibus conjunctae), cellulae a fronte visae in sciagraphia circulares usque ellipticae usque rectangulares, interdum longe cylindricae aut prolongatae summis angustatis (Closterium), in medio incisura majus minusve profundiore incisae et in dimidia bina perfecte aequalia divisa, interdum in medio non incisae (Closterium). Substantia chlorophyllacea in utroque dimidio regulariter et apud genera singula diverse formata, corpus chlorophyllaceum sphaericum aut ex luminis radialiter dispositis exstitutum, interdum ex vittis longitudinalibus compluribus exstitutum (Docidium). Propagatio efficitur copulatione (cellulae propagativae zygosporae Aut. evolutione) aut cellulae maternae divisionis in cellulas filias aequales binas processu proprio (Conf P. Reinsch. Bullétin de Moscou 1864 III. p. 38. 40). Sporae evolutio intra sacculum ex prominentiis copulativis concretis exstitutum efficitur. Cellularum copulatarum membranae vacuae spora evo-

luta et maturata delapsae, sporae sphaericae, membrana crassiore verrucosa aut aculeata.

Didymidium. P. Reinsch.

(Gen. includ: *Cosmarium* Corda, *Enastrum* Ehrenberg, *Eucosmium* Naegeli, *Micrasterias* Agardh, *Staurastrum* Meyer.)

Cellulae a fronte visae ex dimidiis binis perfecte aequalibus symmetria convenientibus exstitutae, in medio utrinque aut profundius incisura incisae aut emarginatura acutangula, rectangula, obtusangula, elliptica usque semicirculari emarginatae; cellulae dimidia a fronte visa in sciagraphia elliptica, semicircularia, semielliptica, polygona et quadratica, aut indivisa aut simpliciter usque multipliciter divisa; cellulae dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, trigona, tetragona, pentagona usque nonagona; cellulae a fronte visae diameter transversalis diametro longitudinali aequalis (interdum paulo longior et brevior); dimidiorum interanea aut corpusculis chlorophyllaceis sphaericis singulis regulariter dispositis (*Cosmarium*) aut corpusculis compluribus absque ordine dispersis (*Micrasterias*) aut laminis chlorophyllaceis e corpusculo chlorophyllaceo sphaerico singulo ad angulos dimidii radialiter excurrentibus} instructa; zygospora verrucosa, aculeata aut spinosa.

Subgenus I. *Cosmarium* Corda.

Cellula a fronte visa in sciagraphia elliptica usque fere circularis (interdum angulosa), in medio utrinque non profunde emarginata aut excisa et dimidia extra articulum conjunctivum inter se configua; dimidiorum a fronte visorum margines integerrimi, (margines laterales interdum simpliciter usque multipliciter emarginati), margo terminalis non incisus; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica; dimidiorum interanea corpusculo chlorophyllaceo singulo (interdum binis) instructa; membrana glabra, punctulata aut verrucosa; zygospora verrucosa.

Didym. (Cosmarium) bioculatum. Brebisson. (Alg. Palaise p. 56. Taf. 7. Ralfs. britt. Desmid. p. 95. Taf. 15. Fig. 5. *Cosmar. tinctum* Ralfs. britt. Desmid. p. 35. *Euastrum minutum* Focke *physiol. Studien* I. p. 41. Taf. 1. Fig. 1.)

Diese sehr kleine Form gehört nicht dem Formenkreise des *Cosm. pyramidatum*, zu welchem *Cosm. rupestre* Nägeli gehört, an, wie Rabenhorst (*Kryptog. Sachs.* p. 199) bemerkt, sondern stellt wegen der immer glatten nie punktierten Membran, wegen der quer elliptischen Hälften eine eigene Art dar. Die Länge beträgt 0,012mm. bis 0,015mm., die Breite 0,01 — 0,014mm.

In stehenden Wassern (kleinen Pfützen in verlassenen Steinbrüchen) unter Conferven. Erlangen (Burgberg), Reichsforst; Rothenburg (Burgbernheimer Wildbald.)

Didym. (Cosmarium) pyramidatum. Brebisson. (Ralfs. britt. Desmid. p. 94. Taf. 15. Fig. 4. Alg. Europ. Nr. 1348. Dec. 35. 36. *Pythiscus angulosus.* Kützing *Phyc. germ.* p. 129.)

Von dieser Art habe ich in Franken zwei Formen beobachtet

a. *franconicum.* Länge 0,046mm. Breite 0,027mm.

b. *Brebissonii.* Länge 0,073 mm. bis 0,084 mm. Breite 0,05mm. bis 0,054mm.

Eine dritte von mir unterschiedene Form (*Bulnheimi*), bei welcher der Querdurchmesser bis beinahe die Hälfte des Längendurchmessers erreicht, während bei den beiden aufgeführten der Querdurchmesser nur $\frac{2}{3}$ des Längendurchmessers, habe ich in Franken noch nicht beobachtet. (In dem unter Nr. 1430. der 43. 44. Dek. der Alg. Europas enthaltenen Präparate Schneeberg in Sachsen gesammelt von O. Bulnheim.)

Im Reichsforste an verschiedenen Orten beobachtet, in Altwässern der Regnitz bei Bamberg, Forchheim, am Bischofssee bei Erlangen.

Didym. (*Cosmarium*) *Cucumis* Corda. (Almanach de Carlsb. 1839. p. 121. Fig. 25. Meneghini Synops. Desmid. p. 220. Ralfs. britt. Desmid. p. 93. Taf. 15. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 199. Euastr. rupestre. Naegeli Gattgen. einzell. Alg. p. 119. Taf. VII. A. Fig. b. Alg. Europ. Nr. 1081. dec. 9. 10.)

Die von mir in meiner Arbeit unterschiedenen fünf Formen, welche eine zusammenhängende Formenreihe, in welche das *Cosmar. rupestre* Naegeli sich einreicht, darstellen, unterscheiden sich fast nur in den Dimensionsverhältnissen.

Die Dimensionen bewegen sich in der Länge von 0,054mm. bis 0,092mm., in der Breite von 0,047mm. bis 0,054mm.

Die grösseren Formen finden sich nur in Sümpfen; Bischofssee, Kosbacher Weiher, Altwässer der Regnitz. Das *Cosmar. rupestre* an einem von tropfendem Wasser überrieselten Keuperfels (,,der tropfende Fels“) im Reichsforste.

Didym. (*Cosmarium*) *circularis*. P. Reinsch.

Cellulae dimidia a fronte visa in sciagraphia semicircularia, dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua; dimidia e vertice visa elliptica, a latere visa ovoidea; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis triens (aut paulo minus); membrana punctulata.

Longit. 0,054mm. usque 0,069mm.

Latit. 0,054mm. usque 0,169mm.

Crassit. 0,025mm. usque 0,038mm.

In kleinen Sümpfen, Reichsforst; an nassen Keupersandsteinfelsen (,,tropfender Fels“) im Reichsforst

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X. Fig. II.

Fig. II. a) Ein lebendes Individuum in der Frontansicht, in jeder Hälfte je zwei kugliche Chlorophyllkörperchen befindlich; b) Seitenansicht; c) Verticalansicht.

Didym. (*Cosmarium*) *Ralfsii*. Brebisson. (Ralfs the britt. Desmid. p. 93. Taf. 15. Fig. 3. Rabenh. Kryptog.

Sachs. p. 198. Alg. Europ. Nr. 1430. Nr. 1434. Cosmar. Cucumis. Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 14. p. 395.)

Die Hälften sind in der Frontansicht breitherzförmig, während bei der vorhergehenden die Hälften immer genau halbkreisrund.

Die Dimensionen sind um die Hälfte grösser.

Länge 0,117mm bis 0,121mm.

Breite 0,093mm. bis 0,1mm.

In Gräben und kleineren stehenden Wassern; Reichsforst, am Bischofssee.

Didym. (Cosmarium) granatum Brebisson. (Ralfs the britt. Desmid. p. 97 Taf. XXXII. Fig. 6. Rabenh. Krypt. Sachs. p. 199.)

Von dieser Art habe ich im Gebiete drei theils durch die Dimensionen theils durch die Gestalt der Hälften unterschiedene Formen unterschieden. Die grösste Form misst in der Länge 0,046mm, die kleinste 0,023mm., in der Breite 0,02mm.

In Gräben und stehenden Wassern; Reichsforst, Altwässer der Regnitz unterhalb Erlangen.

Didym. (Cosmarium) plicatum. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa truncato-conoidea usque fere rectangularia, dimidia e vertice et a latere visa elliptica; cellula a fronte visa in medio utrimque non profunde incisum; diameter transversalis diametri longitudinalis dimidium; articuli conjunctivi latitudo tres usque quatuor quintae diametri transversalis; membrana glabra.

Die Länge beträgt von 0,03mm. bis 0,058mm, die Breite von 0,015mm. bis 0,027mm.

In stehenden Wassern und in halbausgetrockneten Gräben, Kraftshof bei Erlangen, Reichsforst.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IX. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum der Form mit abgestutztem Endrande der Hälften und mässig konvexen Seitenrändern; b) dasselbe in der Seitenansicht; c) ein anderes etwas grösseres

Individuum derselben Form; d) ein Individuum der Form mit mässig ausgeschweiften Terminalrande der Hälften und ebenso beschaffenen Seitenrändern.

Didym. (Cosmarium) obsoletum. Hantsch. (Alg. Europ. ed. Rabenhorst. Nr. 1407. dec. 41. und 42.)

Cellula a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, dimidia a fronte visa regulariter semielliptica, extra articulum conjunctivum inter se contigua, dimidii anguli singuli laterales acuminati in apicem obtusiusculam subito acuminati, dimidia e vertice visa regulariter elliptica, a latere visa fere circularia; diameter transversalis diametro longitudinali paulo brevior; articuli conjunctivi latitudo duae quintae diametri transversalis; membrana subtiliter punctulata.

Longit. 0,042mm.

Latit. 0,05mm.

Crassit. 0,021mm.

Am Dechendorfer See bei Erlangen (unter Rasen von freischwimmenden Conferven.)

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IX. Fig. V.

Fig. V. a) Ein leeres abgestorbenes Individuum; b) ein lebendes Individuum, in jeder Hälfte befinden sich je zwei Chlorophyllkörperchen; c) Seitenansicht; d) Scheitelansicht eines lebenden Individuums.

Didym. (Cosmarium) concinnum. Rabenhorst. (Euastr. concinnum Rabenhorst. Alg. Europ. Nr. 1303. Krypt. Sachs. Nachtr. p. 620. *Cosmarium pygmaeum* Hantsch. Alg. Europ. Nr. 1204.)

Von dieser sehr kleinen Art sind mehrere Formen unterschieden.

A. majus. Dimidia a fronte visa hexagona; Longit. 0,019mm. usque 0,021mm., Latit. 0,015mm.

B. pygmaeum. (*Cosmar. pygmaeum* Hantsch), dimidia a fronte visa rectangularia, anguli rotundati aut indistincte truncati.

Longit. 0,009mm.

C. concinnum. (*Euastrum concinnum*, Rabenhorst)
 dimidia a fronte visa rectangularia, anguli truncati.)

Longit. 0,013mm. usque 0,015mm.

Latit. 0,013mm. usque 0,005mm.

Von diesen drei Formen habe ich nur A. und C. in Franken beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf IX. Fig. III.

Fig. III. a) Ein Individuum der Form A. von Erlangen; b) ein Individuum der Form C. von Erlangen; c) Seitenansicht desselben Individuums; d) ein in der Fortpflanzung begriffenes Individuum, die beiden neugebildeten Tochterzellen schon vollkommen ausgebildet, Erlangen; e) ein Individuum der Form B. aus Nr. 1204 der Alg. Europas; f) ein anderes Individuum derselben Form mit etwas abgerundeten Ecken, von ebendaher; g) ein Individuum der Form C. aus Nr 1303 der Alg. Europas (ges. vom Autor).

Didym. (*Cosmarium*) *polygonum*. Naegeli. Gattgen. einzell. Alg. p. 120. Taf. 7. A. Fig. 9. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 199)

Diese zierliche sehr kleine und sehr konstante Art habe ich um Erlangen an mehreren Orten beobachtet. Die Länge beträgt 0,008mm., die Breite 0,006mm.

Didym. (*Cosmarium*) *Hammeri*. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia truncato conica usque fere trapezica, dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua, margo terminalis rectus et emarginatus, margines laterales plus minusve simpliciter emarginati, marginis terminalis latitudo dimidium usque duae partes diametri transversalis; dimidia e vertice visa regulariter elliptica, a latere visa semielliptica usque fere circularia; diameter transversalis diametro longitudinali paululo longior; articuli conjunctivi latitudo triens diametri transversalis; corporis crassitudo diametri transversalis dimidio paulo magis; membrana glabra.

F o r m a e.

A. majus. Dimidia a fronte visa late truncato conica,

margo terminalis rectus, margines laterales leniter repandi, marginis terminalis latitudo diametri transversalis dimidium, Longit. 0,045mm.

B. minus. Dimidia a fronte visa late truncato conica, margo terminalis rectus, margines laterales leniter repandi, marginis terminalis latitudo diametri transversalis dimidio paulo magis. Longit. 0,015mm., Latit. 0,012mm.

C. octogibbosum. Margo terminalis marginesque laterales emarginati, marginis terminalis latitudo diametri transversalis dimidio magis. Longit. 0,014mm., Latit. 0,014mm. usque 0,012 mm.

Von diesen drei eine einzige Formenreihe darstellenden Formen habe ich nur B. und C. um Erlangen beobachtet, A. findet sich in dem viele Desmidiaceen enthaltenden Präparate unter Nr. 1434 der 23. und 24. Dekade der Algen Europas 1861 (vom Filzteiche bei Schneeberg in Sachsen) vor. Zwischen A. und B. findet sich noch eine Form vor, deren Dimensionen gerade die Mitte halten. Alle vier Formen gehen durch allmähliche Uebergänge in einander über.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum der Form A. aus Nr. 1434 der Alg. Europas; b) Ein Individuum der zwischen A. und B. stehenden Form aus Nr. 1224 der Alg. Europ. (Wurzen in Sachsen); c) dasselbe in der Seitenansicht; d) ein etwas kleineres Individuum derselben Form von ebendaher; e) Scheitelansicht desselben; f) ein Individuum der Form C. von Erlangen (Reichsforst); g) ein anderes derselben Form aus einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf; h) ein Individuum der Form B. aus Nr. 1528 der Alg. Europas (Harthwald bei Leipzig); i) ein Individuum der Form C. aus Nr. 1347 der Alg. Europ. (Falaise leg. Brébisson); k) ein in der Fortpflanzung begriffenes Individuum derselben Form von Erlangen; l) ein Individuum der Form B. von Erlangen.

Didym. (Cosmarium) Regnesi. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in sciagraphia rectangularis, in medio utrimque semielliptice excisa; dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica, summum dimidium in medio emarginatum, dimidii margines denticulis octonis in intervallis aequis distantibus instructi; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; articuli conjunctivi latitudo dimidium; membrana glabra.

Longit. 0,011mm. usque 0,013mm.

Latit. 0,011mm. usque 0,013mm.

In den Altwässern der Regnitz bei Oberndorf unterhalb Erlangen, unter vielen andern Desmidiaceen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VIII Fig. VIII

Fig VIII. a) Ein lebendes Individuum, in jeder Hälfte befindet sich ein einzelnes Chlorophyllkörperchen; b) dasselbe in der Scheitelansicht; c) dasselbe in der Seitenansicht.

Didym (Cosmarium) quadratum. Ralfs. (the britt. Desmid. p. 92. Taf. 15. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 197.)

Die kleinere Form, welche die Ralf'sche Art darstellt, misst in der Länge 0,03 mm. bis 0,038 mm., in der Breite 0,021 mm. bis 0,023 mm., in der Dicke 0,014 mm. bis 0,016 mm. Eine grössere von mir in der Natur noch nicht beobachtete Form fand ich in dem unter Nr. 1445 der Alg. Europ. 1863 befindlichen Algengemenge (Zürich leg. C. Cramer). Die Dimensionen der letzteren Form sind genau um das doppelte höher als die der Form A., zwischen beiden stehende Uebergangsformen habe ich noch nicht beobachtet.

Unter freischwimmenden Conservenmassen im Bischofssee bei Erlangen.

Didym. (Cosmarium) norimbergense. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia rectangularia, extra articulum conjunctivum inter se contigua, margo terminalis marginesque laterales leniter emarginati (margo terminalis rarius rectus), summi dimidii latitudo corporis diametro transversali aequalis; dimidia e vertice visa elliptica, a latere visa

rectangularia; *diameter transversalis tres partes (et paulo minus) diametri longitudinalis*; *articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis dimidio paulo minus*; *corporis crassitudo diametri transversalis dimidio paulo magis*; *membrana glabra*.

Die kleinere der beiden unterschiedenen Formen misst in der Länge 0,012mm. bis 0,015mm., in der Breite 0,008mm. bis 0,011mm., die grössere in der Länge 0,023mm., in der Breite 0,012mm., in der Dicke 0,009mm.

Die grössere Form beobachtete ich in Gräben am „Schmaussenbuck“ bei Nürnberg; die kleinere findet sich um Erlangen an mehreren Orten.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. IX. Fig. II.

Fig. II. a) Ein Individuum (lebend) der kleineren Form, aus einem Graben im Reichsforste; b) ein leeres Individuum vom Bischofssee; c) ein Individuum von der geringsten beobachteten Breite; d) Seitenansicht desselben Individuums; e) ein Individuum der kleineren Form mit etwas mehr vorgezogenen oberen Ecken und geraden Terminalrändern, vom Schmaussenbuck bei Nürnberg; f) ein Individuum der grösseren Form mit geraden Terminalrändern; g) Seitenansicht desselben Individuums; h) ein Individuum der grösseren Form mit ausgerandeten Terminalrändern (etwas dicker als voriges).

Didym. (Cosmarium) Brauni. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia truncato conica usque fere rectangularia, extra articulum conjunctivum inter se contigua, margo terminalis rectus et emarginatus, margines laterales dupliciter emarginati, marginis terminalis latitudo dimidium usque tres quintae diametri transversalis, gibber intermedius lateralis singulus aut una cum dimidii angulo terminali et basilari in eadem linea jacens aut extra lineam jacens; dimidia e vertice visa regulariter elliptica: diameter transversalis quinque sextae usque quatuor quintae diametri longitudinalis; articuli conjunctivi latitudo triens diametri transversalis; corpo-

ris crassitudo diametri transversalis dimidio paulo magis; membrana punctulata.

F o r m a e.

A. Dimidia in sciagraphia rectangularia, anguli truncati emarginati, gibberes quaterni ejusdem lateris corporis in linea recta jacentes, gibber intermedius lateralis singulus una cum dimidii angulo terminali et basilari non in eadem linea recta jacens.

α . majus. margo terminalis rectus. Longit. 0,038mm. Latit. 0,029mm. (Schneeberg. Sachsen.)

β . intermedium. margo terminalis rectus aut levissime repandus. Longit. 0,027mm. usque 0,03mm. Latit. 0,019mm. usque 0,021mm. (Wurzen. Chemnitz. Sachsen.)

γ . Meneghinii. (Cosmarium Meneghinii Brebisson). Margo terminalis emarginatus, (gibber intermedius angulo terminali praecedentibus form. magis approximatus). Longit. 0,021mm. usque 0,023mm. (Erlangen. Dresden. Thüringen. Italien. England. Frankreich.)

δ . minimum. Margo terminalis rectus, marginis terminalis latitudo diametro transversali paulo minor; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis. Longit. 0,012mm. usque 0,015mm. (Erlangen. Wurzen. Sachsen.)

B. Dimidia in sciagraphia truncato conoidea, gibberes quaterni ejusdem lateris corporis non in linea recta jacentes gibber intermedius lateralis singulus una cum dimidii angulo terminali et basilari in eadem linea recta jacens.

α . majus. Margo terminalis leniter emarginatus. Longit. 0,028mm. usque 0,042mm. Latit. 0,022mm. usque 0,027mm. (Erlangen. Schneeberg. Sachsen.)

β . minus. Margo terminalis rectus aut leniter emarginatus. Longit. 0,023mm. Latit. 0,019mm. usque 0,021mm. (Erlangen. Chemnitz in Sachsen.)

Diese Formenreihe enthält folgende als Arten aufgeführte Formen: Cosmar. bioculatum Meneghini Synops. Desmid.

Linnaea. 1840. p. 220. non Cosmar. bioculatum Bribisson), Euastr. bioculatum. Kützing. (Phycol. German. p. 136), Cosmarium Meneghinii. Brébisson (Ralfs, britt. Desmid. p. 96. Taf. 15. Fig. De Bary Conjugat. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 199.)

Von diesen sechs Formen habe ich in Franken nur A. δ und B α . B β . beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X. Fig. III.

Fig. III. a) Ein Individuum der Form A. α . aus Nr. 1407 der Alg. Europas (Bautzen ges. von Rostock, Länge 0,038mm. Breite 0,028 mm); b) ein Individuum der Form B. α . aus Nr. 1434 der Alg. Europas (Schneeberg in Sachsen leg. Bulnheim) (Länge 0,042mm., Breite 0,027mm.); c. ein Individuum der Form A. β . aus Nr. 1070 der Alg. Europas (Wurzen in Sachsen ges. v. Bulnheim). (Länge 0,027mm., Breite 0,019mm.); d) ein Individuum der Form A. γ . von Erlangen. (Länge 0,021 mm., Breite 0,015 mm.); e) ein Individuum der Form B. β . aus dem Reichsforste bei Erlangen (Länge 0,023mm., Breite 0,019mm., Dicke 0,015mm.); f) Seitenansicht des Fig. c. dargestellten Individuums; g) ein Individuum der Form A. δ . aus dem Reichsforste (Länge 0,013mm., Breite 0,013mm).

Didym. (Cosmarium) trilobulatum. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa trilobulata, lobuli rectangulares, linea terminalis recta, lobulorum anguli rotundati, dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua; dimidia a latere visa rectangularia, e vertice visa elliptica; articuli conjunctivi latitudo triens diametri transversalis; diameter longitudinalis diametro transversali aequalis (aut paulo longior); membrana glabra.

Longit 0,023mm. usque 0,02mm.

Latit. 0,02mm. usque 0,018mm.

Crassit. 0,006mm.

Diese Form, welche ich ausser bei Erlangen auch in einigen in der europäischen Algenflora enthaltenen Algengemengen beobachtet habe (Nr. 1603 Nr. 1224), welche zu Cosmarium gehört, zeigt die Anlage zu einer Theilung der

Hälften der Zelle und darin einen Uebergang von *Cosmarium* zu *Eucosmium*.

In Altwässern der Regnitz bei Baierdorf zuerst beobachtet, hierauf wiederholt am Bischofssee.

Nach den in der Algenflora enthaltenen Präparaten kommt die Pflanze auch in Sachsen vor.

Erklärung der Abbildungen auf Taf IX Fig. VI.

Fig. VI. a) Ein Individuum aus Nr. 1222 der Alg. Europas (Wurzen in Sachsen), (Länge 0,023mm., Breite 0,019mm.); c) ein Individuum (lebend) aus einem Altwasser der Regnitz bei Erlangen, in jeder Hälfte ein einzelnes Chlorophyllkörperchen (Länge 0,023mm., Breite 0,022mm.); b) Vertikalansicht desselben Individuums; d) Seitenansicht desselben.

Didym. (Cosmarium) undulatum. Corda. (Alman. de Carlsbad 1893. p. 243. Taf. 5 Fig. 26. Ralfs the britt. Desmid. p. 97. Taf. 15. Fig. 8. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 199. *Cosmarium crenatum*. Ralfs. britt. Desm. p. 97. Taf. 15. Fig. 7. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 199. *Euastrum crenatum*. Focke physiol. Studien. p. 41. Taf. 1 Fig. 3. *Cosmarium subcrenatum*. Hantsch. Nr. 1213 der 21. und 22. Dekade der Alg. Europas.)

Die hier aufgeführten Arten der Autoren stellen eine einzige zusammenhängende Formenreihe einer Art dar, für deren Namen ich den der längst bekannten Corda'schen Form beigelegt habe. Die sämtlichen Formen habe ich in zwei Gruppen gebracht, deren erste 8—9 höckerige Hälften, deren zweite 10—mehrhöckerige Hälften besitzt; jede der grösseren Gruppen habe ich nach den Dimensionsverhältnissen der Zellchen in je drei kleinere Gruppen gespalten. Die sämtlichen Gruppen sind in dem fränkischen Gebiete vertreten.

Didym. (Cosmarium) notabile. Brébisson. (Liste de Desmid. Normand. p. 129 Taf. 1 Fig. 15 Nr. 1111. der Alg. Europas. De Bary. Conjugaten. p. 72. Taf. 6. Fig. 52. 53. Rabenhorst. Kryptog. Sachs. p. 199.)

In Franken vorkommende Formen.

A. *Dimidiorum margo terminalis integerrimus*. Longit. 0,038mm. Latit. 0,023mm. usque 0,027mm.

Eine grössere Form findet sich in Nr. 1111 der Alg. Europas.

B *Dimidiorum margo terminalis undulatus*.

α . minus. Longit. 0,038mm. usque 0,041mm. Latit 0,027mm. usque 0,03mm. Crassit. 0,023mm.

β . majus. Longit. 0,054mm. Latit. 0,038mm. Crassit. 0,023mm.

A. beobachtete ich bei Rothenburg (Ermetzhofen); B. α . und β . bei Rothenburg (Wildbad) und in Waldgräben im Reichsforste.

Das *Cosmarium amoenum*, welches sich von *notabile* und *undulatum* durch die mehrhöckerigen (16—20höckerigen) Hälften, durch den schmaler elliptischen Umriss der Zellchen untercheidet, habe ich in Franken noch nicht beobachtet.

Didym. (Cosmarium) margaritiferum. Turpin. (Dictionn. des sc. natur. Mem. de Mus p. 295. *Euastr. margaritiferum*. Ehrenberg Infusionsth. p. 163. Taf. XII Fig. 7. Kützing Phycol. German. p. 136. *Cosmarium margaritiferum*. Meneghini Synops. Desmid. Linnaea. 1840. p. 219. Ralfs britt. Desmid. p. 100. Taf. 16. Fig. 2. Algen Europ. Nr. 1443 Nr. 1444. Nr. 1507. Nr. 1338. Rabenh. Kryptog. Deutschl. p. 54. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 200)

Von dieser Art kommen die drei von mir unterschiedenen Formen in Franken vor.

α . minus. Longit. 0,019 mm. usque 0,023 mm. Latit. 0,017mm usque 0,023mm.

β medium. Longit. 0,084mm. usque 0,046mm. Latit. 0,028mm. usque 0,036mm.

γ . majus. Longit. 0,054 mm. usque 0,665 mm. Latit. 0,038mm. usque 0,054mm.

α) Reichsforst, Bischofssee, Altwässer der Regnitz bei Erlangen, Schmaussenbuck bei Nürnberg; β) Bischofssee, Altwässer d. Regnitz; γ) Solitude b. Erlangen, Altwässer d. Regnitz.

Didym. (Cosmarium) Botrytis. Bory. (Meneghini Synops. Desmid. p. 220. Ralfs the britt. Desmid. p. 99. Taf. 16. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 200. Naegeli Gattgen. einzell. Alg. p. 119. Taf. 7. A. Fig. 3. Nr. 1122 der Alg. Europas. Nr. 1232. Nr. 1407. Nr. 1507. Euastrum Botrytis Ehrenberg Infusionsth. p. 163. Taf. 12. Fig. 8. Rabenh. Deutschl. Kryptogamenflora p. 54. Euastrum unguulosum. Ehrenberg, Infusionsh. p. 163. Taf. 10. Fig. 8. Cosmarium Broomei. Ralfs britt. Desmid. p. 103. Taf. 16. Fig. 6. Cosmarium Ungerianum Naegeli. Gattgen einzell. Alg. p. 120. Taf. 7. A. Fig. 10. Cosmarium Corbula Brébisson. Liste de Desmid. Normand.)

Die sämtlichen hier angeführten Formen bilden eine zusammenhängende Formenreihe einer einzigen Art, mit Ausnahme einer einzigen kommen dieselben sämtlich im fränkischen Florengebiete vor.

Die Formen sind folgende.

A. minus. Dimidia a fronte visa truncato cordata, summi dimidii latitudo duae quintae diametri transversalis.

Longit. 0,03mm. Latit. 0,03mm. Crassit. 0,018mm.

(Cosmar. Corbula Brébisson) in Franken noch nicht beobachtet.

B. medium.

α. Dimidia a fronte visa truncato cordata, summi dimidii latitudo usque duae quintae diametri transversalis.

Longit. 0,038mm. usque 0,058mm. Latit. 0,03mm. usque 0,046mm.

β. Dimidia a fronte visa trapezica, summi dimidii latitudo duae partes diametri transversalis. Longit. 0,046mm. usque 0,048mm. Latit. 0,046mm. usque 0,05mm. Crassit. 0,028mm.

C. majus.

α. Dimidia a fronte visa truncato cordata, summi dimidii latitudo duae quintae diametri transversalis, dimidiorum superficieis pars media sine verrucis. Longit. 0,06 mm. usque 0,076mm. Latit. 0,054mm. usque 0,061mm.

β . Dimidia a fronte visa truncato cordata; summi dimidii latitudo diametri transversalis dimidio paulo minus; dimidiorum superficieis pars media verrucosa Longit 0,073 mm. Latit. 0,069mm. Crassit. 0,04mm.

Die Form A. stellt das Cosmar. Corbula Brebisson dar. Die Form B. β . das Cosmarium Broomei. Ralfs. Die Form C. α und C. β . Cosmar. Botrytis bei Ralfs britt. Desmid., das Cosmar. Ungerianum Naegeli. Gattgen. einzell. Alg. gehört gleichfalls C. β . an.

Didym. (Cosmarium) protractum. Naegeli (Gattn. einzell. Alg. p. 119. Taf. 7. A. Fig. 4.)

In Franken beobachtete Formen.

a. majus Länge 0,069mm. Breite 0,065mm. bis 0,069mm.

b. minus. Länge 0,048 mm. Breite 0,03 mm. Dicke 0,018mm.

Die erstere, welche die Naegeli'sche Form darstellt, kommt in Altwässern der Regnitz bei Oberndorf und Baiersdorf vor, die zweite findet sich in Waldgräben im Reichsforste bei Kalkreuth.

Didym. (Cosmarium) commisurale. Brébisson. (Meneghini Synops. Desmid. Linnaea 1840. p. 220. Ralfs britt. Desmid. p. 105. Taf. 16. Fig. 8. Nr. 1532 der Alg Europae. Cosmarium ornatum Ralfs britt. Desmid. p. 104. Taf. 16. Fig. 7. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 201. Euastrum ornatum. Focke Physiol. Studien. p. 41. Taf. 1. Fig. 2.)

A. Diameter transversalis diametro longitudinali brevior. Longit. 0,03 mm usque 0,034 mm. Latit. 0,034 mm. usque 0,042mm. Crassit. 0,017mm.

Diese Form stellt das Cosmar. commisurale Bréb. dar; im fränkischen Florengebiere habe ich dieselbe noch nicht beobachtet; ich kenne dieselbe nach den vom Autor gesammelten Specim. in der europ. Algensammlung.

B. Diameter transversalis diametro longitudinali aequalis. Longit. 0,036 mm. usque 0,038 mm. Latit. 0,036 mm. usque 0,038mm.

Diese Form stellt das *Cosmar. ornatum* Ralfs dar; in der Umgegend von Erlangen habe ich dieselbe an drei verschiedenen Orten wiederholt beobachtet.

Uebergänge zwischen beiden Formen scheinen nicht vorzukommen; der Unterschied beider ist im Ganzen nur habituell.

Didym. (*Cosmarium*) *tetraophthalmum*. Kützing. (Ralfs. the britt. Desmid. p. 98. Taf. 17. Fig. 11. Nr. 1407 der Alg. Europ. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 200. *Heterocarpella tetraophthalma* Kützing. Synops. Diatom p. 597. *Euas-trum tetraphthalmum*. Kützing. Phycol. Germ. p. 136.)

Diese Art beobachtete ich von vielen Standorten als nur in einer konstanten Form. Die Länge beträgt 0,084mm. bis 0,108mm., die Breite 0,061mm. bis 0,076mm., die Dicke 0,038mm. bis 0,046mm.

Am Bischofssee bei Erlangen; in Gräben am Schmausenbuck bei Nürnberg.

Cosmarium ovale Ralfs, welches die grösste Art der *Cosmarien* ist (0,192mm. Länge, 0,117mm. Breite) habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Cosmar. biretum Brébisson ist mir nicht ganz sicher, da mir eine nach mehreren Exemplaren von der Umgebung des Wildbades bei Rothenburg entworfene Zeichnung nicht ganz unzweifelhaft ist.

Didym. (*Cosmarium*) *conspersum*. Ralfs (brittish Desmid. p. 101. Taf. 16. Fig. 4.)

Formen:

a) Länge 0,088mm. bis 0,092mm. Breite 0,069mm. bis 0,073mm. Dicke 0,041mm.

b) Länge 0,054mm. bis 0,073mm. Breite 0,046mm. bis 0,061mm. Dicke 0,028mm. bis 0,032mm.

Die erstere Form kommt im Reichsfoste an mehreren Orten vor, und stellt die Ralfsche Form dar; die zweite Form beobachtete ich in zahlloser Menge im Juni 1865 in einem

kleinen Wiesenmoor am Donau-Mainkanale zwischen Bruck und Erlangen, von welchem Standorte die Form demnächst in der europäischen Algensammlung erscheinen wird.

Didym. (*Cosmarium*) *Brèbissonii*. Meneghini. (Synop. Desmid. Linnaea. 1840. p. 219. Ralfs britt. Desmid. p. 101. Taf. 16. Fig. 3. Nr. 1224 der 23. 24. Dek. der Alg. Europas.)

Diese Form ist sehr konstant und zeigt sich immer von den benachbarten (*margaritifera*, *conspersum*, *tetraophthalmum*) ausser durch die in der Seitenansicht im Umriss kreisrunden Hälften durch die längeren und breiteren Warzen unterschieden. Mit Unrecht bringt Rabenhorst dieselbe als Form zu *Cosmar. Botrytis* (Kryptog. Sachs. p. 200.)

Länge 0,061mm. bis 0,076mm.

Breite 0,05mm. bis 0,061mm.

Dicke 0,038mm. bis 0,046mm.

In einem stehenden Altwasser der Regnitz bei Oberndorf unter schwimmenden Confervenmassen.

Subgenus II. *Eucosmium*. Naegeli.

Cellula a fronte visa in medio utrimque non profunde acutangule emarginata, dimidia a fronte visa trilobata, extra articulum conjunctivum inter se contigua; lobus terminalis indivisus, linea terminalis subconvexa aut leniter emarginata, sed nunquam incisa, lobi laterales in medio leniter repandi aut emarginati, lobi terminalis latitudo loborum lateralium latitudine paulo major, dimidiorum singulorum superficies gibberibus hemisphaericis ternis in serie horizontali jacentibus undulata; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica; corporis crassitudo duae partes usque quatuor quintae diametri transversalis; diametri transversalis diametro longitudinali aequalis aut paulo brevior; membrana glabra aut particulariter verrucosa; zygospores? —

Didym. (*Eucosmium*) *pectinatum*. Brèbisson. (*Euastrum pectinatum*. Ralfs. britt. Desmid. p. 86. Taf. 14.

Fig. 5. Nr. 1407 der Alg. Eur. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 186. *Cosmar. pectinatum* Meneghini Synops. Desmid. p. 222. *Euastrum gemmatum* Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 2. p. 128 (non *Euastr. gemmatum* Brébisson).

Von dieser Art habe ich in Franken drei Formen unterschieden.

A rotundatum. Loborum anguli omnes rotundato obtusi. Longit 0,061mm. usque 0,065mm.

B. Brébissonii. Loborum anguli acuminati.

α. Loborum lateralium margo superior horizontalis; lobi terminalis anguli subito acuminati. Longit. 0,058mm. usque 0,061mm.

β. Loborum lateralium margo superior deorsum inclinat; lobi terminalis anguli paullatim acuminati. Longit 0,054mm.

Die Form A. und B. α. findet sich in stehenden Wassern an der Regnitz bei Baiersdorf und Oberndorf, B. α. besonders häufig in Waldgräben im Reichsforste; die Form B. β., welche ich zuerst in Nr. 1070 der 7. und 8. Dekade der Alg. Europas gesehen habe, habe ich nur ein einziges Mal lebend beobachtet.

Didym. (Eucosmium) Kützingianum. P Reinsch.

Dimidia a fronte visa trilobata, extra articulum conjunctivum inter se contigua, lobi terminalis longitudo lobi latitudinis dimidium, lobus terminalis in sciagraphia trapezicus, linea terminalis subconvexa, lobi laterales in sciagraphia rectangulares, in medio emarginati, loborum anguli omnes rotundato obtusi, inter lobum terminalem lobosque laterales incisurae angustissime ellipticae; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, margines laterales ternis gibberibus instructi; articuli conjunctivi latitudo quarta usque quinta pars diametri transversalis; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; membrana glabra.

Longit. 0,089mm. usque 0,092mm.

Latit. 0,084mm.

In einem Graben am Kosbacher Weiher bei Erlangen.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VIII Fig. III.

Fig. III. a) Ein in der Fortpflanzung begriffenes Individuum, die neugebildeten Hälften der neuen Tochterzellen halb-elliptisch eiförmig im Umriss; b) ein in der Fortpflanzung begriffenes Individuum, die beiden neugebildeten schon vollständig ausgebildet und die beiden Tochterindividuen im Momente des Abtrennens; c) Vertikalansicht eines leeren Individuums.

Didym. (Eucosmium) gemmatum. Meneghini. (Cosmar. gemmatum. Meneghini. Synops. Desmid. p. 221. Euastrum gemmatum. Kützing. Phycol. german. p. 134. Ralfs britt. Desmid. p. 87. Rabenh. Kryptog. Sachs p. 187. Alg. Europ. Nr. 367. Euastrum papulosum Kützing Phycol. Germ. p. 135 Euastrum (Eucosmium) Hassalianum. Naegeli. Gattgen. einzell Algen p. 121. Taf. 7. B.)

Länge 0,054mm. Breite 0,03mm. bis 0,034mm. Dicke 0,021mm.

Nur in einigen Individuen beobachtet, in Desmidiengemengen von Gräben in Meerrettigfeldern bei Baiersdorf.

Die Form zeigt sich mit sächsischen und thüringischen Specim. verglichen sehr konstant.

Didym. (Eucosmium) verrucosum. Ehrenberg. (Euastrum. verrucosum. Ehrenberg. Infusionsth. p. 162. Taf. 12. Fig. 5. Ralfs the british Desmid. p. 79. Taf. 11. Fig. 2. Kütz. Phycol. German. p. 135. Rabenh. Deutschl. Kryptog. Flora Nr. 4922. Alg. Europ Nr. 1212. 21. und 22. Dekade. Nr. 1407. der 41. und 42. Dek. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 185. Cosmarium verrucosum. Meneghini, Synops. Desmid. p. 222.)

Diese sehr wenig variirende Art ist in Franken ziemlich verbreitet. Im Reichsforste an verschiedenen Orten in Altwässern der Regnitz, in Gräben am Bischofssee, am Schmausenbuck und bei Mögeldorf bei Nürnberg.

Länge 0,08 mm. bis 0,092 mm. Breite 0,069 mm bis 0,084mm. Dicke 0,054mm.

Die Oberfläche jeder einzelnen Hälfte ist mit 12 halb-

kugelichen mit derben Warzen versehenen Höckern versehen, am Terminalläppchen stehen 4 solche Höcker in regelmässigen Abständen, so dass das Läppchen vom Scheitel gesehen 4seitig im Umrisse erscheint. Jede Seite der Basis der Hälften ist mit je drei in einer Linie liegenden Höckern versehen, deren mittelster der grösste ist, die seitlichen Pole der Hälften sind gleichfalls mit je einem Höcker versehen. Die Membran zwischen den Höckern ist grob punktiert (selten ganz kleinwarzig).

Subgenus III. *Xanthidium* Ehrenberg.

Cellula a fronte visa in medio utrimque plus minusve acutangule excisa, dimidia a fronte visa in sciagraphia elliptica truncato ovoidea usque fere polygona, indivisa, extra articulum conjunctivum inter se contigua aut disjuncta; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, in medio utrimque elevatione breviter turbinata aut breviter truncato conoidea instructa; membrana spinis firmis rigidis armata, spinae aut in distantibus regularibus binae altera post alteram positae aut raro irregulariter dispersae; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis aut duae partes posterioris; dimidiorum interanea binis aut quaternis corpusculis chlorophyllaceis sphaericis instructa; zygospora spinis firmis armata.

Didym. (*Xanthidium*) *bisenarium*. Ehrenberg. (Verbreit. und Einfl. d. Mikrosk. Leb. Xanthid. Brébissoni. Ralfs britt. Desmid. p. 113. Taf. 19. Fig. 2. Nr. 1640 der Alg. Eur. Rabenh. Kryptog. Sachs p. 195.)

F o r m e n :

a. minus. Longit. (spin. excl.) 0,054mm. Latit. (spin. excl.) 0,054mm Crassit. 0,03mm.

b. majus. Longit. (spin. excl.) 0,069mm., spinorum longit. 0,01mm, usque 0.012mm.

Die kleinere Form habe ich bis jetzt noch nicht im fränkischen Gebiete beobachtet, ich habe dieselbe neben der

grösseren Form, welche die Ralfs'sche darstellt, in Nr. 1640 der Alg. Europ. (Bryère de Noron leg Brébisson) gesehen. Die grössere Form findet sich in einem Waldgraben im Reichsforste bei Erlangen. Der Seitenrand der Hälften ist bei dieser konstanten Art mit 8 bis 10 Paaren von derben Stacheln bewaffnet.

Didym. (Xanthidium) fasciculatum. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 146. Taf. 10. Fig. 24. a. b. Ralfs. britt. Desmid. p. 114. Taf. 19. Fig. 4. Rabenh. Deutschl. Kryptogfl. p. 55. Kryptog. Sachs. p. 196. Cosmarium antilopaeum Meneghini Synops Desmid. p. 218. Euastrum fasciculatum. Kützing. Phycol German. p. 137. Xanthid. polygonum Hassal. britt. Freshw. Algae. p. 360. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 196. Alg. Europ. Nr. 1212. Nr. 1227. Nr. 1443. Nr. 1338.)

Formae:

A. antilopaeum. Dimidiorum a fronte visorum marginum membrana paribus quaternis aculeorum armata, dimidia a fronte visa in sciagraphia plus minusve regulariter hexagona linea terminalis lineis lateralibus duplo longior, anguli pari singulo aculeorum armati; cellula a fronte visa in medio utrimque emarginatura usque ad articulum conjunctivum se pertinente excisa. Longit. (spin. exclus) 0,058mm. bis 0,061mm. Latit. 0,054mm. 0,069mm. Crassit. 0,026mm. usque 0,028mm.

B. polygonum. Dimidiorum a fronte visorum marginum membrana paribus senis aculeorum armata, dimidia a fronte visa in sciagraphia elliptica usque fere semicircularia, spinorum parium distantiae aequaliter longae; dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua aut emarginatura usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta. Longit. (spin. excl.) 0,054mm. usque 0,061mm. Latit. 0,046mm. usque 0,058mm. Crassit. 0,03mm. usque 0,034mm. spinorum longit. 0,011mm. usque 0,012mm.

Das Xanthid. fasciculatum. Ehrenberg und das Xanthid. polygonum Hassal, Cosmar. antilopaeum Brébisson stellen zum

Theil die Form A. dar; *Xanthid. fasciculatum* Ehrenberg bei Ralfs britt. Desmid. Taf. 19. und Taf. 20. gehören der Form B. an.

Im fränkischen Gebiete kommen beide Formen vor. Die angegebenen Maasse bei A. beziehen sich auf Specimina aus Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf und aus Waldgräben im Reichsforste, die Maasse bei B. auf Specimina aus Waldgräben im Reichsforste; an einigen Orten habe ich beide Formen gesellig beobachtet.

Didym. (*Xanthidium*) *cristatum*. Brébisson. (Ralfs brittish Desmidiaceae p. 115. Taf. 19. Fig. 3. Rabenhorst Alg. Europ. Nr. 1112. Nr. 1410. Nr. 1443. Kryptog. Sachs. p. 196.)

Diese sehr konstante Art, welche nur in der Richtung der Stacheln variirt, ist von den benachbarten (*bisenarium*, *fasciculatum*, *antilopaeum*) durch die im Umrisse fast trapezischen Hälften und die konstant eindornigen Seitenpole der Hälften unterschieden.

Länge (mit Ausschl. d. Dornen) 0,058mm. bis 0,065mm. Breite (mit Ausschl. d. D.) 0,049mm. bis 0,051mm. Dicke 0,037mm. Länge der Stacheln 0,012mm.

In Franken habe ich nur die typische Form mit geraden Stacheln beobachtet, die Form b. *uncinatum* Brébisson (britt. Desmid. Fig. 3. e. f.) habe ich in deutschen Specim. noch nicht gesehen.

In Waldgräben im Reichsforste (beim Peterleinswege) in einem sehr artenreichen Desmidiengemenge, in Gräben im Reichsforste unterhalb Kalkreuth; in Altwässern der Regnitz in vereinzelt alten Hälften beobachtet.

Didym. (*Xanthidium*) *octocorne*. Ehrenberg. (Meteorp. Taf. 1. Fig. 22. Ralfs britt. Desmid. p. 116. Taf. 20. Fig. 2. *Arthrodesmus octocornis*. Ehrenberg Infusionsth. p. 152. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 197. *Micrasterias octocornis*. Meneghini Synops. Desmid. p. 216. *Staurastr. octocorne*. Ralfs Ann. of Nat. Hist. v. 15. p. 159.)

Diese sehr kleine Form, deren Stellung bei *Xanthidium* nicht unzweifelhaft ist, da die charakteristischen Mittelhöckerchen der Hälften fehlen, beobachtete ich im fränkischen Gebiete am Kosbacher und Dechsendorfer Weiher. Die Länge der Specimina von daher beträgt 0,017mm. bis 0,002mm. (m. Auschl. der Stacheln). Breite 0,015mm. bis 0,019mm. Dicke 0,006mm. bis 0,008mm.

Didym. (Xanthidium) bicornutum. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa emarginatura acutangula usque ad articulum conjunctivum se partinente excisa; dimidia a fronte visa in sciagraphia hexagona, anguli pari singulo spinarum firmarum dimidii diametri longitudinalis longitudinem subaequantium, rectorum armati; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, in medio utriusque elevatione non instructa; dimidia a latere visa semicircularia; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis dimidium; cellulae crassitudo diametri transversalis dimidium; membrana glabra.

Longit. 0,011mm. usque 0,013mm.

Latit. 0,011mm. usque 0,013mm.

Crassit. 0,007mm.

Diese Form scheint zu der bei Ralfs britt. Desmid. Taf. 20. Fig. 2. f. g. h. i. abgebildeten p. 116, als *Xanthid. octocorne* β . major. aufgeführten Form zu gehören, unterscheidet sich jedoch durch um die Hälfte kleinere Dimensionen (Länge bei Ralfs $\frac{1}{16}$ Zoll engl. = 0,027mm.) (Breite bei Ralfs $\frac{1}{16}$ Zoll engl. = 0,028mm.

In einem Graben am Rödelheimbache bei Erlangen in einem sehr reichhaltigen Desmidiengemenge (nicht mit *Xanthid. octocorne*). Ich habe diese nur in wenigen Specim. beobachtete Form einstweilen als Art aufgeführt, ohne jedoch deren Recht hierzu als gesichert zu betrachten.

Erklärung der Abbildung auf Taf. IX. Fig. VII.

Fig. VII. a) Ein Individuum in der Front betrachtet; b) ein anderes von ganz gleichen Dimensionen; c) ein Indi-

viduum von der Seite betrachtet; d) Scheitélansicht eines Individuums.

Xanthid. aculeatum Ehrenberg. (Abh. d. Berliner. Acad. 1833. p. 318. Infusionsth. p. 318. Infusionsth. p. 147. Taf. 10. Fig. 23. Meneghini Synops. Desmid. Linnaea, p. 224. Ralfs. brittish. Desmid. p. 113. Taf. 19. Fig. 1.e. Rabenh. Deutschl. Kryptog. p. 55. Kryptog. Sachs. p. 195. Nr. 1327. Alg. Europ.)

Diese konstante Form ist durch die ohne Ordnung stehenden derben Stacheln der von der Front gesehenen Seitenränder der Hälften ausgezeichnet. Länge (m. A. d. St.) 0,061mm. bis 0,069mm. Breite 0,061mm bis 0,069mm. Dicke 0,031mm. bis 0,035mm. Länge der Stacheln 0,01mm.

In einem Graben am Rödelheimbache — wo dieser den Reichswald verlässt — beobachtet.

(Es war nothwendig, dass der ältere Namen der Art verändert werden musste, der Verwechslung vorzubeugen, welche bei der Aufstellung der Gattung *Didymidium* mit dem *Staurostrum aculeatum* Ehrenberg eintritt.)

Didym. (Xanthidium) armatum Brebisson. (Ralfs britt. Desmid. p. 112. Taf. 18. Rabenh. Deutschl. Kryptog. p. 55. Nr. 5936. Alg. Europ. Nr. 1430. Nr. 1212. Nr. 1434 Kryptog. Sachs. p. 195. *Euastrum armatum*. Kützinger. Phycol. German. p. 137. *Xanthid. furcatum* Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 14. p. 466. *Cosmarium ornatum* Meneghini Synops. Desmid. Linnaea 1840. p. 218.)

Diese zierliche sehr konstante und gar nicht variirende Art beobachtete ich an mehreren Orten. Die Länge der von mir beobachteten Specimina beträgt 0,076 mm. bis 0,08 mm., die Breite 0,076 mm. bis 0,08 mm., die Dicke 0,046 mm. bis 0,05mm. Die Länge der Stacheln 0,012mm., die Breite der Stacheln 0,007mm.

In Waldgräben nahe bei der Schleifmühle bei Erlangen in einem reichhaltigen Desmidiengemeinde, in der „Solitude“ bei Erlangen in vereinzelt leeren Hälften beobachtet, in Gräben im Reichsforste.

Subgenus IV. Euastrum. Ehrenberg.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica, rectangularia usque semielliptica, extra articulum conjunctivum inter se contigua, dimidiorum a fronte visorum margines usque multipliciter emarginati aut incisuris tri-et quinquilobati, summum dimidium in medio incisum; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, margines laterales binis usque quinternis gibberibus instructi; diameter transversalis diametri longitudinalis duae partes usque dimidium; dimidiorum interanea singulo aut pluribus corpusculis chlorophyllaceis sphaericis dispositis instructa; membrana punctulata.

Didym. (Euastrum) ansatum. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 162. Taf. 12. Fig. 6. Ralfs britt. Desmid. p. 84. Taf. 14. Fig. 2. Rabenh. Deutschl. Kryptog. Nr. 4923. Kryptog. Sachs p. 186. Alg. Europ. Nr. 1212. 1224. 1407. 1403. 1506. Focke Physiol. Studien I. p. 43. Taf. 1. Fig. 8.)

Formae:

A. Dimidiorum a fronte visorum pars basilari sinteegerri-mus.

B. Supra partem basilem dimidiorum a fronte visorum gibberulus leviter elevatus.

Longit. 0,084mm. usque 0,092mm Latit. 0,038mm. usque 0,045mm. Crassit. 0,023mm.

Diese Art ist in Franken ziemlich verbreitet; die Form B. findet sich immer vereinzelt unter A. und im Ganzen seltener.

Didym. (Euastrum) insigne. Hassal. (Britt. Freshw. Algae p. 381. Taf. 91. Fig. 2. Ralfs british. Desmid. p. 83. Taf. 8. Fig. 6. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 185. Alg. Europ. Nr. 1657.)

Diese zierliche sehr konstante gar nicht variirende Art mit ihren flaschenförmigen Hälften beobachtete ich im Gebiete nur an einem einzigen Orte (einem Waldgraben mit mooriger Unterlage am „Moosbrunnlein“ im Reichsforste unterhalb Kalkreuth).

Länge 0,1 mm. bis 0,107 mm., grösste Breite 0,049 mm. bis 0,061 mm. Dicke 0,039 mm.

Didym. (*Euastrum*) *varians*. P. Reinsch.

Eine ganze Reihe von von den englischen Botanikern (Ralfs, Hassal) aufgestellten Arten haben sich mir auf Grund langer ununterbrochen fortgesetzter Beobachtung und Vergleichung theils der sämmtlichen in den verschiedenen Präparaten der europäischen Algensammlung von Rabenhorst enthaltenen Formen grossentheils aber auf Grund der Beobachtung lebender Specimina aus der Natur als eine zusammenhängende eine von den benachbarten Specien abgegrenzte Formenreihe einer Art sich dargestellt. Um ein Beispiel anzuführen lassen von ein und demselben Standorte entnommene Specimina eines der Ralfs'schen oder Hassal'schen Arten genau mit einander verglichen so manichfache Uebergänge und Variationen wahrnehmen, dass für einzelne Specimina oft schwer zu entscheiden ist ob die Wahl dieser oder jener Art zulässiger sei. Nach einzelnen oder selbst nach vielen Specimen lässt sich bei sehr vielen der Desmidiaceen nicht leicht — ohne der Natur willkürliche Arten Begriffe anzupassen — die Art begrenzen, erst die Vergleichung und Beobachtung sehr vieler Specimina lässt uns den Formenkreis einestheils innerhalb der Art andernteils die Begrenzung von den benachbarten Arten deutlicher wahrnehmen. Ich kann hier leider nur die systematische Anordnung in den Diagnosen der Formen geben und muss in Bezug der bildlichen Darstellung — da hier bildlich nur die neuen Gattungen und Arten dargestellt werden konnten — theils auf die citirten Schriften theils auf meine später erscheinende monographische Arbeit über die Desmidien verweisen. Da eine der mehreren kontrahirten Species nicht gut zum

Typus gewählt werden konnte, so musste eine neue Bezeichnung für die Collectivspezies gewählt werden.

A. *Dimidia a fronte visa indivisa, margines laterales multipliciter emarginati.*

α . *Dimidiorum a fronte visorum marginum lateralium gibber medius in medio inter basim et summum et in eadem directione cum dimidii basi et summo jacens; dimidii a fronte visi pars basillaris non bigibba; dimidiorum a fronte visorum superficies quinternis tuberculis undulata.*

Longit. 0,046mm. usque 0,065mm. Latit. 0,03mm. usque 0,038mm.

β . *Gibber medius super medium et in eadem directione cum basi et summo jacens, pars basillaris non bigibba; dimidiorum a fronte visorum superficies quinternis tuberculis undulata.*

1. minus Longit. 0,117 mm. Latit. 0,065 mm. usque 0,069 mm.

2. majus. Longit. 0,146mm. Latit. 0,076mm.

γ . *Gibber medius super medium et in eadem directione cum basi et summo jacens, pars basillaris bigibba; dimidiorum a fronte visorum superficies ternis (aut quinternis?) tuberculis undulata.*

1. *Dimidium a fronte visum infra summum utrimque profundius incisum.* Longit. 0,117mm. usque 0,138mm.

2. *Dimidium a fronte visum infra summum utrimque non incisum (partis basilaris lobuli bini alter supra alterum perpendiculariter positi).* Longit. 0,083mm. usque 0,092mm.

δ . *Gibber medius super medium inter basim et summum et in eadem directione cum basi et summo jacens, prolongatus et sursum versus, pars basilaris bigibba; dimidiorum a fronte visorum superficies quinternis tuberculis undulata.* Longit. 0,138 mm. usque 0,146 mm. Latit. 0,08 mm. usque 0,084 mm.

ϵ . *Gibber medius non in eadem directione cum basi et summo dimidio jacens, gibber medius et pars basilaris alter post alterum perpendiculariter positus.* Longit. 0,058mm. usque 0,069mm. Latit. 0,038mm. usque 0,046mm.

ζ. Gibber medius in eadem directione cum basi et summo dimidio jacens; dimidium a fronte visum infra summum utrimque profundius incisum; diameter transversalis diametri longitudinalis duae partes. Longit. 0,08mm. usque 0,084mm.

B. Dimidia a fronte visa incisuris binis profundioribus trilobata.

Gibber medius et pars basalis alter post alterum perpendiculariter positus; dimidiorum a fronte visorum superficies quinternis usque compluribus tuberculis undulata. Longit. 0,065 mm. usque 0,069 mm. Latit 0,046 mm. usque 0,05 mm.

Die hier aufgeführten sämtlich im fränkischen Florengebiete vorkommenden Formen, welche noch nicht erschöpfend sind, gehen durch vielfache Zwischenformen in einander über, ich gebe in dieser Reihe nur diejenigen, welche ich in der Natur selbst zu beobachten und diejenigen, welche ich nach aufbewahrten Exemplaren zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Führen wir noch die mit den in dieser Reihe aufgestellten natürlichen Gruppen synonymen früheren Arten an.

Das bei Ralfs britt. Desmid. p. 190. Taf. 7. Fig. 2. a. b. aufgeführte *Euastrum Didelta* ist synonym mit dem *Heterocarpella Didelta* Turpin (Mem 1828. p. 295.) und dem *Cosmarium Didelta Meneghini* (Synops. Desmid. Linnaea, 1840. d. 219.) und bildet die Gruppe A, die meisten der unter *Didelta* verstandenen Specimina gehören zu A. γ. dahin gehört auch bei Focke (Physiol. Studien I. p. 43. Taf. I. Fig. 9) dargestellte Form, die Nummern in der Rabenhorst'schen europäischen Algensammlung Nr. 1226. Nr. 1430. Nr. 1434. Nr. 1407. Nr. 1331. Nr. 1223. Nr. 1224. enthalten *Formen von B untermischt mit einzelnen Individuen von Formen von A. Nr. 1366. enthält Formen von A (ampullaecum und *Didelta*) untermischt mit Formen von B.

Von dem *Euastrum circulare* Hassal. (British Freshwater Algae p. 383. Taf. 90. Fig. 5. und in Ralfs british Desmidiaceae. p. 85. Taf. 13. Fig. 5 und Taf. 14. Fig. 3.) gehört die var. β. Ralfs (synonym mit *Euastrum sinuosum* Lenormand)

zu A. ϵ ., die var. γ Ralfs stellt die Form B. dar. Die drei bei Ralfs br. Desm. Taf. 13. Fig. 5. a. b. dargestellten Individuen gehören einer Form an und zwar einer Uebergangsform von A. β zu A. ϵ .

Euastrum Didelta. Ralfs (Annales of Nat. Hist. v. 14. p. 190. Taf. 7. Fig. 2. c. d. e. f.) gehören nicht zu *varians* sondern zu *Euastrum ansatum*. Ehrenberg. Das Ralfs'sche *Euastrum circulare* ist nicht die Hassal'sche Form, letztere gehört zu *Euastr. ansatum*, mithin gar nicht in die Formenreihe des *Didym.arians*.

Euastrum ampullaceum Ralfs. (brittish Desmidiaceae p. 83 Taf. 13. Fig. 4. stellt die Form A. ζ . dar. Die beiden 4 a. und 4. b. dargestellten Individuen stellen die Form A. ζ . (von Franken) nicht ganz dar, das mittlere Höckerchen ist in der Abbildung kleiner, der oberste Theil der Hälften ist im Verhältniss zum Querdurchmesser breiter. Die bei Hassal (britt. Freshwater Algae Taf. 100. Fig. 11.) abgebildete Form gehört ebenfalls zu A. ζ ., ebenso die in Nr. 1656 der Alg. Eur. enthaltene Form (böhmisches Erzgebirge leg. Richter.)

Euastrum humerosum Ralfs (brittish Desmidiaceae p. 82. Taf. 13. Fig. 2.) stellt die Form A. δ . dar. Die beiden a. und b. dargestellten Individuen stimmen gut überein.

Euastrum affine. Ralfs (Ann. of Nat. Hist. v. 14. p. 191. Taf. 7. Fig. 3. und Brittish Desmidiaceae. p. 82. Taf. 13. Fig. 3.) welches ich in der Natur noch nicht beobachtet und auch noch nicht selbst gesehen habe, gehört ebenfalls der Formenreihe des *Did.arians* an und vermittelt den Uebergang von A. δ . (*Euastr. humerosum*) zu A. ζ . (*Euastr. ampullaceum*).

Euastrum pinnatum Ralfs (britt. Desmid. p. 81. Taf. 13. Fig. 1.) vermittelt den Uebergang von A zu *Euastrum oblongum* Greville und kann mit ebenso gutem Rechte als Form des *D. oblongum* als des *D.arians* betrachtet werden. Ich kenne diese Form nur aus einigen in einem Präparate der Alg. Eur. enthaltenen Exemplaren, im Gebiete habe ich die Form noch nicht beobachtet.

Alle die unter A. aufgeführten Formen finden sich namentlich in Moor- und Waldgräben des Reichsforstes, jedoch immer in vereinzelt Speciminen und nie in so grosser Menge dass sie rein gesammelt werden könnten. Die Form B. beobachtete ich ziemlich reichlich in einem jetzt leider durch Trockenlegung vernichteten Standorte in der „Solitude“ bei Erlangen in Gesellschaft vieler anderer schöner Desmidien (*Micrasterias morsa*, *papillifera*, *rotata*, *Crux Melitensis*, *Euastrum oblongum*, *binale*, *Staurastrum franconicum* n. sp., *Xanthidium armatum*, dem schönen neuen *Closterium Brauni*, *Closterium striolatum*, *acerosum* u. v. a.) Das schöne *Euastrum crassum* Brébisson, welches nach den vielen Desmidienpräparaten in der europäischen Algensammlung von Rabenhorst, in welchen dasselbe enthalten ist, in Sachsen und Thüringen häufig sein muss, habe ich in Franken selbst noch nicht aufgefunden.

Didym. (*Euastrum*) *Sendtnerianum*. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia truncato deltoidea, extra articulum conjunctivum inter se contigua, margines laterales crenati (7is usque 8is gibberulis), summum dimidium in medio incisum, lobuli rotundato obtusi, summi dimidii latitudo dimidium inferioris partis latitudinis; dimidia a latere visa deltoidea, summum dimidium non incisum; dimidia e vertice visa elliptica; diameter transversalis diametri longitudinalis dimidium; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis dimidium; membrana glabra.

Longit. 0,023mm. usque 0,027mm. Latit. 0,012mm usque 0,015mm. Crassit. 0,006mm usque 0,008mm.

In Waldgräben im Reichsforste; in stehenden Wassern an der Regnitz (auch in Nr. 1212. in Nr. 1230 und in Nr. 1703 der Alg. Europas enthalten; Sachsen).

Erklärung der Abbildungen auf Taf IX. Fig. IV.

Fig. IV. a) Ein Individuum aus dem Reichsforste; b) ein Individuum aus Nr. 1230 der 23. und 24. Dekade der Algen

Europas (Leipzig. leg. Bulnheim); e) Seitenansicht eines Individuums; d) Scheitelansicht.

Didym. (Euastrum) oblongum. Greville. (*Echinella oblonga*. Greville. Hooker. Britt. Flora vol. II. p. 398. *Oplarium pterophorum*, Losana. Mem di Torino. XXXIII. *Euastrum Pecten*. Ehrenberg. Infusionsth. p. 162. Nr. 194. Taf. 12. Fig. 4. Kützing Phycol. German. p. 435. Focke. Physiol. Stud. I. p. 44 Taf. 1. Fig. 10. *Cosmarium sinuosum* Corda Ahn. de Carlsbad 1835 p. 206. Taf. II. Fig. 21. *Cosmarium oblongum*. Meneghini Synops. Desmid. p. 221. *Euastrum oblongum* Ralfs britt. Desmid. p. 80. Taf. 12. Fig. a. b. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 185. Alg. Europ. Nr. 1212. 1284. 1227. 1331. 1407. 1224. 1434.)

Die typische Form Frankens misst in der Länge 0,158mm. bis 0,184mm., in der Breite 0,076mm. bis 0,084mm., in der Dicke 0,058mm. bis 0,063mm.

Die kleinere Form, welche ich in Franken noch nicht beobachtet habe, welche ich aus Nr. 1224 und 1434 der Alg. Europas in einzelnen Exemplaren kenne, stellt eine Uebergangsform der typischen Form von *oblongum* zu den stärker eingeschnittenen Exemplaren von *A. des Did. varians* (*Euastr. pinnatum* Ralfs) dar.

Ist sehr häufig in kleinen Sümpfen in der „Solitude“ bei Erlangen; in vereinzelt Exemplaren beobachtete ich die typische Form an vielen andern Orten (Reichsforst, in Altwässern der Regnitz).

Didym. (Euastrum) elegans. Brébisson.

Formae:

A. Bulnheimi. Dimidiorum a fronte visorum distantia angulorum exteriorum superiorum a dimidii basi dimidii diametri longitudinalis dimidio aequalis (aut paulo magis).

α . minus. Longit. 0,023mm. usque 0,027mm.

Latit. 0,013mm. usque 0,015mm.

β . majus. Longit. 0,031mm. usque 0,034mm.

Latit. 0,019mm. usque 0,021mm. Crassit. 0,013mm.

B. Brebissoni. Dimidiorum a fronte visorum distantia angulorum exteriorum superiorum a dimidii basi dimidii diametri longitudinalis quarta usque quinta pars.

α . minus. Longit. 0,019mm. usque 0,021mm.

Latit. 0,015 mm. usque 0,017 mm. Crassit. 0,009 mm.

β . medium. Longit. 0,03mm. usque 0,037mm.

Latit. 0,019 mm. usque 0,021 mm. Crassit. 0,012 mm.

γ . majus. Longit. 0,65mm. usque 0,061mm.

Latit. 0,03 mm. usque 0,038 mm. Crassit. 0,023mm.
usque 0,021mm.

Es ist zur Bezeichnung der Art der ältere Brebisson'sche Name beibehalten worden. Die mit diesen Formen synonymen Arten der Autoren sind folgende.

Cosmarium elegans Brebisson. Meneghini. Synops. Desmid. Linnaea. p. 222. gehört zu B.

Euastrum spinosum Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 14. p. 193. Taf. 7. Fig. 6. stellt die Form B. β oder B. γ . dar.

Euastrum elegans. Kützing. Phycol. German. p. 135. Ralfs the britt. Desmid p. 89. Taf. 14. Fig 7. Rabenh Kryptog. Sachs. p. 187 gehören der Form A. an. Die var. α . Ralfs „segments slightly constricted beneath the end lobe, which has on each side a short horizontale spine“ stellt die Form B. β . und B. γ . dar. Die 7. a. b. c. dargestellten Individuen stimmen mit den fränkischen überein. Die var. β . innerme Ralfs scheint aus Exemplaren der Form A. α . und A. β . des Didym. varians zu bestehen. Das 7. e dargestellte Individuum hat grosse Aehnlichkeit mit der A. β . Nr. 1112 der Alg. Europ Nr 1224. Nr. 1407. Nr. 1413. enthalten verschiedene Formen.

Euastrum spinosum. Focke Physiol. Studien I. p. 41. Taf. 1. Fig. 4. Taf. 2 Fig. 14. 15. gehört zu B. Das Taf. 2. Fig. 16. dargestellte Individ. gehört zu binale.

Euastrum bidentatum, Naegeli Gattgen. einz. Alg. p. 122. Taf 7. B. Fig. 1. gehört zu der Form B, nach den angegebenen Dimensionen zu B. γ .

Alle die angegebenen Formen finden sich gewöhnlich in vereinzelt Individuen (sehr selten rein) unter Fadenalgenmengen wie in Desmidiengemengen. Im Reichsforste in stehenden Wassern an der Regnitz!

Didym. (Euastrum) binale. Turpin.

Formae:

A. corniculatum. Lobulorum terminalium anguli exteriores in spinas breves oblique sursum versos acuminati.

α . Lobulorum basaliū margines simpliciter aut dupliciter repandi. Longit. 0,034mm. usque 0,038mm. Latit. 0,026mm. usque 0,03mm. Crassit. 0,01mm. usque 0,013mm.

β . Lobulorum basaliū margines (et saepe lobulorum terminalium margines) crenulati; Longit. 0,036mm. usque 0,038mm. Latit. 0,028mm. usque 0,03mm. Crassit. 0,014mm.

γ . Lobulorum basaliū margines simpliciter repandi, lobulorum terminalium anguli exteriores subito breviter acuminati. Longit. 0,023mm. usque 0,028mm. Latit. 0,015mm. usque 0,021mm.

Diese Form, welche in einzelnen Individuen Uebergänge zu elegans bildet, habe ich einstweilen, obgleich nicht ganz mit Recht bei der Form A. mit untergebracht.

B. tetralobulum. Lobulorum terminalium integerrimorum anguli exteriores in apiculum breve in marginis terminalis directione versum acuminati, lobuli basiliares a lobulis terminalibus fissura brevior disjuncti.

α . Lobulorum basilarium margines simpliciter repandi. Longit. 0,023mm. usque 0,029mm. Latit. 0,021mm. usque 0,023mm.

β . Lobulorum basilarium margines crenulati. Longit. 0,023mm. Latit. 0,022mm.

C. integrum. Dimidiorum margines integri anguli superiores breviter acuminati, margo terminalis rectus. Longit. 0,012mm. usque 0,015mm. Latit. 0,01mm. usque 0,014mm.

Die mit diesen Formen synonymen Arten der Autoren sind folgende.

Heterocarpella binalis. Turpin. Dictionn. des sc nat 1820 Fig. 14. Kützing Synops. Diatom. Linnaea. p. 598 Brebisson Alg. Falaise p. 56. Taf 7. *Cosmarium binalis*. Meneghini Synopsis Desmid. Linnaea p. 221. gehören alle drei Formen an.

Euastrum binalis Ralfs Ann. ot Nat. Hist. v 14. p. 193. Hassall britt Freshw. Algae. p. 384. Ralfs british Desmidiace. p. 90. Taf. 14 Fig. 8. gehören theils A. (A γ .) theils C. an. Die var. β . Ralfs ist synonym mit A. β .

Euastrum spinosum. Focke Physiol. Stud. I. p. 41. Taf. 2. Fig. 16. gehört zu A γ . an. (Die übrigen Taf. 1. Fig. 4. Taf. 2. Fig 14. 15 gehören zu *Did. elegans*.)

Euastrum dubium. Naegeli. Gattgen, einzell. Alg. p. 122 Taf. 7. D. Fig 2. gehört A. γ . an.

Die in den Alg. Europ. enthaltenen Nummern Nr. 1212. 1338. 1407. enthalten verschiedene der unterschiedenen Formen

Mit Ausnahme der Form C. kommen die sämtlichen unterschiedenen Formen im fränkischen Gebiete vor. Die Form C. kenne ich nur aus einigen in der europäischen Algen-sammlung enthaltenen Präparaten (Nr. 1212. Nr. 1229. Nr 1430. sämtlich aus dem sächsischen Gebiete.)

Das *Euastrum rostratum* Ralfs. (britt Desmid. p. 383. Taf. 14. Fig. 6.) habe ich im fränkischen Gebiete noch nicht beobachtet. Die in Nr. 1444 der Alg. Europas enthaltenen Specimina sind mit den bei Ralfs britt. Desmid. dargestellten nicht ganz gleich.)

Didym. (Euastrum) venustum. Hantsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica aut truncato cordata, extra articulum conjunctivum inter se contigua, summum dimidium in medio incisum, anguli exteriores obtusi sed non rotundati, in marginis terminalis directione jacentes, angulorum exteriorum distantia diametri transversalis dimidium, dimidii lobus basilaris in medio leniter emarginatus; lobi basillares incisura a lobo terminali non disjuncti; dimidia a latere

visa deltoidea; dimidia e vertice visa elliptica, utrimque in medio paulo convexa; articuli conjunctivi latitudo triens diametri transversalis; diameter transversalis diametri longitudinalis duae partes; membrana glabra.

Longit. 0,021mm. usque 0,031mm. Latit 0,015mm. usque 0,022mm. Crassit. 0,01mm. usque 0,013mm.

Um Erlangen an mehreren Orten beobachtet; Rothenburg; in Lachen an der Regnitz am Theresienhain bei Bamberg.

Euastrum venustum. Hantsch. in Nr. 1543 der 55. und 56. Dek. der Alg. Europ. in einem Sphagnumtümpel bei den Rauensteinen in Sachsen) stimmt gut mit den fränkischen Exemplaren überein. Diese als Art aufgestellte Form scheint nicht in binale überzugehen. Der Bemerkung des Autors auf der Etiquette stimme ich bei: „In Grösse des Euastr. binale (binale minus) auch in Form ähnlich, jedoch sind die Enden weniger breit und etwas mehr vorgezogen und es fehlt die spitze Ausladung der Endlappchen nach aussen, welche hier stets gerundet sind.“

Subgenus V. *Micrasterias*. Agardh.

Cellula a fronte visa in sciagraphia elliptico circularis usque circularis, utrimque in medio non emarginata aut emarginatura acutangula emarginata; dimidia a fronte visa incisuris profundioribus angustioribus aut latioribus in ternos, aut quinternos, lobos divisa; lobus terminalis in medio indivisus; lobi laterales indivisi (pinnatifidum) aut simpliciter, dupliciter aut tripliciter regulariter lobati; respondentes ordinisque eadem lobuli latitudine et divisionis ratione aequales; dimidia e vertice visa in sciagraphia anguste elliptica usque lenticulari depresso; diameter transversalis diametro longitudinalis aequalis; corporis crassitudo diametri transversalis quarta usque octava pars; articuli conjunctivi latitudo quinta usque octava pars diametri transversalis; dimidiorum interanea corpusculis chlorophyllaceis compluribus irregulariter dispersis instructa; memb-

rana glabra, punctulata, raro papillis aut aculeis vestita; zygospora aculeis multipartitis armata.

Didym. (*Micrasterias*) *pinnatifidum*. Kützing (*Euastrum pinnatifidum* Kützing. Phycol. German. p. 134. *Micrasterias pinnatifida* Ralfs. british. Desmid. p. 77. Taf. 10. Fig. 3. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 184. Alg. Europ. Nr. 1443. 1407. *Euastrum bifidum*. Focke Physiol. Stud. I. p. 45. Taf. 1. Fig. 12. Taf. 2. Fig. 22. *Euastrum didymacanthum*. Naegeli Gattgen. einzell. Algen p. 123. Taf. 6. H. Fig. 11.)

Die Länge dieser konstanten ganz unveränderlichen Art beträgt nach den fränkischen Specimenen 0,069mm., die Breite 0,061mm. bis 0,065mm., die Dicke 0,022mm.

Bis jetzt nur an einem einzigen Orte im Gebiete beobachtet. Unter schwimmenden Conferven und Zygnemenmassen (*Mescarpus*, *Sirogonium*) im Bischofssee bei Erlangen.

Didym. (*Micrasterias*) *Herrmannianum*. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrimque acutangule emarginata; dimidia a fronte visa trilobata; lobus terminalis a lobis lateralibus incisura acutangula disjunctus; lobus terminalis indivisus, pars superior in sciagraphia trapezica, pars inferior breviter cylindracea, inferioris partis latitudo articuli conjunctivi latitudini aequalis (aut paululo latior), superioris partis (summi cornub. exclus) latitudo duae quintae diametri transversalis, anguli in cornua divaricata, conoidea cylindracea, truncata elongati, cornuum longitudo lobi terminalis partis superioris longitudine paulo brevior, cornuum summorum distantia latitudinis inferioris partis lobi terminalis dimidio paulo magis; lobi laterales incisura acutangula divisa, lobulorum latitudo inaequalis, lobulus inferior angustior indivisus, lobulus superior incisura acutangula in binos lobulos aequales divisus, incisura usque ad lobuli medium se pertinens; dimidia a latere visa ovato elliptica, truncata, anguli superiores bini in cornua (sic descript.) excurrentes; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, lobus terminalis rectangularis; articuli conjunctivi

latitudo quadrans (aut paulo minus) diametri transversalis; corporis crassitudo dimidium (aut paulo minus) diametri transversalis; diameter transversalis quatuor quintae diametri longitudinalis; lobulorum et lobi terminalis membrana aculeis brevioribus in seriebus longitudinalibus dispositis ad corporis medium versis obiecta (lobulorum cornuumque margines laterales argute serrati apparent).

Longit. 0,2mm. Latit. 0,154mm. Crassit. 0,051mm.

Diese schöne neue Form, welche sich von allen seither bekannten Micrasterien auffallend unterscheidet und mit keiner der seither bekannten eine entfernte Aehnlichkeit gemein hat, habe ich bisher in Franken nur an einer einzigen Stelle beobachtet. In stehenden Wassern unter andern Desmidien und Fadenalgen Syrogonium sticticum, Zygnemen, der seltenen Lyngbia cincinnata, Desmidium aptogonum, Swartzii, quadrangulare u. A.) in einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf unweit Baiersdorf (im Oktober 1863 entdeckt und dann wiederholt gesammelt).

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VIII. Fig. 1.

Fig. 1. a) Ein Individuum in der Front betrachtet; b) ein anderes genau zur Seite gewendet betrachtet; c) Scheitelansicht eines Individuums, die Hörner des Terminalläppchens ragen über die Seitenränder der Hälfte hinaus.

Didym. (Micrasterias) decemdentatum. Naegeli. (Gattgen. einzell Alg. p. 123. Taf. 6. H. Fig. 2. Nr. 1224 der 23. und 24. Dek. der Alg. Europ. (Wurzen in Sachsen leg. Hantsch.)

Diese gute und wie es scheint sehr konstante Art, da die fränkischen Specimen genau mit den bei Naegeli abgebildeten schweizerischen Individuen übereinstimmen, entdeckte ich nur an einem einzigen Orte im Gebiete in wenigen Individuen, in einem sehr reichhaltigen Desmidiengemenge aus einem kleinen moosigen Tümpel am Donau-Mainkanale zwischen Bruck und Erlangen

Die Länge betrug 0,054 mm. bis 0,059 mm., die Breite 0,054 mm. bis 0,058 mm., die Dicke 0,021 mm. bis 0,023 mm.

Didym. (*Micrasterias*) *mossum*. Ralfs (british Desmidiaceae p. 74. Taf. 10. Fig. 1.)

Länge 0,115 mm. bis 0,123 mm. Breite 0,092 mm. bis 0,107 mm. Dicke 0,049 mm.

F o r m a e :

A. *inermis*. Lobi terminalis anguli rotundati, sine cornubus.

B. *cornutum*. Lobi terminalis anguli cornubus binis breviter conoideis truncatis instructi, cornua summa in medio paulo emarginata aut gibberulis instructa.

Diese bisher nur von England und Nordamerika bekannte zierliche Species ist von mir im fränkischen Gebiete an mehreren Stellen in der Umgegend von Erlangen aufgefunden worden; in einem Graben am Fusse des Rathsberges (den Weg, der auf den Rathsberg führt, querdurchschneidend), in Thongruben bei Spardorf (mit *Euastrum oblongum*, *Closterium acerosum*, *Micrasterias denticulata*, *rotata*), in einem Waldgraben und unter einer steinernen Brücke im Reichsforste. Von dem zweiten Standorte wird die Art in der europäischen Algensammlung erscheinen.

Didym. (*Micrasterias*) *truncatum*. Corda. (*Cosmarium truncatum* Corda. Alman. de Carlsbad. 1835. p. 206. Taf. 2. Fig. 23. 24. *Euastrum Rota*, Infusionsth. T. 12. Fig. 1.h. *Micrasterias Rota*. Meneghini. Synops Desmid. p. 215. Kützing Phycol. German. p. 134. Naegeli Gattgen. einzell. Algen. p. 123. Taf. 6. H. Fig. 3. *Micrasterias truncata* Ralfs britt. Desmid. p. 75. Taf. 8. Fig. 4. Taf. 9. Fig. 5.).

Länge 0,094 mm. bis 0,107 mm. Breite 0,084 mm bis 0,1 mm. Dicke 0,038 mm.

F o r m a e :

a. *crenatum*. Lobi laterales in medio non profunde emarginati aut incisi, lobuli in medio emarginati aut non profunde incisi, lobulorum secundae ordinis anguli rotundato ob-

tusi; lobi terminalis anguli unidentati. (*Micrasterias crenata* Brébisson. Ralfs british Desmidiaceae p. 75. Taf. 7. Fig. 2.).

b. *dentatum*. Lobi laterales in medio incisi, lobuli (secundae ordinis) denticulis binis longioribus aut brevioribus interdum divergentibus instructi; lobi terminalis anguli uni- aut bidentati.

Die var. a. in einem Graben im Reichsforste bei Tennenlohe in wenigen Specim beobachtet (nicht in Gesellschaft der var. b.). Die gezähnte Form, welche als die typische betrachtet werden muss, findet sich ziemlich verbreitet im Gebiete. Ziemlich rein beobachtete ich die Form nur an einem Orte, in der „Solitude“ bei Erlangen in Gesellschaft des *Closter. Braunii*, *Micraster. denticulata*, *Staurostrum dejectum*, *Cosmar. Braunii* u. v. a., an welchem Orte dasselbe im letzten Herbste wie verschwunden war.

Didym. (Micrasterias) furcatum. Agardh.

Formae:

A. *Crux. Melitensis*. Loborum lateralium incisurae profunditas lobi lateralis longitudinis triens (et paulo magis), lobulorum latitudo lobi lateralis latitudinis triens (et paulo magis). Longit. 0,107mm. usque 0,123mm. Latit. 0,098mm. usque 0,119mm.

B. *intermedium*. Loborum lateralium incisurae profunditas lobi lateralis longitudinis dimidium (interdum paulo minus) lobulorum latitudo lobi lateralis latitudinis triens (et paulo magis). Longit. 0,122mm. Latit. 0,117mm.

C. *furcatum*. Loborum lateralium incisurae profunditas lobi lateralis longitudinis dimidium, lobulorum latitudo lobi lateralis latitudinis quinta pars, lobuli cylindracei, divaricati. Longit. 0,146 mm. usque 0,114 mm. Latit. 0,113 mm. usque 0,138mm. Crassit. 0,035mm

Die erste Form stellt das *Euastr. Crux Melitensis* Ehrenberg dar. (Abhandl. der Berlin. Acad 1831. p. 82 Infusion. p. 162. Nr. 193. Taf. 12. Fig. 3. Ralfs britt. Desmid. p 73. Taf. 9. Fig. 3. Focke Physiol. Stud. I. p. 45. Taf. 1. Fig. 13.

Rabenh. Krypt. Sachs. p. 183. Alg. Europ. Nr. 1367. 1338. 1444. 1445. Diese Form ist synonym mit folgenden Arten der Autoren. *Echinella radiosa* Lyngbye Tentamen Hydrophyt. Danic. p. 208. Taf. 89. Fig. E. 3. *Echinella ricciaeformis* Agardh. Systema Alg. p. 15. *Hierella Lyngbyi*. Bory de St. Vincent Mus. d'hist. nat. *Micrasterias radiosa* Agardh. Flora Regensb. bot. Zeitg. 1827.

Diese Form geht durch die Zwischenform B. intermedium in die folgende Art der Autoren, welche die Form C. darstellt, über.

Micrasterias furcata Agardh. Regensb. botan. Zeitg. 1827. Kützing. Synops. Diatom. Linnaea 1838. p. 603. Meneghini. Synops. Desmid. p. 266. Ralfs. britt. Desmid. p. 73. Taf. IX. Fig. II. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 183. Alg. Europ. Nr. 1212. der 21. 22. Decade. *Micr. furcata* ist synonym mit *Micrast. radiata*. Hassal. Britt. Treshw. Algae. p. 386.

Die Form A. ist sehr selten im fränkischen Gebiete, dieselbe findet sich gewöhnlich in vereinzelt Exemplaren, da wo Desmidien vorkommen, vor. Dieselbe zeigt sich nicht ganz konstant und in vielen Specim. in der Tiefe der Einschnitte, der Breite der Lappchen Uebergänge zu B. Die Formen C. und B. sind im Gebiete seltener. Zu jeder Jahreszeit habe ich dieselben beobachtet in einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf an demselben Standpunkte, an welchem ich die *Micrast. Hermanniana* entdeckte. Unter den Spec. von C. sind an diesem Standorte immer einzelne von B. zu beobachten, welche sehr allmähliche Uebergänge in C. darstellen. Die exquisite Form B. beobachtete ich auch an einem andern Orte ohne Beisein von *furcatum*. (In einem Graben im Reichsforte.)

Didym. (Micrasterias) apiculatum. Ehrenberg. (*Euastrum apiculatum* Abhandl. der Berliner Akademie 1832. p. 245. Infusionsth. p. 161. Nr. 192. Taf. XII. Fig. II. Kützing. Phycol. German. p. 134. Rabenh. Kryptog. Deutschl. p. 53. Nr. 5918. *Euastrum aculeatum* Ehrenberg Infusionsth. Taf.

XII. Fig. II. *Micrast. aculeata*. Meneghini Synops. Desmid. Linnæa p. 216).

Diese nach Ralfs (britt. Desmid. p. 203) noch nicht in England beobachtete Mikrasterie scheint bis jetzt nur noch bei Berlin beobachtet zu sein. Diese Mikrasterie unterscheidet sich von allen übrigen Mikrasterien durch die derben, die ganze Oberfläche des Zellehens bedeckenden Stacheln, durch die mit ebensolchen Stacheln bewaffneten Läppchen.

Im Gebiete an zwei Orten beobachtet. In stehenden Wässern (Altwässern) der Regnitz bei Oberndorf, bei Baiersdorf und unter frei schwimmenden Fadenalgenmassen im Bischofssee bei Erlangen. (Zu jeder Jahreszeit beobachtet und gesammelt.)

Didym. (*Micrasterias*) *papilliferum*. Brebisson. (*Micrasterias papillifera*. Ralfs brittish Desmid. p. 72. Taf. 9. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 182. Alg. Sachs. 690 und 510. Alg. Europ. Nr. 1212. 1284. 1367. 1427. 1430. 1506.)

Diese konstante und in der Form und Theilung der Läppchen gar nicht variirende Art misst nach den fränkischen Specim. in der Länge 0,123mm.--0,146mm., in der Breite 0,1mm.--0,115mm., in der Dicke 0,027mm.

Die Oberfläche der Zellchen ist mit in Reihen stehenden sehr kurzen Dörnehen besetzt, welche nur bei den abgestorbenen inhaltslosen Zellchen sichtbar sind, die Zähnechen der Läppchen sind gewöhnlich mit kleinen kopfförmig verdickten Papillchen besetzt.

Im fränkischen Gebiete ziemlich verbreitet, aber immer vereinzelt oder nur in kleinerer Anzahl von Individuen unter andern Desmidien (gewöhnlich *Micrast. rotata* und *denticulata*) lebend. Im Reichsforste in Altwässern der Regnitz, im Bischofssee.

Didym. (*Micrasterias*) *denticulatum*. Brebisson. (*Micrasterias denticulata*. Alg. Falaise. p. 54. Taf. 8. Ralfs. britt. Desmid. p. 70. Taf. 7. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 182. Alg. Sachs. Nr. 666. Alg. Europ. Nr. 1639 1207.

1212. 1331. 1367. 1430. 1506. *Euastrum Rota* Ehrenberg. Infus. Taf. 12 Fig. 1 a. Focken Physiol. Stud. I. p. 46. Taf. 2. Fig. 1—7. *Micrasterias Rota* Meneghini (ex. p.) Synops. Desmid. p. 210. *Micraster. rotata*. Ralfs (ex p.) Ann. of Nat. Hist. v 14. Taf. 6.)

F o r m a e .

a. *denticulatum*. Lobuli tertiae ordinis breviter bi-aut tridentati, lobuli inferiores bini lobuli primae ordinis bidentati, lobuli exteriores bini tridentati.

b. *crenulatum*. Lobuli tertiae ordinis inermes, integerrimi aut in medio submarginati.

Diese Form verhält sich zu a. wie bei *Didym. truncatum* die wehrlose Form zur gezähnelten.

Die Dimensionen sind bei beiden Formen gleich.

Länge 0,224mm.—0,254mm. Breite 0,208mm.—0,224mm. Dicke 0,026mm.

Diese Art Form ist im fränkischen Gebiete ziemlich verbreitet. An manchen Orten beobachtete ich dieselbe sehr rein, die Individuen in ungeheurer Anzahl gesellig beisammen-lebend; an einem Orte beobachtete ich einmal das aus dem Graben in ein Gläschen geschöpfte Wasser durch die im Wasser dicht vertheilten Individuen eine grünliche Färbung annehmend, so dass mit Berücksichtigung der Zwischenräume nach annähernder Berechnung in einem Cubikmillimeter 35 bis 40, in einem Cubikeentim. 3500 bis 4000 Individuen sich befinden mochten.

Die Form A. ist die seltenere und von mir nur an einem einzigen Orte im Gebiete (im Reichsforste bei Tennenlohe) beobachtet.

Didym. (Micrasterias) angulosum. Haütsch. (Alg. Nr. 1407. der 41. und 42. Dek. Nr 1564. der 66 und 77. Dek.

Cellula a fronte visa in sciagraphia elliptica et plus minusve octangulosa, dimidia a fronte visa quinquilobata, incisurarum inter lobum terminalem lobosque laterales profunditas diametri longitudinalis cellulae dimidii dimidium; lobus terminalis

indivisus deltoideus, in medio acutangule emarginatus, anguli juxta emarginaturam subconvexi, lobi anguli exterioris integerimi, rotundati; lobi laterales aequaliter dupliciter aut tripliciter lobati, loborum lateralium incisurae profunditas lobi longitudinis dimidium, lobus lateralis inferior lobo laterali superiore paulo angustior, lobi terminalis latitudo loborum lateralium latitudine minor, lobi lateralis inferioris lobulus superior (primae ordinis) inferiore paulo latior, supraque inferiorem paulo prominens, lobulorum (secundae aut tertiae ordinis) exteriores lobuli (primae ordinis) interioribus paulo latiores, lobulorum exteriorum anguli exteriores paulo producti supraque lobulos interiores paulo prominentes, lobulorum omnium anguli inermes, rotundati, lobuli in medio interdum subemarginati; omnium lobulorum (secundae aut tertiae ordinis) = 32 usque 64; cellula a latere et e vertice visa anguste elliptica; dimidiorum margines inferiores extra articulum conjunctivum totaliter inter se contigua; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis septima usque octava pars; diameter transversalis quinque septimae diametri longitudinalis; cellulae crassitudo octava pars diametri transversalis; membrana dense subtiliter tuberculato punctulata.

a. Lobi laterales dupliciter lobati. Longit. 0,255mm. Latit. 0,208mm.

b. Lobi laterales tripliciter (plus minusve distinctius) lobati. Longit. 0,269mm.—0,284mm. Latit. 0,208mm.—0,216mm

Diese zuerst von Herrn Hantsch in Sachsen entdeckte und in Nr. 1407 mitgetheilte Art habe ich an mehreren Orten im fränkischen Gebiete beobachtet. Sehr reichlich habe ich dieselben beobachtet und gesammelt in einem halbbeschatteten immer feuchten Waldgraben mit humoser Unterlage in dem Forstorte „Rehbock“ im Reichsforste, von welchem Standorte (in Gesellschaft mit dem *Staurastr. polymorphum*, *Closter. striolatum*, *juncidum*, *costatum*, *lineatum* u. a.) ich dieselbe unter Nr. 1654. der 66. und 67. Dekade mitgetheilt habe.

Didym. (Micrasterias) rotatum. Greville. (*Echinella rotata*. Hooker britt. Flora v. 2. p. 398. *Euastrum Rota*

Ehrenberg. (ex. p.) Infusionsth. p. 161. Nr. 191. Taf. 12. Fig. 1 c e. Focke Physiol. Studien I. p. 46. Taf. 1. Fig. 15. Taf. 2. Fig. 5. Naegeli Gattgen. einzell. Alg. p. 124. Taf. 6. H. Fig. 4. *Cosmarium stellinum* Corda Alman. de Carlsbad. 1835. p. 206 Taf. 2. Fig. 22. *Micrasterias rotata* Ralfs britt. Desmid. p. 71. Taf. 8. Fig. 1. Rabenh. Kryptog Sachs. p. 182. Alg. Sachs. Nr. 41. Alg. Europ. Nr. 1407. 1212. 1247. 1331. 1367. 1429. 1506. 1654.)

F o r m a e.

a. Omnium lobulorum (ultimae ordinis) dentes aequaliter longi.

b. Lobulorum (ultimae ordinis) dentes inaequales, lobulorum singulorum dens exterior paulo longior supraque dentem anteriorem paulo prominens.

c. Lobulorum (ultimae ordinis) dentes aequales aut inaequaliter longae, dentes omnes capitulo sphaerico instructi.

Die Dimensionen dieser Formen sind gleich, Länge 0,276mm. — 0,308mm. Breite 0,248mm. — 0,263mm. Dicke 0,024mm.

Diese Art ist im fränkischen Gebiete wie das *Did. denticulatum* verbreitet. a. und b. sind die häufigeren Formen und meist gemeinschaftlich in Gräben im Reichsforste, im Hauptmoorwald bei Bamberg, in Altwässern an der Regnitz, in Gräben am Eisenbahndamme bei Baiersdorf, in der „Solitude“ bei Erlangen, c. habe ich nur an einem Orte im Gebiete beobachtet, in einem Graben am Rande des Reichsforstes bei Neuhof (mit einem etwas eisenockerigen Wasser) in Gesellschaft von *Closter. striolatum*, *Micrast. denticulata* und einigen *Staurostren* wie der neuen *Nitschia franconica*.

Von diesem Standpunkte wird die Form c. in den Alg. Europ. mitgetheilt werden.

Didym. (Micrasterias) fimbriatum. Ralfs (British Desmid. p. 71. Taf. 8. Fig. 2. *Euastrum Rota* Ehrenberg. Infusionsth. Taf. 12. Fig. 1. A. *Euastr. apiculatum*. Focke. Physiol. Studien I. p. 50. Taf. 1. Fig. 16).

Die Specimina welche ich in der Natur zu beobachten Gelegenheit hatte, lassen die Form als sehr konstant mit den Abbildungen der Autoren und als eine gute Art erkennen. Die konstant vorgezogenen innersten Lappchen des unteren Seitenlappens wie die konstant mit langen gewöhnlich divergirenden Wimpern besetzten Lappchen letzter Ordnung lassen die Form leicht von einzelnen Specim. des *Micraster. denticulata* unterscheiden.

Nur an einem Orte im Gebiete beobachtet; in einem Altwasser der Regnitz bei Baiersdorf unter vielen andern Desmidiën, immer aber nur in vereinzelt Specimin.

Subgenus VI. *Staurastrum*. Meyer.

Dimidia indivisa, a fronte visa in sciagraphia plus minusve regulariter elliptica usque trapezica; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, 3- 4- 5- 6 gona raro 7- et 9 gona; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis (et paulo longior et brevior); formarum cum dimidiis e vertice visis ellipticis dimidiorum interanea corpusculo chlorophyllaceo singulo sine laminis chlorophyllaceis aut cum laminarum paribus binis instructa, formarum cum dimidiis e vertice visis tri-usque nonagonis dimidiorum interanea laminarum chlorophyllacearum radialiter dispositarum divergentium aut paralleliseptarum e corpusculo chlorophyllaceo axillari excurrentium paribus ternis, quaternis usque nonagenis instructa; membrana glabra, punctulata usque grosse verrucosa, setosa, aculeata aut spinis firmis armata; Zygospora spinis simplicibus spinosa

Didym. (Staurastr.) muticum. Brebisson. (*Binatella mutica* Breb. Alg. Falaise p. 57. Taf. 8. *Staurastr. trilobum* Meneghini. Conspect. Alg. europ. p. 18. *Staurastrum muticum*, Bréb. Meneghini Synops. Desmid. 1840. Ralfs britt. Desmid. p. 125. Taf. 21. Fig. 4. Taf. 34. Fig. 13. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 188. *Euastrum depressum*. Naegeli. Gattgen. einzell. Alg p. 126. Taf. 8. A. Fig. 1. Alg. Europ. Nr. 1506 (enthält

die Form A.) Nr. 1443. (enthält *Cosmar. depressum* Naeg. Nr. 1338 (enthält dieselbe Form mit dreiseitigen Hälften.

F o r m a e.

a. *muticum*. Dimidia a fronte visa regulariter elliptica, emarginatura acutangulosa; dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica tri- et tetragona, margines laterales emarginati. Longit. 0,03mm.—0,033mm. Latit. 0,03mm.—0,033mm.

b. *alternans*. Dimidia a fronte visa regulariter elliptica, emarginatura praecedente angustior acutangulosa; dimidia e vertice visa elliptica, trigona, margines laterales leniter repandi; dimidiorum anguli bini alternantes. Longit. 0,023mm. Latit. 0,023mm.

c. *Bieneanum*. Dimidia a fronte visa regulariter elliptica, emarginatura acutangulosa; dimidia e vertice visa elliptica trigona, margines laterales subconvexi aut leniter repandi corporis dimensionis forma praecedente et sequente duabus partibus majores. Longit. 0,042mm.—0,046mm. Latit. 0,042mm.—0,06mm. (*Staurastrum Bieneanum* Rabenhorst).

d. *minus*. Dimidia a fronte visa irregulariter elliptica, dimidiorum pars inferior ad articulum conjunctivum paulatim angustata, margines laterales leniter emarginati. Longit. 0,024mm. Latit. 0,024mm.

e. *decedens*. Dimidia a fronte visa irregulariter elliptica, dimidiorum pars inferior supra articulum conjunctivum subito angustata, emarginatura obtusangulosa; dimidia e vertice visa tetragona, margines laterales emarginati (obtusangule aut rectangule). Longit. 0,03mm. Latit. 0,026mm.

Diese sämtlichen Formen finden sich im fränkischen Gebiete an verschiedenen Orten. a. in Gräben in der Solitude bei Erlangen, in Gräben im Reichsforste; b. in einem Wiesentümpel am Donau-Mainkanal vor Erlangen; c. welches das *Staurastr. Bieneanum* Rabenhorst. Alg. Europas. Nr. 1410. der 41. und 42. Dekade darstellt, in einem Graben im Reichsforste unweit Erlangen, am Kosbacher Weiher; d. in einem Graben

in der „Solitude“ bei Erlangen; e. in Gräben bei der Schleifmühle bei Erlangen.

Didym. (Staurastrum) orbiculare. Ehrenberg. (Desmidium orbiculare. Abhandl. der Berliner Academie der Wissensch. 1832. p. 292. Infusionsth. p. 141. Taf. 10. Fig. 8. a. b. c. Rabenh. Deutschl. Kryptogfl. p. 57. Nr. 4952. Staurastrum orbiculare. Ralfs the british Desmid. p. 125 Taf. 21. Fig. 5. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 168. Phycastrum orbiculare. Kützing. Phycol. Germ. p. 137. Gonioecystis orbicularis. Hassal. British Freshw. Algae. p. 349.

Formae.

a. minus. Dimidia a latere visa in sciagraphia semielliptica usque ovato elliptica, dimidia e vertice visa elliptica et trigona. Longit. 0,023mm.—0,027mm. Latit. 0,021mm.—0,023mm.

b. intermedium. Dimidia a latere visa in sciagraphia semielliptica usque ovatoelliptica, dimidia e vertice visa elliptica et trigona. Longit. 0,036 mm. — 0,038 mm. Latit. 0,03 mm.

c. majus. Dimidia a latere visa in sciagraphia late ovato elliptica, dimidia e vertice visa trigona. Longit. 0,054mm. Latit. 0,042.

Diese drei Formen finden sich in verschiedenen Orten der Umgegend von Erlangen.

Staur. muticum und Staur. orbiculare würden den Formenkreis einer einzigen Art darzustellen haben, wenn nicht die nach Ralfs in den britt. Desm. Taf. 24. Fig. 13. darstellende Zygosporc von Staur. muticum wesentliche Verschiedenheiten zeigte von der nach Ralfs ebendas. Taf. 13. Fig. 5. 9. darstellenden Zygosporc von Staur. orbiculare. Ich habe keine der von Ralfs abgebildeten Zygosporcn bis jetzt in der Natur zu beobachten Gelegenheit gehabt und muss daher diese Abbildungen noch als entscheidend gelten lassen. Der von Ralfs hervorgehobene Hauptunterschied von orbiculare und muticum „Staurastr. muticum differs from St. orbiculare by its elliptic

segments and mucous covering“ ist nach meinen Beobachtungen sehr wenig konstant, die „schleimige Bedeckung“ beobachtete ich nur bei einigen wenigen Specim., die Form der Hälften ist bei beiden Formenreihen durchaus nicht konstant, deren kleine Formverschiedenheiten allein noch keine Art bedingen. — Die Specimina mit vom Scheitel gesehen im Umrisse elliptischen Hälften der verschiedenen Formen der beiden Arten können sehr leicht für Cosmarien gehalten werden, wo die Inhaltsstruktur aber deutlicher wahrzunehmen ist, ist eine Verwechslung nicht leicht möglich, da die Staurastrumspecimina von Cosmarien immer noch durch die verschiedene Inhaltsstruktur, welche bei der von Naegeli als Cosmarie beobachteten Form des Staur. muticum mit elliptischen Hälften (*Euastrum depressum*) gewöhnlich deutlicher als bei andern Formen erkennbar ist, aus einander gehalten werden können.

Didym. (*Staurastrum*) *bacillare*. Brebisson. (Meneghini Synops. Desmid. p. 228. Ralfs britt. Desmid. p. 214. Taf. 35. Fig. 21. *Binatella bacillaris*. Brebisson. Alg. Falaise p. 66. (ist die Form A.) *Staurastrum globulatum*. Brebisson in Ralfs the british Desmid. p. 217. Taf. 30. Fig. 53. (Stellt die Form B. dar.)

F o r m a e.

A *glabrum* Dimidiorum anguli capituliformes glabri. Longit. 0,019mm. — 0,021mm. Latit. 0,019mm. — 0,021mm. (*Staurastrum bacillare* Brebisson.)

B. *granulatum*. Dimidiorum anguli capituliformes granulati. Longit. 0,019mm. — 0,021mm. Latit. 0,019mm. — 0,021mm. (*Staurastrum globulatum*. Brebisson.)

Die Form A. habe ich in schwimmenden Conferven- und Zygneemen-Massen im Bischofssee bei Erlangen beobachtet. B. habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Didym. (*Staurastrum*) *minutissimum*. Auerswald. (Nr. 1428. der 43. und 44. Dekade der Alg. Europas.)

Cellula a fronte visa in medio utrimque subrepanda, non incisa, in sciagraphia rectangularis, anguli paulo producti;

cellula e vertice visa tetragona et pentagona (trigona?), margines laterales submarginati; articuli conjunctivi latitudo diametro transversali (summi dimidii latitudine) paulo angustior; diameter transversalis diametro longitudinali paulo brevior; membrana glabra.

Longit. 0,008mm.—0,012mm. Latit. 0,007mm — 0,008mm.

In der Umgegend von Erlangen an mehreren Orten beobachtet; im Reichsforste in mehreren Waldgräben, am Bischofssee. (Zuerst im Torfmoor des Hartthwaldes bei Leipzig von Auerswald entdeckt.)

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum in der Front gesehen, mit vom Scheitel gesehen fünfseitigen Hälften; aus dem Reichsforste; b. Scheitelansicht eines Individuums mit vierseitigen Hälften; c. Frontansicht eines Individuums mit vom Scheitel gesehen vierseitigen Hälften vom Bischofssee; d. Scheitelansicht eines Individuums mit fünfseitigen Hälften.

Didym. (Staurastrum) convergens. Ehrenberg. (*Arthrodesmus convergens.* Ehrenberg. Infusionsth. p. 152 Taf. 10. Fig. 18. Ralfs britt. Desmid. p. 118. Taf. 20. Fig. 3 Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 197. *Staurastrum convergens* Meneghini Synops. Desmid. p. 228. Alg. Europ. Nr. 1338. Nr. 1445. *Euastrum convergens.* Kützinger. Phycol. German. p. 136. (*Tetracanthium*) *convergens.* Naegeli Gattgen. einzell. Algen p. 113. Taf. 7. C. Fig. 1. *Staurastrum Dickiei* Ralfs brittish Desmidiaceae. p. 123. Taf. 21. Fig. 3.)

Formae.

A. *ellipticum.* *Dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica.* (*Arthrodesmus convergens.* Ehrenbg. *Staur. convergens* Menegh. *Euastrum convergens.* Naegeli)

B. *trigonum.* *Dimidia e vertice visa in sciagraphia trigona.* (*Staurastrum Dickiei.* Ralfs.) Die Dimensionen der Specim. beider Formen stimmen überein Länge (mit Ausschl. d. Stacheln) 0,034mm.—0,046mm: Breite (m. Ausschl. d. St) 0,034mm.—0,046mm. Länge der Stacheln 0,006mm.—0,015mm.

Bei der elliptischen Form finden sich, ganz ähnlich wie bei den elliptischen Formen von *Staur. muticum* und *orbiculare*, zwei Paare von Chlorophyllplatten, welche von dem in der Mitte gelagerten Chlorophyllkörperchen aus nach den seitlichen Polen laufen, bei einzelnen Individuen sind jedoch die Chlorophyllplatten wegen des dichten grünen Inhaltes nicht erkennbar, bei der dreiseitigen Form finden sich drei Paare central gestellter Chlorophyllplatten. Die Länge der Stacheln variiert sehr, öfters sind an ein und demselben Individuum die Stacheln ungleich lang, bei Individuen, welche sich eben getheilt haben, sind in der Regel die Stacheln der neugebildeten Hälfte kürzer als an der alten Hälfte, die Stacheln entwickeln sich erst später, nachdem die neugebildeten Hälften schon eine bestimmte Grösse erlangt haben. Das *Staur. Dickiei* Ralfs. ist mit dem *Arthrodesmus convergens* Ehrenb. ebenso verwandt wie bei *Staur. muticum* die elliptische Form mit der dreiseitigen

a beobachtete ich im Gebiete unter schwimmenden Confervenmassen im Bischofssee, in Gräben im Reichsforste und im Hauptmoorwald bei Bamberg, b. in einem kleinen Moortümpel am Donau-Mainkanale zwischen Erlangen und Bruck.

Didym. (Staurastr.) erlangense. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrimque emarginatura acutangula usque obtusangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente emarginata; dimidia a fronte visa elliptica usque fere trapezica dimidia e vertice visa trigona, anguli obtusi, in spinulam brevem acuminati, margines laterales recti aut leniter repandi; articuli conjunctivi latitudo triens (aut paulo magis) diametri transversalis, diameter transversalis diametro longitudinali aequalis (aut paulo longior); membrana glabra.

Formae.

a. Dimidia a fronte visa regulariter elliptica. Longit. 0,023mm. Latit. 0,023mm

b. Dimidia a fronte visa fere trapezica, margo terminalis subconvexus. Longit. 0,019mm.—0,023mm. Latit. 0,019mm.—0,023mm.

c. Dimidia a fronte visa trapezica, margo terminalis rectus aut subconvexus, angulorum spinulae sursum versae. Longit. 0,03mm. Latit. 0,023mm.

a. und b. finden sich in kleinen Sümpfen unter andern Desmidien in der „Solitude“ bei Erlangen; c. in einem Graben im Reichsforste.

Die Form c., welche ich nur in wenigen Exemplaren beobachtet habe, macht wahrscheinlich eine eigene Art aus.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XI. Fig. IV.

Fig. IV. a) Ein Individuum der Form c. in der Frontansicht; b. ein Individuum der Form a aus der „Solitude“ bei Erlangen; c. ein Individuum der Form b. von eben daher; d. Scheitelansicht dieses letzteren Individuums, die Inhaltsstruktur deutlich ausgeprägt, drei Paare von einem Centralkörperchen auslaufende Chlorophyllplatten, e. Scheitelansicht eines andern Individuums der Form c., die Chlorophyllplatten zum grössten Theile mit einander verwachsen, so dass der Chlorophyllkörper dreiseitig mit nur eingeschnittenen Ecken erscheint.

Didym. (Staurastr.) spinulosum. Brebisson. (Binatella tricuspida Brebisson. Alg. Fal. p. 57. Staurastrum cuspidatum Breb. Meneghini Synops. Desmid. p. 226. Ralfs. britt. Desmid. p. 122. Taf. 33. Fig. 10. Taf. 21. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 189. Phycastrum cuspidatum Kützinger. Phycol. German. p. 138. Phycastr. spinulosum. Naegeli. Gattigen. einzell. Alg. p. 125. Taf. 7. A. Fig. 2.)

Länge (m. A. d. St.) 0,023mm.—0,03mm. Breite 0,026mm.—0,03mm. Länge der Stacheln 0,014mm.

In kleinen Sümpfen in der „Solitude“ bei Erlangen.

Didym. (Staurastr.) dejectum. Brebisson.

Formae.

A. ellipticum. Dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, spinarum angulorum directio plerumque horizontalis. (Arthrodesmus Incus. Hassal. Staurastrum Incus Menegh.)

B. trigonum. Dimidia e vertice visa trigona, spinarum

angulorum directio plus minusve declinata (*Staurastrum dejectum*. Brebisson. *Staurastr. mucronatum*. α und γ Ralfs).

Länge (m. A. d. St.) 0,019mm. 0,03mm.

Breite (m. A. d. St.) 0,019mm.—0,03mm.

Länge der Stacheln 0,014mm.

Der Form A. sind folgende Synonyme einzureihen.

Cosmarium Incus Brebisson. Meneghini Synops. Desmid. *Staurastrum Incus*. Meneghini. Synops. Desmid. p. 228. *Euastrum retusum*. Kützing. Phycol. German. p. 136. *Arthrodesmus Incus*. Hassal. Britt. Freshw. Algae, p. 357. Ralfs british Desmid. p. 318. Taf. 20. Fig. 4. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 157. Alg. Eur. Nr. 1204. der 21. und 22. Dekade.

Der Form B. sind folgende Synonyme einzureihen.

Staurastrum mucronatum. α und γ Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v 15. pag. 152. Taf. 10. Fig. 5. *Staurastrum dejectum*. Brebisson (ex. p.) Meneghini Synops. Desmid. p. 227. Ralfs. britt. Desmid. p. 121. Taf. 20. Fig. 5. De Bary. Unters. über die Conjugaten. pag. 48. Taf. 6. Fig. 25—32. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 189.

Die Form a. findet sich im Gebiete seltener als die Form b. a. beobachtete ich in einigen Specim. in einem Desmidiengemenge von der „Solitude“ bei Erlangen und in einem Confervengemenge vom Reichsforste; b. in der „Solitude“, im Reichsforste, im Hauptsmoorwald bei Bamberg, in Altwässern der Regnitz.

Didym. (Staurast) erectum. P. Reinsch.

Diese Art enthält wie die vorige mehrere von den Autoren als verschiedene Arten unterschiedene Formen.

Cellula a fronte visa in medio utrimque acutangule usque obtusangule excisa; dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica usque rectangularia, articulo conjunctivo longiore non disjuncta, anguli obtusi aut acuminati, aculeo firmo sursum verso armati, aculei longitudo usque cellulae dimidii diametri transversalis dimidium et longior, dimidia e vertice visa trigona tetragona aut elliptica, margines laterales dimidiorum e vertice

visorum trigonorum leniter repandi aut recti, angulorum respondentium binorum alius supra alium positi; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis triens et paulo minus; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; membrana glabra.

Formae.

A. Dimidia a fronte visa in sciagraphia plus minusve regulariter rectangularia, dimidia incisura angustiore disjuncta, elliptica et trigona. Longit. 0,015 mm. — 0,028 mm. Latit. 0,015 mm. — 0,03 mm.

B. Dimidia a fronte visa in sciagraphia plus minusve trapezica, dimidia incisura acutangula disjuncta (45°), elliptica, trigona et tetragona.

Longit. 0,013 mm. — 0,03 mm. Latit. 0,013 mm. — 0,03 mm.

? C. Dimidia a fronte visa in sciagraphia fere rectangularia, dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua, trigona. Longit. 0,023 mm. Latit. 0,010 mm.

Im Gebiete in Gräben mit niedrigem stehenden Wasser und in kleinen Sümpfen, häufig mit einander vorkommend. „Solitude“, Reichsforst, Hauptmoorwald bei Bamberg.

Diesen drei Formen sind folgende von den Autoren unterschiedene Arten als synonym einzureichen.

(ex. p.) *Staurastrum dejectum*, Brebisson. Meneghini Synops. Desm. p. 227. Ralfs. the britt. Desmid. p. 121. Taf. 20. Fig. 5. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 189. Alg. Eur. Nr. 1429. 1443. 1407. 1327. stellen meistens Individuen der Form B. dar. *Arthrodesmus Incus*. Hassal. Britt. Freshw. Alg. p. 357. Ralfs. br. Desmid. p. 118. Taf. 20. Fig. a. b. d. stellen Individuen der Form A. dar. Nr. 1224. der 23. und 24. Dek. der Alg. Europas.

Didym. (Staurastrum) franconicum. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrimque plus minusve emarginata; dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica, usque rectangularia, anguli plus minusve producti usque cornuti sursum versi dimidia e vertice visa elliptica, trigona, tetragona et pentagona, margines laterales dimidiorum e vertice visorum polygonorum

emarginati, anguli bidentati; articuli conjunctivi latitudo diametro transversali (cornub. exclus.) paulo minor; diameter transversalis diametro longitudinali (cornub. exclus.) aequalis (aut paulo brevior); membrana glabra (aut cornua verruculosa).

Longit. (cornub. exclus.) 0,014mm.—0,017mm.

Latit. (cornub. exclus.) 0,011mm.—0,015mm.

Cornuum distantia 0,019mm.—0,03mm.

Formae.

A. Cellula a fronte visa in medio utrimque angulate emarginata, cornua glabra aut verruculosa; dimidia e vertice visa elliptica, trigona? tetragona, tentragona, pentagona

B. Cellula a fronte visa in medio utrimque elliptice emarginata, cornua glabra, dimidia e vertice visa trigona, tetragona.

In Gräben unter andern Desmidien, in der Umgegend von Erlangen an mehreren Orten.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XII. Fig. III.

Fig. III. a) Ein Individuum der Form B. mit vom Scheitel gesehen vierseitigen Hälften, von der „Solitude“ bei Erlangen; b) Vertikalansicht eines Individuums dieser Form; c) ein anderes Individuum der Form B. mit vom Scheitel gesehen vierseitigen Hälften von der Schleifmühle bei Erlangen; d) ein Individuum der Form A. mit vom Scheitel gesehen fünfseitigen Hälften, von der Schleifmühle bei Erlangen; e) Vertikalansicht desselben Individuums; f. ein Individuum der Form A. mit vom Scheitel gesehen elliptischen Hälften, von der Schleifmühle; g) Vertikalansicht desselben Individuums.

Didym. (Staurastr.) punctulatum. Brebisson. (Breb. in Ralfs. britt. Desmid. p. 133. Taf. 12. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 188. Alg. Eur. Nr. 1208. 1331. Staurastrum dilatatum. Ehrenberg Infus. p. 143. Taf. 10. Fig. 13. Meneghini Synops. Desmid. p. 156 Phycastrum dilatatum. Kützing Phycol. German. p. 138. Staurastr. tricornu. Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 15. 141. Taf. 11. Fig. 2. Staurastr. alternans. Ralfs. britt. Desmid. p. 132. Taf. 21. Fig. 7. Phycastrum striolatum. Naegeli.

Gattgen. einz. Alg. p. 125. Taf. 8. A. Fig. 3. Staurastr. rugulosum. Ralfs. britt. Desmid. p. 214. Taf. 35. Fig. 19).

F o r m a e .

A. minus. Longit. 0,023mm.—0,03mm. Latit. 0,022mm.—0,03mm.

α . trigonum. | anguli bini dimidiorum binorum su-
 β . tetragonum | perimpositi.

γ alternans. anguli bini dimidiorum binorum alternantes.
 (Staurastr. alternans. Ralfs.)

B. majus. Longit. 0,038mm.—0,046mm. Latit. 0,038mm.—0,042mm.

Die kleinere dreiseitige Form ist im Gebiete sehr verbreitet, die Form γ habe ich nur in der „Solitude“ bei Erlangen beobachtet. Die grössere Form ist in einigen Gräben am Rödelheimbache im Reichsforste nicht selten.

Didym. (Staurast.) asperum. Brebisson. (Ralfs. the british Desmid. p. 139. Taf. 12. Fig. 6. Nr. 1543. der 55. und 56. Dek. der Alg. Eur.)

F o r m a e .

A. minus. Longit. 0,03mm. Latit. 0,028mm.

α . dimidia regulariter elliptica extra articulum conjunctivum inter se non contigua.

β . dimidia extra articulum conjunctivum inter se contigua.

B. majus. Dimidia late ovato elliptica, extra articulum conjunctivum inter se contigua summum dimidium interdum truncatum.

Longit. 0,046mm.—0,054mm. Latit. 0,039mm.—0,042mm.

In Gräben im Reichsforste.

Didym. (Staurastrum) Meriani. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa utrimque non aut obtusangule emarginatum; dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica usque fere rectangularia, e vertice visa trigona, tetragona, pentagona aut hexagona, margines laterales recti aut leniter emarginati, anguli non producti rotundato obtusi, respondentium binorum alius supra alium positus; articuli conjunctivi latitudo diametro transversali paulo minor (interdum diametri transversalis dimi-

dium); diameter transversalis diametri longitudinalis duae partes; membrana dense verruculosa, verruculae in angulis in seriebus parallelis dispositae.

Longit. 0,037mm.—0,046mm. Latit. 0,018mm.—0,03mm.

Formae.

A. minus.

α. trigonum. dimidia e vertice visa trigona. Longit. 0,038mm. Latit. 0,019mm.—0,021mm

β. tetragonum. dimidia e vertice visa tetragona. Longit. 0,038mm Latit 0,019—0,022mm.

γ. pentagonum dimidia e vertice visa pentagona Longit. 0,039mm Latit. 0,019mm.—0,021mm.

B. majus.

α. tetragonum. dimidia e vertice visa tetragona. Longit. 0,046mm. Latit. 0,03mm.

β. pentagonum? (nondum observavi).

γ. hexagonum. dimidia e vertice visa hexagona. Longit. 0,046mm. Latit. 0,03mm.

Die kleineren Formen beobachtete ich in einem Graben und in kleinen Waldtümpeln (gemeinschaftlich mit der Eremosphaera viridis de Bary) am Fusse des Rathsberges bei Erlangen, die grösseren Formen am Bischofssee.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XII. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum der kleineren Form mit vom Scheitel gesehen im Umrisse dreiseitigen Hälften, die Seitenränder der Zelle mässig stumpfwinklich ausgerandet; b) Scheitelansicht eines Individuums derselben Form mit vierseitigen Hälften; c) Scheitelansicht eines Individuums mit dreiseitigen Hälften; d) Scheitelansicht eines Individuums mit fünfseitigen Hälften; e) Scheitelansicht eines etwas schmäleren Individuums mit vierseitigen Hälften.

Didym. (Staurastr.) Tigurinum. P. Reinsch.

(Staurastrum denticulatum. Naégeli Gattgen einzell. Algen. p. 182. Taf. 8. Fig. 3.)

Formae:

A. Dimidia a fronte visa in sciagraphia trapezica, anguli acuminati.

α . serrulatum. dimidiolum a fronte visorum margo terminalis spinulis serrulatus, anguli spina singula sursum versa armati, spinae longitudo diametri transversalis octava pars. Longit. 0,023mm.—0,05mm. Latit. 0,023mm. — 0,046mm.

β . inermes. dimidiolum anguli inermes, aculeti, margines denticulati. Longit. 0,034mm.—0,038mm. Latit. 0,034mm.

B. Dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, anguli rotundato obtusi, spina singula horizontali (interdum spinis binis) armati, spinarum longitudo diametri transversalis sexta pars, dimidiolum margines denticulati. Longit. 0,023mm. — 0,03mm. (Phycastrum denticulatum Naegeli).

Diese Formen beobachtete ich an verschiedenen Orten im Gebiete. Die Form B stellt die Nägelische Art dar, ich habe ungern den Namen, die Verwechslung mit einer anderen gleichlautenden älteren Art der Gattung Didymidium (Didym. Micrasterias denticulata Breb.) zu vermeiden, umändern müssen.

Didym. (Staurastr.) margaritaceum. Ehrenberg.

(Pentasterias margaritacea Ehrenb. Infus. p. 144. Taf. 10. Fig. 15. Staurastr. margaritaceum. Menegh. Synops. Desmid. p. 227. Ralfs. britt. Desm. p. 134. Taf. 21. Fig. 9. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 190. Alg. europ. Nr. 1209. 1212. 1328. 1434. 1543. Staurastr. dilatatum. Ehrenb. Infusionsth. p. 143. Taf. 10. Fig. 13. Menegh. Synops. Desmid. p. 156. Ralfs. br. Desmid. p. 133. Taf. 21. Fig. 8. Desmidium hexaceros Ehrenb. Infusionsth. p. 141. Taf. 10. Fig. 10. Staurastr. tricornue Menegh. Synops. Desmid. p. 225. Ralfs. britt. Desmid. p. 135. Taf. 12. Fig. 11. Taf. 25. Fig. 8. Phycastrum crenulatum. Naegeli. Gattgen. einzell. Alg. p. 129. Taf. 8. B)

Formae:

A. Cellula a fronte visa in medio utrimque obtusangule emarginata, dimidiolum anguli minus producti, inermes, diameter

transversalis tres partes usque quatuor quintae diametri longitudinalis; dimidia e vertice visa trigona? tetragona; pentagona; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis dimidium (aut paulo minus).

Longit. 0,03mm.—0,038mm

B. Cellula a fronte visa in medio utrimque rectangule aut semielliptice emarginata, dimidiorum anguli plus minusve producti, dimidia e vertice visa trigona, tetragona, pentagona, diameter transversalis diametro longitudinali aequalis (et paulo longior).

α. minimum. Dimidia e vertice visa trigona, margines laterales repandi. Longit. 0,015mm. Latit. 0,015mm.

β. intermedium. Dimidia e vertice visa tetragona et pentagona, margines laterales obtusangule emarginati, anguli inermes aut breviter bidentati. Longit. 0,021mm.—0,033mm.

γ. alternans. Dimidia e vertice visa trigona, margines laterales repandi, anguli recte versi aut paulo aversi, inermes aut breviter dentati, dimidiorum anguli respondentes alternantes. Longit. 0,023mm.—0,032mm. Latit. 0,027mm.—0,038mm.

δ. subglabrum. Dimidia e vertice visa pentagona, margines laterales repandi usque emarginati, anguli inermes; membrana subglabra. Longit. 0,023mm. Latit. 0,021mm.—0,023mm.

ε. decedens. Dimidia e vertice visa trigona, margines laterales recti, anguli non producti, breviter truncati, angulorum membrana verruculosa, dimidia a fronte visa regulariter elliptica; anguli paulo producti. Longit. 0,027mm. Latit. 0,034mm.

ζ. bidentatum. Dimidia a fronte et e vertice visa trigona, margines laterales repandi, denticulati, anguli paulo producti, bidentati, denticulorum longitudo anguli latitudine paulo minor. Longit. 0,027mm.—0,03mm.

η. margaritaceum. Dimidia e vertice visa trigona, tetragona, pentagona et hexagona, margines laterales plus minusve repandi aut emarginati, anguli inermes aut breviter denticulati. Longit. 0,03mm.—0,038mm. Latit. 0,03mm.—0,042mm.

S. radiatum. Dimidia e vertice visa trigona, tetragona et pentagona, margines laterales emarginati (dimidiorum pentagonalium usque rectangule excisi), Longit. 0,027mm -- 0,03mm. Latit. 0,027mm.—0,03mm.

Diese sämtlichen Formen kommen mit Ausnahme von *B. z* und *B. r.* im fränkischen Gebiete vor. (Ersteres findet sich in Nr. 1224. der 23. und 24. Dekade der Algen Europas. Wurzeln in Sachsen, letzteres in Nr. 1230. der Alg. Eur. Leipzig.)

In Bezug der bildlichen Darstellung der einzelnen hier unterschiedenen Formen des formenreichen *margaritaceum* muss ich auf mein Desmidiengewerk verweisen.

Didym (Staurastr.) paradoxum. Meyer. (Nova Acta Acad. Leop. Carol. vol. 14. p. 43. Taf. 37. 38. Meneghini Synops. Desmid. p. 227. Ralfs. britt. Desmid. p. 183. Taf. 23. Fig. 8. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 191. *Micrasterias Staurastrum*. Kützing. Synops. Diatom. p. 599. *Phycastrum paradoxum*. Kützing. Phycol. German. p. 138. *Goniocystis paradoxum*. Hassal. Britt. Freshw. Algae. p. 354. Diese Synonyme stellen die Formen B. und C. dar, die nachfolgenden gehören der Form A. an. *Micrasterias Staurastrum* und *Micrast. tetracera*. Kützing. Synops. Diatom. p. 599. Taf. 20. Fig. 83. *Staurastrum paradoxum* (Meyer.) Ehrenberg. Abhandl. der Berl. Acad. 1832. p. 314. Infusionsth. p. 143. Taf. 10. Fig. 14. *Staurastr. tetracerum*. Kützing. Ralfs. britt. Desm. p. 137. Taf. 23. Fig. 7. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 197. Alg. Eur. Nr. 1388. *Goniocystis tetracerum*. Hassal. britt. Freshw. Algae. p. 354.).

Länge (m. Ausschl. d. Forts.) 0,023mm.—0,03mm.

Breite (m. Ausschl. d. Forts.) 0,023mm.—0,03mm.

Länge der Fortsätze 0,009mm.—0,012mm.

Formae.

A. tetracerum. Dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, dimidia binis processibus in planitie jacentibus aut alternantibus instructa.

α . cruciforme. Dimidiorum processus in planitie jacentes.

β . alternans. Dimidiorum processus alternantes

B. trigonum. Dimidia e vertice visa in sciagraphia trigona.

C. tetragonum. Dimidia e vertice visa in sciagraphia tetragona.

D. mixtum. Ejusdem individui dimidia bi-et tricornuta aut tri-et quadricornuta.

Diese sämtlichen Formen sind im fränkischen Gebiete mit Ausnahme von A. β . und C. vertreten.

Die Specimina sind zwar an vielen Orten zu beobachten, aber immer nur vereinzelt.

Didym. (Staurastr.) polymorphum. Brebisson. (Ralfs. britt. Desmid. p. 135. Taf. 22. Fig. 9. Taf. 34. Fig. 9 Rabenh. Kryptog Sachs p. 192. Alg Europas Nr. 1430. der 43. und 44. Dekade *Staurastrum cyrtocerum.* Ralfs. britt. Desmid p. 139. Taf. 22. Fig. 10 *Staurastr. asperum.* β . proboscidium. (Brebisson) Ralfs. britt. Desmid. p. 139. Taf. 23. Fig. 12.).

Länge 0,034mm.—0,046mm.

Breite (Entfernung der Ecken) 0,034mm.—0,05mm.

Länge der strahlförmigen Fortsätze 0,009mm.—0,014mm.

Formae.

α . trigonum. Dimidia e vertice visa trigona, margines laterales leniter emarginati, anguli recte versi aut omnes in eodem latere curvati, bini respondentes saepe alternantes Longit. 0,038mm —0,036mm. (*Staurastrum cyrtocerum.* Brebisson).

β . tetragonum.

γ . pentagonum.

δ . hexagonum.

ϵ . heptagonum.

Diese sämtlichen Formen kommen mit Ausnahme von β . an einer Stelle im Reichsforste in einem beschatteten Waldgraben mit humoser Unterlage in dem Forstorte Rehbock reich-

lich vor, von welcher Lokalität ich dieselben mit dem *Micrasterias angulosa* unter Nr. 1430. der 43. und 44. Dekade der Algen Europas mitgetheilt habe. Die Form β . habe ich noch an einigen andern Orten in einzelnen Specimen beobachtet.

Didym. (Staurastr.) sexcostatum. Brebisson. (Meneghini. Synops. Desmid. p. 228. Ralfs britt. Desmid. p. 129. Taf. 23. Fig. 5. *Staurastrum Jenneri*. Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 15. p. 158. *Goniocystis Jenneri*. Hassal. Britt. Freshw. Alg. p. 194).

Länge 0,036mm.—0,038mm. Breite 0,026mm.—0,028mm.

Diese, wie es scheint sehr konstante Art, beobachtete ich an einem einzigen Orte im Gebiete, einem moorigen Waldgraben im Reichsforste, in Individuen mit konstant sechsstrahligen Hälften, die genau mit der guten Ralfs'schen Abbildung übereinstimmen, wie auch in den von Ralfs für die englischen Specimina angegebenen Dimensionen (Länge $\frac{1}{861}$ engl. Zoll = 0,038mm. Breite $\frac{1}{883}$ — $\frac{1}{894}$ engl. Zoll = 0,03mm.—0,038mm.), der Werth für die Längendimensionen ist von Ralfs ein wenig höher angegeben, während in der Abbildung dasselbe relative Verhältniss zwischen Länge und Breite sich darstellt.

Didym. (Staurastr.) gracile. Ralfs (britt. Desmid. p. 136. Taf. 22. Fig. 12. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 192. *Trigonocystis gracilis*. Hassal. Britt. Freshw. Algae. p. 352. *Staurastr. gracile. var. bicornis*. Bulnheim. Nr. 1224. der 23. und 24. Dekade der Alg. Eur.).

Formae.

A. *bicornis*. Dimidia e vertice visa in sciagraphia elliptica, poli subito producti et prolongati, corporis crassitudo angulorum distantiae triens. Longit. 0,03mm. 0,036mm. Latit. 0,054mm — 0,061mm. (*Staur. gracile. var. bicornis*. Bulnheim.) Wurzeln in Sachsen.

B. *tricornis*. Dimidia e vertice visa in sciagraphia trigona, anguli subito producti et prolongati, margines laterales repandi, prolongationes radii gracillimae. Longit. et Latit. dimensiones ut var. *bicornis*.

Im Gebiete habe ich bis jetzt nur die Form B. beobachtet.
Reichsforst, am Bischofssee, in Altwässern der Regnitz.

Didym. (Staurastr.) Naegelianum. P. Reinsch.

(Staurastr. cristatum Naegeli. Gattgen einzell. Alg. p. 127.
Taf. 8. c. Fig. 1.)

Länge der fränkischen Specimina 0,038mm.—0,042mm.
Breite 0,038mm.—0,04mm.

Diese von mir im Gebiete nur an einer Stelle beobachtete
Art scheint nicht zu variiren, da die fränkischen Specimina
genu mit den bei Naegeli abgebildeten schweizerischen über-
einstimmen.

In einem kleinen Sumpfe in einer Wiese am Donau-
Mainkanale zwischen Erlangen und Bruck. Es musste der
Speciesnamen, die Verwechslung mit einer anderen gleich-
lautenden Art der Gattung Didymidium (Xanthidium cristatum.
Brébisson) zu vermeiden, umgeändert werden

Staurastr. Avicula Brébisson. (Ralfs. britt. Desm. p. 140
Taf. 23. Fig. 11. habe ich noch nicht im Gebiete beobachtet.

Didym. (Staurastr.) vestitum. Ralfs. (brittish Desmid.
p. 143. Taf. 23. Fig. 1. Rabenh Kryptog. Sachs. p. 193. Alg.
Europas Nr 1444.)

Formae.

A. Dimidiorum e vertice visorum margines laterales in
medio spinis binis longioribus armati.

B. Dimidiorum e vertice visorum margines laterales spinis
firmis longioribus spinisque brevioribus interdum dimidiorum su-
perficiem totam obruentibus armati.

Länge 0,038mm.—0,046mm. Breite 0,065mm.—0,073mm.

Die Form A. findet sich in Gräben im Reichsforste und
in Altwässern der Regnitz, die Form B., welche sich in Nr.
1224. der 23. und 24. Dekade der Algen Europas mit der
Form A. vorfindet, habe ich im fränkischen Gebiete noch nicht
beobachtet.

Die Ralfs'sche Art ist aus beiden Formen zusammen-
gesetzt.

Didym. (Staurast.) Renardii. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrimque acutangule aut rectangule emarginata, dimidia a fronte visa in sciagraphia elliptica usque fere trapezica, anguli non producti, anguli laterales et superiores spina singula firma breviter truncata bidendata glabra aut crenulata armati; dimidia e vertice visa trigona, margines laterales recti aut subconvexi, spinis binis firmis (ut descript.) ab angulis aequè distantibus armati, anguli obtusi spina singula (descripta) armati; spinarum longitudo diametri transversalis duae quintae; diameter transversalis (spin. excl.) diametro longitudinali aequalis; membrana glabra.

Longit. 0,019mm.—0,028mm. Latit 0,019mm.—0,028mm.

Formae.

Dimidiorum a fronte visorum margines laterales spinis binis ab angulis aequè distantibus armati.

B. Dimidiorum a fronte visorum margines laterales spinis binis non regulariter alteris ab altero distantibus armati.

Die erstere Form am Bischofssee, im Reichsforste an mehreren Orten beobachtet, die Form B. nur in wenigen Specim. beobachtet; erstere beobachtete ich auch in zwei in der europäischen Algensammlung enthaltenen Präparaten (Nr. 1224. der 23. und 24. Dekade, Nr. 1428. der 43. und 44. Dekade).

Erklärung der Abbildungen auf Taf. VII. Fig. IX.

Fig. IX. a) Ein Individuum der Form A. aus einem Graben im Reichsforste, die Stacheln kaum so lang als breit; b) Scheitelaussicht eines Individuums derselben Form von ebendaher.

Didym. (Staurastrum) spinosum. Brebisson. (Balls. britt. Desmid. p. 143. Taf. 22. Fig. 8. Algen Europ. Nr. 1407. der 41. und 42. Dekade, Nr. 1230. der 23. und 24. Dekade.

Länge 0,03mm.—0,046mm. Breite 0,023mm.—0,046mm.

Länge der Stacheln 0,006mm.—0,008mm.

In Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf, im Reichsforste, im Hauptmoorwald bei Bamberg.

Didym. (Staurast.) *Pseudofurcigerum*. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrimque acutangule excisa, dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, anguli laterales paulo producti et spina singula firma bidentata denticulata armati, margo superior ad spectatoris oculum adversus spinis binis (ut descript.) armatus; dimidia e vertice visa trigona, margines laterales recti, anguli paulo producti, spina singula (ut descripta) armati, margines laterales spinis binis (ut descript., ab angulis aequae distantibus paulo introrsum positis armati, angulorum respondentium binorum alius supra alium positus; spinarum longitudo diametri longitudinalis aut transversalis (spin. exclus.) triens et paulo minus, spinarum latitudo latitudinis sexta usque quarta pars; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis (spin. inclus.) quinta pars, diametri longitudinalis (spin. exclus.) triens; diameter transversalis (et spin. excl. et incl.) diametro longitudinali aequalis; membrana glabra.

Longit. (spin. excl.) 0,042mm—0,046mm.

Latit. (spin. excl.) 0,038mm.—0,043mm.

spinarum longitudo 0,013mm.—0,015mm.

spinarum latitudo 0,004mm.

Am Dechsendorfer See, in einem sumpfigen Weiherchen zwischen Herzogenaaurach und Frauenaaurach.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XI. Fig. II.

Fig. II. a) Ein Individuum in der Frontansicht, von den beiden Hälften sind dem Beschauer alle drei Ecken zugewendet, von jedem Stachelpaar je einer Ecke ist dem Beschauer nur ein einziger Stachel zugewendet; b. Vertikalansicht dieses Individuums, die Inhaltsstruktur deutlich erkennbar, die drei Paare der Chlorophyllplatten etwas bogig nach den Ecken eingekrümmt, die Stacheln der Paare der Ecken ragen über die Seitenränder der Hälften hinaus; c. die leere Hälfte eines abgestorbenen Individuums von der untern Seite betrachtet,

in Altwässern der Regnitz bei Forchheim, in einem Waldgraben beim Wildbade im Burghornheimer Forste.

Didym. (Staurast.) hirsutum. Ehrenberg (Abhandl. der Berl. Acad. 1833. p. 318. Infusionsth. p. 318. Taf. 10. Fig. 22. Meneghini Synops. Desmid. p. 234. Robenh. Kryptog. Deutschl. p. 55. Kryptog. Sachs. p. 190. Alg. Europas Nr. 1269. 1282. 1543. 1445. Ralfs britt. Desmid. p. 127. Taf. 22. Fig. 3. *Binatella hispida*. Breb. Alg. Falaise p. 58. Taf. 8. *Xanthidium pilosum*. Ehrenb. Ber. d. Berl. Acad. 1836. *Staurastrum truncatum* Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 15. p. 154.).

Formae:

A. minus.

α. *Dimidia* a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, incisura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta. Longit. 0,27mm. Latit. 0,027mm.

β. *Dimidia* a fronte visa in sciagraphia usque fere semicircularia (interdum paulo truncata), extra articulum conjunctivum inter se contigua. Longit. 0,027mm.—0,03mm. Latit. 0,027mm.—0,03mm.

B. majus.

α. *Dimidia* a fronte in sciagraphia regulariter elliptica, incisura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta. Longit. 0,039mm.—0,042mm. Latit. 0,03mm.—0,042mm.

? β. *Dimidia* a fronte visa in sciagraphia irregulariter elliptica, incisura rectangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta. Longit. 0,038mm. Latit. 0,034mm.

γ. *Dimidia* a fronte visa in sciagraphia usque fere semicircularia, extra articulum conjunctivum inter se contigua. Longit. 0,042mm.—0,05mm. Latit. 0,038mm.—0,042mm.

Diese sämtlichen Formen sind im fränkischen Florengebiete vertreten.

Didym. (Staurastr.) Pringsheimii, P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa emarginatura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente utrimque in medio dis-

juncta aut extra articulum conjunctivum inter se contigua, in sciagraphia plus minusve regulariter elliptica usque fere semicircularia, anguli non producti, rotundato obtusi; dimidia e vertice visa elliptica, trigona, (tetragona?) margines laterales recti aut subconvexi, anguli rotundato obtusi; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis (spin. exclus.) triens; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; dimidiorum membrana tota spinis firmis truncatis non regulariter dispositis plus minusve dense armata.

Formae:

A. minus.

α . ellipticum. Dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, incisura angustiore usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta; dimidia e vertice visa regulariter elliptica; corporis crassitudo diametri transversalis dimidium. Longit. 0,038mm. Latit. 0,038mm.

β . trigonum. Dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, incisura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta; dimidia e vertice visa trigona. Longit. 0,046mm. — 0,05mm. Latit. 0,045mm. — 0,047mm.

B. franconicum. Dimidia a fronte visa in sciagraphia plus minusve regulariter elliptica, incisura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente disjuncta; dimidia e vertice visa trigona.

Longit. (spin. exclus.) 0,065mm. — 0,069mm.

Latit (spin. exclus.) 0,061mm. — 0,064mm.

Spinarum longitudo 0,008mm.

? C. subcordatum. Dimidia a fronte visa in sciagraphia late cordata usque fere semicircularia, extra articulum conjunctivum inter se contigua. Longit. (spin. exclus.) 0,061mm. Latit. (spin. exclus.) 0,051mm. spinarum longitudo 0,006mm.

Die kleinere Form α beobachtete ich in einem Graben am Rödelheimbache im Reichsforst, die kleinere Form ? in Gräben im Reichsforste bei Kalkreuth, am Bischofssee. Die

Form B. beobachtete ich zuerst in einem humosen Wiesen-graben am Kosbacher Weiher bei Erlangen ziemlich reichlich, hierauf in vereinzelt Specim. noch an mehreren anderen Orten (Altwässer der Regnitz, Hauptsmoorwald bei Bamberg); die für die Art etwas zweifelhafte Form C. beobachtete ich nur in ganz wenigen Specim. an zwei Orten, am Kosbacher Weiher und im Reichsforste.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. X. Fig. IV.

Fig. IV. a) Ein Individuum der Form B. vom Kosbacher Weiher, die beiden Hälften durch einen spitzwinklichen Ausschnitt von einander getrennt; b) Vertikalansicht desselben Individuums, die Seitenränder gerade, die Inhaltsstruktur der Hälften nicht deutlich erkennbar.

Didym. (Staurastr.) Ungeri. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrinque emarginatura acutangula usque ad articulum conjunctivum se pertinente excisa, dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter elliptica, anguli rotundato obtusi, spina singula firma horizontali aut paulo deorsum versa, spinis ceteris ter usque quater longiore armati; dimidia e vertice visa trigona et tetragona, margines laterales recti aut subrepandi, anguli rotundato obtusi, spina singula armati; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis triens et paulo magis; diameter transversalis diametro longitudinali aequalis; dimidiorum membrana tota spinulis breviter conoideis non regulariter dispositis dense obteeta, angulorum spinae longioris longitudo diametri transversalis triens usque quadrans, spinularum ceterum longitudine ter usque quater major.

Formae.

α . trigonum Longit. 0,027 mm. Latit. 0,027 mm. angulorum spinae longitudo 0,008 mm.

β . tetragonum Longit. 0,028 mm. Latit. 0,028 mm. angulorum spinae longitudo 0,008 mm.

Die beiden Formen befinden sich am Kosbacher Weiher, im Reichsforste, in Altwässern der Regnitz bei Forchheim.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XI. Fig. III.

Fig. III. a) Ein Individuum der Form α . aus einem Altwasser der Regnitz bei Forchheim, bei diesem Individuum befindet sich oberhalb des grossen Stachels der Ecken noch ein nach aufwärts gerichteter kleinerer Stachel; b. Scheitelansicht desselben Individuums; c. Scheitelansicht eines Individuums der Form β . aus einem Waldgraben im Reichsforste.

Didym. (Staurastr.) spongiosum. Brebisson. (Meneghini Synops. Desmid. p. 229. Ralfs. britt. Desmid. p. 141. Taf. 23. Fig. 4. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 193. Alg. Europ. Nr. 1328. der 33. und 34. Dekade. Desmidium ramosum. Ehrenberg. Verbreit. Taf. 4. Fig. 21. Phycastrum Griffithsianum. Gattgen. einzell. Algen. p. 127. 128. Taf. 8. C. Fig. 2.).

Länge 0,046mm.—0,061mm. Breite 0,046mm. 0.054mm

In Gräben am und im Reichsforste bei Puckenhof, am Dechsendorfer See unter schwimmenden Confervenmassen.

Didym. (Staurastr.) Sancti Sebaldi. P. Reinsch.

Cellula a fronte visa in medio utrinque semielliptice emarginata, dimidia a fronte visa in sciagraphia truncato obconica usque fere trapezica, anguli exteriores sensim angustati et paulo producti, breviter truncati, tri-quadridentati, margo terminalis in medio subconvexus utrinque subdeclinatus, angulorum exteriorum distantia cellulae dimidii inferioris partis latitudinis duae quintae, margines laterales et margo terminalis et dimidiorum superficies aculeis firmis armati, anguli exteriores verrucis in seriebus transversis parallelis dispositis exasperati, marginis terminalis spinae bi-tridentatae, superficieis marginumque lateralium integerrimae; dimidia e vertice visa trigona, lineae laterales rectae, spinis integerrimis armatae, anguli subito angustati et in processum breviter truncatum verrucis in seriebus transversis parallelis dispositis exasperatum prolongati, marginum lateralium spinae bi- aut tridentatae in seriebus binis (interdum singula) lineis lateralibus parallelis dispositae; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis (angulorum exteriorum distantiae) triens et paulo minus; diameter transversalis diametro

longitudinali aequalis et paulo longior; spinarum longitudo diametri transversalis 10 a usque 12 a pars

Longit. 0,073mm.—0,076mm. Latit. 0,069mm.—0,076mm. Spinarum longit. 0,006mm.

In Waldgräben im Seballdorste bei Puckenhof, Kalkreuth, am Bischofssee.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XI. Fig. I.

Fig. I. a) Ein Individuum vom Reichsdorste, in einer Lage gezeichnet, in welcher von jeder Hälfte dem Beschauer nur je zwei Ecken der Hälften zugewendet sind (Länge 0,074mm. Breite 0,07mm); b. Vertikalausicht eines Individuums von ebendaher, der mittlere Theil der Hälfte glatt und wehrlos, der breiten zweizähligen Stacheln eine einzige Reihe auf jeder Seite der Hälfte.

Didym. (Staurastr.) aculeatum. Ehrenberg. Infusionsth. p. 143. Taf. X. Fig. 12. Ralfs. britt. Desmid. p. 142. Taf. 23. Fig. 2. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 194. Algen Europas Nr. 1224. 1407. Meneghini Synops. Desmid. p. 226. Phycastrum aculeatum. Kützing. Phycol. Germ. p. 138. Staurastrum controversum. Meneghini Synops. Desmid. p. 228. Ralfs. britt. Desmid. p. 141. Taf. 23. Fig. 2. Algen Europas Nr. 1430).

Formae.

I. Spinae omnes aequaliter longae, dimidiorum anguli respondentea superimpositi.

A. trigonum.

α. minus. Dimidia e vertice visa trigona, diameter transversalis (spin. exclus.) diametro longitudinali (spin. exclus.) paulo brevior. Longit. (spin. exclus.) 0,03mm — 0,038mm. Latit. (spin. exclus.) 0,042mm. — 0,054mm. spinarum longit. 0,006mm.

β. majus. Dimidia e vertice visa trigona, diameter transversalis (sp. excl.) diametro longitudinali (sp. excl.) aequalis. Longit. (spin. excl.) 0,069mm. Latit. (spin. excl.) 0,07mm. spinarum longit. 0,009mm.

B. tetragonum.

Dimidia e vertice visa tetragona, diameter transversalis (spin. exclus.) diametro longitudinali (sp. excl.) aequalis.

Longit. (spin. exclus.) 0,034mm — 0,038mm.

Latit (spin. exclus.) 0,034mm — 0,038mm.

Spinarum longit. 0,007mm.

C. pentagonum. teste Ralfs.

II. Spinae omnes aequaliter longae; dimidiorum anguli respondentes non superimpositi (magis minusve alternantes). Longit. 0,032mm. — 0,038mm. Latit 0,046mm. (Staurationum controversum Brebisson).

III. Braunii. Spinarum longitudo inaequalis, dimidiorum marginum terminalium spinae longiores; dimidiorum anguli respondentes superimpositi.

α . minus. Longit. 0,023mm. — 0,025mm. Latit. 0,023mm.

β . majus. Longit. (spin. exclus.) 0,016mm. Latit. (spin. exclus.) 0,046mm.

Ausser den Formen A α . und II. kommen die sämtlichen hier unterschiedenen Formen im Gebiete vor.

In kleinen stehenden Wassern und Gräben unter andern Desmidiën.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XII Fig II.

Fig. II. a) Ein Individuum der Form A α . aus einem Graben im Reichsforste, die Ecken wenig vorgezogen und zweizählig, die längeren zweizähligen Stacheln der Terminalränder über die Ränder hinausragend (Länge 0,024mm. Breite 0,023mm.); b. Vertikalansicht eines Individuums derselben Form, mit vierseitigen Hälften, die vier Ecken ein wenig vorgezogen.

Disphinctium Naegeli.

Disphinct Thwaitesii. Ralfs. (Cosmarium Thwaitesii. Ralfs. britt. Desmid. p. 109. Taf 17. Fig. 8. Rabenh Kryptog. Sachs. 202. Alg. Europas Nr 170: der 70. und 71. Dekade.)

Länge 0,1mm.—0,104mm. Breite 0,037mm.—0,046mm.
Dicke 0,034mm.

In einem Graben im Reichsforste in mehreren Specim. beobachtet.

Disphinct. curtum. Brebisson. (*Cosmar. curtum.* Ralfs. britt. Desmid. p. 109. Taf. 32. Fig. 9.) habe ich im fränkischen Gebiete noch nicht beobachtet.

Disphinct. n. sp.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia semielliptica ad polum rotundatum paulo angustata, sulco non profundo disjuncta, dimidia e vertice visa circularia; diameter transversalis diametri longitudinalis duae quintae; membrana glabra; dimidiorum interanea corpusculo chlorophyllaceo singulo laminisque aut vittis chlorophyllaceis radialiter regulariter dispositis octonis instructa.

Longit. 0,106mm.—0,108mm. Latit. 0,038mm.—0,04mm.

In Gräben am Bischofssee.

Disphinct. connatum. Brebisson. (*Cosmarium connatum* Brebisson. Ralfs. britt. Desmid. p. 108. Taf. 17. Fig. 10. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 202. *Disphinctium Meneghinianum.* Naegeli Gattgen. einzell. Algen. p. 112. Taf. 6. G. Fig. 2.)

Länge 0,065mm.—0,076mm. Breite 0,046mm.—0,054mm
Dicke 0,038mm.—0,042mm.

In stehenden Wassern an der Regnitz bei Forchheim und Baiersdorf.

Disphinct. cucurbita. Brebisson. (*Cosmarium cucurbita.* Desmid. Algen Falaise Nr. 1103. Ralfs. british Desmid. p. 367. Taf. 17. Fig. 7. *Cosmarium clandestinum.* Kützing. Phycol. German. p. 132. *Cosmarium globosum.* Bulnheim. Hedwigia. Nr. 1X. Taf. 9. Fig. 8. Alg. Europ. Nr. 1223. der 23. und 24. Dekade).

Formae:

A. *Dimidia* a fronte visa usque fere semicircularia, sulco non profundo disjuncta, dimidia e vertice visa circularia, diameter

transversalis diametri longitudinalis tres quintae. Longit. 0,03mm. —0,088mm. Latit. 0,019mm. —0,023mm. (*Cosmarium globosum* Bulnheim).

B. Dimidia a fronte visa in sciagraphia semiovato elliptica, interdum paulo truncata, sulco non profundo disjuncta, dimidia e vertice visa circularia; diameter transversalis diametri longitudinalis dimidium aut paulo minus.

2. minus. Longit. 0,03mm. —0,038mm. Latit. 0,015mm. 0,017mm.

3. majus. Longit. 0,052mm. —0,054mm. Latit. 0,023mm. —0,026mm.

(*Cosmarium cucurbita* Brebisson).

Von diesen beiden Formen kommt im Gebiete nur B. vor, die kleinere Form von B. ist sehr häufig und beinahe ganz rein in einem tiefen Waldgraben bei der Schleifmühle bei Erlangen, in vereinzelt Specim. beobachtete ich dieselbe an verschiedenen anderen Orten; die grössere Form von B. kommt ebenfalls in einem Graben bei der Schleifmühle vor, jedoch seltener.

Disphinct. striolatum. Naegeli (Gattungen einzelner Algen. p. 112. Taf. 6. G. Fig. 1.)

Länge 0,13mm. Breite 0,069mm.

In einem kleinen Sumpfe in einer Wiese am Donau-Mainkanale zwischen Erlangen und Bruck. Die Inhaltsstruktur war bei allen von mir untersuchten fränkischen Specim. nicht zu erkennen.

Disphinct. turgidum. Brebisson. (*Cosmarium turgidum*. Ralfs. britt. Desmid. p. 110. Taf. 32. Fig. 8. *Pleurotaenium turgidum*. De Bary. Unters. über die Conjug. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 177.)

Formae.

a. minus. Longit. 0,13mm. Latit. 0,061mm.

b. majus. Longit. 0,176mm. —0,182mm. Latit. 0,076mm. —0,092mm.

Die erstere Form am Dechsendorfer See, in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf, die zweite häufigere Form ebenda sowie im Hauptmoorwald bei Bamberg in Moortümpeln, am Donau-Mainkanale bei Bruck.

Disphinct. moniliforme. Turpin. (Tessarthis moniliformis. Turpin. Dictionn. des sc. natur. 1820. Taf. 7. Fig. 1. Tessarthis moniliformis. Ehrenberg. Infusionsth. p. 145. Taf. 10. Fig. 20. Cosmarium moniliforme. Ralfs. british Desmid. p. 107. Taf. 17. Fig. 6 Alg. Europas Nr. 1443. der 45. und 46. Dekade).

Formae.

A. Cellula a fronte visa in medio utrimque emarginatura obusangula emarginata; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis duae partes.

Longit. 0,021mm.—0,023mm. Latit. 0,013mm.—0,015mm.

α . Dimidia a fronte visa in summo paulo truncata, in sciagraphia fere elliptica.

β . Dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter circularia.

B. Cellula a fronte visa in medio utrimque emarginatura acutangula emarginata, dimidia a fronte visa in sciagraphia regulariter circularia; articuli conjunctivi latitudo diametri transversalis dimidium usque duae partes. Longit. 0,03mm.—0,031mm. Latit. 0,015mm.—0,021mm. (Cosmarium moniliforme Turpin).

Diese Formen, von denen B. die typische moniliforme darstellt, sind sämtlich in Franken vertreten. A. α . in Tümpeln von Donau-Mainkanale bei Bruck, A. β . ebenda und dem Bishopssee, B. ausser diesen auch noch im Hauptmoorwald bei Bamberg, in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf und Oberndorf beobachtet. Die Zellchen der Form B. sind gewöhnlich mit einer dicken glashellen Hülle umkleidet.

Das Disphinct. pluviale. Brebisson (Cosmar. pluviale Breb.

Nr. 1242. der 64. und 65. Dekade der Algen Europas) habe ich in Franken noch nicht beobachtet, ebenso noch nicht das *Disphinct. orbiculatum*. Ralfs. (*Cosmar. orbiculatum*. britt. Desm. p. 107. Taf. 17 Fig. 5.)

Disphinct. annulatum. Naegeli. (Gattungen einzell. Algen p. 3. Taf. VI. F.)

Dem *Cosmar* (*Disphinct.*) *cylindricum*. Ralfs ähnlich aber durch die zerstreut stehenden kleineren Warzen, durch die nicht rektangulären Hälften in der Frontansicht unterschieden.

Länge 0,054mm. Breite 0,025mm.

Am Bischofssee. im Reichsforste

? *Disphinct. cylindricum*. Brebisson. (*Cosmarium cylindricum*. Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 14. p. 392. britt. Desm. Taf. 17. Fig. 4.)

Länge 0,03mm. — 0,038mm. Breite 0,023mm.

Von dieser Form ist es mir noch nicht ganz sicher, ob dieselbe mit der bei Ralfs abgebildeten identisch sei. Die Hälften von der Front gesehen im Umriss rektangulär, die Seitenränder bei manchen Specim nach innen ein wenig konvergierend, die Hälften vom Scheitel gesehen undeutlich sechseckig, die ganze Oberfläche der Zellchen mit zerstreut stehenden Wörzchen besetzt, der Querdurchmesser $\frac{3}{4}$ bis $\frac{3}{5}$ des Längendurchmessers der Zelle.

In Gräben und kleinen Sümpfen in der „Solitude“ bei Erlangen, am Bischofssee.

Tetmemorus. Ralfs. (Ann. of Nat. Hist. v. 14)

Tetmem. granulatus. Brebisson (Ralfs Ann. of Nat. Hist. v. 14 Taf. 8. Fig. 2 Ralfs. britt. Desmid. p. 378. Taf. 24. Fig. 2. Rabenhorst Kryptog. Sachs p. 175 Alg Europ Nr. 1407. 1434. 1223. *Closterium granulatum* Meneghini Synops Desmid p. 246. Kützing. Phycol. Germ. p. 132)

Länge 0,117mm.—0,2mm. Breite 0,027mm.—0,046mm.

In Franken ziemlich verbreitet Immer in Waldgräben. Reichsforst an vielen Orten, Hauptmoorwald bei Bamberg, am Bischofssee.

Tetmemorus Brebissonii, Meneghini. (*Closterium Brebissonii* Menegh. Synops. Desmid. p. 236. *Tetmemor. granulatus* Ralfs. Britt. Desmid. p. 145. Taf. 24. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 175. Alg. Europas Nr. 1430. der 43. und 44. Dekade).

Formae

A. Articuli conjunctivi latitudo quatuor quintae diametri transversalis.

B. Articuli conjunctivi latitudo tres partes diametri transversalis. (*Tetmemor. Brebissonii*. β . *turgidus*. Ralfs) Longit. 0.156mm—0.2mm. Latit. 0.038mm.—0.05mm. Fissurae profunditas. 0.008mm.

A am Bischofssee, im Reichsforste, B. im Reichsforste, im Hauptsmoorwald bei Bamberg.

Tetmemor. laevis. Kützing. (*Closterium laeve*. Kützing. Phycol. German. p. 132. *Tetmemor granulatus* Ralfs (ex. p.) Ann. of Nat. Hist. v. 14. Taf. 8. Fig. 2. *Tetmemorus laevis* Ralfs. british Desmid. p. 146. Taf. 24. Fig. 3. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 175.)

Länge 0,46mm—0,076mm. Breite 0,019mm.—0,023mm.

Im Reichsforste an mehreren Orten beobachtet, am Bischofssee.

Docidium. Brebisson. (Alg. Falaise).

Docid Trabecula. Ehrenberg. (Abhandl. der Berlin. Acad. 1830. p. 62. Infusionsth. p. 93. Taf. 6. Fig. 2. Meneghini Synops. Desmid. p. 235. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 176. *Docidium Ehrenbergii*. Ralfs. britt. Desmid. p. 157. Taf. 26. Fig. 4. Taf. 33. Fig. 4. Alg. Europas Nr. 1407. 1443. 1224. 1367. 1414. *Pleurotaenium Trabecula* Naegeli. Gattgen. einzell. Alg. p. 104. Taf. 6. A. *Closterium truncatum*. Kützing. Phycol. German. p. 133. *Docidium clavatum*. Kützing. Ralfs. britt. Desmid. p. 156. Taf. 26. Fig. 3.)

Formae.

A. *Ehrenbergii*. Dimidia a fronte visa perfecte cylindrica, sulci fundus sine prominentia circum cellulam ducta, summa dimidia truncata aut rotundata, sine tuberculis (*Docidium Ehrenbergii*. Ralfs).

α . minus. Longit. 0,216mm.—0,231mm. Latit. 0,017mm.—0,023mm.

β . majus. Longit. 0,269mm.—0,315mm. Latit. 0,015mm.—0,023mm.

B. *clavatum*. Dimidia a fronte visa ad summum paulo incrassata, sulci fundus plerumque prominentia annuliformi circum corpus ducta instructus, summa dimidia truncata sine tuberculis; membrana punctulata.

Longit. 0,492mm.—0,538mm. Latit. 0,046mm.—0,065mm. (*Docidium clavatum*. Kützinger. Ralfs.)

C. *coronatum*. Dimidia a fronte visa ad summum paulo incrassata, sulci fundus prominentia annuliformi circum corpus ducta instructus, summa dimidia truncata, tuberculorum verruciformium serie singula (16mm. 20mm.) instructa; membrana glabra aut punctulata. Longit. 0,462mm.—0,402mm.

Diese Formen kommen sämtlich im fränkischen Gebiete vor. A. ist in Waldgräben ziemlich häufig zu beobachten, Reichsforst, in Altwässern der Regnitz, B. und C. sind seltener, am Bischofssee beobachtet, C. nur in wenigen Specim. beobachtet.

Docid. truncatum. Brebisson. (Ralfs, british Desmid. p. 156. Taf. 26. Fig. 2. Alg. Europas Nr. 1443 1444. 1445. 1506. *Closterium truncatum*. Meneghini Synops. Desmid. p. 235.)

Länge 0,352mm.—0,368mm. Breite 0,076mm.—0,085mm.

Am Bischofssee, in Altwässern der Regnitz bei Oberndorf, Forchheim, Bamberg.

Die kleinste Art der Gattung *Doc. minutum*. Ralfs (britt. Desmid. p. 158. Taf. 26. Fig. 5.) deren Dimensionen nach in Nr. 1388. der 39. und 40. Dekade der Algen Europas enthaltenen Specimin. von Falaise gemessen, in der Länge 00,92mm.

0,117mm., in der Breite 0,009mm. — 0,013mm. betragen, habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Docid. maximum. P. Reinsch.

Dimidia a fronte visa in sciagraphia cylindrica, sulci fundus prominentia annuliformi circum corpus ducta instructus, sulci margines exteriores volvati; diameter transversalis diametri longitudinalis usque decima sexta pars; membrana punctulata; (a dimensionibus maximis).

Longit. 0,852mm. Latit. 0,054mm.

In einem Waldgraben im Reichsforste bei Tennenlohe, in mehreren Specim. beobachtet.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XII. Fig. IV.

Fig. IV. a) Ein Individuum von den grössten beobachteten Dimensionen; b) ein etwas kleineres Individuum, die Inhaltsstruktur ist undeutlich.

Docid. nodulosum. Brebisson. (Ralfs. british Desmid p. 155 Taf. 26. Fig. 1. *Pleurotaenium nodulosum.* Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 176. Algen Europas Nr. 1212. Nr. 1284 *Closterium Trabecula* Bailey. Americ. Bacillariae Amer. Journ. of Science and Art vol. 41. p. 302. Taf. 1 Fig. 32.

Länge 0,538mm. — 0,612mm. Breite 0,05mm. — 0,054mm

Diese konstante Form ist durch die mehrfach ausgerundeten (welligen) Seitenränder ausgezeichnet. Im Reichsforste, am Bischofssee, in Gräben unter dem Schmaussenbuck bei Nürnberg, in kleinen Sümpfen in der „Solitude“ bei Erlangen

Closterium. Mtsch.

Subgenus I. *Netrium.* Naegeli. (*Penium.* Brebisson).

Closter (Netrium): Penium. Reinsch.

(*Penium Closterioides.* Ralfs british Desmid. p. 152. Taf. 34 Fig. 4. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 169. Algen Europ. Nr. 1224 Nr. 1430. Nr. 1434.)

Von dieser Form kommen im fränkischen Gebiete eine grössere und eine kleinere Form vor. Die kleinere Form

misst in der Länge 0,122mm., in der Breite 0,023mm., die grössere Form in der Länge 0,263mm., in der Breite 0,041mm.

In Gräben im Reichsforste und in Gräben in der „Solitude“ bei Erlangen.

Closter. (Netrium) Digitus. Ehrenberg. (Abhandl. der Berlin. Acad. 1831. p. 68. Infusionsth. p. 94. Taf. 6. Fig. 3. Meneghini Synops. Desmid. p. 236. Kützing. Phycol. German. p. 132 Algen Europas Nr. 1212. 1302. 1225. 1227. 1443. 1407. 1327. 1331. Ralfs. britt. Desmid. p. 151. Taf. 25. Fig. 3. Naegeli Gattgen einzell. Alg. p. 108. Taf. 6. D. Closterium lamellosum Brebisson. Alg. Falaise. p. 59. Taf. 8. Pleurosycios myriopodus Corda Almanach de Carlsbad p. 125. Taf. 5. Fig. 68.)

Von den zwei in Franken vorkommenden zwei nur in den Dimensionen unterschiedenen Formen misst die kleinere in der Länge 0,054mm.—0,092mm., in der Breite 0,017mm.—0,028mm., die grössere in der Länge 0,2mm.—0,217mm., in der Breite 0,069mm.—0,077mm.

In Waldgräben, im Reichsforste und im Hauptsmoorwalde ziemlich verbreitet.

Closter. Penium und Closter. Digitus sind in der Gestalt und im Umrisse der Zellchen öfters fast gleich, diese beiden unterscheidet dann fast nur die Verschiedenheit der Chlorophyllstruktur, bei ersterem sind die central gestellten Chlorophyllplatten an ihrem äusseren Rande ganz und vom Scheitel beobachtet nicht strahlig, bei Cl. Digitus dagegen sind die Chlorophyllplatten vom Scheitel betrachtet an ihrem äusseren Rande mehrstrahlig.

Closter. (Netrium) interruptum. Brebisson. (Ralfs british Desmidiaceae. p. 151. Taf. 25. Fig. 4. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 168. De Bary Unter. über die Conjug.)

Länge 0,184mm.—0,2mm. Breite 0,039mm.—0,054mm.

Am Bischofssee, in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf.

Subgenus II. Closterium.

Closter. Lunula Müller. (*Vibrio Lunula* Müller. Naturforscher. 1784. p. 142. *Mülleria Lunula*. Schrank. Fauna boica. III. p. 47. *Bacillaria Lunula*. Acta Leop. Carol. N. Cur. 1823. XI. p. 533. Closter. Lunula. Ehrenberg. Abhandl. der Berlin. Acad. 1830. Infusionsth. p. 90. Taf. 5. Fig. 15. Kützing. Alg. aq. dulc. exs. Nr. 22. Corda Alman. de Carlsb. 1835. p. 190. Taf. 5. Fig. 56. 57. Ralfs. britt. Desmid. p. 163. Taf. 27. Fig. 1. Focke Physiol. Stud. I. p. 51. Taf. 3. Fig. 13. 14. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 169. Algen Europas Nr. 1229. 1407. 1212.)

Länge 0,478mm.—0,6mm. Breite 0,076mm.—0,092mm.

In Gräben im Reichsforste an mehreren Orten, im Hauptmoorwald bei Bamberg, in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf, Forchheim, Eggolsheim, am Bischofssee und am Kosbacher Weiher

Clost. acerosum. Schrank (*Vibrio acerosus*. Schrank. Fauna boica. III p. 47. *Closterium acerosum*. Ehrenberg. Infusionsth. p. 92. Taf. 6. Fig. 1. Meneghini Synops. Desmid. p. 233. Kützing. Phycol. Germ. p. 131. Ralfs. britt. Desmid. p. 164. Taf. 27. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 170. Alg. Europ. Nr. 1232. *Closterium lanceolatum*. Kützing Phycol. German. p. 130. Ralfs. britt. Desmid. p. 165. Taf. 28. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 171. Alg. Europas Nr. 1047. *Closterium angustum* Hantsch. Alg. Europas Nr. 1206. Closter. ambiguum Hantsch Alg. Europas Nr. 1337.)

Formae.

A. majus. Longit. 0,381mm.—0,462mm.

Latit. 0,038mm.—0,042mm.

(Closter. acerosum Schrank.)

B. medium. Longit. 0,306mm.—0,336mm (Vacuolae, ut praecedentis, corpuscula automobilia compluria exhibentes). (Closter. acerosum β . minus. Hantsch).

C. ambiguum. Vacuolae corpusculo automobili majore singulo instructae. Longit. 0,315mm — 0,328mm Latit. 0,028mm. — 0,03mm. (*Closterium ambiguum.* Hantsch).

? *D. lanceolatum.* Diameter transversalis diametri longitudinalis sexta usque septima pars.

Longit. 0,276mm.—0,306mm. Latit. 0,017mm. 0,05mm.
(*Closterium lanceolatum.* Kützing.)

E. angustum. Diameter transversalis diametri transversalis septima usque decima pars. Longit. 0,176mm. — 0,208mm Latit. 0,023mm. — 0,027mm

(*Closterium angustum.* Hantsch).

Die Form A. findet sich im Reichsforste an mehreren Stellen, meist unter anderen Closterien, die Form B. habe ich im fränkischen Gebiete noch nicht beobachtet, ich kenne dieselbe aus Nr. 1047. der 5. und 6. Dekade der Algen Europas (Desden leg. Hantsch, die Form C. habe ich ebenfalls noch nicht im Gebiete beobachtet (Nr. 1337. der 33. und 34. Dek. der Alg. Eur. Desden leg. Hantsch), ich habe diese Form, obwohl dieselbe im Wesentlichen nicht zu unterscheiden ist von B (*acerosum* β . minus Hantsch) als eigene Form des *acerosum* aufgenommen, da das Vorkommen von nur einem einzigen beweglichen Körperchen in der Vakuole konstant zu sein scheint. Die Form D, welche doch vielleicht eine eigene Art darstellt, da die Membran sehr fein gestreift bei stärkerer Vergrößerung sich zeigt, kommt in Gräben am Kosbacher Weiher und in kleinen stehenden Wassern bei Baiersdorf vor, die Form E. (*Cl. angustum* Hantsch. Nr. 1206. der Alg. Europas) habe ich im Gebiete auch noch nicht gesehen.

Closter. pusillum. Hantsch. (Nr. 1505. der 51. und 52. Dekade der Algen Europas.)

Cellula a fronte visa minus curvata, margo dexter rectus, margo sinister minus convexus, summis truncato rotundatis; diameter transversalis diametri longitudinalis octava pars; membrana glaberrima; Zygospora quadratica

Longit. 0,03mm.—0,046mm. Latit. 0,004mm.—0,006mm.

Diese mir nur aus Nr. 1505. der 51. und 52. Dekade der Alg. Europas (Pohlenzthal in Sachsen leg. Bulnheim) bekannte Closterie beobachtete ich in einer sehr reichlichen Desmidiennmasse aus einem Graben am Rodelheimbache im Reichsforste in vereinzelt in Copulation befindlichen Specim. (Juli 1864.)

Closter. pronum. Brebisson. (Liste des Desmid. de Normand Taf. 2. Fig. 42. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 175. Alg. Europ. Nr. 1228. Nr. 1433. Nr. 1409. Brebisson Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Cherbourg. IV. Closter. Pritshardianum Archer. Lond. Microscop Journ. 1862. Heft X. Closter. setaceum. Focke Physiol. Studien I. p. 59. Taf. III. Fig. 32.)

Formae.

A. tenerrimum. Cellula a medio ad summum corpus paulatim angustata, summum paulo recurvatum; diameter transversalis diametri longitudinalis tricesima quinta pars. Longit. 0,321mm.—0,344mm. Latit. 0,009mm.—0,012mm.

B. Brebissonii. Cellulae summa paulatim angustata; diameter transversalis diametri longitudinalis vicesima sexta usque tricesima pars. Longit. 0,344mm.—0,405mm. Latit. 0,012mm.—0,015mm.

(Closterium pronum. Brebisson).

C. Pritshardianum. Cellulae summa paulatim angustata, diameter transversalis diametri longitudinalis decima octava usque vicesima sexta pars. Longit. 0,479mm.—0,6mm. Latit. 0,023mm.—0,027mm.

(Closterium Pritshardianum Archer).

Die Form A. habe ich bis jetzt noch nicht in Franken beobachtet, ich kenne dieselbe aus Nr. 1433. der 33. und 44. Dekade der Alg. Eur., die Form B. habe ich in Waldgräben im Reichsforste und am Bischofssee beobachtet, dieselbe ist in Nr. 1228. der 23. und 24. Dekade der Alg. Europas ent-

halten; die Form C. kommt in einem Graben am Bischofssee vor, dieselbe ist in Nr. 1409. der 41. und 42. Dek. der Alg. Eur. enthalten.

Closter. acutum. Lyngbye. (*Echinella acuta* Lyngbye. Tentam. Hydrophytol. Danic. p. 209. *Frustulia acuta*. Kützing. Synops. Diatom. p. 537. *Closterium acutum*. Ralfs britt. Desmid. p. 177. Taf. 30. Fig. 5. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 175. *Frustulia subulata*. Kützing Synops. Diatom. p. 538. *Closterium Cornu* Ehrenberg. Infusionsth. p. 94. Taf. 6. Fig. 5 Abhandl. der Berl. Acad. 1830. p. 62. Meneghini Synops Desmid. p. 233. Kützing. Phycol. German. p. 131. Ralfs. britt. Desmid. p. 176. Taf. 30. Fig. 6. Alg. Europas Nr. 1408. der 41. und 42. Dekade. *Closterium tenue* Kützing. Synops. Diatomac. p. 595. Phycol. German. p. 130. *Closter. rostratum* Focke (exp.) Physiol. Studien I. p. 59. Taf. 3. Fig. 34. 35.)

F o r m a e .

A. *Cornu*. Cellulae summa truncato rotundata aut minime angustata. Longit. 0,117mm. — 0,138mm. Latit. 0,006mm. — 0,008mm. (*Closterium Cornu* Ehrenberg).

B. *Lyngbyanum*. Cellulae summa paulatim angustata; diameter transversalis diametri longitudinalis decima sexta usque decima octava pars Longit. 0,133mm. — 0,135mm. Latit. 0,008mm. (*Closterium acutum* Lyngbye.)

Die erstere Form kommt im Gebiete in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf, in Gräben im Burgbernheimer Wald, in Gräben am Eisenbahndamme bei Eltersdorf vor und ist in Nr. 1408. der 41. und 42. Dekade der Alg. Europ. enthalten; die letztere Form am Bischofssee.

Zu der Form A. gehört: *Echinella acuta* Lyngbye. *Frustulia acuta*. Kützing. *Closterium acutum*. Brebisson. Ralfs. *Closterium Cornu* Ehrenberg. *Closterium tenue*. Kützing. *Closter. rostratum*. Focke.

Zu der Form B. gehört: *Closterium acutum* Ralfs. *Frustulia subulata* Kützing.

Closter. moniliferum, Ehrenberg. (*Lunulina monilifera*, Bory Encycl. Meth. Zoophytes Taf. 3. Fig. 22. 25. 27. *Closter Lunula*, Kützing. Synops. Desmid. Taf. 1. Fig. 80. *Closter. moniliferum*, Ehrenberg. Infusionsth. p. 90. Taf. 5. Fig. 16. Meneghini Synops. Desmid. p. 232. Kützing. Phycol. German. p. 130. Ralfs. britt. Desmid. p. 166. Taf. 28. Fig. 3. Naegeli Gattgen. einzell. Alg. p. 106. Taf. 6. C. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 171. *Closter. Lunula* Leiblein, Flora. 1827. p. 259. *Closterium Leibleinii*, Kützing Synops. Diatom. p. 596. Kütz. Phycol. German. p. 130. Meneghini Synops. Desmid. p. 232. Brebisson Alg. Falaise p. 58. Taf. 8. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 171. Alg. Sachs. Nr. 507. 849. Alg. Europas Nr. 1230. 1226. *Closterium parvulum*, Naegeli Gattgen. einzell. Alg. p. 106. Taf. 6. C. Fig. 2. Alg. Europ. Nr. 1444. Rabenh. Kryptog. Sachs. Nachtr. p. 620. *Closterium Lunula* Ehrenberg. Infusionsthierch. Taf. 5. Fig. 15. Focke. Physiol. Stud. I. p. 51. Taf. 3. Fig. 1. 9. *Closter. Ehrenbergii*, Meneghini Synops. Desmid. p. 232. Hassal. Britt. Freshw. Alg. p. 369. Ralfs. britt. Desmid. p. 166. Taf. 28. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 171. Rabenh. Bacill. exsicc. Nr. 69. Algen Europas Nr. 1121. der 13. und 14. Dekade. Nr. 1447. der 45. und 46. Dekade).

F o r m a e.

A. *Leibleinii*. Cellulae interanea corpusculorum chlorophyllaceorum serie singula instructa.

α . Longit. 0,061mm. — 0,122mm. Latit. 0,01mm. — 0,021mm. (*Closterium parvulum*, Naegeli. *Closterium Leibleinii*, Kützing).

β . Longit. 0,138mm. — 0,168mm. Latit. 0,021mm. — 0,023mm. (*Closterium Leibleinii*, Kützing).

B. *angulatum*. Cellulae a fronte visae margo dexter usque fere rectus, cellula in medio plus minusve ventricoso inflata, cellula minus semilunata incurvata. Longit. 0,168mm. — 0,2mm. Latit. 0,03mm. — 0,038mm. (*Closterium angulatum* Hantsch).

C. Boryanum. Cellulae interanea corpusculorum chlorophyllaceorum (ut formae praecedentis) serie singula instructa.

α . Longit. 0,2mm. — 0,255mm. Latit. 0,03mm. — 0,028mm. (Closterium moniliferum Bory).

β Longit. 0,2mm. — 0,216mm. Latit. 0,03mm. — 0,038mm. (Closterium moniliferum Bory).

D. Ehrenbergianum. Cellulae interanea corpusculis chlorophyllaceis dispersis instructa.

α . Longit. 0,325 mm. — 0,368 mm Latit. 0,073 mm. — 0,092mm. (Closterium Ehrenbergii. Meneghini).

β . Longit. 0,4mm. — 0,478mm. Latit. 4,122mm. — 0,138mm.

γ . Cellulae a fronte visae summa productiora et acuminata (plus minusve incurvata).

Longit. 0,432mm. — 0,462mm. Latit. 0,069mm. — 0,084mm.

Mit Ausnahme der Form B. sind diese sämmtlichen Formen im Gebiete vertreten. A. findet sich am Bischofssee, in Altwässern der Regnitz, im Hauptmoorwald bei Bamberg, C. am Bischofssee, in Gräben am Fusse des Schmaussenbuck bei Nürnberg, in einzelnen Gräben im Reichsforste, D. am Korbacher Weiher und am Bischofssee, Gräben am Dutzendteich bei Nürnberg, Altwässer der Regnitz.

Zu der Form A. gehört: Closterium Lunula. Leiblein. Closterium Leibleinii. Kützing. Closter. parvulum Naegeli.

Zu der Form B. gehört: Closter. angulatum. Hantsch.

Zu der Form C. gehört: Closterium Lunula var. Ehrenberg. Lunulina monilifera. Bory. Closterium Lunula Kützing. Closter. moniliferum. Ehrenberg.

Zu der Form D. gehört: Closter Lunula Ehrenberg. Closter. Ehrenbergii. Meneghini.

Closter. Dianae. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 92 Taf. 5. Fig. 17. Kützing. Phycol. German. p. 130. Ralfs. britt. Desmid. p. 168. Taf. 28. Fig. 5. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 170. Alg. Europas Nr. 1212. 1228. 1407. 1432. Closter. ruficeps. Ehrenberg. Abhandl. der Berl. Acad. 1831. p. 67.)

Länge 0,284mm. — 0,316mm. Breite 0,03mm. — 0,038mm.

Am Bischofssee, am Kosbacher Weiher, am Dutzendteich bei Nürnberg, in Waldgräben im Reichsforste unterhalb Kalkreuth.

Das Closter. *didymotocum* Corda (Alman. de Carlsb. 1835. p. 125. Taf. 6. Fig. 64. 65. Ralfs. britt. Desmid. p. 169. Taf. 28. Fig. 7.) habe ich bis jetzt im Gebiete noch nicht beobachtet.

Closter. striolatum. Ehrenberg. (Abhandl. d. Berl. Acad. d. Wissensch. 1833. p. 68. Infusionsth. p. 95. Taf. 6. Fig. 12. Meneghini Synops. Desmid. p. 234. Kützing. Phycol. German. p. 131. Hassal. brittish Freshwater Algae. p. 373. Ralfs. brittish Desmidiaceae. p. 171. Taf. 29. Fig. 2. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 112. Alg. Europas Nr. 1229. 1112. 1430. 1434. 1407. 1409. 1366. 1327)

Länge 0,336mm. — 0,384mm. Breite 0,03mm. — 0,046mm.

Diese Art ist sehr konstant und variirt ausser ein wenig in den Dimensionen gar nicht; die Membran ist bei den älteren Specim. dick und immer bräunlich gefärbt, sehr viele Specim. zeigen sich in der Mitte seicht ringförmig ausgerandet.

Ist im Gebiete ziemlich verbreitet und findet sich an einzelnen Orten fast rein, wie z. B. in einem Graben im Reichsforste und in einem jetzt leider allmählig verschütteten kleinen Sumpfe in der „Solitude“ bei Erlangen.

Closter. intermedium. Ralfs (Brittish Desmidiaceae. p. 171. Taf. 21. Fig. 3. Rabenhorst Kryptog Sachs p. 172.)

Länge 0,416mm. — 0,584mm. Breite 0,03mm. — 0,046mm.

Nur in wenigen Specim. in einer Desmidienmasse aus einem Graben am Bischofssee beobachtet.

Closter. lineatum. Ehrenberg. (Abhandl. der Berl. Acad. der Wissensch. p. 238. Infusionsth. p. 95. Taf. 6. Fig. 8. Meneghini. Synops. Desmid. p. 234. Kützing. Phycol. German. p. 131. Hassal. Britt. Freshw. Algae. p. 372. Ralfs. britt. Desmidiaceae. p. 173. Taf. 30. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 173. Bacill. exsicc. Nr. 69. Algen Europas Nr. 1365. 1387.

1407. *Closterium elongatum*. Brebisson. Meneghini Synops. Desmid. p. 234.)

Formae.

A. *tenuissimum*. Diameter transversalis diametri longitudinalis tricesima usque quadragesima pars; summa plus minusve acuminata, curvata. Longit. 0,526mm.—0,631mm. Latit. 0,016mm.—0,023mm.

B. *angustatum*. Diameter transversalis diametri longitudinalis decima sexta usque decima octava pars; summa subito angustata, rotundata aut truncato rotundata.

Longit. 0,612mm.—0,642mm.

C. *angustum*. Diameter transversalis diametri longitudinalis decima quarta pars; cellula ad summa a medio paulatim angustata. Longit. 0,691mm. Latit. 0,025mm.

Die Form A. findet sich in vereinzelt Specimin. an mehreren Orten in Gräben im Reichsforste, unter Confervmassen und Desmidiengemengen in Altwässern der Regnitz bei Erlangen und Baiersdorf ziemlich rein und nur mit einigen andern Closterien untermischt in einem kleinen stehenden Wasser in der „Solitude“ bei Erlangen. Die Form B. habe ich nur in einigen Specimin. vom Kosbacher Weiher bei Erlangen beobachtet. Die Form C. ist in einzelnen Waldgräben und kleinen stehenden Wassern nicht selten.

Closter. juncidum. Ralfs (british Desmidiace. p. 172. Taf. 29. Fig. 6. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 173. Algen Europas Nr. 1113. 1443. 1212. 1444. 1434. 1407).

Formae.

A. Cellula a fronte visa linearis summis minime curvatis, margo dexter usque fere rectus. Longit. 0,138mm.—0,231mm. Latit. 0,006mm.—0,013mm.

B. Cellula a fronte visa semilunata curvata, summis paulatim angustatis curvatis; diameter transversalis diametri longitudinalis duodecima pars. Longit. 0,138mm.—0,16mm.

Die erstere Form ist die häufigere und in vielen Gräben des Reichsforstes zu beobachten, die letztere beobachtete ich

mit vielen andern Closterien in einem kleinen moorigen Wasser in der „Solitude“ bei Erlangen.

Closter. turgidum. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 95. Taf. 6. Fig. 7. Meneghini Synops. Desmid. p. 234. Kützing Phycol. German. p. 131. Ralfs. britt. Desmid. p. 165. Taf. 27. Fig. 3. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 127. Algen Europas Nr. 1367. 1434.)

Länge 0,656mm.—0,688mm. Breite 0,069mm. 0,093mm.

Die gewöhnlich etwas bräunlich gefärbte Membran ist sehr zart und nur bei stärkerer Vergrößerung und gedämpftem Lichte deutlich zu bemerken.

In einem kleinen Tümpel in der „Solitude“ bei Erlangen, am Bischofssee, in einzelnen Waldgräben im Reichsforste.

Das *Closterium attenuatum* Ehrenberg. (Infusionsth. p. 94. Taf. 6. Fig. 4. Ralfs. britt. Desmid. p. 169. Taf. 19. Fig. 5.) habe ich im fränkischen Gebiete noch nicht beobachtet, ebenso noch nicht das *Closter. hybridum*. Rabenhorst (Nr. 1207. der 21. und 22. Dekade der Alg. Eur.), welches mit dem stärkeren *Closter. Ralfsii*. Brebisson (Ralfs. brittish Desmid. p. 174. Taf. 30. Fig. 2.) in den Formenkreis einer Art gehört.

Closter. rostratum. Ehrenberg (Abhandl. der Berl. Acad. d. Wissensch. 1833. p. 240. Infusionsth. p. 97. Taf. 6. Fig. 10. Ralfs. britt. Desmid. p. 175. Taf. 30. Fig. 3. Meneghini. Synops. Desmid. 235. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 174. Algen Europ. Nr. 1285. Focke Physiol. Studien I. p. 59. Taf. 1. Fig. 33—36. *Closterium Acus* Nitsch. Kützing Synops. Diatom. p. 595. Taf. 1. Fig. 81. *Algae aquae dulcis exsicc.* Nr. 80. *Closterium caudatum*. Corda. Almanach de Carlsbad. 1835. p. 125. Taf. 5. Fig. 66. *Stauroceras Acus*. Kützing. Phycolog. German. p. 133.)

Länge 0,046mm. Breite 0,061mm. Länge der Hörner 0,015mm.—0,023mm.

In moorigen Waldgräben im Reichsforste an mehreren Stellen, ziemlich rein am „Moosbrünnlein“, in einigen Gräben am Bischofssee.

Closter. setaceum Ehrenberg. (Abhandl. der Berlin. Academie. 1833. p. 339. Infusionsth. p. 97. Taf. 6 Fig. 11. Meneghini Synops. Desmid. p. 235. Ralfs. britt. Desmid. p. 176. Taf. 30. Fig. 4. Focke Physiol. Studien 1. p. 59. Taf. 3. Fig. 32. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 174. Alg. Sachs. Nr. 547. *Stauroceras subulatum*. Kützing. Phycologia German. p. 133.)

Länge 0,193mm. 0,246mm Breite 0,008mm.—0,013mm.

Länge der Hörner 0,061mm.—0,076mm.

Breite der Hörner 0,003mm.

Am Bischofssee, am Dutzendteich bei Nürnberg, Altwässer der Regnitz bei Forchheim, in einzelnen Waldgräben im Reichsforste.

Von dieser Art ist die Copulation sehr gewöhnlich im Sommer zu beobachten; die Zygosporie ist von der grösseren Fläche gesehen im Umriss quadratisch mit schwach ausgerandeten Seitenrändern.

Closter. costatum Corda. (Almanach de Carlsbad 1835. p. 124. Taf. 5. Fig. 61. Ralfs. britt. Desmid. p. 170. Taf. 29. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 173. Algen Europas Nr. 1069. Nr. 1331. Nr. 1654. *Closter. doliolatum*. Brebisson. Meneghini. Synops. Desmid. p. 237. *Clost. dilatatum*. Kützing. Phycol. German. p. 132.)

Länge 0,336mm.—0,384mm. Breite 0,046mm.—0,099mm.

Diese ziemlich konstante nur in der Anzahl der starken Rippen (10 bis 20) variirende Art findet sich im fränkischen Gebiete an mehreren Orten. In der Solitude bei Erlangen, im Hauptsmoorwald bei Bamberg, in Waldgräben im Laurenziforste beim Dutzendteich bei Nürnberg, in Waldgräben im Sebaldiforste auf dem Forstorte Rehbock, an dem letzteren Orte in Gesellschaft mit *Micraster. angulosa* und *Staurostrum polymorphum*, von welchem ich die Pflanze unter Nr. 1654. der 66. und 67. Dekade mit mehreren Desmidien vermischt mitgetheilt habe.

Closter. angustatum. Kützing. (Phycologia German. p. 132. Ralfs. britt. Desmid. p. 172. Taf. 29. Fig. 4. Rabenh.

Kryptog. Sachs. p. 173. Algen Europas Nr. 1224. 1366. 1407. 1506. 1445. 1654.)

Länge 0,336mm — 0,432mm. Breite 0,019mm — 0,03mm.

F o r m a e .

A. Membrana striis transversis singulis in partibus aequalibus quaternis divisa; (membranae pars media raro striis transversis binis instructa).

B Membranae pars media striis transversis compluribus (6is—20is) instructa, membranae altera pars sine striis transversis.

Am Bischofssee, in der „Solitude“ bei Erlangen, im Hauptmoorwald bei Bamberg, in Gräben im Reichsforste (Nr. 1654. der 66. und 67. Dekade der Algen Europas).

Closter. Braunianum. P. Reinsch

Cellula a fronte visa linearis, margo dexter et sinister usque fere recti, summum paulo incrassatum corporis subito angustatum et rotundatum; cellula in medio protuberantia annuliformi circum corpus ducta instructa; diameter transversalis diametri longitudinalis duodecima pars; membrana colore flavide fusco verruculis dense positis exaspera, costis longitudinalibus in corporis summo paulo spiraliter contortis exasperis denis usque duodenis instructa.

Longit. 0,6mm.—0,672mm. Latit. 0,046mm.—0,061mm.

In kleinen Waldsümpfen unter andern Closterien in der „Solitude“ bei Erlangen (der Standort ist jetzt leider fast zugeschüttet). Im Juni 1864 entdeckt.

Dieses schöne Closterium ist die einzige bekannte Art deren Membran warzig ist.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XII. Fig. V.

Fig. V. a) Ein Individuum $\frac{1}{4}$ vergrößert; b) der mittlere Theil eines Individuums (der Membran) um das Doppelte vergrößert, die dicht stehenden Wärzchen erstrecken sich nicht bis in den mittleren Theil der Rinne; c) der oberste Theil der Membran eines Individuums um das Doppelte vergrößert, die starken ebenfalls mit feinen Wärzchen besetzten Rippen sind

unterhalb der ein wenig bauchig erweiterten Spitze ein wenig gedreht und laufen dann in entgegengesetzter Richtung zur abgerundet stumpfen Spitze aus; d) Scheitelansicht eines Individuums.

Cylindrocystis. Brebisson.

Cylindrocystis Brebissonii. Meneghini. (*Palmella cylindrosperma* Brebisson. Alg. Falaise. p. 64. *Cylindrocystis Brebissonii* Meneghini Cenni organograps. e fisiol. delle Alg. p. 5-26. Monogr. Nostoch. Taf. 12 Fig. 3. *Closterium Cylindrocystis*. Kützing. Phycol. German. p. 132. *Penium Brebissonii*. Menegh. Ralfs. britt. Desmid. p. 153. Taf. 25. Fig. 6. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 168. Taf. 168. Algen Europas Nr. 1114. der 11. und 12. Dekade. *Penium Jenneri*. Ralfs. british Desm. p. 153. Taf. 33. Fig. 2. Algen Europ. Nr. 1431. Nr. 1505. *Penium truncatum*. Brebisson Ralfs. britt. Desmid. p. 152 Taf. 25. Fig. 5. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 169.)

Länge 0,046mm — 0,069mm. Breite 0,015mm. — 0,03mm.

Im Reichsforste in einigen Gräben, z. B. beim „Moosbrännlein“ weit sich erstreckende gallertige Massen auf der Oberfläche des Wassers bildend, wenn das Wasser der Gräben allmählig vertrocknet ist, so finden sich nur noch vereinzelte Specimina am moorigen Grunde der Gräben. Dieses stellt das *Pen. Brebissonii* dar, welches jedoch nicht unveränderlich und konstant in der Abrundung der Enden und in den Dimensionen ist, sondern mit zwei andern von Ralfs unterschiedenen Arten eine Formenreihe darzustellen scheint. Die zwischen *Pen. Jenneri* Ralfs und *Pen. Brebissonii* aufgestellten Unterschiede der Sporenbildung „*sporangium situated between the deciduous cells*“ und „*sporangium permantle attached to the conjugated cells, at first quadrate, then orbicular*“ würden beide als zwei verschiedene Arten bestimmen, so lange aber nicht sicher die Abstammung der als „Zygosporen“ betrachteten Zellen besonders von *Brebissonii* ermittelt ist, bleibt die Verschiedenheit noch zweifelhaft.

Cylindroc. margaritacea. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 95. Taf. 6. Fig. 13. Meneghini Synops. Desmid. p. 236. Kützing. Phycol. German. p. 132. Hassal. Britt. Freshw. Algae p. 376. *Penium margaritaceum*. Ehrenb. Ralfs. britt. Desmid. p. 149. Taf. 25. Fig. 1. Taf. 34. Fig. 3. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 169. Alg. Sachs. Nr. 510. Alg. Europas Nr. 1225. Nr. 1364. Nr. 1407.)

Nicht oder nur in den Dimensionen etwas variirend.

Länge 0,084mm.—0,117mm. Breite 0,023mm —0,038mm.

Im Reichsforste in Gräben gewöhnlich, in vereinzelt Specimin. seltener. Viele Specimina gesellig in Gallertmassen beisammenlebend, ebenfalls meist vereinzelt in der „Solitüde“ bei Erlangen, in Altwässern der Regnitz mit niedrigem Wasser bei Baiersdorf. Die Specimina stellen gewöhnlich verschiedene Grade der Theilung der Zellchen dar, die neugebildeten Hälften der neuen Tochterzellchen sind im Anfange glatt und warzenlos, die Wärzchen beginnen sich erst zu entwickeln, wenn die neuen Hälften den alten an Grösse fast gleich sind.

Cylindroc. Cylindrus. Ehrenberg. (Infusionsth. p. 95. Taf. 6. Fig. 6. Meneghini Synops. Desmid. p. 236. Kützing. Phycol. German. p. 132. *Penium Cylindrus* Ehrenb. Ralfs. britt. Desmid. p. 150. Taf. 25. Fig. 2. Algen Europ. Nr. 1354. der 35. und 36. Dekade, Nr. 1544. der 55. und 56. Dekade).

Länge 0,1mm.—0,117mm. Breite 0,028mm —0,038mm

F o r m a e.

A. Cellulae superficiei pars media glabra (haec pars glabra sulcus non profundus in superficiei medio annuliformis circum corpus ductus adparet) aut superficies tota verruculosa.

B. annulatum. Hantsch)

Cellulae superficies sulcis non profundis annuliformibus circum corpus ductis glabris compluribus (9is—10is, interdum ternis) instructa

Die letztere Form habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet, dieselbe kenne ich aus Nr. 1544. der 55. und 56. Dekade der Algen Europas, die erstere kommt im Gebiete

immer nur in vereinzelten Specim., nie massenhaft vor. Im Reichsforst an mehreren Stellen beobachtet, am Kosbacher Weiher und am Bischofssee.

Cylindroc. Cylindrus unterscheidet sich vom *Cylindroc. margaritacea* durch die Anordnung der Wärzchen; bei ersterem sind die Wärzchen in parallelen längs laufenden Reihen geordnet, bei letzterem sind die Wärzchen nicht in Reihen geordnet.

Sphaerosozma. Corda.

Sphaeroz. excavatum. Ralfs. (Ann. of Nat. Hist. v. 16. p. 15. british Desmid. p. 67. Taf. VI. Fig. 2. Hassal britt. Freshw. Alg. p. 349. Rabenh Kryptog Sachs. p. 178).

Länge der Zellchen 0,008mm. — 0,011mm. Breite der Zellchen (Breite des Fadens) 0,042mm. Dicke der Zellchen 0,006mm.

Im Reichsforste, am Bischofssee, Gräben unter dem Schmaussenbuck bei Nürnberg, Altwässer der Regnitz bei Oberndorf, Baiersdorf, Forchheim; ziemlich rein (mit anderen Desmidien vermisch: *Staurastr. Hystrix*, *Cylindrocyst. Brebissonii*, *Xanthid. armatum*, *Micraster. denticulata*) in einem Graben bei der Schleifmühle bei Erlangen, wie auch in einem kleinen Graben mit immerwährend fliessendem Wasser im Reichsforste beim „Moosbrünnlein“ mit *Staurastr. franconicum* und *Docidium asperum* Ralfs. vermisch, von welchen beiden letzteren Standorten die Pflanze in den Algen Europas erscheinen wird.

Sphaeroz. vertebratum. Brebisson. (*Desmidium vertebratum* Brebiss. Alg. Falaise p. 65. *Sphaerosozma elegans.* Corda Alman. de Carlsbad 1835. Taf. IV. Fig. 37. *Observ. Microsc. sur les An. de Carlsb.* p. 21. Taf IV. Fig. 30. *Odontella unidentata.* Ehrenberg Infusionsth. p. 159. *Odontella filiformis.* Ehrenberg. Infusionsth. p. 180. Taf. 10. Fig. 21. *Isthmia vertebrata* Meneghini Synops. Desmid. p. 205. *Desmid. compressum* Ralfs. Ann. of Nat. Hist. v. 9 p. 253 *Isthmosira vertebrata.* Kützing. Phycol. German. p. 141. *Sphaerosozma*

vertebratum. Ralfs. british Desmid. p. 66. Taf. 6. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. 178. Alg. Europas Nr. 1443. und 1445. der 45. und 46. Dekade).

Formae:

A. minus Cellularum diameter longitudinalis diametri transversalis tres usque quatuor quintae; incisurarum profunditas diametri transversalis usque triens Longit. 0,015mm.—0,017mm. Latit. 0,017mm. — 0,019mm. Crassit. 0,007mm.

B. *Krameri*. Cellularum diameter longitudinalis diametri transversalis dimidium; incisurarum profunditas diametri transversalis octava pars (et paulo magis); Filamina ut Desmidii Swartzii et quadrangularis spiraliter contorta.

Longit. 0,017mm.—0,019mm. Latit. 0,03mm.—0,034mm. Crassit. 0,009mm (Zürich).

Die zweite sehr zierliche Form habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet, dieselbe findet sich unter Nr. 1343. der 45. und 46. Dek. der Algen Europas (Zürich leg. Kramer et Brügger); die erstere kommt im Gebiete immer nur unter andern Algen in vereinzeltten Fäden vor am Bischofssee, in Altwässern der Regnitz bei Oberndorf, in einem Tümpel am Donau-Mainkanale vor Bruck.

Anhang zu den Desmidiaceen (Didymidiaceen).

Eremosphaera. De Bary.

(Unters. über die Conjug. p. 50.)

Eremosph. viridis. De Bary. (Unters. über die Conjug. p. 56. Taf. 7. Fig. 26. 27. Hofmeister Bericht d. Kön. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. Febr. 1857 p. 33. Taf. 1. Fig. 26 - 28. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 167.)

Die kugelförmigen sehr grossen Zellen messen 0,1mm.—0,222mm. im Durchmesser. Die Membran ist ziemlich dick und die innere Wand der Membran ist im Anfange dicht mit homogenem Chlorophyll überkleidet, später zerreisst die homo-

gene Chlorophyllschicht in eine Anzahl gleichgrosser zuerst unregelmässig begrenzter Partikelchen, die später eine regelmässige Gestalt und durch hyaline Zwischenräume getrennt den ganzen inneren Raum der Zelle einnehmen, den weiteren Verlauf der Entwicklung des Inhaltes habe ich nicht weiter beobachten können, ob die ohne Zweifel später zu selbstständigen Zellchen individualisirten Partikelchen ausschwärmen oder durch Zertliessen der Membran der Mutterzelle frei werden ist mir noch unentschieden. Offenbar gehört aber die Gattung nicht zu den Desmidiën vielmehr mit aller Wahrscheinlichkeit zu den Palmellaceen und zwar wahrscheinlich zu den Protococceen.

Findet sich im Gebiete nicht selten in etwas beschatteten kleinen Pfützen und Gräben in Wäldern (am liebsten in Erlenbüschen) namentlich im Frühling und Sommer. In Gesellschaft des *Staurastr. Meriani* in grosser Menge in einer kleinen Pfütze im Erlanger Stadtwald im Sommer 1864 beobachtet.

Palmogloea. Kützting.

Palmogl. macrococca Kützting. Alex. Braun. (Betracht. über d. Verjüngung in der Natur. p. 216 Taf 1. Fig. 1–42. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 167. Alg. Sachs. Nr. 85. 545. 691. *Mesotaenium Braunii*. Be Bary. Untersuch. über die Conjugaten)

Zellchen 0.012mm. – 0.03mm. lang, 0.007mm. – 0.011mm breit.

Lebt nie in Wasser, sondern an den Wänden feuchter Sandsteinblöcke, überzieht auf der Erde und zwischen Moos und Flechten öfters mehrere Quadratzoll grosse Flächen als eine grünliche Gallerte; gewöhnlich mit *Glöökapsen* und *Glöothecen* untermischt.

In dem Walde hinter Rathsbürg, im Atzelsberger und Bubenreuther Wald, an feuchten Wänden in den verlassenen Sandsteinbrüchen auf dem Schmausschbuck bei Nürnberg, im Reichsforste bei Tennenlohe.

Palmogloea unterscheidet sich sowohl von den Desmidiaceen wie von den Zygnemaceen auffallend durch die Art der Copulation. Während bei diesen einerseits an der Bildung der Zygosporie die Membranen der beiden sich kopulirenden Zellen keinen Antheil nehmen und die Membranen dieser Zellen nach vollendeter Copulation und Reifung der Zygosporie als leere Hüllen obliteriren (Desmidiaceen) oder andererseits die Membranbildung der Zygosporie zwar unabhängig von den Membranen der sich kopulirenden Zellen jedoch innerhalb des von beiden Zellen gebildeten Raumes erfolgt (Zygnemaceen), so nehmen bei der Zygosporienbildung des *Palmogloea* nicht bloss der Inhalt der beiden kopulirenden Zellen, sondern auch an der Membranbildung der Spore die Membranen beider Zellen Antheil. (Alex. Braun. Verjüng. p. 216. Taf. 1. Fig. 1—42.) *Palmogloea* würde demgemäss eine eigene dritte Abtheilung der kopulirenden Algen darzustellen haben.

Spirotaenia. Brebisson.

Spirot. condensata Brebisson. (Ralfs brittish Desm. Taf. 34. Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs p. 177. Alg. Sachsens Nr. 171.)

Länge 0,092mm.—0,192mm. Breite 0,015mm.—0,024mm.

Im Gebiete an mehreren Orten beobachtet, entweder unter anderen Algen vereinzelt oder unvermischt mit Algen in wässerigem, gewöhnlich eisenoockerigem, Schlamme. Im schlammigen Grunde am Rande einzelner Tümpel in der „Solitude“ bei Erlangen, in Gräben an der Eisenbahn bei Eltersdorf unter andern Algen (Zygnemaceen), in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf und Oberndorf.

Spirot. obscura. Ralfs. (britt. Desmid. Taf. 34. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 178.)

Die Zellchen kürzer und schmaler als die Zellchen der *condensata*. Länge 0,061mm.—0,076mm. Breite 0,007mm.—0,013mm.

An einem einzigen Orte im Gebiete, aber daselbst in grosser Menge beobachtet; in einem Graben an dem Eisenbahndamme vor der Station Baiersdorf (auf der östlichen Seite des Dammes) mit andern Desmidiaceen theils vermischt, theils auch ganz unvermischt.

Im Inneren der Zellchen finden sich mehrere Chlorophyllbänder, während bei der vorigen Art ein einziges breites Chlorophyllband (in 6 bis 10 sehr engen Windungen) sich findet.

Die Stellung der Spirotänien im System ist noch sehr unsicher, dieselben gehören mit Eremosphaera am wahrscheinlichsten zu den Palmellaceen. Die Zellchen theilen sich durch Quertheilung fort und sind im jüngeren Zustande mit einer schleimigen Hülle umkleidet.

Familie der Zygnemaceen. Zygnemaceae.

Hyalotheca. Ehrenberg.

Hyaloth. dissiliens. Brebisson. (Smith.) (Engl. bot. Tab. 246. Ralfs. britt. Desmid. p. 52. Taf. 1. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 179. Algen Sachsens Nr. 384. Algen Eur. Nr. 1660. *Desmidium mucosum*. Brebisson Alg. Falaise p. 65. Taf. 2. Meneghini Synops. Desmid. Linnaea. p. 204. *Gloeoprium dissiliens*. Berkeley Ann. of Nat. Hist. v. 16. p. 11. Hassal. britt. Freshw. Alg. p. 346.)

In Gräben, kleinen Wassertümpeln mit ruhigem klaren Wasser nicht sehr selten im Gebiete; ziemlich rein in dem im Frühling mit Wasser angefüllten ausgemauerten Durchlasse durch den Eisenbahndamm vor der Station Baiersdorf, von welchem letzteren Standorte ich die Pflanze in Nr. 1660. b. der Algen Europas mitgetheilt habe. Dieselbe unterscheidet sich von der unter Nr. 1560. ebendort mitgetheilten Pflanze von Falaise gesammelt von Brebisson durch die grössere Zerbrechlichkeit der Fäden, die Dimensionen der Brebisson'schen Pflanze sind ein wenig niedriger als die der fränkischen. In

dem Brebisson'schen Präparate bildet die Pflanze lange — und wie es scheint — wenig zerbrechliche Fäden, in den meinigen bildet die Pflanze kürzere 2 bis 3 Linien lange schon mit blossen Auge recht gut erkennbare Fädchen.

„Eines der wichtigsten unterscheidenden Merkmale zwischen *H. mucosa* (Mert. non Kütz.) und *Hyal. dissiliens* (Smith) liegt, wie schon Ralfs. (britt. Desmid. p. 52.) hervorgehoben hat, in dem verschiedenen Grade der Zerbrechlichkeit der Fäden. *H. mucosa* bildet lange beim Umbiegen nicht zerbrechende Zellfäden, die Breite der Fäden ist etwas geringer als bei *H. dissiliens*, dagegen ist die Länge der einzelnen Zellen bei *dissiliens* im Verhältnisse zur Breite länger (2 : 1) als bei *mucosa* (wie 1 : 1), die Zellen der *H. dissiliens* sind ferner in der Mitte ringförmig eingefaltet, die Struktur des Inhaltes lässt sich bei *H. mucosa* weniger deutlich erkennen, als bei *H. dissiliens*, bei welcher um einen centralen Chlorophyllkörper radienförmig längliche Chlorophyllkörper sich anlagern. *H. dissiliens* bildet leicht zerbrechliche Fäden (wie *Desmidium Swartzii*, *apogonum*, *quadrangulare*, *Bambusina Brebissonii*). Länge der einzelnen Zellen in dem Präparate 0,023mm. Breite 0,09mm.“
Eitikette zu Nr. 1660. b. der Alg. Eur.

Hyaloth. mucosa. Ehrenberg. Ralfs. britt. Desmid. p. 52. Taf. 1. Fig. 2. Rabenh. Deutsch. p. 58. Kryptog. Sachs. p. 179. Alg. Sachs. Nr. 385. Desmasz. Kryptog. de France I. Nr. 809. *Conferva mucosa*. Mertens. Agardh System. p. 90).

In beschatteten etwas moorigen Waldgräben im Reichsforste an mehreren Orten beobachtet. Rein und in ziemlicher Menge findet sich die Pflanze in dem tiefen, immerwährend mit langsam fliessenden Wasser versehenen Waldgraben der in der Nähe des Waldortes „Moosbrunnlein“ seinen Ursprung nimmt, von welchem Standorte die Pflanze in den Algen Europas erscheinen wird.

Die Fäden sind im frischen Zustande mit einer dicken

glashellen Gallertscheide umhüllt, welche veranlasst, dass viele Fäden vereinigt eine schleimige gallertige Masse darstellen.

Desmidium. Agardh.

Desmid. Swartzii. Agardh. (Systema p. 9 Ralfs. britt. Desmid. p. 54. Taf. 5. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 56. Bacill. Nr. 41. Ehrenberg Infusionsth. Nr. 155. Taf. 10. Fig. 8. Conferva dissiliens. Engl. bot. Taf. 24. 64. Diatoma Swartzii. Ag. Swartz bot. Taf. 491. Lyngbye Hydroph. Dan. Taf. 61. Wallroth. Fl. Krypt. German. p. 118.)

F o r m a e.

a. Brebissonii Kütz. (Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 180.)
Cellularum a fronte visarum dentes truncati aut truncato rotundati; laminae chlorophyllaceae e corpusculo centrali excurrentes. ternae Cellularum latiduto 0,023mm.

b. Ralfsii. Kütz. (Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 181.)
Cellularum a fronte visarum dentes acute acuminati, laminae chlorophyllaceae e corpusculo centrali excurrentes ternae. Cellularum latitudo 0,038mm.—0,024mm.

Die erstere Form ist im Gebiete seltener als die zweite. Die erstere unter Desmidien und Zyguemeengemengen im Bischofssee, in einem Tümpel am Donau-Mainkanale bei Bruck, in einem Waldgraben im Reichsforste (immer in sehr vereinzelt meist kürzeren Fäden). Die zweite Form mit dem quadrangulär und aptogonum gemischt in Altwässern der Regnitz bei Baiersdorf, Oberndorf, Forchheim, Eggolsheim, in Gräben unter dem Schmaussenbuck bei Nürnberg und an a. O. Diese letztere Form bildet gewöhnlich längere schön dunkelgrüne von den umgebenden Algen schon mit blossem Auge deutlich unterscheidbare gerade Fäden bis zu 2 bis 3 Linien Länge. Die Fäden dieser Form zeigen sich besonders schön und regelmässig mehrfach spiralig gewunden. Die Form amblyodon Itzigs., deren Fäden von fast goldgelber Farbe sind, deren Zähne wie bei a. beschaffen sind, habe ich noch nicht beobachtet. Der Unterschied der Formen a. und b. in den

Chlorophyllplatten ist nicht sehr wesentlich, da von den drei Chlorophyllplatten jede einzelne Platte aus je zwei sehr genäherten Platten zusammengesetzt ist. Die zwischen den Platten befindlichen meist hyalinen Räume sind sehr häufig mit einer Unzahl lebhaft beweglicher Moleküle erfüllt.

Desmid. quadrangulare Kützinger (Ralfs brittish Desmid. p. 54. Taf. 5. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 181.) Die Zellchen 0,038mm.—0,054mm. breit, die Zähne entweder wie bei der Form b. des *Swartzii* beschaffen oder geschweift zweizähnig.

Im Gebiete an einer einzigen Stelle beobachtet; in Altwässern der Regnitz bei Oberndorf gemeinschaftlich mit *Desm. Swartzii. a.*

Diese Art stellt wahrscheinlich nur eine Form des *Swartzii* dar, dieselbe verhält sich zu *Swartzii* gerade so wie bei einer *Staurostrum*art ein Specim. mit 4seitigen Hälften zu einem Specim. mit 3seitigen Hälften.

Desmid. aptogonum. Brebisson. (*Aptogonum Desmidium.* Ralfs britt. Desmid. Taf. 32. Fig. 1. De Bary Unters. über die Conjug. Taf. 6. Fig. 55. 56. *Odonella Desmidium.* Ehrenberg. Infusionsth. Taf. 16. Fig. 4. *Desmid. aptogonum.* Breb. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 181.)

Die Dimensionen der Zellchen wie bei der Form a. des *Desmid. Swartzii*, auch die Form der Zähne mit dieser übereinstimmend, nur durch die zwischen je zwei Zellchen befindlichen Zwischenräume, welche von der Seite betrachtet im Umriss elliptisch sind.

In Gräben am Rödelheimbache im Reichswald, mit vielen andern Desmidien untermischt, in Altwässern der Regnitz, bei Baiersdorf, Oberndorf, in einem Tümpel am Donau-Mainkanale bei Bruck.

Der Inhalt der Zellchen ist nicht so lebhaft gefärbt wie bei *Desmid. Swartzii*, die Fädchen meist kürzer.

Desmid. didymum Corda. (Alman. de Carlsbad Taf. 4. Fig. 43. und 44.) habe ich im Gebiete noch nicht beobachtet.

Didymoprium. Kützing.

Didymopr. Grevillii. Kützing. (*Phycologia generalis* p. 166. Ralfs. britt. Desmid. Taf. 2 Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 180. Alg. Sachens Nr. 125. Nr. 628. Bacill. Nr. 58. Kryptogfl. Deutschl. p. 57. *Desmidium cylindricum* Greville Scott, Flor. Taf. 293.)

Grösste Breite der Zellchen 0,042mm. 0,061mm., kleinste Breite der Zellchen 0,034mm. - 0,046mm.

Die Zellchen sind vom Scheitel betrachtet von elliptischem Umrisse, die Pole plötzlich in ein stumpfliches Spitzchen verschmälert, die einzelnen Zellchen am Faden wie bei *Desmidium* spiralig um ihre Achse gedreht, die Fäden sind mit einer dicken glashellen Gallertröhre umhüllt, deren Dicke bis 0,024mm. beträgt. Der Inhalt der Zellen besteht, vom Scheitel der Zelle betrachtet, aus je fünf strahlig angeordneten, am äusseren Ende breiteren nach innen verschmälerten, in der Mitte selbst zusammenhängenden oder durch einen hyalinen Raum von einander getrennten schön grünen Chlorophyllplatten, seltener finden sich der Chlorophyllplatten nur vier; der innere hyaline Raum ist sehr häufig mit einer Unzahl lebhaft beweglicher Moleküle erfüllt.

In Altwässern der Regnitz bei Forchheim, Eggolsheim, in einem Weiherchen unter andern *Zygnemeen* bei Effeltrich am Hetzles, in einem Tümpel am Donau-Mainkanale bei Bruck, in der „Solitude“ bei Erlangen.

Bambusina. Kützing.

Bambusina Brebissonii. Kützing. (*Phycol. German.* p. 140. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 58. Kryptog. Sachs. p. 180. Alg. Sachs. Nr. 483. *Didymoprium Borreri* Ralfs britt. Desmid. Taf. 3.)

Die Länge der tonnenförmigen an den beiden Enden verschmälerten Zellchen 0,015mm.—0,025mm., die grösste Breite 0,012mm.—0,021mm. Der Zelleninhalt besteht aus einer un-

bestimmten Anzahl peripherisch gestellter Chlorophyllplatten, von der Front betrachtet zeigen sich dieselben in der Mitte durch einen schmalen hyalinen Raum getrennt.

Im Gebiete ziemlich selten. In der „Solitude“ bei Erlangen, sehr vereinzelt unter *Didymoprium Grevillii* und vielen Desmidiaceen, ebenso in einem Graben bei der Schleifmühle bei Erlangen.

Gonatozygon. De Bary.

Gonatozygon asperum. (Ralfs.) Rabenhorst. (*Docidium asperum* Ralfs britt. Desmid. Taf. 26. Fig. 6. *Gonatozyg. Ralfsii*. De Bary. Unters. über die Conjugat. p. 76. Taf. 4. Fig. 23—25. *Gonatoz. mesotaenium*. De Bary. Hedwigia I. p. 106. *Gonatoz. asperum* Rabenhorst. Kryptog. Sachs. p. 182. Algen Sachsens Nr. 539.)

Die an den beiden Enden plötzlich etwas verschmälerten und zusammenhängenden Zellchen messen in der Breite 0,006mm. — 0,012mm, in der Länge 0,107mm. — 0,146mm. Gewöhnlich findet man die einzelnen Zellchen von einander abgetrennt und freischwimmend, seltener noch an ihren Enden zusammenhängende Fäden bildend, weshalb Ralfs verleitet wurde, die Pflanze zu *Docidium* zu stellen. Die ganze Oberfläche der Zellchen ist sehr dicht mit sehr feinen spitzen Wärzchen besetzt.

In einer Stelle im Gebiete, aber daselbst sehr reichlich beobachtet; in einem vom „Moosbrünnelein“ im Reichsforste seinen Ursprung nehmenden Bächlein mit immerwährend langsam fließenden Wasser an Moosen (*Hypn. cordifolium*, *aduncum* *Sphagnum*) und Binsenhalmen anhängende fluthende Gallertmassen bildend.

Mit vielen Desmidiaceen (*Staurastr. franconium* u. sp. *Micrasterias rotata*, *denticulata* u. v. a.) untermischt; von diesem Standorte wird die Pflanze in den Algen Europas mitgetheilt werden.

Rhynchonema. Kützing.

Rhynchon. quadratum. Hassal (Britt. Freshw. Algae. p. 151. Taf. XXXVII. Fig. 1. Kützing. Tabul. Phycol. Taf. 32. Fig. 6. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 204). In Copulation beobachtet unter andern Zygnemeen in vereinzelt Fäden, in einem Weiherchen bei Kosbach bei Erlangen.

Die mit einem einzigen Chlorophyllbande versehenen Zellen 0,027mm. – 0,03mm. dick, 0,092mm. — 0 1mm lang.

Von den übrigen im Gebiete vorkommenden von den bis jetzt unterschiedenen Arten wage ich mit Bestimmtheit andere nicht anzugeben, da bei den Rhynchomenen nur der Zustand der Copulation die Gattung überhaupt von den Spirogyren unterscheiden lässt, den ich nur bei einer Art beobachtet und der nur in günstigen Fällen zu beobachten ist.

Spirogyra. Link.

Von den sehr vielen bis jetzt aufgestellten Arten der Spirogyren mögen im Gebiete eine grössere Anzahl sich vorfinden, da die Spirogyren in den stehenden Wassermassen von oft grösserer Ausdehnung (Bischoffsee u. a.) in dem westlichen Theile des Gebietes in oft ungeheuren Massen wie auch in fast allen Gewässern nicht nur des Keuper- sondern auch des Kalkgebietes sich vorfinden; der Aufsuchung und Unterscheidung dieser Formen im Sinne der neueren algologischen Schriften meine Zeit zuzuwenden, hätte ich nur in dem Falle für lohnenswerth erachtet, wenn ich den Entwurf zu einer genaueren kritischen Monographie der Gattung, die dringend nothwendig wäre, mir jetzt schon vorgenommen hätte; denn offen gestanden habe ich den meisten Spirogyraarten wenig Geschmack abgewinnen können und ich glaube, dass die Gesamtzahl der bis jetzt aufgestellten Arten (mehr als 65) bei einer zukünftigen gründlicheren Bearbeitung und kritischen Durchsichtung jedenfalls bis auf die Hälfte ja vielleicht bis weniger als ein

Drittel reducirt werden müssen. Ich führe von den näher untersuchten der im Gebiete vorhandenen Formen nur einige der unzweifelhaften Arten an, ohne aber damit deren Abgegrenztheit von anderen neuerdings aufgestellten Arten anzudeuten und ohne eine spätere Einreihung vieler dieser letzteren für nicht zulässig erachten zu wollen.

Spirog. inflata. Vaucher (Hist. de Conf. d'eau douce. Taf. V. Fig. 3. Rabenhorst Kryptogfl. Deutschl. p. 120. Kryptog. Sachs. p. 206. *Zygnema inflatum*. Hassal britt. Freshw. Alg. Taf. XXXII. Fig. 6—3. *Spirogyra gastroides*. Kützing. Spec. Alg. p. 437. Tab. Phycol. Taf. V. Fig. 29.)

Zellen 0,015mm.—0,021mm dick, 0,061mm.—0,084mm. lang.

Im Bischofssee, in Gräben bei der Ruine Scharfeneck bei Baiersdorf, im Duzendteich bei Nürnberg u. a. a. O.

Spirog. Weberi Kützing und *Spirog. ventricosa* Kützing, welche einer Art anzugehören scheinen, finden sich gesellschaftlich in einem Teiche bei Röttenbach.

Spirog. condensata. Vaucher (Conf. d'eau douce. Taf. V. Fig. 2. Kützing. Tab. Phycol. Taf. 22. Fig. III. Rabenhorst. Kryptog. Sachs. p. 208. *Zygnema condensatum* Agardh. Systema).

Zellen 0,038mm.—0,05mm. dick, 0,04mm.—0,045mm. lang.

In Gräben am Donau-Mainkanale bei Erlangen, in Gräben bei der Station Baiersdorf, in Wiesengräben bei Eltersdorf.

Spirog. insignis Kützing. (Tabul. Phycol. Taf. 31. Fig. 4. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 207. Alg. Sachs. Nr. 635.

Zygnema insigne Hassal britt. Freshw. Algae. Taf. 103. Fig. 1. 2.)

Zellen 0,027mm.—0,031mm. dick, 0,122mm.—0,169mm. lang.

In Gräben und stehenden Wassern bei der Ruine Scharfeneck bei Baiersdorf.

Spirogyra arcta Agardh. (Kützing Tabul. Phycol.

Taf. XI. Fig. 2. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 208. *Zygnema arctum*. Agardh. Systema Algarum p. 79.)

Zellen 0,033mm.—0,038mm dick, 0,083mm.—0,042mm. lang.

In stehenden und langsam fliessenden Gräben bei der Station Baiersdorf, Gräben am Kosbacher Weiher.

Spirog. nitida. Dillwyn (Synopsis. of the britt. Conferveae Kützing. Tab. Phycol. Taf. 27. Ftg. 1. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 121. Kryptog. Sachs. p. 210. Algen Sachsens. Nr. 55. Hassal. br. Freshw. Alg. Taf. TXII. Fig. 1. *Conferva scalaris* Roth. Tentam. fl. Germ. *Zygnema nitidum*. Agardh. Systema Algarum).

Zellen 0,062mm.—0,075mm. dick, 0,122mm.—0,138mm. lang.

Ziemlich verbreitet im Gebiete, die prächtigen dunkelgrünen schleimigen Rasen in Bächen mit tiefem langsam fließenden Wasser sind in der Regel *Spirog. nitida*, in der Seebach, in Gräben bei der Station Baiersdorf in Altwässern der Regnitz bei Forchheim u. a. a. O.

Spirog. crassa. Kützing (Spec. Alg. Taf. 28. Fig. 2. Algae exsicc. Nr. 98. Tab. Phycol. Taf. 14. Fig. 4. Rabenhorst Kryptogomen fl. Deutschl. p. 121. Kryptog. Sachs. p. 211. Alg Sachs. Nr. 397. *Zygnema maximum* und *serratum*. Hassal. britt. Freshw. Alg. Taf. XVIII.)

Die Zellen dieser von allen *Spirogyren* ansehnlichsten Art, deren Zellfäden die Dicke eines mässig dicken Zwirnfadens besitzen, eine Breite von 0,123mm.—0,165mm., eine ziemlich wechselnde Länge von 0,084mm.—0,168mm

In einem Graben am Kosbacher Weiher.

Spirog. jugalis. Dillwgn. (Synopsis of the br. Confervae. Kützing Phycol. Germ. p. 233. Phycol. Gener. Taf. 14. Fig. 2. Rabenhorst Kryptogomenfl. Deutschl. p. 121. Kryptog. Sachs. p. 211. Alg. Sachs. Nr. 1049).

Zellen 0,073mm.—0,094mm. dick, 0,092mm.—0,184mm. lang.

Verbreitet in den grösseren Teichen des Gebietes, Bischofssee, Kosbacher Weiher, Dutzendteich.

Zygnema. Agardh.

Zygn. stellinum. Vaucher. (Agardh Systema Alg. Kützing. Phycol. Gener. Taf. 15. Fig. 2. Rabenhost Kryptogfl. Deutschl. p. 121. Kryptog. Sachs. p. 212. Alg. Sachs. Nr. 184, 252. *Conjugata stellina* Vaucher Conf. d'eau douce. Taf. VII. Fig. 1.)

Zellen 0,019mm.—0,027mm. dick, 0,038mm.—0,06mm. lang.

In Gräben olivengrüne Rasen bildend, am Bischofssee, im Aurachthale bei Falkendorf, Herzogenaurach, in Gräben bei Mögeldorf bei Nürnberg.

Zygn. cruciatum, Agardh. (Systema Alg. 77. Kützing. Tab. Phycol. Taf. 17. Fig. 14. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 122. Kryptog. Sachs. p. 212. Alg. Sachs. Nr. 95. 712. *Conjugata cruciata*. Vaucher Conferv. d'eau douce. Tef. VI. Fig. 4. *Tyndaridia cruciata*. Hassal. britt. Freshw. Algae. p. 160. Taf. 38. Fig. 1).

Zellen 0,042mm.—0,048mm. dick, 0,046mm.—0,076mm. lang.

Meist etwas dunkler olivengrün gefärbte Massen, sowohl in stehenden grösseren Wassern als in langsam fliessenden Bächen; getrocknet wird die Pflanze stark entfärbt und erlangt schwarzbraune Färbung.

Zygn. Vaucheri. Agardh. (Systema. Algarum. Kützing Phycol. Gener. Taf. 16. Fig. 5. Rabenhorst. Kryptogfl. Deutschl. p. 121. Kryptog. Sachs. p. 213. Alg. Sachs. Nr. 519. 639. *Conjugata gracilis*. Vaucher. Conferves d'eau douce. Taf. VI. Fig. 2.)

Zellen 0,016mm.—0,023mm. dick, 0,038mm.—0,058mm. lang.

In langsam fliessenden Gräben, meist zwischen im Was-

ser befindlichen Gegenständen spinnwebig verwobene dunkel-olivengrüne schlüpfrige Massen bildend.

In Waldgräben im Reichsforste, am Bischofssee, am Dutzendteich.

Zygogonium. Kützing.

Zygogon. anomalum. Ralfs. (Ann. of. Nat. Hist. Kützing. Phycol. Gener. p. 281. Rabenhorst. Kryptogfl. Deutschl. p. 122).

Die Fäden 0,023mm. — 0,061mm dick; die Zellen so lang als breit oder ein wenig länger, die Membran der Zellen dick, nach aussen von einer doppelt konturrierten Hülle umgeben; zwischen mehreren Zellen findet sich oft ein einzelner obliterirter Zellraum.

In einem zeitweise von Wasser befreiten aber immer feuchten Torfgraben am „Moosbrünnlein“ im Reichsforste (Seibaldsforst); überzieht daselbst die ganze innere Fläche des Grabens mit einer dichten Haut, welche in quadratschuhgrossen Stücken abgezogen werden kann.

Von diesem Standorte wird die Pflanze in den Algen Europas mitgetheilt werden.

Zygogon. ericetorum. Dillwyn. (Synopsis. of the britt. Conservae. Kützing Tab. Phycol. Taf. X. Fig. 11. Rabenhorst Kryptogmfl. Deutschl. p. 122. Kryptog. Sachs. p. 214. Alg. Sachs. Nr. 181. Conferva ericetorum. Roth. Catalog. Taf V. Fig. 1. Kützing. Alg. exsicc. Nr. 51).

Zellen 0,013mm. breit, 0,015mm. lang.

In Vertiefungen und Lachen, welche nur zur Regenzeit mit Wasser angefüllt sind, röthlich bis rosenfarbig gefärbte Ueberzüge bildend. Die Ueberzüge haben nicht die derbe filzige Beschaffenheit des *Zygogon. anomalum*. Im Erlanger Stadtwalde, im Spardorfer Wald bei Erlangen, in dem Föhrenwalde zwischen dem Schmaussenbuck und Pillenreuth bei Nürnberg, in dem Hauptsmoorwald bei Bamberg.

Zygogon. delicatulum. Kützing (Tabul. Phycol.

Taf. 10. Fig. 1. Rabenhorst. Kryptog. Sachs p. 214. Alg. Sachs. Nr. 372).

Zellen 0,009mm.—0,013mm. breit, 0,006mm.—0,01mm. lang.

In halb und ganz ausgetrockneten Gräben im Reichsforste, im Erlanger Stadtwald.

Pleurocarpus. Alex. Braun.

Pleuroc. mirabilis. Alex. Braun. (Algar unicell. genera. p. 60. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 317. Alg. Sachsens Nr. 1119. Algen Europas Nr. 1675, Mesocarpus pleurocarpus. De Bary. Unters. über die Conjugaten p. 31. Taf. III. Fig. 14).

Zygogonium pleurocarpus. Kützing. Tabul. phycol. V. Taf. 13. Fig. 4.

Die Zellen 4 bis 5mal so lang als breit, 0,023mm breit.

In einem Grabeu am Eisenbahndamme von der Station Eltersdorf bei Erlangen; in einem Teiche bei Effeltrich. Von dem ersteren Standorte von mir unter Nr. 1675 der 64. und 65. Dekade der Algen Europas mitgetheilt.

Sirogonium. Kützing.

Sirogon. sticticnm. Kützing. (Tabul. phycol. V. Taf. 4. Fig. 1. 2. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 215. Algen Sachsens Nr. 168. 659. 526).

Zellen 0,038mm. dick, 0,192mm.—0,305mm. lang.

Der geradelaufenden Chlorophyllbänder drei bis vier, jedes einzelne Chlorophyllband mit 7 bis 8 einzelnen, in einer Reihe liegenden Amylumkörnchen versehen, die Breite der Chlorophyllbänder 0,004mm.—0,006mm., Breite der Körner 0,008mm.

Die Copulation und Zygosporienbildung erfolgt ganz wie bei Spirogyra.

In einem Altwasser der Regnitz bei Oberndorf unterhalb

Erlangen, flockige grünliche auf der Oberfläche des Wassers schwimmende Watten bildend.

Mougeotia. Agardh.

Moug. genuflexa. Roth. (Catalog. II. p. 199. Agard. Systema Algarum. p. 83. Kützing Tabul. Phycol. V. Taf. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 216. Kryptogfl. Deutschl. p. 119. Alg. Sachs. Nr. 9. *Conterva genuflexa*. Roth. Catalog).

Zellen 0.03mm. -- 0,038mm. dick, 0,065mm. -- 0,138mm. lang.

Im Gebiete ziemlich verbreitet; auf der Oberfläche des Wassers sowohl schwimmende als auch untergetauchte schmutzig-grünliche Rasen bildend. Im Teiche bei Ebersbach, im Bischofssee, im Dutzendteich, im Teiche bei Effeltrich u. a. a. O.

Die zwei Formen: *gracilis* (*Moug. gracilis* Kütz. Phycol. German. p. 221.) und *elongata* (*Moug. gracilis* γ . Kützing. Phycol. German. *Moug. genuflexa* Kützing. Phycol. gener. Taf. 14. Fig. 1) kommen häufig mit der typischen Form vor.

Die erstere hat bis zu 0,023mm. breite Fäden, die letztere bis zu 0.384mm. lange Zellen.

Moug. radicans. Kützing (Tabul. Phycol. Taf. 3. Fig. 1. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 216. *Mougeotia gracilis* β . *radicans*. Kützing. Spec. Alg. p. 434).

Die Copulationsfortsätze der Zellen, welche nicht kopulieren, verlängern sich und wachsen allmählig in wurzelartige dünne Aestchen aus, die sich aber nicht theilen, sondern auch später noch als blinde Aussackungen der Zellen des Fadens erscheinen. Die wurzelartigen Zweige, welche von den Fäden der Rhizoclonien abgehen, sind dagegen wie die Fäden selbst aus Zellen zusammengesetzt.

In einem Weiherchen bei Kersbach oberhalb Forchheim.

Mesocarpus. Hassal.

Mesocarp. scalaris. Hassal. (Brittish Freshw. Algae p. 166. Taf. 42. Fig. 1. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 216.

Alg. Sachs. Nr. 433. 991. De Bary. Unters. über die Conjugat. p. 80. *Sphaerocarpus scalaris* Kützing Tabul. Phycol. V. Taf. 5. Fig. 1).

Zellen 0,016mm.—0,019mm. breit und bis 0,13mm. lang.

Der Durchmesser der kugeligen Sporen mit brauner glatter mittlerer Membran 0,027mm—0,038mm.

Im Teiche bei Ebersbach, in einem kleineren Teiche am Kosbacher grösseren Weiher; in dem kleinen Moore unter dem „tropfenden Felsen“ im Reichsforste (am 14. Mai schön in Copulation).

Mesocarp. parvulus. Hassal. (britt. Freshw. Algae. p. 169. Taf. 45. Fig. 2. 3. Rabenhorst. Kryptog. Sachs. p. 217. Alg. Sachs. Nr. 713. De Bary Unters. über die Conjug. Taf. I. Fig. 15. Kützing. Tab. Phycol. Taf. 7. Fig. 3).

Zellen 1,009mm.—0,012mm. breit, 0,016mm.—0,093mm. lang.

Der Durchmesser der kugelrunden Sporen mit glatter brauner mittlerer Membran 0,013mm.—0,015mm.

Im Reichsforste in kleinen nur im Frühling und Frühsommer mit Wasser angefüllten, während des Sommers trockenen Waldgräben, wie auch in ebenso beschaffenen Pfützen und Tümpeln (im April und Anfang Mai sehr schön in Copulation mit Früchten beobachtet).

Mesocarp. intricatus. Hassal. (britt. Freshw. Algae. p. 167. Taf. 43 Fig. 1. Rabenhorst Kryptog. Sachs. p. 217. Alg. Sachs. Nr. 454. Kützing. Tabul. Phycol. Taf. 6. Fig. 1).

Zellen 0,018mm. breit, 0,038mm — 0,054mm. lang.

Sporen länglich, fast ellipsoidisch, nie kugelrund, 0,024mm.—0,03mm. lang und 0,021mm.—0,024mm breit; die Mittelmembran ziemlich dick, braun und glatt; nur *Mesoc. nummuloides* Hass., welches sehr dünne Fäden hat, und welches ich im Gebiete noch nicht beobachtet habe, hat getüpfelte Mittelmembran.

In der „Solitude“ bei Erlangen in kleinen Weiherchen und Tümpelchen, an einer Stelle im Reichsforste bei Puckenhof.

Staurospermum. Kützing.

Staurosp. viride. Kützing. (Spec. Algar. p. 436. Tabul. Phycol. V. Taf. 8. Fig. 2. Rabenh. Kryptog. Sachs p. 218. Alg. Sachs. Nr. 90. De Bary. Unters. über d. Conjug. Taf. II. Fig. 17. 18).

Zellen 0,006mm.—9,008mm. dick, 0,03mm.—0,076mm. lang.

Sporen an den vier Ecken grubig vertieft.

In Gräben im Reichsforste, die während des Sommers trocken sind; meist mit Mougeotien, Spirogyren, Conferven und Rhizoklonien untermischt.

Staurosp. franconicum. P. Reinsch.

Zygospora a latere latiore visa in sciagraphia quadratica, lineae laterales submarginatae, Zygospora a latere angustiore visa elliptica; Zygosporarum membrana glaberrima, decolorata, Zygospor. anguli quaterni recte truncati (non lacunose impressi), interanea corpusculis chlorophyllaceis sphaericis regulariter dispositis quaternis instructa. Filamentum cellularum latitudo longitudinis nona usque undecima pars.

Filamentum cellularum longitudo 0,076mm.—0,092mm.

Cellularum latitudo 0,009mm.—0,008mm.

Zygosporae latitudo 0,03mm.—0,034mm.

Unterscheidet sich von dem *Staurosp. gracillimum*. Hassal durch die nicht grubig eingedrückten Ecken, durch die glatte mittlere Membran der Zygosporen, von dem *Staurosp. viride*. Kützing ebenfalls durch die nicht grubig eingedrückten Ecken der Zygosporen. Die mittlere Membran bei der ersteren Art ist dicht feinwarzig.

Beim Wildbade bei Rothenburg (in Gräben auf der Höhe im Burgbernheimer Wald zwischen dem Wildbade und dem Nortenberg), mit Desmidien und Conferven untermischt (Ende April sehr schön in Copulation und Anfangs Mai mit reifen Zygosporen).

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII. Fig. II.

Fig. II. a. Theil zweier in Copulation befindlicher Fäden, mit vier bereits beinahe gereiften Zygosporen; b. eine einzelne Zygospore von einem Fadenpaar in diesem Zustande stärker vergrößert, der Inhalt schon vollkommen ausgebildet und aus körnigem Plasma mit Chlorophyll untermischt und vier sphärischen in den Ecken regelmässig vertheilten Chlorophyllkörperchen bestehend; c. Theil eines stärker vergrößerten Fadens im ersten Stadium der Copulation und kopulationsreif, die schon angedeuteten Copulationsfortsätze breit kegelförmig mit abgerundeten Spitzen; d. eine reife Zygospore, die Membranen der leeren kopulirten Zellen sind von den vier Ecken schon abgefallen; e. Seitenansicht einer reifen Spore (gleich vergrößert).

III. Ordnung der chlorophyllhaltigen Algen: Siphonaceae, Schlauchalgen.

Familie der Traubenalgen (Botrydiaceae.)

Botrydium. Wallroth.

Botryd. granulatum. Linne. (*Ulva granulata* Linne. Spec. p. 1633. Schreber Spicilleg. p. 141. *Vaucheria radicata* Agardh Syst. p. 465, *Coccochloris radicata* Sprengel. Syst. IV. p. 372. *Tremella granulata* Roth. Tent. fl. Germ. III. p. 552, *Vaucheria granulata* Wallroth. Fl. Cryptog. Germ. p. 57. *Botrydium granulatum*. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. II. p. 124. Kryptog. Sachs. p. 222. Alg. Sachs. Nr. 86. 537).

Die Pflänzchen bis zu $1\frac{1}{2}$ mm. Durchmesser, der obere (oberirdische) Theil kugelförmig nach unten zu allmählig verschmälert und in eine oder zwei Hauptwurzeln verlaufend, die allmählig in viele feine Würzelchen sich verzweigen, der im Anfange dichte und homogene die innere Zellmembran umkleidende Chlorophyllinhalt erstreckt sich nur bis an den Wurzelhals; die Membran ist ziemlich rigid, bei einem Einschnitt

in dieselbe dringt der Zellinhalt heraus, die Membran sinkt als ein derbes Häutchen zusammen, dessen Inhalt sich durch Pressen vollends heräusdrücken lässt, der ausfliessende Inhalt besteht in diesem Stadium aus feinkörnigem Plasma mit Chlorophyllkörnchen tingirt. Später löst sich die grüne Plasmaschichte von der Membran los, zerreisst in einzelne gleichgrosse Fragmente, die sich abrunden, mit einer Membran umkleiden, und sich allmählig zu Tochterzellen individualisiren. Zuletzt ist das ganze kugelige Zellchen mit kugelichen Tochterzellchen dicht erfüllt, während die Pflanze vor diesem Stadium eine intensiv grasgrüne Färbung zeigte, zeigt die Pflanze in dem letzteren Stadium eine hell- bis meergrüne Färbung, (reife und unreife Pflänzchen) lassen sich daher durch die Färbung leicht mit blossen Auge unterscheiden. Die Membran des Mutterindividuums verflüssigt sich zuletzt, sie sinkt zusammen und die Tochterzellchen gelangen als Keime zu neuen Individuen in die Erde. Die Reifung der Individuen geschieht gegen den Herbst, wonach die Keimzellchen während des Winters ruhend in der Erde liegen und im nächsten Frühling keimen. Die Entwicklung des Keimzellchens zu einem neuen Individuum geht ohne Vorkeimbildung vor sich. Das eine wurzelartig sich verlängernde Ende dringt sogleich als Wurzel in die Erde ein, das andere Ende entwickelt sich zum oberirdischen Theile. Der Durchmesser eines reifen Keimzellchens ist 0,009mm.—0.12mm. der Cubikinhalt eines reifen Pflänzchens von einem Millimeter ist = 0,52cmm., der Cubikinhalt eines reifen Keimzellchens von 0,01mm. Durchmesser = 0,00004cmm., mithin enthält ein reifes Pflänzchen von 1mm. Durchmesser = 10000—10500 einzelne selbstständige Keimzellehen.

Auf feuchtem Teichschlamm in während des Herbstes und Winters trocknen Weihern bei Möhrendorf unterhalb Erlangen; die Pflanze siedelt sich gerne auf den Flächen der grossen Spalten an, welche entstehen, wenn das Wasser zurückgetreten und der Grund allmählig an der Luft austrocknet. Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII. Fig. IV.

Fig. IV. a Ein Individuum im Zustande der Reife 12mal vergr.; b. zwei Individuen in natürlicher Grösse; c. reife Keimzellchen (Durchmesser 0,012m.).

Familie der Vaucheriaceen (Vaucheriaceae).

Vaucheria, De Candolle.

Vaucher. clavata. Agardh. (Syst. Alg. p. 172. Unger, die Pflanze. i. Momente etc. Kützing. Tabul. Phycol VI. Taf. 66. De Cand. Flore. franc. II p. 64. Vaucher Hist. de Conf. Taf. 3. Fig. 10. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 125).

In Gräben am Eisenbahndamme unterhalb des Tunnels bei Erlangen.

Vaucher. dichotoma. Lyngbye. (Hydrophyt. Dan. p. 75. Taf. 19. Martius Fl. Erlang. p. 304. Agardh. Syst. p. 171. Conferva dichotoma Linne Spec. Plant. 1635. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 124).

In Gräben mit ruhigem stehendem Wasser, Möhrendorf, im Aurachthale ober Herzogenaurach.

Vaucher. terrestris Vaucher. (Hist. de Conferves. p. 27. Taf. 2. Fig. 3. Lyngb. Hydroph. Dan. Taf. 21. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 125. Alg. Europ. Nr. 1079).

Auf feuchter schattiger Gartenerde; Burgberg bei Erlangen. Früchte 0,076mm. lang, 0,069mm. breit.

Vaucher. Dillwynii. Agardh (Syst. Alg. p. 173. Lyngbye. Hydroph. Dan. Taf. 31. Kützing. Phycol. Gener. Taf. 15 Fig. 5. Wallroth. Fl. Crypt. Germ. p. 59. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 125. Alg. Europ. Nr. 750. 1078).

Früchte 0,069mm. lang, 0,001mm. breit; Breite der Fäden 0,054mm.

Auf feuchtem Weiherschlamme in den Teichen bei Möhrendorf bei Erlangen.

Vaucher. sessilis Vaucher. (Ectosperma sessilis Vaucher. Hist. des Conferves. Taf. 2. Fig. 7. Lyngbye. Hydroph. Dan. p. 80. Taf. 22. Agardh. Systema. Alg. p. 174. Rabenh.

Kryptogfl. Deutschl. p. 125. Kützing. Tabul. Phycol. Taf. VI. Taf. 59).

Breite der Fäden 0,075mm.—0,115mm. grösste Länge der unregelmässig gestalteten Früchte 0,13mm.—0,147mm. grösste Breite 0,117mm.—0,131mm. An manchen Fäden findet sich neben dem Hörnchen nur eine einzige Sporenzelle.

An einer quelligen immer von Wasser überriesselten Stelle an dem Eisenbahndamme unterhalb des Tunnels bei Erlangen (im Mai sehr reichlich blühend und fruktifizierend beobachtet).

Vaucher. pendula. P. Reinsch.

Fila setiformia, rigida, dense intertexta, colore laete smaragdina indivisa (raro dichotoma); fructus solitaires, in ramo laterali brevior (fructus pedicello: autorum) chlorophyllo densius aut dilutius repleto fructus maturi diametro longitudinali duplo longiore supraque cernulum (antheridium: Pringsheimi) simpliciter aut dupliciter convolutum insidentes; fructuum maturorum forma irregulariter sphaerico-ellipsoidica, poli bini diametraliter non oppositi, fructus infima pars laterale breviter truncata, fructus summa pars laterale breviter rostrata, membrana crassa hyalina; fructus ante maturitatis stadium penduli (rostellum deorsum versum), in maturitatis stadio sursum versi (rostellum sursum versum).

Filorum latitudo 0,069mm.

Fructus mat. longit 0,14mm.—0,135mm.

Fructus mat. latit 0,118mm.—0,123mm.

In schattigen tiefen Waldgräben, welche im Frühling zum Theil mit Wasser angefüllt sind, im Herbst wasserleer aber feucht sind; im Reichsforste in dem Waldgraben, welcher den Forstort „Rehbock“ quer durchschneidend sich nördlich erstreckt. Blüht und fruktifizirt im Herbst. Im lebenden Zustande hat die Pflanze eine intensiv smaragdgrüne Färbung, an dem Standorte überzieht die Pflanze die Wände und den untern Theil des Grabens als ein dichter Filz.

Unterscheidet sich von *Vaucher. rostellata* durch die lang

gestielten Früchte, durch längeren Schnabel, von *V. hamata* durch die Gestalt der Früchte, durch verschiedenen Blütenstand, von *V. Dillwynii* durch die Gestalt und Stellung der Früchte durch die langgestielten Früchte, von *V. bursata* durch die Gestalt der Früchte

Erklärung der Abbildungu auf Taf. XIII. Fig. III.

Fig. III a. Ein Blütenstand im Stadium der Reife, Frucht aufwärts gerichtet; b. ein Blütenstand im noch nicht ganz gereiften Zustande, Frucht abwärts geneigt; d. eine reife Frucht (doppelt vergrössert).

Vauch. geminata. De Candolle. (Fl. Gallica. II. Lyngbge. Hydroph. Dan. Taf. 23. Agardh Syst. Alg. p. 174. Spec. Alg. I. p. 467. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 126. Alg. Europ. Nr. 495. Wallroth. Fl. Kryptog. German. p. 60). Eine grössere Form, welche mir von Herrn Dr. Walther in Bayreuth mitgetheilt wurde, hat 0,061mm.—0,076mm. breite Fäden, länglich ellipsoidische Früchte von 0,117mm. Länge und 0,076mm. Breite, das Hörnchen in der Mitte zwischen den zwei an einem Stiele befindlichen Früchten halbaufwärts gerichtet. Die von mir auf dem Hezles (am östlichen Abhange bei Pommer auf Liassand) beobachtete Form hat in allen Theilen fast um die Hälfte niedrigere Dimensionen als die erstere. Breite der Fäden 0,03mm., Länge der Frucht 0,061mm.—0,069mm., die Früchte zwar länglich aber nicht mit abgerundeten Polen, das Ende des Hörnchens abwärts gerichtet, das Verhältniss der Länge der Stielchen zur Länge der Frucht wie des Seitenzweiges wie bei der ersteren. Ob beide identisch sind, wage ich nur nach den wenigen mir vorliegenden Specim. nicht zu entscheiden.

Vauch. racemosa. De Candolle. (Flora Gall. II. p. 61. Lyngbye. Hydroph. Dan. p. 82. taf. 23. Agardh Syst. Alg. p. 175. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 127. Alg. Europ. Nr. 431. Wallroth. Fl. Krypt. German, p. 60. Eotosperma racemosa. Vaucher Hist. des Conferves. Taf. 3. Fig. 8).

Länge der reifen Frucht 0,122mm.—0,138mm., Breite der

reifen Frucht 0,092mm.—1,108mm., Länge des Stielchens der Hörnchen bis 0,246mm., die Anzahl der reifen Früchte an einem Seitenzweige in der Regel drei; bei manchen Seitenzweigen entwickeln sich aus den Aussackungen des oberen Endes der Seitenzweige bloss männliche Blüten (Hörnchen, die übrigen drei zu weiblichen Zellen, manchmal entwickeln sich auch an ein und demselben Seitenzweige zwei Hörnchen und zwei weibliche Zellen und zwar in der Weise, dass neben je eine weibliche Zelle auf demselben Stielchen je ein Hörnchen zu stehen kommt.

In Gräben am Rödelheimbache und im Bache selbst, da wo derselbe den Reichsforst verlässt (im Mai und April reichlich blühend und fruktifizierend).

An einem andern Standorte, in einem Graben bei Falkendorf im Aurachthale beobachtete ich die Pflanze noch mit nicht gereiften Früchten im Oktober.

Vaucher. ornithocephala Agardh. (Systema Alg. p. 174. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 125. Alg. Europ. Nr. 197. 1100. Kützing. Tabul. Phycol. VI. Taf. 58).

Breite der Gäden 0,038mm., Durchmesser einer reifen, nach einer Seite ziemlich stark geschnäbelten fast sphärischen Frucht 0,061mm. Die Früchte an dem Seitenzweige fast sitzend, das zwischen je zwei Früchten befindliche Hörnchen stark hakenförmig eingekrümmt und gleich bei seinem Ursprunge an dem Seitenzweige abwärts gekrümmt (bei *Vaucher geminata* ist das Hörnchen nur an seinem oberen Theile nach abwärts gekrümmt).

Auf feuchter Erde in einer zeitweise mit Wasser angefüllten Vertiefung bei Sieglitzhof bei Erlangen (im Oktober noch recht schön mit reifen und halbreifen Früchten beobachtet).

Vaucher. caespitosa. De Candolle. (Flora Gall. II. p. 63. Lyngb. Hydroph. dan. p. 81. Taf. 23. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 127. Alg. Europ. Nr. 76. Wallroth. Fl. Kryptog. German. p. 60. *Ceramium caespitosum*. Roth. Fl. Germ. III.

p. 475. *Ectosperma caespitosa*, Vaucher. *Conferves* p. 28. Taf. 2. Fig. 4. *Conferva fontinalis* Blumenb. Gött. Mag. II. p. 80).

In einem Bächlein neben dem Weiher neben der Dechsen-dorfer Landstrasse (Erlangen), unweit des Dorfes, am Grunde festwurzelnde schlüpfrige Rasen bildend. Beim Abziehen der Pflanze vom Boden, welche sich in handgrossen Stücken ablösen lässt, bleibt eine dicke Sandlage an der untern Seite der Rasen hängen (nur steril beobachtet). Die eigenthümliche Beschaffenheit der Rasen lässt diese Vaucherie ohne mikroskopische Untersuchung von den übrigen Vaucherien leicht unterscheiden.

IV. Ordnung der chlorophyllhaltigen Algen: Confervaceae, Fadenalgen.

Aus der Familie der Ulvaceen (Ulvaceae), welche von einigen Algologen nicht mit Recht zu den Confervaceen gestellt wird, habe ich im Gebiete bis jetzt einen Repräsentanten nicht beobachtet.

Familie der Sphäropleaceen (Sphaeropleaceae).

Sphaeroplea. Agardh.

Sphaeroplea annulina. Agardh. *Systema. Algar.* p. 76. Rabenh. *Kryptogfl. Deutschl.* p. 89. *Alg. Europ.* Nr. 409 Wallroth. *Fl Cryptog. German.* p. 55. Kützing *Tabul. Phycol. III.* Taf. 31. *Conferva annulina*. Roth. *Catalog. III.* p. 211. Taf. 7).

Die Fäden 0,023mm.—0,038mm. dick, 0,394mm.—0,462mm. lang, die Zellen um das 12 bis 15 fache länger als breit; in jeder Zelle 12 bis 16 Chlorophyllringe; in jeder Zelle bis 20 Sporen. Reife Sporen sah ich in dem Zeitpunkt, in dem ich die Pflanze beobachtete nicht (12. Mai).

In einem kleinen Tümpel, der im Sommer trocken, im Frühling überschwemmt ist, am Donau-Mainkanale bei Kersbach oberhalb Forchheim, da wo die Landstrasse über den Kanalbach nach Kersbach führt.

Familie der Schleimkugeln (Gloeosphaeraceae).

Gloeotila. Kützing.

Gloeot. hyalina. Kützing. (Tabul. Phycol. III. Taf. 32. Alg. exsicc. Nr. 53. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 97).

In kleinen Waldstümpfen in der Markwaldung (bei Röttenbach), abgefallene Baumblätter als schlüpfrigen gelblichen Ueberzug überziehend.

Familie der Conferveen (Conferaceae.)

Microspora. Thuret.

Microsp. floccosa. Thuret. (Ann. dusc. Nat. 1852. p. 12. Taf. 17. Fig. 4—7. Rabenhorst Kryptogfl. Sachs. p. 245. Alg. Europa. Nr. 356. *Conferva floccosa* Agardh Syst. Alg.).

In Gräben am Schmaussenbuck bei Nürnberg.

Microsp. vulgaris. Rabenh. (Kryptogfl. Sachs. p. 245. Alg. Europ. Nr. 146).

In Gräben im Reichsforste.

Conferva. Linne.

Conferva tenerrima. Kützing, *rhyphilo.* Kütz., *subtilis* Kütz., *affinis.* Kütz., welche im Gebiete häufig gemengt und in den vielfachsten Uebergängen von einer Form in die andere vorkommen, sind sämtlich Formen einer einzigen Art.

In Waldgräben im Reichsforste, in der Markwaldung, im Hauptmoorwalde, in Altwässern und Gräben an der Regnitz ziemlich verbreitet.

Conf. bombycina. Agardh. (Syst. Alg. p. 96. Rabenh.

Kryptogfl. Deutschl. p. 103. Kryptogfl. Sachs. p. 246. Alg. Europ. Nr. 109)

Breite der Fäden 0,008mm.

Confervá rigida. P. Reinsch.

Fila rigida intertexta colore flavo virente, membrana crassiore pluristratiosa laminis intergerinis inter cellulas singulas cellularum membrana paulo crassioribus; membranae crassitudo cellularum latitudinis quinta pars; cellularum longitudo quatruplum usque quintuplum longitudinis; cellulae chlorophyllo granuloso dense repletae; fructificatio ignota.

Cellularum longitudo 0,162mm—0,192mm.

Cellularum latitudo 0,023mm.—0,038mm.

Membranae crassitudo 0,004mm.

In immerwährend mit Wasser erfüllten Gräben längs der Eisenbahn nahe bei der Station Baiersdorf.

Unterscheidet sich durch die sehr dicke Membran von den übrigen Conferven. Die Pflanze wird in den nächsten Dekaden der europ. Algensammlung mitgetheilt werden.

Erklärung der Abbildungen auf Taf. XIII. Fig. V. Fig. V. a. Theil eines Fadens (die Stelle, an welcher sich zwei benachbarte Zellen begrenzen) (Vergr. $6\frac{1}{2}$); b. grösseres Stück eines Fadens (mit drei Zellen) (Vergr. 14^0)

Eine Anzahl weiterer Conferven aus dem Gebiete, welche ich im Herbar aufbewahre, habe ich noch nicht hinlänglich untersucht.

Rhizoclonium. Kützing.

Rhizocl. rivulare. Linne. (*Conferva rivularis.* L. Syst. nat. p. 720. Roth. Fl. Germ. III. p. 496. Wallr. Fl. Kryptog. German. p. 37. Martius Fl. Kryptog. Erlang. p. 297. Rhizoclon. rivul. Kützing. Tabul. Phycol. III. Taf. 68. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 247).

In der Schwabach und Regnitz.

Cladophora. Kützing.

Clad. fracta. Vahl. (*Conferva fracta*. Vahl. Fl. dan. Fig. 946. Agardh. Syst. Alg. p. 110. Lyngb. Hydroph. dan. Fig. 52. *Cladoph. fracta*. Kützing. Tabul. Phycol. IV. Taf. 50. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 250. Alg. Eur. Nr. 59. 275).

In dem Teiche bei Effeltrich.

Clad. crispata. Roth. (*Conferva crispata*. Roth. Catal. II. p. 275. Agardh. Syst. Alg. p. 709. *Cladoph. crispata*. Kützing. Tab. Phycol. Taf. 40. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 251. Alg. Europ. Nr. 195).

In Teichen und Altwässern bei Forchheim, im Duzendteich bei Nürnberg.

Clad. glomerata. Linne. (*Conferva glomerata*. L. Spec. Plant. p. 1637. Agardh. Syst. Alg. p. 107. Martius Fl. Kryptog. Erlang. p. 295. *Cladoph. glomerata*. Kützing. Tab. Phycol. Taf. 33. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. 252. Alg. Europ. Nr. 135).

In der Schwabach, in den Bächen im fränkischen Jura ziemlich verbreitet (in mehreren Formen, die ich noch nicht hinlänglich untersucht habe).

Clad. fasciculata. Kützing. (Tab. Phycol. Taf. 35. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 253).

Breite der Fäden 0,076mm.—0,08mm., Zellen 3—5 mal so lang als breit.

In den Bächen die von den Jurabergen herabfliessen, am Fusse des Hetzles, in der Leinleiter, in der Aufsess, an losen Steinen festsitzend und im Wasser in büschlichen Rasen fluthend.

Eine Anzahl weiterer im Gebiete vorhandener Cladophoren habe ich noch nicht hinlänglich untersucht.

Chroolepus. Agardh.

Chrool. aureus. Linne. (*Byssus aurea* L. Spec. Plant. II. p. 1683. *Treutepohlia aurea*. Martius Fl. Kryptog. Erlangens. p. 351. Agardh. Syst. Alg. p. 36. Wallroth. Fl. Cryptog. German. p. 150. *Conferva aurea*. Dillwgn. britt. Conferveae Taf. 35. *Chroolepus aureum* Tab. Phycol. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 83. Alg. Europ. Nr. 13).

An losen kleineren Jurakalksteinen wie an grösseren Felsblöcken, wie an dolomischen Wänden im ganzen Jura nicht selten (am liebsten im Schatten), an den Keuperfelsen ist die Pflanze seltener anzutreffen (Schmaussenbuck bei Nürnberg). Im Herbar geht die im lebenden Zustande der Pflanze schön goldgelbe bis orangerothe Färbung alsbald in ein schmutziges Graugrün über.

Chrool. umbrinus. Kützing. (Fabul. Phycol. Taf. 7. Fig. 2. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 87. Kryptogfl. Sachs. p. 255. Alg. Europ. Nr. 83. Caspari Flora. 1858).

Auf der Rinde verschiedener Wald (Laub-) bäume, meist im Schatten an der untern Seite der Stämme, an der Rinde von Nadelbäumen im Gebiete von mir noch nicht beobachtet. Atzelsberger Wald bei Erlangen, Wälder am Hetzles, Moritzberg u. s. f., auch auf Aepfelbäumen (wie in dem Garten der Wirthschaft auf dem Schmaussenbuck bei Nürnberg).

Chrool. betulinus. Rabenhorst. (Kryptogamenfl. von Sachsen. p. 255. *Chrool. adoratum*. Rabenh. Alg. Europ. Nr. 616).

Ob diese Form, welche ich auf der Rinde am Grunde alter Birkenstämme im Atzelsberger Wald bei Erlangen beobachtete, eine eigene Art darstellt, glaube ich nicht bestimmt behaupten zu dürfen; die Zellchen sind gewöhnlich etwas kugelter als die des *Chrool. umbrinus*.

Familie der Oedogoniaceen (Oedogoniaceae).

Oedogonium. Link.

Oedog. Minutum. Kütz. (Tab. Phycol. III. Taf. 33. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 258).

Am Bischofssee.

Oedog. Rothii. Hassal. (britt. Fresw. Algae. Taf. 53. Fig. 7. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 258).

In Gräben und Altwässern an der Regnitz.

Oedog. tenellum. Kützing. (Tab. Phycol. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 258. Alg. Europa Nr. 612)

Ziemlich verbreitet im Gebiete.

Oedog. capillare. Kützing. (Phycol. Gener. Taf. 12. Fig. II. 1—10. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 102. Kryptogfl. Sachs. p. 259. Alg. Europ. Nr. 4).

Im Gebiete, namentlich in Lachen und Altwässern mit minder tiefem Wasser an der Regnitz. Wenn die Lachen bei anhaltender Dürre austrocknen, so bleibt auf dem trocknen Boden eine dichte zusammenhängende Papierähnliche Masse, welche sich in langen grossen Stücken vom Boden abziehen lässt, auf dem Boden zurück, in der Sonne bleicht die Masse allmählig ab und bildet eine weiss gelbliche Papierähnliche Substanz (Metorpapier), diese bildet die Form c Pannosum Rabenhorst (Alg. Europ. Nr. 818).

Oedog. undulatum. Brebisson. (Alg. Falaise. Rabenhorst Kryptogfl. Sachs. p. 261. Alg. Europ. Nr. 632. *Cymotonema confervaceum.* Kützing. Spec. et Tab. Phycol.).

In einem Waldgraben im Reichsforste in vereinzelter Fäden in einem Desmidiaceengemenge beobachtet.

Eine Anzahl weiterer im Gebiete vorkommender Oedogonien, sowie noch in einem Herbar befindliches Material habe ich noch nicht näher untersucht und namentlich wegen Mangel an Früchten noch nicht bestimmen können.

Bulbochaete. Agardh.

Bulboch. setigera. Agardh. Syst. Alg. p. 122 Roth. Catalog. III. Taf. VIII. Fig. 1. Lyrgb. Hydroph. dan. Taf. 45. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 119. Kryptogfl. Sachs. p. 262. Alg. Europ. Nr. 158. Pringsheim Jahrb. I. Taf. VI. Fig. 3).

An Wasserpflanzen wie an im Wasser schwimmenden Pflanzentheilen (Binsenhalmen) festsitzend, im Bischofssee, im Kosbacher Weiher, in Altwässern der Regnitz, in einem Graben bei der Schleifmühle bei Erlangen. Bei einem Altwasser bei Oberndorf entnommenen Rasen von *Lyngbya cinclinnata* beobachtete ich alle Fäden dicht mit jugendlichen *Bulbochaete*-exemplaren in allen Stadien der Entwicklung dicht besetzt, vom einzelligen Zustande eben aus der zur Ruhe gekommenen beweglichen Zelle entstanden an bis zu dem schon verästelten Faden mit entwickelten Borsten.

Familie der Ulotricheen (*Ulotricheae*).

Ulothrix. Kützing.

Ulothr. subtilis. Kützing. (Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 263. Alg. Europ. Nr. 657).

In Gräben.

Ulothr. tenerrima. Kützing (Tabul. Phycol. II Taf. 87. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 264. Alg. Europ. Nr. 371).

Fäden 0,008mm. dick, Zellen so lang als breit, Zelleninhalt genau quadratisch. Die Farbe der frischen Pflanze ist schön intensiv grasgrün — nicht gelbgrün.

An den nassen tropfenden Steinen der Stützmauer an der Brücke am Donau-Mainkanale bei Erlangen, in Lachen beim Bahnhofs in Baiersdorf

Die Kützing'schen Arten: *Ulothrix subtilissima*, *subtilis*, *variabilis* und *tenerrima* sind nur Formen einer und derselben Art.

Ulothr. mucosa. Thuret. (Ann. dessc. natur. 1852. Taf. 18. Fig. 8—11. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 264).

Breite der Fäden 0,012mm.—0,023mm.; Zellen halb so lang als breit.

In der Brunnenröhre mit sehr schnell fliessendem Wasser in dem Brunnen in Unterschöllnbach bei Eschenau.

Ulothr. tenuis. Kützing. (Spec. Alg. p. 347. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 264. Alg. Europ. Nr. 48).

Breite der Fäden 0,015mm.—0,023mm.

An Steinen in Gräben am Donau-Mainkanale lange fluthende Büschel bildend.

? *Ulothr. rigidula* Kützing. (Tabul. Phycol. Taf. 91. Rabenh. Kryptog. Sachs. p. 264. Alg. Europ. Nr. 385).

In einem wenig benutzten alten Brunnentroge eines laufenden Brunnens am Holze festsitzende dichte schleimige Watten zusammensetzend, im Dorfe Hetzles am Jura. Auf diesen *Ulothrix* passt keine der Diagnosen der Kützing'schen *Ulothrix*-species gut, will man die in einer kleinen Partie dieser Watten befindlichen verschiedenen Fäden, aus Zellen von sehr verschiedener relativer Länge zusammengesetzt, als ein und derselben Art angehörig betrachten, so würden die meisten der jetzigen *Ulothrichenspecies* als Formen einer Art betrachtet werden müssen, im andern Falle würde dieses Präparat ein Gemenge verschiedener Species darstellen. — Die häufigsten Fäden darin haben eine Breite von 0,023mm.—0,027mm., die Länge der Zellen ist der Breite gleich oder ein wenig grösser oder kleiner, die Membran dick, die Membran zwischen je zwei Zellen des Fadens doppelt kacturirt; diese Fäden passen somit auf *Ulothr. rigidula* am besten. Die dünnsten in dieser Masse befindlichen Fäden sind 0,008mm. dick, die Zellen doppelt so lang bis gleichlang, zwischen diesen und den für *rigidula* betrachteten finden sich jedoch alle möglichen Uebergänge. Ausser diesen kommen jedoch noch Fäden vor von 0,024mm. Breite, deren Zellen halb so lang als breit (oder noch kürzer) sind. In wie weit alle diese scheinbar verschiedenen schein-

bar unter einander gemengten Species angehörigen Fäden in einem Zusammenhange stehen und in wie weit die Ulothrichen-species wirkliche Species sind, bleibt inzwischen nicht entschieden. Die Pflanze wird von diesem Standorte in der europäischen Algensammlung mitgetheilt werden.

Ulothr. inaequalis. Kützing. (Spec. Alg. p. 347. Tab. Phycol. II. Taf. 91).

An den Brettern des Wehrs der Schleifmühle bei Erlangen. Stimmt mit der vom „Mühlenwehr bei Untersontheim“ bei Heilbronn in Schwaben in der europäischen Algensammlung enthaltenen Pflanze gut überein.

Hormidium. Kützing.

Hormid. murale. Agardh, (*Lyngbya muralis*. Agardh. Systema Algar. p. 74. *Hormid. murale* Kützing. Phycol. German. p. 193. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 96. Alg. Europ. Nr. 91. 817. *Ulothrix radicans*. Kützing Tab. Phycol. II. Taf. 95).

Auf feuchtem schattigem Boden am Rande von Gartenwegen, in Parkanlagen, in Alleen. Am Burgberge und im Schlossgarten in Erlangen gemein, öfters Quadratfuss grosse Flächen als ein lebhaft grün gefärbter Ueberzug überziehend.

Hormid. parietinum. Kützing. (Phycol. Gener. p. 244. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 96 Alg. Europ. Nr. 162).

Am Grunde von Baumstämmen; auf dem Schmaussenbuck bei Nürnberg, im Erlanger Stadtwald.

Mehrere andere Hormidien habe ich noch nicht hinlänglich untersucht.

Microthamnion. Naegeli.

Microth. strictissimum. Rabenh. (Kryptogamenfl. Sachs. p. 266. Alg. Europ. Nr. 829).

In einem kleinen Dümpel am obersten der Kosbacher Weiher, auf schwimmenden Binsenhalmen und Typhablättern aufsitzend.

Länge eines baumförmig verästelten Zellenfadens bis 0,046mm.

Stigeoclonium. Kützing.

Stigeocl. lubricum. Kützing. (Tab. Phycol. III. Taf. 8. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 267. Alg. Europ. Nr. 217).

In hölzernen Wasserleitungsrinnen im Regnitzthale.

Stigeocl. flagelliferum. Kützing. (Tab. Phycol. III. Taf. 10. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 267. Alg. Europ. 118).

Bildet im April, wenn der Schnee weggegangen in Waldgräben im Reichsforste die während des Sommers trocken sind, grössere und kleinere schlüpfrige grünliche Räschen, an Moosen u. dgl. festsitzend; die Glieder des Hauptstammes sind 5—8mal länger, die der Aeste 1. Ordnung gleichlang und ziemlich dicht mit Chlorophyll erfüllt, das Ende des Hauptstammes wie der Aeste 1. Ordnung endet gewöhnlich mit drei, häufig ungleich langen Aesten.

Nach der Breite des Hauptstammes wie nach den Zweigen letzter Ordnung wäre diese Form *flagelliferum*.

Stigeocl. subspinosum. Kützing. (Tabul. Phycol. III. Taf. 2. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 268. Alg. Europ. Nr. 296).

Die Zweige letzter Ordnung sehr kurz; Zellen des Hauptstammes 2—3 mal länger als breit, Endzellen nicht pfriemenförmig verdünnt, zugespitzt.

Mit *Diatoma tenue*, *Melosira varians* etc. in Wasserrinnen, welche mit den Wasserrädern in Verbindung stehen fluthende Räschen bis zu fünf Linien Länge bildend. Regnitzthal zwischen Erlangen und Oberndorf.

Draparnaldia. Bory.

Draparn. glomerata. Agardh. (Systema Alg. p. 58. Sprengel Syst. Plant. IV. p. 309. Wallroth. Fl. Crypt. German.

p. 22. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 100. Alg. Europ. Nr. 99. 476. *Batrachospermum glomeratum*. Vaucher. Hist. des Conferves. Taf. 12. Fig. 1)

In kleinen moorigen Tümpeln im Reichsforste an mehreren Orten, in der Solitüde bei Erlangen, in tiefen Wiesengräben zwischen dem Neuenhaus und Oberndorf bei Erlangen, in Gräben mit kaltem klaren Wasser bei Möhrendorf.

Draparn. plumosa. Agardh. (Syst. Alg. p. 58. Sprengel. Syst. Veget. IV. p. 369. Kütz. Alg. exsicc. Nr. 19. Wallr. Fl. Crypt. Germ. p. 21. Rabenh. Vaucher. Hist. des Conf. Taf. 11. Fig. 2. *Conferva mutabilis*. Roth. Fl. Germ. III. p. 518).

Im Reichsforste (in dem Bächlein, welches vom „Moosbrünnlein“ seinen Ursprung nehmend westwärts fließt), an Gräsern, Binsenhalmen und andern im Wasser befindlichen Gegenständen lange fluthende gallertige Massen bildend.

Coleochaete. Brebisson.

Coleoch. scutata. Brebisson. (Ann. dessc. natur. 1844. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 272. Alg. Europ. Nr. 171. 1126.).

An Wasserpflanzen; in dem kleinen Tümpel an der Regnitzbrücke bei Erlangen, in Tümpeln bei Möhrendorf.

Coleoch. pulchella. Kützing. (Phycol. Gener. Taf. 16. Fig. 2. Rabenh. Kryptogfl. Sachs. p. 272. Alg. Europae Nr. 1054).

Bis $1\frac{1}{2}$ mm. im Durchmesser.

An *Glyceria*, *Phragmites*, *Typha*, auch an der Unterseite der Frons der *Lemna polyrhiza* und *gibba*. Namentlich in den kleineren Teichen und Altwässern mit ruhigem tiefen Wasser.

Chaetophora. Schrank.

Chaetoph. pisiformis. Agardh. (Syst. Alg. p. 27. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 94. Wallr. Fl. Crypt. Germ. p. 10. *Batrachosperm. utriculatum* Vaucher. Hist. des Conferves. Taf. 12. Fig. 2. 3. de Candolle Fl. Gall. II. p. 58).

Meist an Wasserpflanzen festsitzend, seltener freischwimmend; in allen grösseren Teichen.

Chaetoph. endiviaefolia. Roth. *Rivularia endiviaefolia*. Roth. Fl. German. III. p. 546. Martius Fl. Crypt. Erlangens. p. 300. *Chaetoph. endiviaef.* Agardh. Syst. Alg. p. 28. Wallroth. Fl. Crypt. German. p. 11. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 94. Alg. Eur. Nr. 92.

An Wasserpflanzen in Teichen; Kosbacher Weiher, Weiher bei Alt-Erlangen.

Chaetoph. elegans. Agardh. (Syst. Alg. p. 27. Roth. Catal. III. p. 337. Wallr. Fl. Cryptog. German. p. 10. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 93. Alg. Europ. Nr. 77. 897. *Rivularia elegans*. Roth. Catal. III. p. 337).

In Gräben und Teichen an Wasserpflanzen.

Chaetoph. dura. Agardh. (Syst. Alg. *Rivularia dura*. Roth. Catal. III. p. 337. Martius Fl. Cryptog. Erlang. p. 300. *Fremella globosa*. Hedwig Theor. Generat. Taf. 36. Fig. 1—6. *Chaetoph. globosa*. Schrank. bayr. Flora.).

An Wasserpflanzen (namentlich *Potamogeton*) in Teichen und Gräben.

Aus der Abtheilung der *Melanophyceen* (Schwarztange), von welcher im Gebiete die Familie der *Lemniaceen* vertreten sein könnte, habe ich bis jetzt im Gebiete einen Repräsentanten nicht beobachtet.

Vierte Abtheilung.

Rhodophyceae (*Rothtange*).

Familie der Froschlaichalgen (Batrachospermeae).

Batrachospermum. Roth.

Batrachosp. moniliforme. Roth. (Fl. German. III. p. 489). Vaucher. Hist. des Conferves. p. 112. Taf. 1. Fig. 5. Martius Fl. Cryptog. Erlang. p. 290. Agardh. Syst. Alg. p. 53. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 95. Alg. Europ. Nr. 854. Kützinger Alg. exsicc. Nr. 109).

In dem breiten und etwas tiefen $\frac{1}{2}$ Fuss tief mit Wasser angefüllten Graben, welcher sich am nördlichen und östlichen Rande des obern grossen Bischofssees erstreckt, am Holz ansitzende lange fluthende gallertartige Büschel bildend, die Pflanze ist an diesem Standorte dunkelviolet. Von Martius (Fl. Cr. Erlang p. 291.) wird die Pflanze auch bei Kunreuth und in der Quelle bei der Mühle am Wege von Muggendorf nach Gössweinstein angegeben (im fränk. Jura).

In einer Quelle unweit der Brücke des Donau-Mainkanales über den Rödelheim findet sich (in nur wenigen Specim.) eine fast schwarz gefärbte Lokalform mit dicht gedrängten Quirlen.

Fünfte Abtheilung.

Characeae (*Armleuchtergewächse*).

Familie der Armleuchtergewächse (Characeae).

Nitella. Agardh.

Nit. gracilis. Agardh. (Syst. Alg. p. 125. A. Braun. Regensb. Bot. Zeitg. 1835. I. p. 53. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 194. Rabenh. Braun Charac. Nr. 24. Kützing. Tabul. Phycol. VII. Taf. 34)

In Teichen und Gräben an mehreren Orten im Gebiete.

Nit. flexillis. Agardh. (Syst. Alg. p. 124. 125. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 195. Braun. Rabenh. Charac. Nr. 139. Kütz. Tabul. Phycol. VII. Taf. 32).

In stehenden Wassern und Gräben mit reinerem Wasser, an mehreren Orten im Gebiete.

Chara. Linne.

Ch. vulgaris. Linne. (Spec. Plant. p. 1624. Martius. Fl. Cryptog. Erlang. p. 289. Wallr. Fl. Cryptog. German. p. 111. *Ch. foetida.* A. Braun. Charac. Nr. 7. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 197. Alg. Europ. Nr. 259).

In mehreren Formen, welche ich noch nicht hinlänglich untersucht habe, im Gebiete an mehreren Orten.

Ch. hispida. Linne. (Spec. Plant. p. 1624. Hoffmann. Fl. German. II p. 185. Wallr. Fl. Crypt. Germ. p. 122. Martius. Fl. Cryptog. Erlangens. p. 288. Rabenh. Kryptogfl. Deutschl. p. 198).

In mehreren Formen im Gebiete an mehreren Orten. Sehr reichlich in dem Weiher bei Schneckenhof unterhalb Adlitz

östl. von Erlangen, in Teichen an der Eisenbahn zwischen Baiersdorf und Forchheim.

Ch. pulchella. Wallroth. (Fl. Cryptog. German. p. 108. *Ch. fragilis*. Desvaux. Vaill. Fl. Par Taf. 3. Fig. 1. a. Rabenh. Charac. Nr. 13. Alg. Europ. Nr. 140. 170. 240. 280. Kützing. Tabul. Phycol. VII. Taf. 54.).

In dem Moor und in kleinen Weiherchen unterhalb Adlitz. Noch mehrere im Gebiete vorkommende Arten wie auch die vielfachen Formen der aufgeführten Arten habe ich noch nicht genauer untersucht; die Characeen wie auch einige andere Algenfamilien werde ich für das Gebiet noch besonders bearbeiten.

B e i t r ä g e

zu der

**Lehre von der thierischen anomalen Mann-
weiblichkeit**

(Gynandro - Morphismus).

Von

Andreas Johannes Jäckel,
k. Pfarrer in Sommersdorf.

Bei allen thierischen Organismen ist eine deutliche Trennung in zwei Geschlechter wahrnehmbar. Der Regel nach sind die männlichen und weiblichen Zeugungs-Organen auf zwei die Species constituirende Individuen vertheilt, seltener in ein und demselben Individuum (normale Zwitterbildung) vereinigt, bei dem Menschen und den höheren Wirbelthieren, den vierfüssigen Säugern, den Vögeln, Reptilien und Amphibien jederzeit und ohne Ausnahme getrennt, nur bei den Fischen in höchst seltenen Fällen in einem Individuum vereinigt (anomale Zwitterbildung) und selbst bei den wirbellosen Thieren ist die Zweigeschlechtlichkeit in zwei Individuen häufiger, als die in einem und demselben Individuum.

Ein von Rudolphi beobachteter und in den Abhandlungen der Berliner Akademie für 1825 beschriebener Fall von echter Zwitterbildung (Hermaphroditismus), wo sich an einem menschlichen Individuum auf einer Seite Hoden und Samenleiter, auf der andern Eierstock und Muttertrompete befunden haben soll, wird von neueren Forschern wohl mit Recht in Zweifel gezogen und dagegen behauptet, dass alle bis jetzt am Menschen beobachteten Fälle von Zwitterbildung unechter Hermaphroditismus sind, in unvollkommener Entwicklung der Zeugungsorgane, in einem Stehenbleiben auf früheren Bildungsstufen, wo männliche und weibliche Geschlechtstheile sich noch mehr ähneln, ihren Grund haben und sich jedesmal auf den männlichen oder weiblichen Geschlechtstypus zurückführen lassen.

Bei dem Rindvieh ist unechter Hermaphroditismus, wo den äusseren Geschlechtstheilen der Kuh (dies ist der häufigere Fall) Theile des Stieres beigezeugt sind, oder wo Attribute der

Kuh mit den Geschlechtstheilen des Stieres in ein und demselben Individuum vereinigt sind, keine sehr seltene Erscheinung. Es kommen auch Fälle vor, die man am besten als Geschlechtslosigkeit bezeichnet, vermeintliche Kuhkalben, die kein Euter bekommen, nicht rindern, oder wenn auch ein Geschlechtstrieb erwacht, doch nur unfruchtbar sich begatten und bei dem Schlachten ohne Uterus befunden werden. Der mittelfränkische Landmann nennt einen derartigen Zwitter „Zwiedorn“ und mästet und verkauft ihn in thunlichster Bälde. Im Interesse der Wissenschaft ist es zu beklagen, dass so lehrreiche Missbildungen äusserst selten in die rechten Hände zur Untersuchung, gewöhnlich nicht einmal zur Kenntniss der Thierärzte gelangen, weil sie keine Gegenstände thierärztlicher Therapie sind und der Landmann Klügeres nicht thun kann, als solche Stücke für den Fleischer zu mästen. Für zoologische Gärten wäre es eine würdige Aufgabe, ausgesprochen männliche Rindvieh-Zwitter zu erwerben und längere Jahre zu erhalten. Man würde hiedurch zur Gewissheit kommen, ob ein solches Thier, wie der Theorie nach vorausgesetzt werden muss, zu derselben Grösse des Leibes und der Hörner gelangt, als das verschnittene männliche Rind, der Ochse, bei welchem ein Theil derjenigen Kräfte, die nach der Castration zu geschlechtlichen Verrichtungen nicht mehr verbraucht werden können, zu einer stärkeren Masse-Entwicklung des Körpers und der Hörner verwendet wird. Der Stier bleibt kleiner als der Ochse, und behält kurze gedrungene Hörner, während der Hammel, das verschnittene Schaf, kleinere Hörner behält, als das unverschnittene, der Widder.

Auch bei den im Freien lebenden vierfüssigen Thieren ist unechter Hermaphroditismus nicht sehr selten, bisher aber nur an Wildpret beobachtet worden, womit selbstverständlich nicht gesagt sein soll, dass er nur auf Jagdthiere beschränkt ist.

Im Dezember 1826 wurde im Revier Wildbad (Württemberg?) ein 40 Pfund schweres, besonders feistes Reh geschossen, welches der Schütze dem Pinsel nach für einen Bock

gehalten hatte, an dem aber bei der genauesten Untersuchung kein Zeichen entdeckt werden konnte, dass es je ein Geweih aufgesetzt hatte. Der Pinsel nebst dem Harngang fand sich ganz in der Ordnung, wie bei jedem andern Bock, jedoch das Kurzwildpret und die Brunstruthe fehlten ganz. Bei dem Aufbrechen wurde entdeckt, dass das Thier einen Tragsack hatte, wie eine Gaise, nur mit dem Unterschied, dass die Mündung des Tragsackes sich einen Zoll von dem Waidloche entfernt in den Darmkanal und nicht in das Feigenblatt, welches ganz fehlte, verlor. *)

Eine gehörnte Rehgaie, die ein vollkommen verecktes, stark geperltes, jedoch nicht gefegtes Gabelgehörn (rechte Stange $7\frac{1}{2}$, linke 7 Zoll bayr. M. hoch) aufsatte und sich bei der Sektion durch einen Chirurgen als Mannweib auswies, wurde am 19. Juni 1845 auf der Revier Gressertshof in Unterfranken geschossen. Eine Brunstruthe fehlte; am Eingange des Feigenblattes, dem die Schürze beinahe ganz abging, fand sich ein linsengrosser, einer Clitoris ähnlicher Ansatz an der Stelle, wo die Brunstruthe ihren Anfang nimmt. Scheide und Uterus waren ganz normal, letzterer war nie trüchtig gewesen und die linke Niere lag mitten auf dem Rückgrat. **)

Auf den Jagden des Markgrafen Max von Baden wurde am 4. August 1865 ein vermeintlicher starker Sechserbock (42 Pfund ohne Aufbruch) mit starkem Gehörne von 7 Zoll Länge geschossen, an welchem besonders die Rosen vollständig ausgebildet und die Stangen bis über die Mitte gross und schön geperlt waren. Dieses Reh hatte jedoch keinen Pinsel, die Harnröhre öffnete sich nach rückwärts durch ein Feuchtblatt, das in der äusseren Erscheinung dem einer Gaise vollständig glich und wie bei einer solchen am Spiegel hervorstand. Der Jäger fand beim Aufbruch das Kurzwildpret in der Grösse

*) L. Dengler, grossherzogl. bad. Forstrath etc., Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen. Jahrgg. 1865. S. 110.

**) Magazin im Gebiete der Jägerei von H. G. v. Warburg. Berlin 1846. Nr. I. S. 14.

einer starken Haselnuss im Leibe verwachsen und nebst der Wasserblase eine andere, einem kleinen Apfel gleichende Blase, mit klebriger Substanz gefüllt, die er behufs weiterer Untersuchung neben sich hinlegte, die aber leider von seinem herbeigeeilten Dachshund gefressen wurde. Der erfahrene Jäger behauptete, aus der Beschaffenheit der hinteren Theile des Rehes schliessen zu dürfen, dass dasselbe öfters beschlagen worden war *).

1581 fing der Landgraf Wilhelm von Hessen im Reinhardswalde ein geschlechtloses Schwein. Er schrieb darüber: „Sonst haben wir unter andern eine Sau dieses Jahr gefangen, welche, dieweil sie so lange Zähne gehabt, Jedermann für ein Schwein angesehen, indess wird man gewahr, dass sie — — keine Hoden hatte. Da dachten wir, sie wären ihr vielleicht vor Jahren ausgerissen und lassen nach solchem sehen, befinden aber unter das, dass sie auch keinen Schaft, noch des weiblichen Geschlechts Zeichen hat. Also lassen wir sie öffnen, und werden weis, dass sie weder männlichen noch weiblichen Geschlechts inwendige oder auswendige Zeichen an sich hat; denn sie hatte „keinen Schaft, keinen Mutth, kein Mutter, auch keine Duten“ **).

Abnorme Zwitterbildung bei Fischen und zwar echten Hermaphroditismus, wo die keimbereitenden männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane an ein und demselben Individuum vollständig vorhanden sind, hat zuerst der berühmte Ichthyologe Dr. Bloch beobachtet. Er erwähnt in seinem grossen Fischwerke ***), zweier Hermaphroditen des gemeinen Karpfen (*Cyprinus carpio*), bei welchen Rogen und Milch zugleich gefunden wurde. Eines dieser Exemplare, einen dreipfündigen

*) Dengler'sche Monatsschrift 1865. S. 355.

**) Dr. G. Landau, Beiträge zur Geschichte der Jagd und Falknerei in Deutschland. Kassel 1849. S. 239.

***) Dr. Markus Elieser Bloch, Oekonomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. 3 Theile. Berlin 1782—1784. Siehe das Betreffende Bd. II. S. 163 und Bd. III. S. 128.

Karpfen, hat er selbst anatomisch untersucht und gefunden, dass der Rogen wie am geschlechtlich normal entwickelten Karpfenrogner aus zwei Eierstöcken bestand, jedoch mit dem Unterschiede, dass der eine Sack in der Mitte von dem dazwischen liegenden Milch unterbrochen wurde, dergestalt, dass er oben und unten von den grünlichen Eiern gleichsam eingefasst war. Der Milch hingegen selbst war einfach und hatte nur an dem unteren Ende einen kleinen Lappen, dagegen war er noch einmal so dick, als ein jeder Sack sonst zu sein pflegt. Die übrigen Eingeweide wichen von ihrer gewöhnlichen Lage und Bildung nicht ab. Allem Ansehen nach, so schliesst Bloch, kann ein solcher Hermaphrodit sein Geschlecht auf dreifache Art fortpflanzen:

- 1) durch sich selbst; denn da die Befruchtung bei den Fischen ausserhalb des Körpers geschieht, so kann er, indem er sich an Kräutern reibt und Milch und Rogen von sich gibt, letzteren durch ersteren zugleich befruchten;
- 2) wenn sein Milch andere Eier trifft; und
- 3) wenn seine Eier von anderem Milch benetzt werden.

Ich selbst zog im Jahre 1865 einen zweipfündigen Karpfen, welcher gleichfalls ein vollkommener Hermaphrodit war und Rogen und Milch zugleich führte. Das höchst interessante Präparat bewahre ich in Weingeist auf und wäre bereit, dasselbe an einen berufenen Forscher abzutreten.

Eine bei Fischen sehr häufig vorkommende Art von Hermaphroditismus sind jene weder männlichen noch weiblichen sterilen Formen der Teichkarpfen, welche den Fischern und Consumenten unter dem Namen der „Leimer“ wohl bekannt sind, heute noch da und dort für den Streichteich als dritter Faktor bei der Fischzucht nothwendig erachtet und mit den Streichkarpfen eingesetzt werden. Es beruht dieses Verfahren auf altvererbter Unvernunft; der Leimer ist ja steril und trägt zu fruchtbarer Begehung der beiden Geschlechter, des Rogeners und Milchners, nicht das Geringste bei. Bei dem Besetzen der

Streckteiche dagegen hat das Einwerfen von Leimern, wie man im Vorbeigehen anfügen will, guten Grund, da solche Fische ähnlich den Kapaunen, Poularden und künstlich castrirten Karpfen ein viel wohlschmeckenderes Fleisch erhalten, als geschlechtlich normale Karpfen und vom Kenner vorzüglich gesucht sind.

Verhältnissmässig am häufigsten ist abnorme Zwitterbildung bei den niederen Thieren, wiewohl sie auch hier zu den sehr vereinzeltten Erscheinungen gehört. Noch am öftesten sah man Hermaphroditismus bei den Schmetterlingen, um Vieles seltener bei den Hymenopteren, überaus selten bei den Dipteren, Orthopteren und Coleopteren, bei den Lepidopteren am häufigsten unter den Tagfaltern und Spinnern (Rhopalocera und Bombyces), weniger unter den Abend Schwärmern (Sphingidae), noch seltener bei den Spannern (Geometrae) und den Mikrolepidopteren, höchst selten bei den Eulen (Noctuae).

Entomologische Schriftsteller wie Ochsenheimer, Germar, Klug, Rudolphi, Burmeister, Lacordaire u. A. haben Verzeichnisse der bis auf ihre Zeit bekannt gewordenen Insektenzwitter veröffentlicht, das neueste und vollständigste gibt Dr. H. Hagen in der Stettiner entomologischen Zeitung *). Mit Bienenfleiss hat dieser Forscher die entomologische Literatur durchsucht und zählt 130 bekannte Insektenzwitter auf, 107 Lepidopteren, 17 Hymenopteren, 3 Colcopteren, 2 Dipteren und 1 Orthopterum. Von den Schmetterlingen zählen 18 Arten zu den Tagfaltern, 4 zu den Schwärmern, 21 zu den Spinnern, 5 zu den Spannern und je eine Art zu den Eulen und Motten. Wer nähere Nachweise über diese Zwitter wünscht, wolle solche in dem Hagen'schen Verzeichnisse suchen; hier genügt es wohl, deren Namen aufzuführen:

Melitaea phoebe,

„ *didyma*,

*) 22. Jahrgang 1861. S. 259 f.

24. Jahrgang 1863. S. 189 f.

Argynnis cynara (pandora),
 „ *paphia*,
Vanessa antiopa,
 „ *urticae*,
 „ *atalanta*,
Limenitis populi,
Epinephele janira,
Pieris daphidice,
Anthocharis cardamines,
Colias edusa,
Rhodocera rhamni,
Lycæna alexis,
 „ *adonis*,
Polyommatus helle,
Papilio polycæon,
 „ *ulysses*,
Sphinx galii,
 „ *euphorbiae*,
 „ *convolvuli*,
Smerinthus populi,
Saturnia pyri,
 „ *carpini*,
Endromis versicolora,
Gastropacha populifolia,
 „ *quercifolia*,
 „ *pini*,
 „ *crataegi*,
 „ *castrensis*,
 „ *quercus*,
 „ *trifolii* und
 „ *var. medicaginis*,
Harpyia vinula,
Pygaera spec. ?,
Orgyia antiqua,
Leucoma dispar,

Panthea coenobita,
Spilosoma mendica,
Arctia purpurea,
Emydia grammica,
Setina aurita,
Acronycta aceris,
Graphophora conflua,
Angerona prunaria,
Fidonia piniaria,
 „ *artemisiaria* (var. *piniaria*?),
Amphidasis prodromaria,
Nyssia zonaria,
Boarmia lichenaria,
Chimatobache fagella.

Diesem Verzeichnisse kann ich 3 neue Arten zufügen. In der Sammlung des vormaligen Lehrers Büringer zu Gunzenhausen standen Zwitter von *Argynnis amathusia* und *Vanessa polychloros* und Freyer führt eine *Geometra* (*Gnophos*) *dilucidaria* mit männlichem Hinterleibe und weiblichen Fühlern an *).

Ein Zwitter von *Limenitis populi* steht in der Sammlung der naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg und ist in den Gesellschaftsannalen von dem Landesjustiz-Präsidenten Dr. Schenck beschrieben und abgebildet **). Zwei Hermaphroditen des *Smerinthus populi*, von denen einer in die Büringer'sche Sammlung kam, fing Baron Sigmund von Braun in Nürnberg in der Nähe der Stadt in den Jahren 1835 und 1837, einen *Gastropacha quercus*-Zwitter, von dem Pfarrer Heller zu Cammerstein bei Schwabach aus der Raupe gezogen, nun im Besitze des Dr. Staudinger in Dresden, hat Freyer in seinen neueren Beiträgen zur Schmetterlingskunde Taf. 642.

*) Stettiner entomologische Zeitung. 13. Jahrgang 1852. S. 152.

**) Mittheilungen aus dem Osterlande. Altenburg 1852. 12. Bd. 1. Hft. S. 1 ff. mit Abbildung.

Fig. 5. abgebildet und beschrieben und eine *Angerona prunaria* herm. finde ich erwähnt in Herrich-Schäffer's systematischer Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa *). So viel zu weiterer Vervollständigung des Hagen'schen Verzeichnisses.

Von Hymenopteren kennt man nach Ebendemselben Zwitter von

Cimbex Griffini,
Tenthredo angulata,
Ichneumon luctatorius,
 „ *fasciatorius*,
 „ *comitator*,
 „ *migratorius*,
Diapria elegans,
Blacus maculipes,
Formica sanguinea,
Tetrogmus caldarius,
Mutilla europaea,
 „ *obscura*,
Scolia 6-maculata,
Apis mellifica,
Hylaeus spec?,
Anthophora retusa,
Andrena fulvescens,
Bombus lapidarius.

Aus der Ordnung der Käfer sind Hermaphroditen bekannt von

Dytiscus (marginalis?),
 „ *latissimus **)*
Lucanus cervus und
Melolontha (Rhizotrogus) solstitialis.

Letztere dürfte indessen wahrscheinlich kein Hermaphrodit, sondern eher eine monstrositas per defectum, wie v. Sie-

*) 6. Bd. Vol. III. pag. 24. Spalte 2.

**) Stettiner entomologische Zeitung. 26 Jahrgg. 1865. 8. 346 f.

bold diess nennt, nemlich eine halbseitig, durch Verkümmernng des einen Fühlers (der eine war männlich, der andere scheinbar weiblich) unsymmetrisch gestaltete Monstrosität gewesen sein. Hagen kennt nur 3 Käfer-Zwitter, den vierten, einen *Dytiscus latissimus*, hat Dr. Altum in Münster in copula mit einem Männchen dieses grossen Wasserkäfers gefunden und leider die Gelegenheit zu anatomischer Untersuchung dieses allerdings seltenen Cabinetstückes verabsäumt. Der Käfer ist links vorwiegend weiblich, rechts vorwiegend männlich, jedoch in keinem Geschlechte rein ausgeprägt, so dass die weibliche Hälfte noch etwas Männliches und die männliche noch etwas Weibliches hat. Wie schon angedeutet fungirte dieser Zwitter in copula als Weibchen.

Aus der Ordnung der Dipteren endlich sind 2 Fälle von
Beris nitens und
Scaeva clypeata,
 von Orthopteren ein Fall von Hermaphroditismus und zwar von
Acridium dispar
 beschrieben.

So viel mir bekannt, wurden bis jetzt nur 2 im Berliner Museum stehende Zwitter anatomisch untersucht, eine *Melitaea didyma* und eine *Gastropacha quercifolia*. Erstere war rechts männlich, links weiblich, das rechte Auge grösser und vorstehender, der rechte Taster länger, der rechte Fühler $\frac{1}{4}$ Linie länger, weder weiss geringt, noch an der Spitze rothgelb, wie der linke; der rechte Flügel männlich, der linke weiblich; Leib ziemlich dick, gleich gefleckt, rechts mit ausgebildeter männlicher Schamzange, links die Zange weniger entwickelt, kürzer. Die Sektion ergab links einen freien Eierstock und viele hellgrüne Eier, rechts weisse verschlungene Samengänge und Hoden. Die *G. quercifolia* war links männlich, rechts weiblich, mit rechts weiblichen, links männlichen Genitalien versehen, am After mit einigen als Ruthe sichtbaren Spitzen, jederseits nebst einer kleinen rundlichen braunen Hornplatte wie beim Männchen. Die Section ergab auf der weiblichen Seite einen

einfachen Eierschlauch mit 18 entwickelten und dahinter 9 unentwickelten Eiern, auf der männlichen 2 Hoden, Samengang und eine vollkommen ausgebildete Ruthe.

Nach diesen anatomischen Ergebnissen wird man es wahrscheinlich finden müssen, dass Insekten-Zwitter zeugungsfähig sind, eine Ansicht, die dadurch gestützt wird, dass man Zwitter während des Eierlegens gefangen hat oder Angespiesste eine Menge von Eiern hat ablegen gesehen. Ja es entsteht sogar die Frage, ob ein Schmetterlings-Zwitter, bei welchem der laterale Hermaphroditismus äusserlich und innerlich vollständig durchgeführt ist, sich selbst fruchtbar zu begatten im Stande ist oder nicht. Die allgemein bekannte Stelle bei Scopoli, *) wo er mittheilt: „*Phalaena Pini* Linn. larvae binae intra unicum, quem pararunt, folliculum mutatae sunt in unicam pupam, unde animal dimidia corporis parte masculum, antenna plumosa alisque binis majoribus, alia vero femineum, antenna setacea alisque binis minoribus. Quod vero mirabilius, pars mascula emisso pene foecundavit ovula feminea, quae deposita perfectas larvas protulerunt“, scheint die Möglichkeit der Selbstbegattung ausser Zweifel zu stellen, doch hat schon Dr. Schenck darauf hingewiesen, dass die angebliche Vereinigung der männlichen und weiblichen Genitalien für den Zweck der Befruchtung der Eier in der That nicht glaublich, ja für eine physische Unmöglichkeit zu halten ist. Der Annahme dagegen, dass ein vollkommener Hermaphrodit sowohl als Mann ein anderes weibliches Individuum seiner Art zu befruchten, wie auch als Weib von einem anderen männlichen Individuum der eigenen Art befruchtet zu werden fähig sein dürfte, steht wenigstens von Seite der Theorie nichts entgegen. So lange nicht anatomische Untersuchungen, denen praktische Versuche zur Seite gehen müssen, in weitaus grösserer Anzahl, als diess bisher geschehen ist, vorgenommen worden, ist es unmöglich, ins Klare zu kommen und die sich aufdrängen-

*) *Introductio ad historiam naturalem*. Prag. 1777. pg. 416.

den Fragen sicher zu erledigen. Wer wird sich aber überwinden, sagt der bekannte Lepidopterologe Esper, so kostbare Stücke, die im Werthe bei Liebhabern ansehnliche Juwelen übertreffen, zu Versuchen, wie sich Zwitter in ihren Generationen verhalten, zu vernichten? Vor solchen Hindernissen stand die Wissenschaft vor 90 Jahren, wo fabelhafte Preise für Schmetterlinge bezahlt wurden *), vor solchen steht sie heute noch.

Man theilt die Insektenzwitter am besten mit Ochsenheimer in vollkommene, d. h. in halbseitige (laterale), die auf der einen Seite äusserlich und innerlich vollkommen männlich, auf der anderen der äusseren und inneren Organisation nach vollständig weiblich sind, und in unvollkommene, bei denen das eine oder andere Geschlecht in Bezug auf die Genitalien (die Färbung und die äusserlichen plastischen Verhältnisse können hierbei sogar ziemlich hochgradige, laterale Zwitterbildung darstellen) entweder a. ausschliesslich entwickelt ist, oder b. prädominirt, oder aber c. jede Geschlechtlichkeit dem äusseren Ansehen nach aufgehoben und das Individuum geschlechtslos ist.

Dass die Zeugungs-Organen an der Zwitterbildung nicht durchgängig participiren, scheint nach der äusseren Bildung mancher Hermaphroditen gewiss zu sein.

Esper bildet Tom. III. Tab XXXVIII. Fig. 6. eine *Leucoma dispar* ab, die er zwar nur als eine sehr seltene (albinotische?) Ausart bezeichnet, in der aber ein niedriggradiger Hermaphrodit nicht zu verkennen ist. Die Phaläne ist grösser, als ein normales, von seinem Weibchen durch Grösse und Färbung in so hohem Grade verschiedenes Männchen, die Flügel auf beiden Seiten gleich gross; die beiderseitigen Fühler, der Leib und die Unterflügel vollständig männlich, die Oberflügel aber in verschiedener Vertheilung des Weiss und Braun

*) 5 Exemplare *Sphinx nerii* z. B. wurden eines zu 25 fl., ein zweites um 30 fl., ein drittes und viertes à 3 Carolin, das fünfte um 7 Louisd'or verkauft.

halb männlich und halb weiblich. Ein von Freyer gefangener Zwitter der *Gnophos dilucidaria* hat einen männlichen Hinterleib und weibliche Fühler. Ein ausserordentlich kleiner Zwitter von *Saturnia carpini*, *) von welchem Esper berichtet, dass er an den Flügeln und Fühlhörnern rechts männlich, links weiblich war, während ihn Hagen rechts weiblich, links männlich gewesen sein lässt, hatte einen ungetheilten weiblichen Hinterleib. Diese 3 Zwitter sind höchst wahrscheinlich ihrer inneren Organisation nach ausschliesslich nur nach einem Geschlechte gebildet, die *Leucoma* und *Geometra* zeugungsfähige Männchen, die *Saturnia* aber den Genitalien nach ausschliesslich ein Weibchen gewesen.

Die von dem Pfarrer Heller gezogene und von Freyer abgebildete *Gastropacha quercus hermaphr.* dürfte geschlechtlos gewesen sein, da an ihr offenbar weder die männlichen noch die weiblichen Attribute zur ausgesprochenen Form der normalen Entwicklung kamen und auch die Färbung seltsam confundirt erscheint. Die gleichgrossen Fühler mit starkem, weissgelben Schaft versehen, weder ganz männlich, noch ganz weiblich, kurz gekämmt, nicht blos gekerbt, wie die Fühler der weiblichen *Gastropachen*, demnach ein Mittelding zwischen dem normalen männlichen und weiblichen Fühler dieser Spinnerstippe darstellend. Linke Flügelseite kürzer und kleiner, als die rechte, jede Seite aber vollkommen ausgebildet, die Grundfarbe der Vorderflügel mehr weiblich, die der Hinterflügel mehr männlich, mit hellen Flecken und Streifen. Der Körper endlich mehr männlich, als weiblich und auf der Bauchseite stärker als sonst bei dem Männchen behaart.

Nach Dr. B. Altum **), welcher 6 Formen von Hermaphroditismus unterscheidet, eine Eintheilung, die sich wenig Beifall erringen dürfte, kommt bei den Schmetterlingen auch eine Kreuzstellung der geschlechtlich gleichen Flügel vor, so

*) Capioux. Der Naturforscher. Halle 1774—1804. 12. Stück 1778. pag. 72 *Bombyx Pavoniella* Scop (*Carpini* Ochsh.) Tab. 2. Fig. 6.

**) Stett. entomol. Zeitung. 21 Jahrg. 1860. pag. 91.

dass der rechte Vorderflügel dem linken Hinterflügel und der linke Vorderflügel dem rechten Hinterflügel entspräche, eine Form, die bei *Argynnis paphia* vorgekommen seyn soll. Ich gestehe, dass ich einen angeblichen Zwitter von (um ein sehr demonstratives Beispiel zu setzen) *Rhodocera rhamni* mit rechts männlichem Ober- und links männlichem Unterflügel und mit links weiblichem Ober- und rechts weiblichem Unterflügel für das Artefakt eines betrügerischen Händlers halten würde.

Ich kann auch nicht finden, dass Lacordaire unter seinem „Hermaphrodisme croisé“ die Altumsche Kreuzstellung versteht, vielmehr bezeichnet derselbe als typisches Beispiel seiner Kreuzform einen *Gastropacha eastrensis*-Zwitter, der rechts einen weiblichen Fühler und männliche, nur etwas grössere Flügel, als sie sonst das Männchen besitzt, und links einen männlichen Fühler mit weiblichen Flügeln hatte, aber bei allgemein vorherrschendem männlichen Geschlechte auf keiner Seite entschieden männlich oder weiblich war. Was vollends den von Altum ohne näheren Nachweis angeführten *Argynnis paphia*-Zwitter anlangt, so kann darunter schwerlich ein anderer als der von Wesmael gefangene und im Hagen'schen Verzeichnisse Seite 265 unter Nr. 4 aufgenommene sein, dieser war aber ♂ rechts *A. paphia*, ♀ links *A. valesina*: Der rechte Oberflügel allgemein männlich, am Hinterrande mit einer Reihe schwarzer Flecken, so stark wie beim Weibchen, der rechte Hinterflügel männlich geteilt, jedoch die Flecken grösser und der Grund dunkler rötlich; der linke Vorderflügel gemischt männlich und vorherrschend weiblich (*valesina*), der linke Hinterflügel weiblich, also mit Ausnahme des entschieden gemischten linken Vorderflügels die beiden Seiten der dominirenden Färbung nach entschieden rechts männlich, links weiblich. Das rechte Auge dieses höchst interessanten Geschöpfes war grösser, der Thorax links mehr grüngelb behaart, der rechte Vorderfuss männlich, der linke weiblich; der Leib mit scharf getheilte Färbung, rechts *paphia* mas, links *valesina* fem.; rechts an der Spitze Haarbüschel und männliche Genitalien, links ohne beide.

Eine der hervorragendsten Leistungen auf dem in Rede stehenden dunklen Gebiete ist die des berühmten Physiologen Dr. von Siebold in München, welcher die Thatsache fortdauernder Zwitterbildung constatirt hat. Ein Bienenbesitzer beobachtete sie in einem Stocke seit 4 und Siebold untersuchte sie seit 2 Jahren, wodurch sich ihm folgende Erfahrungssätze ergeben haben:

Die Zwitterbildung tritt in den äusseren und inneren Körpertheilen auf. Häufig lässt sich eine Halbierung des Körpers in einen vorderen weiblichen und einen männlichen hinteren Theil unterscheiden. Die Geschlechtsorgane sind am auffallendsten von der Missbildung betroffen. Die Zwitterbildung derselben stand mit der Zwitterbildung der äusseren Körpertheile fast nie im Einklang. Bei vorherrschendem Arbeitertypus (d. h. verkümmerten Weibchen) zeigt sich der Stachel mit Giftapparat vollständig entwickelt, bei männlicher Bildung war mitunter ein Stachel vorhanden, aber verkrüppelt und weich, jedenfalls zum Gebrauche unfähig. Die inneren Geschlechtstheile waren in der auffallendsten Weise vermischt, an einem Ausführungsgange befanden sich mehrere Eierstockröhren und Hodenschläuche, zugleich neben dem Penis der weibliche Giftapparat. Spermatozoiden zeigten sich in den Hodenschläuchen immer in der Entwicklung, während die Eierstockröhren leer waren. Die Zwitter wurden sofort nach dem Ausschlüpfen sämmtlich von den Arbeiterbienen aus dem Stocke geworfen und kamen in Folge unvollständiger Verhärtung der Hautbedeckung, wodurch sie am Davonfliegen gehindert waren, um das Leben. *)

Zwitterbildung gehört, wie ich zum Schlusse dieses Abschnittes noch bemerken will, bekanntlich zu den Dismorphen und lässt sich hieraus a priori schliessen, dass über die Anordnung oder Vertheilung der inneren und äusseren geschlechtlichen

*) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Tom. XIV. pag. 73—80.
Stettiner entomolog. Zeitung. 25 Jahrg. 1864. S. 431 f.

Verschiedenheiten eine irgendwie haltbare Regel sich nicht aufstellen lässt. Die Erfahrung hat dies auch bestätigt, indem die rechte Seite der Insektenzwitter ebenso oft männlich als weiblich befunden wurde.

Bei Vögeln ist, soweit meine Erfahrungen und Kenntnisse der ornithologischen Literatur reichen, noch kein echter Hermaphrodit beobachtet werden, dagegen findet sich bei ihnen eine andere, von der Zwitterbildung streng zu unterscheidende, gewöhnlich nicht angeborene Art der Mannweiblichkeit, welche thatsächlich bloß von vollständig geschlechtlich entwickelten und mit Fortpflanzung der Art erfolgreich beschäftigt gewesenen Weibchen unter Umständen erworben und desshalb im Gegensatz zu der höchst seltenen angeborenen Mannweiblichkeit erworbene Mannweiblichkeit, bei den Vögeln Hahnen-Aehnlichkeit und beziehungsweise Hahnenfedrigkeit genannt wird.

Man hat bei den Vögeln zweierlei Veränderungen des Gefieders zu unterscheiden, die eine, welche bei dem Uebergange von einer Jahreszeit zu der anderen (Sommer- und Winterkleid), die andere, welche bei dem Uebergange von einem Lebensalter zu dem anderen stattfindet. Bezüglich der letzteren hat man wieder zwei Hauptarten von Befiederung zu unterscheiden, eine unvollkommene, das Jugendkleid, und eine unvollkommene, das ausgefarbte Kleid der Art, welches die Männchen früher oder später anlegen. Die Weibchen behalten das unvollkommene Jugendkleid mehr oder weniger vollständig bei, indem sie rücksichtlich der Färbung in ihrer Entwicklung stehen bleiben und nicht bis zu der charakteristischen Ausbildung des vollkommenen Zustandes der Species gelangen. Die Anlage zur Erlangung des vollkommenen Gefieders, nicht bloß der Färbung, sondern auch der männlichen Federzierrathen, sowie anderer männlicher Attribute, z. B. der Fleischkämme, Kehllappen, Sporen und Schnabelhöcker, besitzen aber auch die Weibchen und erlangen ausnahmsweise grössere oder geringere Hahnen-Aehnlichkeit. Bei einzelnen Gattungen, besonders bei den in Polygamie lebenden und unter diesen wieder

vorzüglich bei den hühnerartigen Vögeln wird diese Erscheinung nicht gar selten, im Allgemeinen ungleich häufiger bei gezähnten und in halbwildem Zustande, als bei im Freien lebenden Vögeln beobachtet. Analoge Erscheinungen kommen auch in anderen Thierklassen, selbst bei dem Menschen vor. So ist es nichts Ungewöhnliches, dass Frauen, welche nicht mehr menstruiren, starke Barthaare auf der Oberlippe und am Kinn bekommen, und alte weibliche Thiere der Gattungen *Cervus* und *Capreolus*, nachdem sie gelt geworden sind, Geweihe aufsetzen. Ebenso verhält es sich mit der Hahnenfedrigkeit, die gleichfalls in den meisten Fällen eine Folge des höheren Alters und der damit zusammenhängenden Unfruchtbarkeit ist. Doch nicht immer. Gibt es doch auch jugendliche Frauenzimmer, die zu ihrem Leidwesen auf der Oberlippe mit ganz anständigen Schnurrbürtchen, nicht mit schwachem Wollhaare (*lanugo*), wie es an zarten Hautstellen vorzukommen pflegt, sondern mit männlich derbem Haare verunziert sind, und vom Hirsch und Reh kennt man nicht wenige, vollkommen sicher constatirte Fälle von fortpflanzungsfähigen Hirschkühen mit Geweih und von gehörnten Rehgaisen. Etliche Beispiele mögen das beweisen.

Im Jahre 1792 wurde im Isenburg-Büdingen'schen ein junges weibliches Wildkalb gefangen und auf dem Hofe Leistadt aufgezogen. Im zweiten Jahre erhielt es, demnach ganz zu derselben Zeit, wo das männliche Hirschkalb ein Spiesser wird, einen Spiess ohne Rose, an dem im dritten Jahre ein Augsprosse heraustrat, und erst 1797 verlängerte sich die Stange um $1\frac{1}{2}$ Zoll. Nachdem dieses Thier im Herbst 1797 von einem zahmen Achtender bedeckt worden war, setzte es im Sommer 1798 ein Kalb, worauf 14 Tage später einen Zoll über dem Augsprossen ein Wulst sichtbar wurde, der täglich zunahm, bis am 2. Juli das darüber befindliche Stück der Stange abbrach und eine Verlängerung herauswuchs, welche sich in zwei Enden theilte. Während dessen säugte die Mutter ihr Kalb gross. Am 14. Januar 1799 warf sie die Stange drei Zoll höher ab und setzte eine neue, obwohl kürzere auf.

Nachdem sie am 13. Juni desselben Jahres zum zweiten Male ein Kalb gesetzt, warf sie zwei Tage später auch diese Stange wieder ab und zwar, wie das erste Mal, kurz über dem Augsprossen *).

Am 20. Januar 1838 wurde im Hannover'schen eine alte Rehgaie geschossen, welche an der linken Seite des Kopfes eine etwa $2\frac{1}{2}$ Zoll lange Stange (Spiess), auf der rechten Seite eine Rose mit ganz kurzem Knopfe darauf trug. Das Gehörn war nicht gefegt. In der Gebärmutter fanden sich bei der Untersuchung durch einen Wundarzt I. Klasse zwei Embryos **).

Eine am 15. Januar 1859 im Durlacher Walde geschossene, sehr starke, gehörnte Rehgaie hatte ein Kitz bei sich. Die zwei kleinen, beinahe einen Zoll hohen Gewichtchen waren von der behaarten Kopfhaut, also nicht mit Bast überzogen, der Schädel selbst zeigte einen Knochenfortsatz, wie er etwa bei einem Spiessbocke vorkommt, der abgeworfen hat.

Am 10. Oktober 1863 wurde bei Ehingen im Höhgau eine gehörnte, ausgeweidet 34 Pfund (17 Kilogramme) schwere Rehgaie geschossen, deren Kopf zur Zeit im Jagdzimmer des Grafen Douglas prangt. Das Gehörne hatte das Aussehen, wie das eines Bockes, der noch nicht gefegt hat, war aber ganz hart, knorpelig und mit dem Schädel verwachsen. Die beiden Stangen hatten jede eine Länge von 3" 3'" (10 Centimeter). Das Reh hatte, wie man aus den noch Milch gebenden Eutern sehen konnte, in diesem Jahre gesetzt ***).

Herzog Wilhelm IV. von Bayern besass ein in Silber gefasstes Geweih einer Hirschkuh, Anton Fugger in Augsburg ein desgleichen von 12 Enden und im Schlosse zu Aschaffenburg stand ein solches von 8 Enden mit der Unterschrift:

Schau o Welt! ich bin ein Weib
Und trag des Mannes Waffen;
Ich hab auf meinem Kopf,
Was für ihn ist erschaffen.

*) Siehe das Weitere in v. Wüdungens Taschenbuch von 1801 S. 6. und 1802. S. 74. Auch v. Mosers Forstarchiv XI. 345.

**) Dengler'sche Monatsschrift 1862. S. 435 f.

***) Dengler'sche Monatsschrift 1864. S. 158.

Ein im Besitze des bayerischen Reichsraths-Präsidenten Franz Freiherrn Schenk von Stauffenberg befindliches Geweih einer Hirschkuh sah ich auf Schloss Greifenstein. Die eine Stange ist normal, die andere abnorm, erstere vom Rosenstocke an gemessen 1' 7" hoch mit 3 Enden, letztere 4½" hoch und ebenfalls mit 3 Enden. Darunter steht ein die Jahreszahl 1716 ergebendes Chronostichon:

CerVa fuI, seD Mea CerVice cornua portaVi,
und der Reim:

Durch mein Geweih hab ich den Jäger irr gemacht,
Der mich am Kopf, und nicht der Fährte nach recht betracht.

Nachdem erwiesen ist, dass Geweihe und Gehörne nicht erst im höheren, sondern auch in bestem Alter, ja selbst in der Jugend bei fruchtbaren Hirschkühen und Rehgaissen vorgekommen sind, so wird man theoretisch betrachtet annehmen dürfen, dass auch die erworbene Mannweiblichkeit bei Vögeln nicht immer eine Folge des hohen Alters und eingetretener Unfruchtbarkeit sein, sondern sich schon während der Periode der Fortpflanzungsfähigkeit einstellen werde, und wirklich wird die Theorie durch die That bestätigt.

Bei Haushühnern, namentlich bei solchen, denen aus Sparsamkeit kein Hahn beigegeben ist, entwickeln sich öfters die Sporen an den Füßen, die Kämme und Kehllappen in ungewöhnlicher Weise, letztere hängen wie bei den Hähnen tief herab und es tritt zugleich mit diesen Erscheinungen ein hahnartiges Naturell, ein misstöniges Krähen, eine auffallende Rauflust, ja sogar, ähnlich den Kühen, welche rindern wollen und aus Geilheit anderen Kühen auf den Rücken springen, ein Analogon männlichen Geschlechtstriebes auf. Bei solchen krähenden, andere Hühner geil verfolgenden und tretenden Hennen erscheint die Bildung und Färbung der Integumente manchmal ganz normal, an anderen sind die beiden grössten Schwanzfedern oben ein Weniges gekrümmt und die Hals- und Schwanzdeckfedern mehr, als sonst bei Hennen gewöhnlich ist, entwickelt, wieder an anderen nehmen die Federzierrathen, Halskrause und Schwanz, sowohl in der Struktur, als auch in

der Färbung an Hahnenähnlichkeit immer mehr zu. Diese letzte Phase der Mannweiblichkeit, Hahnenähnlichkeit im Naturrell, an Sporen, Kämmen, Kehllappen und Federn, findet man selten an ein und demselben Individuum vereinigt, weil ein so vollständiges Ensemble nur an ganz alten Hennen, die ausgelegt haben, vorzukommen pflegt, und wer Hühner hält, auf Nutzhühner sieht und schon diejenigen Stücke abschafft, welche im Ertrage zurückgehen. Zudem sind dem Landmanne krähen Hühner verhasst, weil ihr Krähen einen baldigen Todesfall anzeigen soll; sie müssen daher gewöhnlich sofort an die Klinge, um des fatalen *Memento mori* los zu werden.

Die beginnende Hahnähnlichkeit auch im Gefieder stellt sich indessen zuweilen schon bei vorzüglichen Leghühnern im besten Alter ein und Fasanenhennen im freien oder halbfreien Zustande fangen gleichfalls mitunter schon sehr frühzeitig an, hahnenfedrig zu werden.

Eine von dem schwedischen Naturforscher Nilsson und von mir an je einer enterichfederig gewordenen Hausente gemachte Beobachtung dürfte in hohem Grade beachtenswerth sein. Zahme und wilde Entinnen mausern nämlich jährlich nur einmal, die Enteriche dagegen zweimal und auch die Hausentin nimmt die Doppelmauser an, sobald sie enterichfederig geworden ist, behält aber ihre weibliche Stimme, wie ich nun seit 9 Monaten an einer seit 3 Jahren enterichfederigen alten Entin täglich hören kann. Dr. Gloger *) vermuthet bei Besprechung jenes schwedischen Enten-Mannweibes, dass die Stimme desselben — Nilsson hatte nichts Bestimmtes darüber geschrieben — weiblich geblieben sein dürfte, weil der Bau der Luftröhre und demgemäss die Stimme der beiden Geschlechter der Ente sosehr verschieden ist und die Bildung solcher theils knorpeliger, theils knochiger Organe, wie Luftröhre und Kehlkopf, nach einem Lebensalter von 9 Jahren (so alt war die besagte Ente) doch wohl zu fest geworden sei, um noch eine so bedeutende Umgestaltung

*) Journal für Ornithologie von Dr. J. Cabanis und Dr. E. Baldamus. 1860. S. 29 f.

zuzulassen, dass nun die Stimme ebenfalls jener der Enteriche gleich oder nur ähnlich werden sollte. Für geradezu unmöglich wollte aber Gloger die Sache, den neueren Erfahrungen der Physiologie und pathologischen Anatomie zufolge nicht ansehen. Die Pauke oder Knochenblase vor der Bronchialtheilung der Enterichs-Trachea ist allerdings nur von der Grösse einer mässigen Kirsche und durch Rudolph Wagner ist nachgewiesen, dass hie und da auch die Trachea der Entenweibchen am untern Kehlkopf eine leise Asymmetrie zeigt, indessen muss die Möglichkeit einer solchen Umänderung aus den von Gloger dagegen angeführten Gründen verneint werden und meine zur Zeit noch lebende und, während ich diese Zeilen niederschreibe, am Bache meines Gartens ihr „Waakwaakwaak“ laut rufende, enterichfederige Ente beweist die Unmöglichkeit. Sie ruft allerdings nur wenig, meistentheils ein einmaliges, selten ein dreimal wiederholtes „Waak“; dieses klingt auch tiefer, als bei jüngeren Enten, und kann ihre Trachea möglicher Weise eine leise Asymmetrie am Kehlkopfe besitzen. Diese kleinen Abweichungen in ihrer Stimme dürften in dem Alter, in der Einsamkeit (ich halte ausser ihr keine Enten) und endlich in dem Wegfall aufregender Gemüthsbewegungen ihre zureichende Erklärung finden.

Merkwürdig sind bei den Enten die Geschlechtswerkzeuge. Die Enteriche nämlich besitzen sehr lange Ruthen, die ihnen, wie man an den Hausenten leicht sehen kann, sogleich nach der Begattung noch eine kurze Zeit aus dem After heraus hängen, dass sie fast die Erde berühren. Auch eine weibliche Ruthe scheint vorzukommen, wenigstens zuweilen, und an Weibchen von *Anas clangula* ist eine sehr deutliche, etwa 8 Linien lange Clitoris nachgewiesen. Da enterichfederige Hausentinnen jüngere Entinnen verfolgen und treten, so wäre es von Interesse, zu erfahren, ob bei ersteren eine Clitoris vorhanden und ob sie etwa gar hypertrophisch entwickelt ist. An meiner lebenden Ente habe ich Untersuchungen in dieser Richtung unterlassen, weil ausser mit dem Messer ein sicheres Ergebniss nicht zu erwarten steht.

Ein Verzeichniss aller mir bekannt gewordenen Fälle von Hahnenfedrigkeit, beziehungsweise Hahnenähnlichkeit ist jedenfalls erwünscht. Hier ist es:

Oriolus galbula L. Es soll sehr alte Weibchen der Goldamsel geben, welche fast ebenso schön gelb und schwarz aussehen, wie die alten Männchen, und dies sollen solche sein, deren Eierstock leer ist, die also ihres hohen Alters wegen nicht mehr zur Fortpflanzung taugen *).

Turdus merula L. Man findet, wiewohl sehr selten, alte Schwarzamsel-Weibchen, welche beinahe so schwarz wie die Männchen sind, eine dunkelgrau gewölkte Brust, einen braungelben Schnabel und hellgelbe Augenlieder haben **).

Cyanecula suecica L. Sehr alte Blaukehlchen-Weibchen sehen dem ein- und zuweilen sogar dem zweijährigen Männchen ganz gleich. Ein hahnenfederiges Weibchen im Frühjahrkleide bildet Naumann in seinen Nachträgen ab ***)

Budytes boarula Penn. Sehr alte Weibchen der gelben Winterbachstelze haben ebenfalls eine schwarze Kehle, wie die Männchen, doch von etwas geringerem Umfang und mit breiteren grauweissen Federrändern; allein solche sind eine Seltenheit. Gewöhnlich ist Kehle und Gurgel weiss, mit schwarzen Federn gemischt †).

Loxia curvirostra L. Bei sehr alten Männchen steigert sich das Gelb ihres Gefieders bis zum Rothgelb mancher Männchen, doch nicht bis zum eigentlichen Roth ††).

Dryocopus martius L. und *Gecinus canus* Gm. L. Bei sehr alten Weibchen des Schwarzspechts geht die sonst nur das Genick einnehmende rothe Kappe bis auf die Mitte des Scheitels und unter sehr alten Weibchen des Grauspechts finden sich einzelne mit einigen rothen Flecken auf dem Scheitel †††).

*) Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 2 Thl. S. 174.

**) ebenda S. 328

***) ebenda S. 419 und Thl. 13. Taf. 365. Nr. 3.

†) ebenda 3 Thl. S. 827.

††) ebenda 4 Thl. S. 363.

†††) Naumann, Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. 5 Thl. S. 256 und 290.

Tetrao tetrix L. Am 27. Oktober 1842 erhielt der Inspektor des naturhistorischen Museums in Leipzig R. Tobias eine hahnenfedrig werdende Birkhenne als einen jungen Birkhahn zum Ausstopfen zugeschickt. Die Sektion ergab sicher ein altes Weibchen. Es war merklich kleiner und schwächer, als die Birkhähne zu sein pflegen, hatte aber einen langen, gabelförmigen Schwanz mit sichelförmig gekrümmten Federn und einen ebenso warzigen nackten Fleck über den Augen, wie ein Hahu. Die weitere ausführliche Beschreibung kann im Journal für Ornithologie von Dr. J. Cabanis *) nachgelesen werden, hier genügt die summarische Anführung, dass der Vogel in Bezug auf die übrige Färbung im Allgemeinen das Kleid der Henne trug, dass dieses aber durch vieles, die gelbbraune Grundfarbe stellenweise fast ganz verdrängendes Schwarz und Blauschwarz ein sehr düsteres, männliches Aussehen erhielt.

Phasianus colchicus L. Die Weibchen des gemeinen Fasans bekommen meist nur im hohen Alter und als Ausnahme von der Regel, manchmal aber auch, wie schon bemerkt, auffallend frühzeitig ein dem männlichen Edelfasanen ähnlich gezeichnetes Gefieder. Doch bleibt es an dem blässerem Roth des Augenflecks, an den kurzen oder gar mangelnden Ohrfedern, den winzigen Spornen und andern Merkmalen immer noch kenntlich genug. Solche Weibchen taugen gewöhnlich nicht mehr zur Fortpflanzung **).

Sterna cinerea Briss. Bei sehr alten Weibchen des Rebhuhns kommt als Ausnahme von der Regel der Hufeisenfleck auf der Brust, welcher gewöhnlich entweder gar nicht vorhanden oder nur durch einige kleine rothbraune Fleckchen angedeutet ist, so schön wie bei dem Hahne vor. ***)

Anas. Bei den Enten sind die Sommerkleider der alten Männchen der Färbung der Weibchen und die der letzteren, wie auch sonst in der Vogelwelt, dem Federkleide der jungen

*) II. Jahrgang 1854. S. 88 f.

**) Naumann. 6 Thl. S. 439.

***) Neumann. 6 Thl. S. 480.

Männchen sehr ähnlich, ein Phänomen, welches einen überzeugenden Beweis für den Satz bietet, dass das Federkleid der fortpflanzungsfähigen Vogelweibchen nichts Anderes, als ein Zurückbleiben in der Farben-Entwicklung auf dem Standpunkte des jugendlichen Alters ist.

Anas boschas L. Eine Hausente mit Enterichsgefieder, die im Jahre 1829 ausgebrütet worden war und ursprünglich die Färbung der wilden Ente gehabt hatte, erhielt Nilsson *) im Spätherbst 1838. Sie hatte in jüngeren Jahren alljährlich Entchen, sogar bis 1837, doch schien ihr Vermögen, Eier zu legen, seit mehreren Jahren abgenommen zu haben. Im Frühjahr 1838 legte sie deren bloß einige wenige im April, brütete aber nicht. Hernach fing sie an, krumme Federn im Schwanze zu bekommen, im Nacken grün zu werden u. s. w. Weiter in den Sommer hinein, wo sie zu legen aufgehört hatte, gefiel sie sich darin, den andern Enten den Hof zu machen und zog sich hiedurch den Hass des Enterichs zu. Im Januar 1839 glich sie mit Einschluss der vier eingerollten oder geringelten Schwanzfedern einem gewöhnlichen Stock-Enteriche fast ebenso sehr, wie unter diesen selbst ein jüngerer einjähriger den älteren. Als sie jedoch im April 1840 starb, hatte sie bereits angefangen, stellenweise die Sommertracht der Enteriche anzulegen.

Meine schon oben erwähnte Ente ist 1856 ausgebrütet, hat 1863 zum letzten Male 10 Eier gelegt und ausgebrütet, in der nächsten Mauser ein enterichartiges Gefieder, grünen Kopf, braunen Hals und geringelte Schwanzfedern bekommen und ihr Federkleid in der Folgezeit mehr und mehr vervollständigt. Ich kaufte sie am 22. März 1865 in Altenmühl an der Altmühl, woselbst die Fischer sogenannte wildfärbige Enten züchten, die sie bei dem Fangen und Schiessen der wilden Enten als Lockvögel benützen.

*) Illuminerade Figurer till Skandinaviens Fauna. Th. II. Taf. 163. Journal für Ornithologie, herausgegeben von Dr. J. Cabanis und Dr. E. Baldamus. 1860. S. 29 f.

Ihr Schnabel ist an der Basis gelb, leicht in das Grünliche spielend, in der Mitte schwarz, an der Spitze gelb. Im Wintergewande, das sie im Spätherbste vollendet, ist der Oberkopf vom Oberschnabel an über das Auge hinweg, der Nacken und die Rückseite des Halses grünschwarz, goldgrün glänzend, die Backen und der nicht grüne Theil des Halses gelbbraun, erstere dicht braunschwarz gestrichelt, die Kehle fast ungefleckt. Ein weisser, hinten offener Halsring trennt das Goldgrün von der prächtig kastanienbraunen Brust, auf der verschleierte schwarze Flecken des weiblichen Gewandes durch das intensive Braun durchscheinen. Die Schultergegend, die Seiten neben der Oberbrust und die Tragfedern grau, durch zarte Wellenlinien gewässert, die Tragfedern zum Theil wie im weiblichen oder im Sommerkleide schwärzlichbraun mit breiten Kanten; der Bauch und die Schenkelbefiederung schmutzig hellgrau, mit vielen, ovalen, schmutzig bräunlichen Fleckchen besäet und mit undeutlichen feinen Wellenlinien dicht durchzogen. Am After fehlt das glänzend weisse Querband des wilden Entenrichs; die untere Schwanzdecke tiefschwarz, grün glänzend; Oberrücken dunkelbraun, Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecke tief schwarz mit grünem Glanz; Ober-, Mittel- und Unterflügel wie bei der männlichen Wildente; die Schwanzfedern, mit Ausnahme der aufgeringelten, wie am Weibchen weiss, in der Mitte rostgelb, mit vielen bräunlichen Quersflecken, die mittelsten Ringelfedern, (1864, 65 ein Paar, 1865, 66 zwei Paare) tief schwarz mit grünem Glanze; die hintersten Schwingfedern grau; die grossen Schulterfedern lanzettförmig zugespitzt. So gewährt denn dieses Mannweib einen Anblick, welcher selbst bei längerem Beschauen einen geübten Praktiker täuschen kann.

Im Sommergewande verschwindet der weisse Halsring bis auf die letzte Spur; die grauen, schön gewässerten Tragfedern und Bauchseiten vermischen sich mit vielen sommerfarbigen, dunkel gefleckten und hell gekanteten Federn; der grüne Kopf, die braune Brust, die untere schwarze Steissdecke und die Ringelfedern verbleiben, erstere und letztere, sowie die ge-

nannte Steissdecke unverändert, während auf der Brust die im Prachtkleide mehr verschleierte dunkeln Flecken deutlicher hervortreten; der Bauch vorherrschend sommerfärbig.

Der wilde Entenich legt sein Sommerkleid im Juli und August an und trägt es nur bis Anfangs Oktober, legt dann sein Winter- oder Prachtkleid an, das Ende Novembers vollendet ist, und trägt dieses bis in den Juli. Die wilde Entin aber mausert des Jahres nur einmal im August. Bei meiner Entin ist mit dem Eintritt der Mannweiblichkeit, wie schon oben gesagt worden ist, das interessante Phänomen der männlichen Doppelmauser eingetreten, ohne dass jedoch der Termin der Sommer-Toilette ihrer wilden männlichen Anverwandten von ihr eingehalten wird. Am 19. Februar dieses Jahres hatte sie die Ringelfedern des Schwanzes bis auf eine einzige verloren und einige Schwanzfedern, jederseits 2 Paare, vollständig erneuert. Zu gleicher Zeit fand ich einzelne Federn aller Regionen ihres Kleingefieders an den Ufern des Baches in meinem Garten zerstreut und am 26. ej. m. bei näherer Untersuchung der Entin selbst, dass junger Federnachwuchs von verschiedener Entwicklung aller Orten vorhanden war. Ohne alle Ringelfedern sah ich sie niemals und die einzige, welche sie heute noch (8. März) trägt, sitzt so fest, dass der bereits sehr vorgeschrittene schwanzringelnde Nachwuchs mit ihr noch längere Zeit zusammenstehen wird.

Anas nigra Linn. Von dieser Ente erhielt der bekannte Ornithologe Böck in Danzig 2 in der Färbung von dem normalen Kleide ihrer Art- und Geschlechtsgenossinnen nicht abweichende sehr alte Weibchen mit starken grossen Höckern auf den Schnäbeln, gleich denen der alten Männchen, deren ausschliesslicher Schmuck diese Protuberanzen sind. *) Eines dieser Weibchen hat Herr v. Homeyer sen. auf der Ornitho-

*) Böck, Prediger der reformirten Gemeinde, Bericht über meine Privatschule. Ostern. Danzig 1849. S. 19. und Osterbericht 1852. S. 8.

Dr. Thienemann, Rhea, Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Leipzig 1846. 1. Heft. S. 3.

logen-Versammlung zu Köthen unter einer ganzen Reihe recht alter Tauchenten-Weibchen vorgezeigt.

Anas glacialis Linn. Am 18. Februar 1849 erhielt Böck *) ein sehr altes Eisenten-Weibchen mit ziemlich vollendeter Mauser zum Hochzeitskleide, dessen Färbung dem des alten Männchens durchaus entsprach. Eine Eisente, die so sehr zerschossen war, dass er das Geschlecht nicht mehr erkennen konnte, war der Gestalt und theilweise auch der Färbung nach ein Weibchen, anderntheils auch wieder einem alten Männchen im Sommerkleide ähnlich gefärbt und mit Schwanzspiesen wie ein Männchen ausgestattet, so dass er es gewiss mit Recht für ein „emanzipirtes“ Weib gehalten hat.

Zu den seltensten Erscheinungen gehört angeborene Hahnenfederigkeit bei sonst vollständiger Weiblichkeit, wovon Dr. R. Meyer in Offenbach einen sehr interessanten Fall veröffentlicht hat. **) Er betrifft ein hahnenfedriges Haushuhn mit prächtigem Gefieder, auf dem Rücken dunklerem, an den Seiten hellerem Rothgelb, wie man es bei Hähnen häufig findet. Der Schwanz und die Flügeldeckfedern sind schwarzgrün mit Metallglanz, die stark gekrümmten Sichelfedern des Schwanzes und die Schwingen erster Ordnung weisslich, die Sporne an den Füßen stark und gross wie bei dem Hahne, der Kamm und die Kehllappen nach Hühnerart gebildet. Dem Thiere fehlt die stolze Haltung und der Muth des Hahnes und auch die Physiognomie ist die des Huhns. Bei plötzlichem Schrecke und verschiedenen anderen Anlässen legt es den Schwanz, wie diess auch Kapaune und Haushennen zu thun pflegen, horizontal nieder. Es wurde dieses Huhn im Jahre 1864 ausgebrütet, als es zum Verkaufe reif war, für ein Hähnchen gehalten und erst ein Jahr darauf, als es sich in keiner Weise als ein Hahn dokumentirte, nicht krächte und die Hühner nicht trat, im Gegentheil vom Hahne sich treten liess und endlich sogar normale

*) Osterbericht 1849. S. 18.

**) Der zoologische Garten, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere, herausgegeben von Dr. F. C. Noll. Frankfurt a. M. 1866. Jhrgg. VII. S. 167 mit Abbildung.

Eier legte, seinem Geschlechte nach erkannt. Es ist ein gutes Nutzhuhn, legt längliche, spitzige Eier, eine Form, von der behauptet wird, dass daraus Hähnchen entstehen. Ausbrütungsversuche mit solchen Eiern und darnach die Sektion des Huhnes selbst sind in Aussicht gestellt. Die Ansicht des Dr. Meyer, dass bei Entstehung dieses Huhnes im Eie „ursprünglich und bis zu dem Punkte, wo es auf die Gestaltung und Befiederung einen Einfluss haben konnte, das Männliche vorherrschte, später jedoch die wesentlichen männlichen Organe verkümmerten und an deren Stelle die weiblichen zur völligen Ausbildung gelangten,“ ist gewiss richtig, für einen Zwitter aber möchte ich das Huhn doch nicht halten, weil allem Anscheine nach nur die weiblichen Zeugungsorgane und zwar vollständig ausgebildet sind, die Hahnenartigkeit aber nur in äusserlichen Attributen, im Gefieder und in den Spornen, ausgeprägt ist. Hermaphroditismus setzt Coincidenz männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane voraus; gehemmte männliche oder weibliche Individuen sind desswegen noch keine wahren Hermaphroditen. Von zeugungsfähigen Männern mit weiblichem Habitus, bartlosem Gesicht und feiner Stimme, sowie von Damen, die durch Kindergebären als solche hinlänglich legitimirt sind, einen Vollbart tragen und vielleicht noch mit dem grobknochigen männlichen Habitus eine kräftige Baryton- oder Bassstimme vereinigen, wird man annehmen dürfen, dass in ihrem fötalen Leben bis zur morphologischen Differenzirung der Geschlechtswerkzeuge der männliche oder weibliche Charakter vorgeherrscht hat und der zur schliesslichen Ausbildung gekommenen geschlechtlichen Form Eigenschaften der verkümmerten oder gehemmten Form der Anlage nach verblieben und im späteren Leben zu auffallender Entwicklung gekommen sind. Zwitter kann man derartige Persönlichkeiten nicht nennen.

R e s u l t a t e
der
meteorologischen Beobachtungen in Nürnberg

in den Jahren 1864 und 1865.

Von

Dr. Küttlinger,
k. Bezirksarzt.

Den einleitenden Bemerkungen zum Jahre 1863 im 3. Bd. 1. Hälfte der Abhandlungen der Gesellschaft, welche selbstverständlich auch auf alle folgenden Jahre Bezug haben, erlaube ich mir noch beizufügen, dass ich es für angemessen gehalten habe, für die psychrometrischen Messungen statt der Berechnung des Dunstdruckes den Wassergehalt der Luft nach Grammen (1 Gramm etwa $\frac{1}{16}$ Loth) auf Grund einer Tabelle im Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik zu verzeichnen. Die Quantität des in der Atmosphäre suspendirten Wasserdunstes ist nämlich von wesentlichem Einfluss auf das Befinden der Menschen; eine zu geringe ruft Catarrhe, Entzündungen des Halses und der Brust hervor, eine zu grosse disponirt zu gastrisch-typhösen Leiden. Letztere kommt in unsrer Gegend viel seltener vor als erstere. Im Allgemeinen begünstigt bei uns ein Vorherrschen von Feuchtigkeit in der Luft die Salubrität. Das Jahr 1864 unterscheidet sich durch eine um 1,91° niedrigere Mittel-Temperatur und durch einen um 0,86 Grammen geringeren mittleren Wassergehalt der Atmosphäre von dem vorhergegangenen, daher der Gesundheitszustand auffallend ungünstiger war und grössere Sterblichkeit zur Folge hatte.

1864.

Der mittlere Barometer-Stand des Jahres 1864 übertraf das allgemeine Mittel von 325,51^{mm} nur um 0,23^{mm}. Die Schwankungen waren in der Mehrzahl der Monate gering, die grösste Differenz im November mit 14,80^{mm}, die des ganzen Jahres (8,85^{mm}) um 5,95^{mm} übertreffend. Der stärkste Luftdruck 332,50 am 16. Januar, der schwächste 316,60 am 29. März. (In 29 Jahren der stärkste am 9. Januar 1859 mit 334,61, der schwächste am 26. Dezember 1856 mit 311,91^{mm}).

Die Temperatur in den Winter-Monaten eine ziemlich niedrige und in den Sommer-Monaten gemässigte ergab das ziemlich niedrige Jahresmittel $6,61^{\circ}$, blieb demnach um $0,57^{\circ}$ unter dem aus 29 Jahren berechneten allgemeinen Mittel von $7,18^{\circ}$ R. Das Maximum erreichte sie am 6. August mit $24,4^{\circ}$ R. und das Minimum am 12. Februar mit $-14,7^{\circ}$ R. Das Mittel der Maxima aus sämtlichen Monaten $15,09^{\circ}$ und das der Minima $-2,35^{\circ}$ R. Differenz $17,41^{\circ}$.

Der Wassergehalt der Luft im Jahres-Mittel mit 7,15 Grammen auf einen Cubikmeter war im Verhältniss zum Vorjahr mit 8,01 Grammen, fast um ein Gramm ($0,86$) weniger, somit die Luft im Durchschnitt eine mehr trockene zu nennen.

Die Windrichtungen folgten ihrer Häufigkeit nach in absteigender Linie also: W., N.-O., O., N.-W., S.-O., S.-W., N., S. Der N.-O. folgt in zweiter Linie, während er im Vorjahr die dritte einnahm, der O. in dritter, im Vorjahr erst in sechster und der S. in letzter, dagegen im Vorjahr in 5. Linie. Die Polarströmungen hatten demnach sehr überhand genommen und fast in gleichem Verhältniss zu den Aequatorialluftströmungen gestanden, während das allgemeine Verhältniss der P. zu den Aequ.-Strömungen wie 1 : 1,5 sich verhält.

Die Himmelschau ergab ungewöhnlich viel heitere Tage.

Die Zahl der Regen- und Schneetage (84 und 17) war dem Mittel aus 17 Jahren gegenüber ($113,4$ und $28,9$) eine geringe zu nennen. Die 40 Nebel waren meistens nur Morgennebel besonders im Herbst.

Das Jahr 1864 ist demnach für kühler und trockener als gewöhnlich zu erklären.

Von den Jahreszeiten ist zu bemerken:

1. Die Wintermonate December 1863 bis Februar 1864 hatten eine Mittel-Temperatur von $-1,42^{\circ}$, welche um $1,08^{\circ}$ unter dem allgemeinen Mittel von $-0,34^{\circ}$ blieb.

Das Maximum der Temperatur betrug $8,4^{\circ}$ am 25. Februar, das Minimum $-14,7^{\circ}$ am 12. Februar, folglich hatte dieser Monat eine Temperatur-Differenz von $23,1^{\circ}$ R. Eis

hatten 54 Tage und mittlere Temperatur auf oder unter 0° R. 38 Tage. (Im v. J. nur 37 und 17 Tage.). Der mittlere Wassergehalt der Luft betrug 4,5 Grammen. In dem noch ziemlich milden December fiel 8mal Regen und 7mal Schnee, im kalten Januar nur 2mal Regen und 1mal Schnee und wehten kalte Ostwinde fast anhaltend. In dem gleichfalls kalten Februar fiel 4mal Schnee und gar kein Regen.

Der Winter ist demnach als ein kalter mit wenig Niederschlägen zu bezeichnen.

2. Der Frühling übertraf mit $7,38^{\circ}$ Mitteltemperatur das allgemeine Frühlings-Mittel für Nürnberg ($6,87^{\circ}$) um $0,51^{\circ}$. Der Wassergehalt der Luft betrug 6,7 Grammen. Der März war sehr windig, mässig feucht und weniger kalt als gewöhnlich; der April gleichfalls sehr windig und trocken in Folge vorhergehender Polarluftströmungen, auch der Mai windig und mässig feucht. Die Polarluftströmungen verhielten sich zu den Aequatorialluftströmungen wie 1 : 1,2.

3. Die Sommertemperatur kam mit $14,27^{\circ}$ dem allgemeinen Mittel für den Sommer ($14,98^{\circ}$) fast gleich. Der Wassergehalt der Luft betrug im Mittel 10,2 Grammen. Sehr feucht bei wiederholten Gewittern war der Juni. Auch im Juli regnete es viel, so dass die Kornerndte um 14 Tage später fiel als sonst. Weniger feucht und windig war der August. Dieser Sommer war deshalb ein mehr kühler zu nennen, denn keimale überschritt die mittlere Tagestemperatur 20° , das Maximum erreichte sie am 6. August mit $24,4$. Nur an 24 Tagen überschritt die Mittags-Temperatur 20° .

4. Der Herbst (September, October, November) ergab eine Mitteltemperatur von $6,95^{\circ}$, nur $0,28^{\circ}$ unter dem allgemeinen Mittel von $7,23^{\circ}$. Der Wassergehalt der Luft betrug im Mittel 7,3 Grammen. Der September war ziemlich feucht bei milder Temperatur ($11,76^{\circ}$ im Mittel), der October mehr trocken, dergleichen der November, welcher in der ersten Hälfte durch starke Morgenfröste schon einen winterlichen Charakter annahm. Die Polarluftströmungen verhielten sich zu den aequatorialen 1 : 0,9.

Demnach entsprachen die Witterungsverhältnisse dem allgemeinen Charakter dieser Jahreszeit.

Ueberschwemmungen kamen in diesem Jahre nicht vor. Am 20. August wehte ein Sirocco und in der Nacht vom 23. auf den 24. ein Sturm.

1865.

Der mittlere Barometerstand mit 325,84^{mm} übertraf das allgemeine Mittel von 325,51^{mm} nur um 0,33^{mm}. Die Schwankungen waren am stärksten im Januar, Februar und October. Im Februar die grösste Differenz von 12,50^{mm}, die des ganzen Jahres nur 8,61^{mm}. Der stärkste Luftdruck am 25. December mit 333,00^{mm}, der schwächste am 14. Januar mit 317,00^{mm}. Ersterer näherte sich dem Maximum von 29 Jahren mit 334,61^{mm} um 1,61^{mm}.

Die Temperatur in den Wintermonaten wie im Vorjahr ziemlich niedrig, dagegen in den Frühlings- und Sommermonaten ungewöhnlich hoch ergab das Mittel von 8,09°, um 0,91° höher als das allgemeine Mittel von 7,18°. Das Maximum erreichte sie am 21. Juli mit 29,0° R., das Minimum am 11. Februar mit — 11,5° R. Das Mittel der Maxima aus sämtlichen Monaten 16,0°, das der Minima — 0,95°. Differenz 16,95°, folglich nur um 0,45° geringer als im Vorjahr.

Der Wassergehalt der Luft mit 7,65 Grammen im Jahresmittel übertraf den vorjährigen nur um 0,50, also um einen halben Gramm; daher die Luft durchschnittlich als eine mehr trockene sich darstellte.

Die Windrichtungen folgten ihrer Häufigkeit nach in absteigender Linie also: W., S.-W., N.-O., O., N.-W., S.-O., S., N. Die Polarluftströmungen waren zwar weniger vorherrschend als 1864, aber doch viel häufiger als im allgemeinen Mittel (1 : 1,5). N.-O. und O. folgen schon in dritter und vierter Reihe und die Verhältnisszahl ergiebt 1 : 1,17, demnach dem Charakter des Vorjahrs sich nähernd.

Die Himmelsschau ergab ein Vorherrschen der heiteren Tage wie im Vorjahre.

Die Zahl der Regentage war gering, die der Schneetage um 6 mehr als im allgemeinen Mittel. Von den 39 Morgen-Nebeln fielen 13 im December.

Das Jahr 1865 war bei einer hohen mittleren Wärme ein mehr trocknes.

Von den Jahreszeiten ist zu bemerken:

1. Die Wintermonate December 1864 bis Februar 1865 zeigten im Mittel — $1,37^{\circ}$ R., also ähnlich dem Vorjahr um $1,03$ niedriger als das Mittel von — $0,34$. Das Maximum betrug $6,8^{\circ}$ am 27. Januar, das Minimum — $12,7$ am 26. December. Im Ganzen ereigneten sich keine bedeutenden Temperatursprünge. Eis hatten 76 Tage und mittlere Temperatur auf oder unter 0° 56 Tage. Der mittlere Wassergehalt der Luft betrug $4,7$ Gramm.

In dem kalten December fiel nur 1mal Regen und 4mal Schnee, im milderen Januar 4mal Regen und 11mal Schnee, im kalten Februar 4mal Regen und 8mal Schnee.

Der Winter ist demnach als ein ziemlich kalter mit mäßigen Niederschlägen zu bezeichnen.

2. Der Frühling übertraf mit $8,28^{\circ}$ R. Mitteltemperatur das allgemeine Frühlings-Mittel für Nürnberg ($6,87^{\circ}$) um $1,41^{\circ}$. Der Wassergehalt der Luft betrug $7,0$ Grammen durchschnittlich. Der März glich noch ganz einem Wintermonat und am Frühlings-Anfang den 20. zeigte Morgens 7 Uhr der Thermometer sogar — 10° . Regen fiel nur 3mal, dagegen Schnee 14mal und hatten 20 Tage Eis und 9 eine Temperatur von 0° und darunter. Um so milder gestaltete sich der April mit 20 warmen heiteren Tagen und nur 3maligem Regen nebst Gewitter. Diese warme Witterung setzte sich auch in den durch öftern Regen und Gewitter feuchteren Mai fort. Die Polarluftströmungen des ganzen Frühjahrs verhielten sich zu den Aequatorialluftströmungen wie $1:1,13$.

3. Die mittlere Sommertemperatur übertraf das allgemeine Sommermittel ($14,98^{\circ}$) mit $15,42^{\circ}$ um $0,44^{\circ}$, was besonders dem

Juli mit $18,10^{\circ}$ R. im Mittel zuzuschreiben ist. Der Wassergehalt der Luft betrug im Mittel 11,1 Grammen.

Weniger feucht als sehr windig mit einem Sturmwind am 18. Morgens war der Juni. Der Juli entfaltete eine wahrhaft tropische Hitze, die nur 8mal durch kurze Regen mit 4 Gewittern etwas gedämpft wurde, dagegen war der August durch 14 Regentage vorherrschend feucht.

Dieser Sommer ist demnach zu den warmen und mässig feuchten zu zählen.

4. Der Herbst (September, October, November) ergab eine Mitteltemperatur von $9,10^{\circ}$, das allgemeine Mittel von $7,23^{\circ}$, also um $1,87^{\circ}$ übersteigend. Der Wassergehalt der Luft 7,8 Grammen. Die hohe Mitteltemperatur wurde vornehmlich durch den warmen und trockenen September bedingt, welcher 26 heitere Tage und nur 2 Regentage hatte. Der October war feuchter, namentlich im letzten Drittheil, noch regnerischer bei zahlreichen Morgennebeln und vielen trüben Tagen der November. Die Polarluftströmungen verhielten sich in diesem Herbst zu den Aequatorialluftströmungen wie 1 : 0,70, überwogen daher letztere ungewöhnlich.

Als besondere meteorologische Phänomene verdienen nachfolgende Erwähnung:

Am 7. Januar Mittags 1 Uhr entlud sich während dichtem Schneegestöber ein Gewitter und entzündete der im Zickzack herabfahrende Blitz das Dach des nördlichen Lorenzthurmes, welcher bis auf die Thurmsstube abbrannte.

Am 19. März wehte ein eisiger Nordostwind, welcher sich am Abend zur Stärke eines Sturmwindes erhob, ein seltener Fall bei dieser Windrichtung.

Am 8. Juli Abends entluden sich aus einer schnell vorüberziehenden Gewitter-Wolke Schlossen von der Grösse einer welschen Nuss.

Am 31. December Abends erschien ein sehr schöner Mondregenbogen.

N

Janus

Febru

März

April

Mai .

Juni

Juli

Augt

Sept

Octo

Nov

I a-e. Nitschia tranconica. IV a b. Gloeocapsa
III a-b. Calothrix rhizomatoidea. VI a c. Tetrapedia Cr
V a-c. Anabaina gelatinosa. VII. Achnantidium naviculoides.

M

Janua

Febru

März

April

Mai .

Juni

Juli .

Augu


Sept

Octol

Nove

Dece

I a-e Nitschia franconica. n. a. u. merosa
III a-b Calothrix rhizomatoidea. IV a. b. Gloeo
V a-c Anabaina gelatinosa. VI a. c. Tetra
VII. Achnantidium naviculoides



Paul Reinsch ad natur. delin.

I a-e. *Nitschia franconica*.

III a-b. *Calothrix rhizomatoidea*.


V a-c. *Anabaina gelatinosa*.

VII. *Achnantidium naviculoides*

II a d. *Melosira Pfaffiana*.


IV a. b. *Gloeocapsa conspicua*.

VI a c. *Tetrapedia Crux Michaeli*.




Paul Reinsch ad natur. delin.

I. a-m. *Tetrapedia gothica*. II. *Polyedr. lobulatum* Naeg.
 III. a-b *Polyedr. decussatum*. IV. *Polyedr. decussatum multi lobum*.
 V. *Polyedr. enorme* Ralfs.




Paul Reinsch ad natur. delin.

I.a-e. Polyedr. trigonum; a-b gracile; c-d. minus; e-f. crassum.
 II.a-g. Polyedr. pentagonum. III. Polyedr. Pinacidium. IV. Pleuro-
 coccus vestitus. V. Characium pyriforme Alex. Braun.-




Paul Reinsch ad natur. delin.

I. a-b. *Sorastrum bidentatum*. II. *Selenastrum Bibraianum*.
III. a-b. *Selenastrum gracile*.




Paul Reinsch ad natur delin

I. a-e. *Cerasterias raphidioides*. II. *Polyedr. tetraetricum majus*. III. a. b. *Polyedr. tetraetricum hastatum*. IV. a-e. *Polyedr. octaetricum acuminatum*. V. a. b. *Polyedr. acuminat. spinosum*. VI. *Sorastr. spinulosum* Naegeli.




Paul Reinsch. ad. natur. delin.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| I. a c. <i>Cylindrocapsa involuta</i> . | II. <i>Cylindrocapsa nuda</i> . |
| III. <i>Scenedesmus alternans</i> . | IV. <i>Rhaphidium bplex</i> . |
| V. <i>Pediastrum serratum</i> . | VI. <i>Scenedesmus radiatus</i> . |
| VII. <i>Characium longipes</i> . | |




Paul Beinsch ad natur delin

I. a-d. Pediastrum Sturmii. II Pediasstr. gracile A. Braun. III a-b. Pediasstr. integrum Naeg. IV a-b Pediasstr. simplex A. Br. V. Pediasstr. vagum Kü. VI a. Pediasstr. Boryanum var. a. VI. b. P. Boryan. var. b. c. VII a-c. Botrycystis pentagonalis. VIII. Cosmarium Regnesi. IX a-b. Stauroastr. Renierii.




Paul Reinsch ad natur. delin.

I.a-c. *Micrasterias Hermanniana*. II.a. c. *Micraster angulosa*
 III.a-c. *Eucosmium Kützingerianum*.



Paul Reinsch ad natur delin

I a-d. *Cosmar. plicatum*. II a-h *Cosmar. norimbergense*. III a-g *Cosmar. concinnum* Rabenh. IV a-d. *Euastr. Sendtneriaum*. V a-d. *Cosmar. obsoletum* Hantsch. VI a-d. *Cosmar. trilobulatum*. VII a-d. *Xanthidium bicornutum*




Paul Reinsch ad natur. delin.

I. a-l. *Cosmarium Hammeri*. II. a-c. *Cosmar. circulare*.


III. a-g. *Cosmar. Brauni*. IV. a-b. *Staurostr. Pringsheimi*.


V. *Pediastrum perlusum* Kütz. *clathratum*.



Paul Reinsch ad natur delin.


I. Staurastr. Sancti Sebaldi II. a-c. Staurastr. pseudofurcigerum.
 III. a-c. Staurastr. Ungerii. IV. a-c. Staurastr. Erlangense





Paul Reinsch ad natur. delin.

I. a-f. Staurastr. Meriani. II. a-b. Staurastr. aculeatum Braunii.
 III. a-g. Staurastr. franconicum. IV. Docidium maximum.
 V. a-d. Closterium Braunii.



Paul Reinschad natur delin.

I.a-d. *Staurostrum minutissimum* Auersw. II.a-e. *Staurospermum franconicum*. III.a-d. *Vaucheria pendula*. IV.a-c. *Botrydium granulosum* L. V. a-b. *Conferva rigida*.

ABHANDLUNGEN
der
NATURHISTORISCHEN
GESELLSCHAFT

zu
NÜRNBERG.



IV. Band.
(Mit 5 lithographirten Tafeln.)



NÜRNBERG.

W i l h e l m S c h m i d.


Sm 1868.

Druck von Bielling (J. P. W. Dietz) in Nürnberg.

VORWORT.



Von dem abgelaufenen Vereinsjahre haben wir grösstentheils nur Erfreuliches zu berichten, zwar nicht in Beziehung auf eine erhebliche Vermehrung der Mitglieder, aber ganz besonders auf ein regeres Leben in dem Vereine selbst, auf eine bedeutend vermehrte Theilnahme an den wissenschaftlichen Versammlungen der Gesellschaft. Wir verdanken diess besonders einer Einrichtung, welche auf den schon früher gemachten Vorschlag unseres thätigen Mitgliedes, des Herrn Rector Dr. Kellermann hin in diesem Winter zum erstenmale in's Leben trat. Es sind diess regelmässige Berichterstattungen, zum Theile dem reichen Schatze unserer Bibliothek entnommen, zum andern Theile fanden wir in den neuesten literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Naturwissenschaften ein überreiches Material, welches diesem Zwecke dienstbar gemacht wurde. Die Gesellschaft versammelte sich vom October vorigen Jahres bis Ende April dieses



IV

Jahres allwöchentlich, wobei selbstständige grössere Vorträge mit Berichterstattungen abwechselten. Schon nach den ersten Versammlungen waren wir, Dank der Thätigkeit einer grossen Anzahl Mitglieder und Gäste, welche bereitwilligst Referate übernahmen, in der Lage, jedesmal auch nach vorausgegangenem Vortrage noch Interessantes auf diesem Gebiete zu hören. Es gereicht mir zur angenehmen Pflicht, allen jenen Herren, welche unser Hauptstreben, die Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse, fördern halfen, auch an diesem Platze meinen Dank auszusprechen, und die Hoffnung zu hegen, dass sie auch in Zukunft mit gewohnter Lust und Liebe zur Sache uns treu zur Seite stehen werden. Der schon länger im Vereine eingeführte Fragekasten bot gleichfalls häufig Gelegenheit zu interessanten und belehrenden Discussionen.

Dem bereitwilligen Entgegenkommen des hiesigen Gewerbevereines haben wir es zu verdanken, dass wir mit demselben gemeinsam ein Lesezimmer besitzen, worin Bibliothek und Zeitschriften in einer unseren Mitgliedern bequemen Weise zugänglich gemacht wurden. Das Lesezimmer ist täglich, den ganzen Tag über mit Ausnahme der Mittagstunde, geöffnet, und ist hiedurch ein bisher bestehender Mangel in vollkommen befriedigender Weise beseitigt.

Die Gesellschaft steht gegenwärtig mit 113 gelehrten Gesellschaften und Instituten in Verbindung und Schriftentausch, wie aus nachstehendem Verzeichnisse ersichtlich ist, worin namentlich die letzten Jahre äusserst fruchtbringend für uns waren, indem sie uns mit einer erheblichen Anzahl derselben in Berührung brachten. Diesem Umstande namentlich danken wir es, dass unsere Bibliothek über 1400 Bände zählt, indem uns für den Ankauf jährlich nur beschränkte Mittel zur Verfügung stehen.

Was die Zahl unserer Mitglieder anlangt, haben wir in dem abgelaufenen Jahre den Tod zweier Ehrenmitglieder, des Prinzen Maximilian von Wied-Neuwied und des Herrn Dr. Lindermeyer in Athen, sowie eines correspondirenden des Herrn Dr. Schulz in Deidesheim zu beklagen. Herr Prof. Dr. Virchow in Berlin wurde zum Ehrenmitglied, die Herren Lehrer und Zeidelmeister Lotter in Ziegelstein und Dr. F. Buchanan, Lehrer in Bremen wurden zu correspondirenden Mitgliedern ernannt. Aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder sind 14 ausgetreten, 3 sind gestorben, und 21 wurden neu aufgenommen, so dass unsere Gesellschaft zur Zeit aus 46 Ehrenmitgliedern, 65 correspondirenden, und 208 ordentlichen Mitgliedern besteht, die in nachstehendem Verzeichnisse namentlich aufgeführt sind.

VI

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass unsere Gesellschaft den Boden einer gedeihlichen Fortentwicklung, den sie in neuerer Zeit in erhöhterem Maasse festzuhalten sich bestrebte, auch in Zukunft nicht mehr verlassen werde, welcher Umstand gewiss am besten geeignet sein wird, die zahlreiche Theilnahme auswärtiger Gesellschaften an unserem Streben auch für die Zukunft uns zu sichern.

Nürnberg im Juli 1868.

Dr. Balerlacher.

Verzeichniss

der

im Winter 1867/68 gehaltenen Vorträge und Berichte.

23. October. Bericht von Herrn Dr. Baierlacher über Hallier, Gährungserscheinungen. Leipzig 1867.
30. October. Bericht von demselben über Legung des transatlantischen Telegraphenkabels und Telegraphenapparate hiezu. Jahrbuch der Erfindungen. Leipzig 1867.
6. November. Vortrag von Hrn. Voit über Generationswechsel im Thier- und Pflanzenleben.
Bericht von Hrn. Dr. W. Merkel über Minenkrankheiten. Bericht der „Philomathie“. Neisse 1867.
13. November. Beleuchtung Geissler'scher Röhren mit dem Rumkorff'schen Apparate von Hrn. Heller.
Bericht von Hrn. Dr. Seelhorst über Fett- und Eiweissbestimmung auf optischem Wege von A. Vogel. Abhandl. d. bair. Academie der Wissenschaften.
Bericht von demselben über Temperaturbestimmung in einigen Gebirgsseen von H. v. Schlagintweit. Dieselbe Quelle.
20. November. Vortrag von Hrn. Thierarzt Schwarz über verschiedene Methoden der Milchprobe.
Herr Dr. Seelhorst liefert den experimentellen Nachweis von Cyanwasserstoff und Schwefelwasserstoff im Tabackrauche.
Bericht von Hrn. E. Hektor, die Stimme der Vögel.
27. November. Vortrag von Hrn. C. Puscher über Ozon.
Bericht von Hrn. Dr. v. Pechmann über die Nothwendigkeit der Annahme eines Hohlraumes zwischen Erdrinde und Erdkern von Novak. Sitzungsbericht der k. Böhm. Gesellschaft f. Wissensch. 1867,

VIII

27. November. Bericht von Hrn. Dr. Neger über Sonnenflecken von Cecchi. Mitth. der naturf. Gesellsch. in Bern 1866.
4. Dezember. Bericht von Hrn. Dr. Baierlacher über ehemalige Gletscher in den Alpen. Jahrbuch des Oesterr. Alpenvereins. Wien 1865.
11. Dezember. Vortrag von demselben über Fleischextract und Fleischbrühe und deren Nahrungswerth.
Bericht von Hrn. Rector Dr. Kellermann über die Biene Aegyptens. Zeitschr. f. Acclimatis. 1867.
18. Dezember. Bericht von Hrn. Dr. Fuchs über das Verhalten des menschlichen Gehörorgans in comprimierter Luft. S. B. der naturf. Gesellschaft in Königsberg 1866.
Bericht von Hrn. Dr. Seelhorst über Schechner's Schrift. Unumstößlicher Beweis, dass die Erde nicht um die Sonne geht.
14. Januar. Vortrag von Hrn. Voit über Pilze, essbare und giftige.
Bericht von Hrn. Dr. Seelhorst über Dove: Eiszeit, Föhn und Sirocco. Berlin 1867.
Bericht von Hrn. Dr. Ebermeyer über Bonhorst's Methode, Bier mittelst comprimierter Kohlensäure aus dem Keller zu heben.
Mittheilungen über Liebig's Brod aus geschrotetem Korn von Hrn. C. Puscher.
21. Januar. Bericht von demselben über unterirdische Eisbildung in der Dornburg.
Versuche über Liebig's Kleienbrod von Hrn. Prof. Kraft.
28. Januar. Vortrag von Hrn. Dr. Fuchs über die Entwicklung des menschlichen Schädels nach den neuesten Untersuchungen von Virchow.
5. Februar. Vortrag von Hrn. Prof. Dr. Stölzel über die Natur der Flamme.
Mittheilungen von Hrn. Dr. Seelhorst über eine eigenthümliche Färbung der Wasserstofflampe.
12. Februar. Vortrag von Hrn. Dr. Hiller über künstliche Darstellung organischer Körper.
Demonstration und Experimente mit der Holz'schen Influenzmaschine von Hrn. Heller.
Bericht von Hrn. Dr. Baierlacher über Versuche von Husmann über Phosphoresorption im Thierkörper.
19. Februar. Vortrag von Hrn. Engelhard über die Entwicklung des menschlichen Geistes.

IX

19. Februar. Bericht von Hrn. Dr. Hiller über Diffusion der Gase von Voit. Nach. der naturf. Gesellsch. in Karlsruhe 1867.
26. Februar. Mittheilungen von Hrn. Prof. Kraft über Darwin's Theorie der Vulkanbildung.
Mittheilungen von Hrn. Dr. Seelhorst über die jüngsten vulkanischen Vorgänge auf Santorin.
4. März. Vortrag von Hrn. Dr. Neger über Krystalle und deren Formen.
11. März. Demonstration einiger seltenen Drogen von Hrn. F. Hertel.
18. März. Vortrag von Hrn. Lehrer Lotter in Ziegelstein über das Geschlechtsleben der Biene.
Bericht von Hrn. Dr. W. Merkel. Mittheilungen über einen bisher noch unbekannten Blasenwurm. Archiv für Naturkunde von Lifland etc. VI. Band.
Bericht von Hrn. Dr. Hiller über Einheit und Unzerstörbarkeit der Kräfte.
25. März. Vortrag von Hrn. Lehrer Lotter über die Arbeitsbienen.
Mittheilungen von Hrn. Dr. Seelhorst über Töpfer's neue Closets.
Mittheilungen über Vorkommen und Bereitung einiger Levantischer Drogen von Herrn F. Geith.
1. April. Vortrag von Hrn. Engelhard über die Farbe der Blumen.
Mittheilungen von Hrn. Ingenieur Leidel über Dampfkessel-explosionen.
Mittheilungen von Hrn. Engelhard über rothe Schimmelbildung.
8. u. 15. April. Vortrag von Hrn. Lehrer Lotter: die Anatomie der Biene.
-

Verzeichniss

der

gelehrten Gesellschaften, mit welchen die naturhistorische
Gesellschaft in Nürnberg in Schriftentausch steht.



Altenburg, naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Antwerpen, Académie d'Archéologie de Belgique.

Augsburg, naturhistorischer Verein.

Bamberg, Gewerbeverein.

„ naturforschende Gesellschaft.

Basel, naturforschende Gesellschaft.

Berlin, Entomologischer Verein.

„ Physikalische Gesellschaft.

„ deutsche geologische Gesellschaft.

„ Acclimatisationsverein für die preussischen Staaten.

„ Gesellschaft der naturforschenden Freunde.

Bern, Schweizerische naturforschende Gesellschaft.

„ naturforschende Gesellschaft.

Bonn, naturhistorischer Verein der preuss. Rheinlande und Westphalens.

Boston, American Academy of Arts and Sciences.

„ Society of natural history.

Bremen, naturwissenschaftlicher Verein.

Breslau, schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.

Brünn, naturwissenschaftliche Sektion der k. k. mähr. schles. Gesell-
schaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde.

„ naturforschender Verein.

Brüssel, Société malacologique.

Budweis, Handels- und Gewerbekammer.

Cambridge, (U. St. A.) Massachusetts Museum of comparative Zoology.

Carlsruhe, naturwissenschaftlicher Verein.

XI

- Cassel, Verein für Naturkunde.
Catania, Accademia Givonia di Scienze naturali.
Cherbourg, Société impériale des Sciences naturelles de Cherbourg.
Chur, naturforschende Gesellschaft Graubündens.
Columbus, (U. St. A.) Ohio-State: Board of Agriculture.
Danzig, naturforschende Gesellschaft.
Darmstadt, mittelrheinisch-zoologischer Verein.
„ Gesellschaft für Erdkunde und verwandte Wissenschaften.
Dessau, naturhistorischer Verein.
Dorpat, Naturforscher-Gesellschaft.
Dresden, k. statistisches Bureau.
„ naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
„ kais. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher.
Dublin, the natural history Society.
Dürkheim, naturwissenschaftlicher Verein der Pfalz.
Emden, naturforschende Gesellschaft.
Erfurt, k. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.
Frankfurt a. M., Redaktion des zoolog. Gartens.
„ Senckenbergische naturforschende Gesellschaft.
Freiburg, Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften im
Breisgau.
„ naturforschende Gesellschaft.
Fulda, Verein für Naturkunde.
St. Gallen, naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Graz, naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
„ geognostisch-montanistischer Verein.
Görlitz, naturforschende Gesellschaft.
Göttingen, k. Gesellschaft der Wissenschaften.
Halle a. S., naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.
„ naturforschende Gesellschaft.
„ landwirthschaftliches Institut der Universität.
Hamburg, naturwissenschaftl. Verein.
Hanau, Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.
Hannover, naturhist. Gesellschaft.
Heidelberg, naturhistorisch-medecin. Verein.
Herrmannstadt, Siebenbürgischer Verein für Naturkunde.
Hildburghausen, bibliogr. Institut.
Kiel, Verein für Naturwissenschaften nördlich der Elbe.
Klagenfurt, naturhist. Landesmuseum von Kärnten.
Königsberg, k. physikal.-ökonom. Gesellschaft.
Landshut, mineralogischer Verein.

XII

- Landslut, botanischer Verein.
Leipzig, k. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.
 " Fürstl. Jablonowskische Gesellschaft.
Linz, Museum Franzisko-Carolineum.
St. Louis, Academy of Science.
Mannheim, Verein für Naturkunde.
Marburg, Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften.
Moskau, k. Gesellschaft der Naturforscher.
München, k. bayr. Akademie der Wissenschaften.
Neisse, Philomathie.
Neubrandenburg, Verein der Freunde der Naturwissenschaften in
 Mecklenburg.
New-York, Lyceum of natural history.
Nürnberg, Stadtbibliothek.
 " Germanisches Museum.
 " Verein Merkur.
 " Gymnasialbibliothek.
 " Gewerbeverein.
Offenbach, Verein für Naturkunde.
Paseau, naturhistor. Verein.
Pest, k. ungarische Gesellschaft der Naturwissenschaften.
Philadelphia, Academy of natural Sciences.
 " American Philosophical Society.
Prag, naturhist. Verein Lotos.
 " k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
 " k. k. patriotisch-ökonomische Gesellschaft im Königr. Böhmen.
Pressburg, Verein für Naturkunde.
Regensburg, k. botanische Gesellschaft.
 " Zoologisch-mineralogischer Verein.
Riga, naturforschender Verein.
Salem, Essex-Institute.
Salzburg, Museum Carolino-Augustum.
San Franzisko, Californian Academy of natural Sciences.
Solothurn, naturforschende Gesellschaft.
Stockholm, k. schwedische Akademie der Wissenschaften.
Stuttgart, Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
Turin, k. Akademie der Wissenschaften.
Venedig, k. Institut der Wissenschaften.
 " Commentario de la Fauna, Flora o gea di Venetia.
Washington, Smithsonian Institution.
Wien, k. k. geographische Gesellschaft.

XIII

Wien, k. k. geologische Reichsanstalt.

„ akademischer Leseverein.

„ k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft.

„ Hofmineralienkabinet.

„ österreichischer Alpenverein.

Wienbaden, Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau.

Würzburg, Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

„ Polytechnischer Verein.

Zürich, naturforschende Gesellschaft.

Zweibrücken, naturhistorischer Verein.

Verzeichniss
der
Mitglieder der naturhistorischen Gesellschaft
zu Nürnberg
im Juni 1868.

Direktorium der Gesellschaft.

- Direktor:* Dr. med. Ed. Baierlacher, praktischer Arzt.
I. Sekretär: Dr. med. Wilhelm Merkel, praktischer Arzt.
II. Sekretär: Dr. med. Wilhelm Fuchs, praktischer Arzt.
Bibliothekar: Dr. H. Weger, k. Professor am Realgymnasium.
Conservator: C. Clauss, Kaufmann.
Cassier: C. H. Klinger, Kaufmann.
-

Ehrenmitglieder.

Se. Königliche Hoheit Maximilian, Herzog in Bayern.

Herr Dr. A. Bello, Rektor der Akademie an der Universität zu Santiago de Chile.

- „ Dr. C. G. C. Bischof, k. preuss. Geh. Bergrath und ord. Professor der Chemie und Technologie etc. in Bonn.
- „ Dr. A. Braun, Professor der Botanik an der Universität und Direktor des k. botan. Gartens und des k. Herbariums zu Berlin.
- „ B. S. Castellanos, Direktor der k. archäolog. Akademie und General-Direktor der Normal-Schulen des Königreichs Spanien zu Madrid.
- „ Jul. Colbeau, Sekretär der malakolog. Gesellschaft in Brüssel.

Herr Théophile le Comte, Naturforscher zu Lessines.

- „ Dr. J. Domeyko, Professor zu Santiago in Chile.
- „ J. Duval Jouve, Inspektor der Akademie zu Strassburg und Mitglied der botanischen Gesellschaft von Frankreich.
- „ Dr. L. J. Fitzinger in Wien.
- „ Dr. F. Flügel, Privatgelehrter in Leipzig.
- „ Dr. H. R. Göppert, k. preuss. Geh. Medicinalrath, Professor der Medicin und Botanik, Präses der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur zu Breslau.
- „ Dr. F. E. Guérin-Meneville, Professor u. Direktor der Cuvier'schen Gesellschaft zu Paris.
- „ Dr. W. Ritter von Haidinger, k. k. Hofrath in Wien.
- „ Dr. L. Freiherr von Hohenbühel, genannt Heufler zu Rasen, k. k. wirklicher Kämmerer und Ministerialrath im Ministerium für Cultus und Unterricht.
- „ A. J. Jäckel, k. Pfarrer in Sommersdorf.
- „ Dr. J. R. L. Comte de Kerkhove, dit van der Varent, Präsident der Archäolog Akademie Belgiens und Vicepräsident der k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Antwerpen.
- „ Dr. F. von Kobell, Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates und Professor der Mineralogie an der k. Universität zu München.
- „ F. Lambrecht, k. holl. Hauptmann in Sumatra.
- „ Professor Dr. Freiherr J. von Liebig, Vorstand der k. Akademie der Wissenschaft etc. zu München.
- „ Dr. C. F. P. von Martius, k. b. Geh. Rath, Präsident der k. bayer. botan. Gesellschaft zu Regensburg etc. zu München.
- „ Dr. Mettenius, Professor der Botanik und Direktor des k. botan. Gartens zu Leipzig.
- „ Dr. H. von Mohl, Professor der Medecin und Botanik an der k. Universität und Direktor des botan. Gartens zu Tübingen.
- „ Dr. J. G. Morris, Pastor zu Baltimore.
- „ Dr. J. W. Freiherr von Müller, Privatgelehrter zu Paris, ehem. k. k. österr. General-Consul für Central-Afrika.
- „ Dr. K. Müller, Privatgelehrter zu Neustadt an der Saale.
- „ Dr. R. A. Philippi, Professor an der Akademie zu Santiago de Chile.
- „ Dr. E. Pöppig, Professor der Zoologie und Direktor des naturhistor. Museums an der k. Universität zu Leipzig.
- „ Dr. J. G. L. Reichenbach, k. sächs. Hofrath, Professor der Botanik, Direktor des k. zoolog. und botanischen Museums und des botan. Gartens zu Dresden.

XVI

Herr Dr. Carl von Renard, Excellenz k. k. russischer wirklicher Staatsrath, Sekretär der kais. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau.

- „ Dr. J. A. Ried, praktischer Arzt zu Valparaiso in Chile.
- „ Dr. F. F. Runge, Professor der Gewerbkunde zu Oranienburg.
- „ Dr. P. Savi, Professor zu Pisa.
- „ Dr. A. von Schauss-Kempfenhausen, k. griechischer Consul in München.
- „ Dr. H. Freiherr von Schlagintweit, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ Dr. R. Freiherr von Schlagintweit, auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ Dr. M. J. Schleiden, grossherzogl. Sachsen-Weimar'scher Hofrath, Professor der Botanik zu Dorpat.
- „ Dr. A. Schnizlein, Professor der Botanik und Direktor des botan. Gartens an der k. Universität zu Erlangen.
- „ A. Senoner, Bibliothekscustos der k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien.
- „ Dr. C. T. E. von Siebold, Professor der Zoologie an der k. Universität und erster Conservator der zoolog.-anatom. Sammlungen des Staates zu München.
- „ Dr. C. A. Steinheil, k. bayer. Ministerialrath, Conservator der mathemat.-physical. Sammlungen des Staates und Professor der Mathematik an der Universität zu München.
- „ Dr. W. F. R. Suringar, Professor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens zu Leyden.
- „ Dr. C. M. Tallaviana zu Laibach.
- „ K. Freiherr von Zu-Rhein, k. bayer. Reichsrath und Regierungs-Präsident von Oberbayern zu München.
- „ Dr. Rudolph Virchow, k. Universitätsprofessor in Berlin.
- „ B. L. F. von Voltz, Exc. k. bayer. wirkl. Staatsrath etc. zu München.

Correspondirende Mitglieder.

Herr A. D. Bache, Professor und Superintendent United States Coast, Survey in Washington.

- „ Dr. Spencer F. Baird, Professor und Secretär am Smithsonian-Institut zu Washington.
- „ Dr. A. Besnard, k. bayr. Stab- und prakt. Arzt zu München.

XVII

Herr Dr. Boll in Neubrandenburg.

- „ Dr. Franz Buchenan, Lehrer in Bremen.
- „ J. F. Caflich, Professor in Augsburg.
- „ Dr. Calvi, Professor in Genua.
- „ Dr. Stephan della Chiaje, prakt. Arzt und Professor der Medecin an der Universität zu Neapel.
- „ José Maria Latino Coelho, Sekretär der k. Academie der Wissenschaften in Lissabon.
- „ Dr. H. Döbner, Herzogl. Sachs.-Meining. Medicinalrath und Hofmedicus in Meiningen.
- „ Dr. O. Döpping, Chemiker zu Moskau.
- „ Dr. Th. Dompierre, k. bayer. Oberstabsarzt.
- „ L. Dufour zu S. Sever.
- „ Dr. J. Dumas, Professor der Medecin an der Universität zu Montpellier.
- „ K. Ehrlich, Ausschussmitglied und Custos des Museum Franzisko-Carolinum in Linz.
- „ Dr. F. Emmert, k. Pfarrer zu Schweinfurt.
- „ Dr. J. A. A. Erlenmeyer, prakt. Arzt, Direktor und Oberarzt der Privat-Heilanstalt für Gehirn- und Nervenkrankheiten zu Bendorf bei Coblenz.
- „ Dr. A. L. A. Fée, Professor der Botanik und Pharmacie an der medic. Facultät, Director des botan. Gartens zu Strassburg.
- „ J. G. Fehr, Lehrer in Gunzenhausen.
- „ Dr. A. Fischer von Waldheim, wirkl. kaiserl. russ. Staatsrath und Vice-Präsident der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau.
- „ Franz Foetterle, k. k. Bergrath, erster Sekretär der k. k. geograph. Gesellschaft zu Wien.
- „ Georg Ritter von Frauenfeld, erster Sekretär der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien.
- „ Dr. S. Friedmann, quiesc. k. niederländ. Militärarzt und prakt. Arzt in München.
- „ L. Frischmann, k. zweiter Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates zu München.
- „ K. Fuss, Professor zu Hermannstadt in Siebenbürgen.
- „ Dr. S. S. Haldemann, Professor zu Columbia in Pensylvanien.
- „ J. Hall, Staatsgeolog von Iowa und Paläontolog für die Staaten New-York, Albany etc.
- „ F. Ritter von Hauer, Sectionsrath und Direktor der k. k. geologischen Reichsanstalt.

XVIII

- Herr Dr. Th. von Heldreich, Direktor des botanischen Gartens und Direktionsmitglied des naturhistorischen Museums in Athen.
- „ Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer, k. Bezirksgerichtsarzt und Director des zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg.
 - „ Dr. med. Heidenschreider, prakt. Arzt in Herrieden.
 - „ Dr. J. Hoffmann, Verlagsbuchhändler zu Stuttgart.
 - „ A. le Jolis, Botaniker, Stifter, Präsident und beständiger Sekretär der kaiserl. naturwissenschaftl. Gesellschaft zu Cherbourg.
 - „ H. Koch, früher Director des zoologischen Museums zu Triest.
 - „ Dr. C. R. König, Lehrer an der Realschule und Adjunct am I. Univers.-Laboratorium zu Leipzig.
 - „ Dr. E. Kratzmann, prakt. Arzt zu Marienbad.
 - „ Dr. H. C. Küster, Vorstand des k. Telegraphenamtes zu Bamberg.
 - „ Dr. W. Lachmann, Professor zu Braunschweig.
 - „ Lotter, Lehrer und Zeidelmeister in Ziegelstein bei Nürnberg.
 - „ Dr. C. B. F. Merklein, Professor zu Schaffhausen.
 - „ Dr. J. Milde, ordentl. Lehrer der Naturwissenschaften und Botanik an der zweiten höhern Bürger- und Realschule zu Breslau.
 - „ Dr. J. Müller, fürstl. waldeckischer Medicinalrath, Vice-Director des norddeutschen Apotheker-Vereins zu Berlin.
 - „ Dr. W. Müller, ordentl. Professor an der Universität Jena.
 - „ Dr. A. Mousson, Präsident der naturhist. Gesellschaft zu Zürich.
 - „ Dr. G. D. Mardo, Director der k. k. Findelhäuser in Venedig.
 - „ J. Natterer, früher Kustos am k. k. Hof-Naturalienkabinet zu Wien.
 - „ Dr. A. A. von Palliardi, fürstl. reuss.-schleiz. Medicinalrath und Badearzt zu Kaiser-Franzensbad in Böhmen.
 - „ Dr. Rehm, prakt. Arzt zu Markt Sugenheim.
 - „ V. B. Rosales, chilensischer General-Consul zu Hamburg.
 - „ Dr. P. Savi, Professor, Director des Museums zu Pisa.
 - „ Dr. C. H. Schauenburg, prakt. Arzt und Privatdocent an der k. Universität zu Bonn.
 - „ Dr. A. Schenk, Prof. der Botanik an der Universität zu Würzburg.
 - „ Dr. A. Schilling, prakt. Arzt in München.
 - „ Dr. C. F. Schimper, Privatgelehrter zu Schwetzingen.
 - „ Dr. F. Schlegel, prakt. Arzt zu Altenburg.
 - „ F. J. Schmidt, Privatier zu Schischka bei Laibach.
 - „ Dr. Karlos Segeth, zu Santiago in Chile.
 - „ Dr. A. Skofitz, Herausgeber der österr. botanischen Zeitschrift in Wien.
 - „ T. Fr. Tempsky, Buchhändler in Prag.
 - „ V. Graf von Trevisan, Privatgelehrter zu Padua.

Herr Dr. med. Ullersperger, herzogl. leuchtenbergischer Leibarzt und
prakt. Arzt in München.

- „ Dr. P. J. Vallez, Direktor des ophthalm. Instituts zu Brüssel.
- „ Dr. R. Wagner, Professor an der k. Universität zu Würzburg.
- „ F. Winkler, k. Regierungs- und Kreisforstrath in Ansbach.
- „ G. C. Wittstein, Professor in München.

Ordentliche Mitglieder.

Herr Dr. med. Ed. Baierlacher, prakt. Arzt.

- „ J. A. G. Bäumlcr, Kaufmann.
- „ Dr. med. Ad. Bartholmess, prakt. Arzt.
- „ J. F. Bauer, Oberlehrer.
- „ C. F. Beck, privatisirender Apotheker.
- „ A. Beckh, Kaufmann.
- „ Dr. med. W. Beckh, prakt. Arzt.
- „ O. Berger, Kaufmann.
- „ Dr. med. et philos. E. Freiherr von Bibra, Gutsherr auf Schwebheim in Unterfranken.
- „ Fr. Bleicher, Kaufmann.
- „ Friedrich Beck, Lehrer.
- „ C. A. Braun, Besitzer der Joh. Phil. Raw'schen Buchhandlung.
- „ A. von Bressendorf, k. Bahnbeamter.
- „ Chr. Burger, k. geistlicher Rath und Stadtpfarrer.
- „ J. Campe, Besitzer der Apotheke zur goldenen Kugel.
- „ C. Clauss, Kaufmann.
- „ J. C. Clericus, Kaufmann.
- „ P. Cnopf, Banquier.
- „ Matthäus Dannegger, Kaufmann.
- „ L. Dengler, Professor an der k. Kreisgewerbschule.
- „ J. P. W. Dietz, Buchdruckereibesitzer.
- „ C. Drexel, k. Rechtsanwalt.
- „ G. Drittlcr, k. Bankhauptbuchhalter.
- „ J. Eberhard, k. Professor an der Kunstschule.
- „ Dr. philos. Ed. Ebermayer, Chemiker.
- „ W. F. Echt, Flaschnermeister.
- „ E. Eckart, Besitzer der Apotheke zum heiligen Geist.
- „ S. K. Th. Eisen, qu. k. Revierförster.
- „ C. Engel, Verwalter am landwirthschaftl. Institut zu Lichtenhof.

Herr C. Engelhard; Rechtsrath.

- „ C. J. F. A. Engelhard, Privatier.
- „ Fr. Erb, Kaufmann.
- „ A. Ertheiler, Kaufmann.
- „ Falk, Fabrikbesitzer.
- „ A. Falke, k. Forstamtsaktuar.
- „ Dr. L. Feuerbach, Privatgelehrter.
- „ A. Firsching, Professor an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ J. Förderreuther, Kaufmann.
- „ Chr. von Forster, Kaufmann.
- „ Freytag, k. Handelsappellationsgerichtsrath.
- „ Chr. Fuchs, Kaufmann.
- „ Dr. med. W. Fuchs, prakt. Arzt.
- „ J. Fuchs, Kaufmann.
- „ G. Gagstetter, Kaufmann.
- „ J. Galimberti, Hotelbesitzer.
- „ H. Gebhardt, Fabrikbesitzer.
- „ L. Gebhardt, Kaufmann.
- „ Franz Geith, Kaufmann.
- „ C. von Gemming, pens. k. Obrist.
- „ P. Gessner, Kaufmann.
- „ L. Göschel, Apotheker.
- „ G. F. Gonnermann, Kaufmann.
- „ F. M. Gürster, Kaufmann.
- „ Dr. R. Hagen, Fabrikbesitzer zu Fürther Kreuzung.
- „ J. Hahn, Fabrikbesitzer.
- „ C. Ritter von Haubner, Rittergutsbesitzer.
- „ Dr. A. Fr. Hauck, k. Professor am Realgymnasium.
- „ Dr. H. Hauck, Lehrer an der Handelsschule.
- „ J. G. Haeupler, Lehrer.
- „ A. Heerdegen, Kaufmann.
- „ Joh. Heerdegen, Chemiker.
- „ E. W. Hektor, Sekretär am germanischen Museum.
- „ J. Fr. Heller, Mechaniker.
- „ Jean Hemeter, Privatier.
- „ G. Herforth, Kaufmann.
- „ Dr. Fr. Herold, k. Gymnasialprofessor.
- „ Fr. Hertel, Kaufmann.
- „ L. Hessenauer, Besitzer der Paradiesapotheke.
- „ Dr. phil. Hiller, Gewerbareferent.
- „ Hirscheider, Kunstgärtner.

Herr Gottl. Hirzel, Ingenieur.

- „ N. Hoffmann, Mechaniker.
- „ J. H. Hofmann, Privatier.
- „ Hofmann, k. Sektionsingenieur.
- „ Ernst Hofmann, Pharmaceut.
- „ K. Hofmann, k. Professor an der Kreisgewerbschule.
- „ Albert Hoheimer, Privatier.
- „ C. S. Freiherr von Holzschuher, k. k. Hauptmann.
- „ G. Huber, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ H. Jungmann, Kaufmann.
- „ Kaussler, ehem. Direktor des Gaswerks.
- „ A. A. Keerl, Kaufmann.
- „ Dr. philos. J. Kern, Chemiker.
- „ Dr. J. C. Kellermann, k. Rektor an der Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ Dr. J. G. Kellermann, k. Professor an der Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ H. F. E. Kieser, herzogl. leuchtenberg. Bergmeister.
- „ C. H. Klinger, Kaufmann.
- „ Fr. Knapp, Kaufmann.
- „ H. v. Koch, Studiosus der Naturwissenschaften.
- „ Dr. med. L. C. Koch, prakt. Arzt.
- „ Ad. Köllner, Buchhändler.
- „ A. Kohn, Banquier.
- „ J. Kohn, Banquier.
- „ Dr. A. R. J. König, quiesc. Lehrer an der Handelsschule.
- „ Johannes Krafft, Ingenieur.
- „ Th. Krafft, k. Studienlehrer.
- „ A. Krage, Mechaniker.
- „ W. Lamprecht, Fabrikbesitzer.
- „ J. A. Langhans, Seiden- und Damastweber.
- „ Dr. med. Leupoldt, prakt. Arzt.
- „ C. Leydel, k. Betriebs-Ingenieur.
- „ J. Leykam, Kaufmann.
- „ Fr. Freiherr von Löffelholz, k. Revierförster zu Lichtenhof.
- „ J. L. Lotzbeck, Buchhändler.
- „ Dr. med. M. Maas, prakt. Arzt.
- „ K. Mahla, Fabrikbesitzer.
- „ K. Mandel, Kaufmann.
- „ F. C. Meyer, k. Professor an der Kunstschule.
- „ Merck, Kaufmann.

Herr C. S. Merkel, Besitzer der Apotheke zum Mohren.

- „ Dr. med. Gottl. Merkel, prakt. Arzt.
- „ G. Merkel, Fabrikbesitzer.
- „ Dr. med. Wilh. Merkel, prakt. Arzt.
- „ Heinr. Meusel, Patentstiftfabrikant.
- „ J. F. Methsieder, Lehrer.
- „ Ludw. Mitzler, Besitzer der Apotheke zu St. Johannis.
- „ E. Model, Privatier.
- „ Christian Münzinger, Kaufmann.
- „ A. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.
- „ P. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.
- „ A. zur Nedden, Zahnarzt.
- „ Dr. philos. J. Neger, Fabrikbesitzer.
- „ J. G. Nudinger, Kaufmann.
- „ Dr. philos. Th. Oppler, Fabrikbesitzer.
- „ R. Pabst, Fabrikbesitzer.
- „ C. Paraviso, Kaufmann.
- „ Dr. med. H. Freiherr von Pechmann, prakt. Arzt.
- „ M. G. Pfann, Lehrer.
- „ C. Pfeiffer, Kaufmann.
- „ J. H. Pfeiflen, Kaufmann.
- „ H. Pretscher, Optikus.
- „ C. Probst, Photograph.
- „ C. Puscher, Privatier.
- „ W. Puscher, Privatier, Marktsadjunkt und Handelsappellations-
gerichts-Assessor.
- „ Dr. philos. G. Rauhenzahner.
- „ A. Raum, Kaufmann.
- „ J. Reissig, Kaufmann.
- „ Reissinger, k. Bezirks-Ingenieur.
- „ Dr. med. H. Reuter, k. Bezirksgerichtsarzt.
- „ J. M. M. Richter, Kaufmann.
- „ Fr. Riemann, Privatier und Gutsbesitzer.
- „ Ritter, privatisirender Apotheker.
- „ C. H. Römhild, Kaufmann.
- „ M. Rosenschon, Professor an der k. Kreisgewerbeschule.
- „ Th. Rüll, Buch- und Kunsthändler.
- „ L. Schäffer, Oberlehrer.
- „ Scheidemandel, privatis. Apotheker.
- „ von Schellerer, k. bayr. Hauptmann.
- „ A. Schilling, Kaufmann.

Herr Karl Schlemmer, Aktuar.

- „ W. Schmid, Buchhändler.
- „ Chr. Schmidmer, Kaufmann.
- „ L. Schmidmer, Kaufmann.
- „ A. Schmidt, Zahnarzt.
- „ E. Schmidt, Landgerichtsthierarzt.
- „ Jacob Schmitt, Kaufmann.
- „ F. Schmidt, Kaufmann in Cadolzburg.
- „ J. Schmidt, Assistent an der k. Kreis-Landwirthschaftsschule.
- „ Schöberlein, Fabrikdirektor.
- „ Cand. theolog. F. Schönborg, Lehrer an der Handelsschule.
- „ Ernst Scholl, Kaufmann.
- „ H. Schrag, Buchhändler.
- „ Th. Schröder, Lehrer der Mathematik am k. Gymnasium.
- „ E. J. G. Schrodt, k. Regierungsrath und Stadtkommissär.
- „ J. C. D. von Schwarz, Kaufmann.
- „ K. Schwarz, städtischer und Bezirks-Thierarzt.
- „ L. v. von Schwarz, Kaufmann.
- „ U. E. Sebold, Buchdruckereibesitzer.
- „ Dr. G. Seelhorst, Lehrer an der Handelsschule.
- „ G. Seitz, Fabrikbesitzer.
- „ Seufferheld, Kunstgärtner.
- „ H. von Sicherer, Chemiker.
- „ Dr. med. Solger, prakt. Arzt.
- „ Solger, städtischer Baurath.
- „ A. Solger, Kaufmann.
- „ J. Stief, Spielwaarenfabrikant.
- „ J. L. Stieglitz, Lehrer.
- „ Gottfr. Spielhagen, Kaufmann.
- „ Dr. C. Stölzel, Professor an der k. Kreisgewerbeschule.
- „ Heinr. Strauss, Commis.
- „ Stramer, k. Handelsappellationsgerichtsrath.
- „ E. von Stromer, Oekonom.
- „ E. Ph. Thiess, Kaufmann.
- „ C. Tölke, Kunstgärtner.
- „ M. Völkel, Oberlehrer.
- „ C. Voit, Chemiker.
- „ E. Vollrath, Kaufmann.
- „ Dr. med. Th. Weber, prakt. und Kurarzt in Streitberg.
- „ Dr. H. Weger, Professor am k. Realgymnasium.
- „ J. A. Weiss, Kaufmann.

XXIV

Herr Fr. Weigel, Commis.

- „ G. L. Weigel, Kaufmann.
- „ C. J. G. Freiherr von Welser, Rittergutsbesitzer.
- „ J. E. Weltrich, freiherrl. von Tucher'scher Administrator.
- „ G. Wheeler, ehem. Consul der vereinigten Staaten von Nordamerika.
- „ J. Werther, Fabrikbesitzer.
- „ J. F. Weyssel, Besitzer der Apotheke zum goldnen Stern.
- „ Dr. med. Winkler, k. Bezirksarzt.
- „ A. Wolf, Oberlehrer.
- „ L. K. Wucherer, k. Bezirks-Maschinenmeister.
- „ K. Wünsch, Commis.
- „ E. Zahn, Kaufmann.
- „ J. Zeltner, Fabrikbesitzer.
- „ J. Zeltner, jun., Kaufmann.
- „ H. Zeltner, Fabrikbesitzer.
- „ Dr. Wilh. Zollmann, Lehrer an der Handelsschule.
- „ Zöbisch, Chemiker.
- „ A. Zöllner, Kaufmann.

Die Arachnidengattungen
Amaurobius, Caelotes und Cybaeus

von

Dr. L. Koch.



Im Jahre 1855 habe ich im Correspondenzblatte des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg die Arten der Gattung Amaurobius zusammengestellt. Es lag mir jedoch damals nur daran nachzuweisen, dass bei den eigentlichen Spinnen jede Art sich an der verschiedenen Bildung der Epigyne wie der Palpalorgane des Mannes erkennen lasse. Die Gattung Amaurobius sollte mir damals nur die Objecte stellen, an welchen ich das Erforderliche demonstrieren wollte und es wurden nur nebenbei Beschreibungen der einzelnen Arten angefügt. Manche der durch sorgfältigeres Studium, wie namentlich durch Westrings vortreffliches Werk (*Araneae Suecicae*), erst in der Neuzeit in ihrem Werthe anerkannten Merkmale konnten damals nicht berücksichtigt werden, manche neue Arten wurden erst in der Folge aufgefunden — die Absonderung der Gattung Caelotes durch Blackwall's interessante Entdeckung des Calamistrum und eines eigenthümlichen mit dem Spinnapparate verbundenen Organes *), — alles dies drängte mich zu einer erneuten, sorgfältigen Untersuchung dieser Thiere, deren Ergebniss ich hiemit veröffentliche.

Die Gattung Amaurobius war sonst, und auch noch von Westring den Drassiden beigezählt worden; — Blackwall stellt das Genus Caelotes zu den Ageleniden und theilt die Gattung Amaurobius, welche bei ihm den Namen Ciniflo führt, einer neuen Familie, den Cinifloniden zu. Ueber letztere habe ich meine Ansicht bereits an anderer Stelle (L. Koch „Die Drassiden“ p. 1)

*) Diesem bis jetzt namenlosen Organe habe ich vorläufig wegen seiner Aehnlichkeit mit einem Siebe den Namen Cribellum beigelegt.

ausgesprochen und muss hier nur wiederholen, dass dieselbe, weil Thiere, welche im allgemeinen Habitus und in ihrer Lebensweise weit von einander verschieden sind, in ihr vereinigt werden müssten, kaum für die Folge, wenigstens in ihrem jetzigen Umfange, bestehen bleiben kann.

Während das Genus *Caelotes* ohne allen Zweifel zu den Ageleniden gehört, ist es nach meiner Ansicht immer bedenklich, innerhalb der Grenzen, welche für letztere Familie bestimmt sind, auch der Gattung *Amaurobius* einen Platz anzuweisen. Das Vorhandensein einer Afterklaue an den Tarsen trennt sie von den Drassiden, die Bildung des obersten Spinnwarzenpaares, wie ihre Ausstattung mit einem Calamistrum und dem Cribellum gestatten nicht, sie mit den Ageleniden zu vereinigen und desswegen hatte Blackwall entschieden Recht, seine neue Familie der Cinifloniden aufzustellen.

Zwei Thiere, obwohl in ihrem allgemeinen Habitus wie in ihrer Lebensweise mit *Caelotes*, wie mit *Amaurobius* in nächster Verwandtschaft, lassen sich wegen der eingliedorigen obersten Spinnwarzen nicht zu der ersteren, wegen des Mangels eines Calamistrum und des Cribellum nicht zu *Amaurobius* rechnen — und so mag denn die Bildung eines neuen Genus, welches ich *Cybaeus* benenne, gerechtfertigt erscheinen. Welcher der jetzt anerkannten Familien dieses Genus angehören mag, darüber mich jetzt schon bestimmt auszusprechen, bin ich nicht im Stande.

***Amaurobius* C. Koch.**

Der Cephalothorax am Kopftheile oben wie seitlich gewölbt, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert, mit einfachen Haaren und Borsten besetzt; beim Männchen so lang oder kürzer als Patella und Tibia eines Beines des vierten Paares, nicht so breit als Tibia IV lang; beim Weibchen länger als Patella und Tibia eines Beines des vierten Paares, so breit oder breiter als Tibia IV lang. Die Mittelritze immer vorhanden, meist lang und tief eingeschnitten. Der Kopftheil seitlich durch eine Furche abgesetzt.

An der vorderen Wölbung des Kopftheiles die Augen in zwei Reihen, die vordere dem Kopfrande genähert, gerade, die Augen entweder gleichweit von einander entfernt oder die Mittelaugen einander mehr als den seitlichen genähert, rund; letztere oval, mit den hinteren Seitenaugen an einer gemeinschaftlichen Erhöhung und von ihnen etwas entfernt. — Die hintere Reihe breiter, durch Tieferstehen der Seitenaugen gebogen; die Mittelaugen einander mehr als den seitlichen genähert.

Die Mandibeln kräftig, lang behaart, so dick, meist aber dicker als die Vorderschenkel, beim Weibchen stärker gewölbt als beim Männchen.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, über der Basis eingeschnürt, am Seitenrande leicht gerundet, nach vorn verschmälert, vorn gerade oder leicht rund ausgeschnitten.

Das Abdomen immer mit einfachen Haaren und Borsten besetzt.

Die Spinnwarzen kurz, das zweite Glied des obersten Paares sehr kurz, das unterste Paar dicker und etwas länger; vor letzteren an der Bauchseite das Cribellum.

Die Beine des Weibchens stämmig, beim Männchen graciler, das erste Paar so lang, meist aber länger als das vierte. Keine Scopula. Die Schenkel oben mehr oder weniger gewölbt. An den Tarsen eine Afterklaue, — die Metatarsen des vierten Paares mit einem Calamistrum.

Uebersicht der Arten:

Feminae:

1	{	Die Platte der Epigyne zweitheilig, beide Theile	
		cylindrisch, gewölbt	claustrarius
		Die Platte der Epigyne besteht aus einem Stücke	2
2	{	Die Seitenaugen der vorderen Reihe grösser	
		als die Mittelaugen	3
		Die Seitenaugen der vorderen Reihe kleiner oder	
		nicht auffallend grösser als die Mittelaugen	6

- 3 { Die Platte der Epigyne weder nach vorn noch
 nach hinten verschmälert 4
 3 { Die Platte der Epigyne halbkreisförmig, nach
 hinten verschmälert Erberi
 4 { Der Ausschnitt für die Platte der Epigyne vorn
 bogig, die Bogen hinten in zwei spitze Zi-
 pfel endend, zwischen diesen die länglich
 viereckige Platte obustur
 4 { Der Ausschnitt vorn gerade oder fast gerade,
 hinten nicht in Zipfel verlängert 5
 5 { Die Platte der Epigyne ein einfacher schmaler
 Querswulst pallidus
 5 { Die Platte der Epigyne wenigstens $\frac{1}{3}$ so breit
 als lang, hinten leicht gerundet jugorum
 6 { Die Platte der Epigyne vorn breiter als hinten 7
 6 { Die Platte der Epigyne hinten breiter als vorn similis
 7 { Das Abdomen von dunkler Grundfarbe mit drei
 hellen Längsstreifen an der Basis ferox
 7 { Das Abdomen von heller Grundfarbe mit einem
 grossen schwarzen Flecken atrox.

mares:

- 1 { Die Seitenaugen der vorderen Reihe grösser
 als die Mittelaugen 2
 1 { Die Seitenaugen der vorderen Reihe kleiner
 oder nicht auffallend grösser als die Mit-
 telaugen 4
 2 { Der Tibialtheil der Palpen mit vier Fortsätzen Erberi
 2 { Der Tibialtheil der Palpen mit drei Fortsätzen 3
 3 { Der mittlere Fortsatz der Palpen kürzer als
 der äussere claustrarius
 3 { Der mittlere Fortsatz der Palpen so lang als
 der äussere obustus

4	{	Der äussere Fortsatz des Tibialtheiles der Palpen am vorderen Ende unten mit einer Ecke	ferox
		Der äussere Fortsatz des Tibialtheiles der Palpen ohne Ecke am Ende	5
5	{	Der mittlere Fortsatz am Tibialtheil der Palpen gespalten	similis
		Der mittlere Fortsatz am Tibialtheil der Palpen ganz	atrox.

Amaurobius atrox De Géer.

Aranea atrox De Géer Mem. p. servir à l'hist. des Ins. T. VII.
p. 253. n. 15. Pl. 14. f. 24.
Lister. Hist. anim. Angl. De Aran. Tit. 21. p. 68. t. I. f. 21.
Aranea atrox Walck. Faun. Par. II. p. 218.
Clubiona atrox Latr. Gen. Crust et Ins. I. p. 93.
" " Sundev. Vet. Acad. Handl. 1831. p. 144.
" " Hahn „Die Arachn.“ Bd. I. p. 115. Tab. 30. f. 87.
" " Walcken. Hist. nat. des Ins. Apt. T. I. p. 605.
Amaurobius atrox C. Koch „Die Arachn.“ Bd. X. p. 116.
T. 355. f. 831.
Ciniflo atrox Blackw. Linn. Trans. vol. XVIII. p. 607.
" " " Ann. and Mag. of Nat. Hist. second ser.
vol. VIII. p. 98.
Amaurobius atrox L. Koch. Correspond. Bl. des zool.-min. Ver.
zu Regensburg. Jahrg. 1855. p. 166.
" " Westr. Aran. suec. p. 376.
Ciniflo atrox Blackw. Spid. of Great Brit. and Irel. P. I. p. 140.
Pl. IX. f. 88.

Länge des Cephalothorax: mas: 0m 0035 femina 0m 004.			
Länge eines Beines des I. Paares: " 0m 014 " 0m 011.			
"	"	"	II. " 0m 012 " 0m 0105.
"	"	"	III. " 0m 01 " 0m 0085.
"	"	"	IV. " 0m 012 " 0m 0105.

Mas.

Der Cephalothorax bräunlichgelb, am Kopftheile vorn verdunkelt, so lang als Patella und Tibia IV, so breit als Tib. IV lang, in den Seiten leicht gerundet, vorn wenig verschmälert, vom Hinterrande schräg ansteigend, hochgewölbt, in die Seiten steil abfallend, am Kopftheil oben leicht gewölbt und hier nicht höher, als der höchste Punkt des Brusttheils, gegen die Augen zu in sanfter Wölbung abfallend, glänzend, licht mit angedrückten, vorwärts gerichteten Haaren, am Kopftheile oben mit langen, abstehenden Borsten besetzt. Die Mittelritze in einer tiefen, breiten Grube, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchenstriche, der Kopftheil seitlich durch eine Furche abgegrenzt. Die Fläche glatt, glänzend, die hintere Abdachung kahl.

Die vordere Augenreihe gerade, im Durchmesser eines ihrer Mittelaugen vom Kopfrande entfernt, gerade, die Mittelaugen dicht beisammen, rund; die seitlichen oval, kleiner, in ihrem Halbmesser von der mittleren entfernt; die hintere Reihe über die vordere gebogen, breiter, die Augen gleichgross, die Mittelaugen einander mehr als den seitlichen genähert, letztere mit den vorderen an einem gemeinschaftlichen gebogenen Wulste.

Die Mandibeln röthlichbraun, so lang als die vordersten Tarsen, an der Basis so dick als die Vorderschenkel, hier etwas, jedoch nur wenig unter dem Kopfrande hervorgewölbt, dann senkrecht abfallend, im letzten Dritttheil innen etwas divergirend, glänzend, reichlich mit langen, herabhängenden Haaren besetzt, der Quere nach fein gerunzelt; die Klaue kurz, am vorderen und hinteren Falzrande drei Zähnen.

Die Maxillen bräunlichgelb, gerade vorgestreckt, gewölbt, ohne Eindruck, vorn gerundet.

Die Lippe bräunlichgelb, über der Basis eingeschnürt, dann wieder breiter und nach vorn zu allmählich verschmälert; der Vorderrand rund ausgeschnitten.

Das Sternum länglich herzförmig, glänzend, leicht gewölbt, ohne Impressionen am Seitenrande, reichlich mit langen, abstehenden Haaren besetzt; bräunlichgelb.

Das Abdomen oben an der Basalhälfte mehr oder weniger rein schwefelgelb, mit einem zwei oder dreimal eingeschnürten schwarzen Längsfleck, welcher an der Basis viel schmaler als am Ende ist, die hintere Hälfte röthlich mit schwarzen, von den Seiten heraufziehenden, schrägen, in der Mittellinie sich winkelig vereinigenden Linien. Die Seiten röthlichgelb, schwarz gesprenkelt, die Bauchseite blassgelb mit drei mehr oder weniger deutlichen Längstrichen. Seiner Form nach ist das Abdomen vorn gerundet, — hier die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, in der Mitte am breitesten, doch nicht breiter als der Cephalothorax, nicht sehr hoch, hinten ebenfalls gerundet; glanzlos, mit kurzen anliegenden, reinweissen und längern abstehenden schwarzen Haaren besetzt. Die Spinnwarzen kurz, bräunlichgelb, grauweiss behaart.

Die Beine hellbräunlichgelb, in der Mitte der Schenkel und der Tibien ein oft sehr undeutlicher schwarzer Ring; die Schenkel oben mit anliegenden, unten mit langen abstehenden Haaren. Die übrigen Glieder ringsum reichlich mit langen abstehenden Haaren besetzt. Keine Scopula, die Tarsen aber unten sehr dicht kurz behaart.

Das Femoralglied der Taster bräunlichgelb, wenig gebogen, fast gleichdick, in der vordern Hälfte 1. 1. 1. Stacheln, die Patella wie das Femoralglied gefärbt, halb so lang als die vordersten Patellen der Beine, am Anfang und Ende oben eine längere Borste, die Tibia röthlichbraun, fast breiter als lang, mit drei Fortsätzen, einem äussern geraden, vorn abgestutzten, einem mittleren, oben sehr kurzen, zahnartigen, ebenfalls stumpfen und einem inneren gebognen, der Länge nach ausgehöhlten, — dieser ist der längste von allen.

Die Tasterdecke an der Basis verschmälert, mit einer starken Impression, dann nach Aussen in einen gerundeten Winkel vorspringend und von diesem zur Spitze gerade, — an der Innenseite aber gebogen verlaufend, hochgewölbt, dicht behaart, so lang als die Patella und das Tibialglied zusammen.

Bestachelung: I. Femur oben 1 (Mitte) vorn 1 (Ende).

Patella hinten 1.

Tibia oben 1, vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1., vorn 1. 1., hinten 1. 1.

Patella hinten 1.

Tibia wie bei I.

III. Femur oben 1. 1., vorn 1. 1., hinten 1. 1.

Patella hinten 1., vorn 1.

Tibia wie bei I.

IV. Femur oben 1. (Mitte) vorn 1. (Ende) hinten 1. (Ende).

Patella hinten 1. vorn 1.

Tibia oben ohne Stacheln, vorn 1. 1., hinten 1. 1., unten 1. 1. 2.

Femina.

Der Cephalothorax braungelb, am Kopftheile vorn in's Schwarzbraune verdunkelt, vom Hinterrande schräg ansteigend, in die Seiten steil abfallend, am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, länger als Patella und Tibia IV zusammen, breiter als Tibia IV lang, in den Seiten leicht gerundet, vorn wenig verschmälert, gegen die Augen in sanfter Wölbung abfallend, die Mittelritze und Impression, sowie die Behaarung wie beim Manne; auch die Augenstellung wie beim Manne, mit der einzigen Ausnahme, dass die Seitenaugen der vorderen Reihe in mehr als ihrem Durchmesser von der Mittleren entfernt sind.

Die Mandibeln schwarzbraun, so lang als Metatarsus II, d. h. viel länger als Tarsus I, unter dem Kopfrande stark knieartig vortretend, dann senkrecht abfallend, an der Basis dicker als die Vorderschenkel, etwas divergirend, sonst wie beim Manne. Die Maxillen und Lippe rothbraun, vorn weisslichgelb, sonst wie auch das Sternum wie beim Manne.

Das Abdomen weniger lebhaft gefärbt, oben bräunlichgelb, mit demselben Längsfleck wie beim Manne, dieser weisslich umsäumt. Die Winkellinien meist ganz fehlend, bei einzelnen Exemplaren, aber gewöhnlich sehr undeutlich vorhanden.

Die Beine mit Ausnahme der Schenkel mehr röthlichbraun, die schwarzen Ringflecken wie beim Männchen, aber meist deutlicher, meist an der Basis und am Ende an der Unterseite ein schwarzer Flecken.

Das Femoralglied der Taster hellbräunlichgelb, die übrigen Glieder röthlichbraun.

Vorkommen: *Am. atrox* scheint durch alle Länder Europas mit gemässigtem Klima verbreitet zu sein; — dagegen den wärmeren, südlichen zu fehlen; bekannt ist, dass er in Schweden, England, Frankreich, in ganz Deutschland und Siebenbürgen vorkommt. In den Alpen findet man ihn bis zu einer Höhe von 4800' (Ausserer). Er hält sich unter Steinen und losen Rinden alter Bäume auf. Entwickelte Thiere beider Geschlechter findet man vom Spätherbste an bis in den Mai des folgenden Jahres. Nach Westring wurde er in Schweden auch in Häusern beobachtet.

Amaurobius ferox. Walek.

Clubiona ferox Walek. Aran. de France. p. 150. f. 12.

„ „ „ Hist. nat. des Ins. Apt. T. I. p. 606. 17.

Amaurobius ferox C. Koch „Die Arachn“ Bd. VI. p. 41. T. 191.
f. 460. 461.

„ „ L. Koch Corr. Bl. des zool.-min. Ver. zu Regens-
burg. 1855. p. 165.

„ „ Westing. Aran. suec. p. 374.

Ciniflo ferox Blackw. Spid. of Great. Brit. and. Irel. T. I. p. 142.
Pl. IX. f. 90.

Länge des Cephalathorax: mas: 0m 006 femina 0m 006.			
Länge eines Beines des I. Paares: „ 0m 021 „ 0m 016.			
„	„	„ II. „	0m 017 „ 0m 0135.
„	„	„ III. „	0m 0145 „ 0m 0125.
„	„	„ IV. „	0m 017 „ 0m 015.

Mas:

Der Cephalathorax braungelb, so lang als Patella und Tibia IV, nicht so breit als Tibia IV lang, vom Hinterrande

schräg ansteigend, an der Seitenabdachung leicht, am Kopftheile oben und seitlich stärker gewölbt, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert, etwas glänzend, am Brusttheile spärlich, am Kopftheile reicher mit langen, vorwärts gerichteten, einfachen Haaren bewachsen. Die Mittelritze lang, tief und breit; gleich am Hinterwinkel des Kopftheils beginnend, zwei abgekürzte Furchen an der Seitenabdachung, — der Kopftheil seitlich durch eine Furche abgegrenzt.

Die vordere Reihe weiter als im Durchmesser eines Auges vom Kopfrande entfernt, gerade, die Mittelaugen rund, nur durch einen schmalen Zwischenraum von einander getrennt, von den seitlichen in ihren Durchmesser entfernt; die seitlichen oval, ungefähr so gross als die mittleren, von den hinteren Seitenaugen so weit als von den vordern Mittelaugen entfernt, mit ihnen an einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste. Die hintere Reihe breiter, durch das Tieferstehen der Seitenaugen stark gebogen, die Mittelaugen näher beisammen als an den Seitenaugen.

Die Mandibeln röthlichbraun, so lang als die vordersten Tarsen (etwas länger als die vordersten Patellen), an der Basis so dick als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieartig stark hervortretend, dann senkrecht abfallend, mattglänzend, der Quere nach fein gerunzelt, licht mit langen, herabhängenden Haaren bekleidet. Am vorderen Klauenfalzrande vier, am hinteren drei Zähne.

Maxillen und Lippe bräunlichgelb, erstere gerade vorgestreckt, gewölbt, ohne Eindruck, aussen mit langen Borsten besetzt. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, über der Basis eingezogen, in der Mitte seitlich leicht gerundet, dann nach vorn sich verschmälernd, vorn gerade abgeschnitten.

Das Sternum bräunlichgelb, länglich herzförmig, fast flach, glänzend, mit leichten Impressionen am Seitenrande, mit langen, schwarzen Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen oben schwärzlichgrau, an der Basis ein gelblicher Längsstreif, von zwei gleichfarbigen Bogenstreifen eingeschlossen, hinter diesem eine Längsreihe von 4—5 gelblichen Winkelflecken. Die Seitenabdachung und die untere Seite

schwärzlichgrau, letztere unten mit zwei gelblichen Längslinien. Das Abdomen ist vorn und hinten gerundet, in der Mitte am breitesten, oben stark gewölbt, fast glanzlos, licht mit kurzen, einfachen, angedrückten Haaren bekleidet.

Die Spinnwarzen bräunlichgelb.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt, oben im letzten Drittheil 1. 1. 1. Stacheln. Der Patellartheil nicht länger als dick, das Tibialglied aussen, innen und unten mit sehr langen, abstehenden Haaren besetzt, drei Fortsätze abgebend, der äussere etwas abwärts gerichtet, am Ende unten mit einer kurzen Ecke, der innere dick, unten blasig aufgetrieben, im rechten Winkel vom äussern abgehend, mit umgebogener Spitze; an der Unterseite ein sehr kurzer, leicht aufwärts gekrümmter Fortsatz. Die Tasterdecke stark gewölbt, lang behaart, der Form nach fast dreieckig, der Innenrand gerade, aussen in der Mitte eine stark vorspringende Ecke, die Spitze abgerundet.

Die Beine röthlichgelb, die Schenkel unten, die Tibien und Metatarsen rings mit langen abstehenden Haaren besetzt. Keine Scopula.

Bestachelung: I. Femur vorn 1. oben 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur vorn 1. 1. oben 1. 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. vorn 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Femina.

Der Cephalathorax wie beim Manne gefärbt, vorn sehr ins Schwarzbraune verdunkelt, etwas länger als Patella und

Tibia IV und so breit als Tibia IV lang; sonst wie beim Manne.— Die Mittelaugen der vordern Reihe weit mehr als in ihrem Durchmesser von den seitlichen entfernt. Die Mandibeln länger als die vordersten Tarsen und als die Patellen, an der Basis viel dicker als die Vorderschenkel, schwarzbraun, vorn viel stärker gewölbt als beim Männchen. Am vorderen Falzrande fünf, am hinteren drei Zähne. Maxillen, Lippe und Sternum wie beim Manne, ebenso auch das Abdomen. Die Palpen bräunlich-gelb mit rothbraunem Tarsaltheil. Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, oben im letzten Drittheil mit 1. 1. 1 Stacheln, der Tibialtheil um $\frac{1}{3}$ länger als das Patellarglied, das Tarsalglied etwas gebogen, dicht lang behaart.

Die Beine bei gleicher Körpergrösse viel kürzer als beim Männchen. Die Behaarung wie bei diesem, keine Stacheln an den Patellen der beiden Vorderpaare. Keine Scopula.

Vorkommen: eine der am weitesten verbreiteten Arten, welche sich sowohl im Norden als im Süden von Europa findet (Schweden, England, Frankreich, durch ganz Deutschland). Ich besitze Exemplare aus der Umgegend von Rom. In Tirol wurde sie bisher noch nicht gefunden; kommt aber in Krain vor. Sie ist auch in Nordamerika (Baltimore) zu Hause.

In unseren Gegenden findet sie sich ausschliesslich an dunklen Orten (in Kellern und Gewölben) bewohnter Gebäude. Nach Blackwall wurde sie in England auch unter Steinen und Felstrümmern gefunden.

Entwickelte Männchen beobachtete ich vom Spätherbste an bis in den Mai, — reife Weibchen in den ersten Frühlingsmonaten bis in den Juni.

Amaurobius similis Bl.

Ciniflo ferox Blackw. Linn. Trans. vol. XIX. p. 116.

„ „ „ Ann. and. Mag. of Nat. Hist. second series
vol. VIII. p. 99.

Ciniflo similis Blackw. Spid. of Great Brit. and Irel. P. I.
p. 141. Pl. IX. f. 89.

Länge des Cephalathorax:		mas:	0m 004	femina	0m 005.
Länge eines Beines des I. Paares:		"	0m 0155	"	0m 0135.
" " " II.		"	0m 0125	"	0m 013.
" " " III.		"	0m 0105	"	0m 0105.
" " " IV.		"	0m 0125	"	0m 013.

Mas. Der Cephalathorax hellbräunlichgelb, am Kopftheile vorn etwas verdunkelt, Mandibeln gelbbraun, Maxillen, Lippe und Sternum hellbräunlichgelb; die Zeichnung der Abdomen jener von *Am. utrox* ganz ähnlich. Dasselbe ist oben schwefelgelb, an der Basis ein in der Mitte durch eine grauweisse Linie der Länge nach getheilter und seitlich tief eingeschnürter schwarzer Fleck, hinter demselben schwärzliche, von der Seite heraufziehende schiefe Flecken, die Seiten der Länge nach schwarz gefleckt, der Bauch bräunlichgelb mit zwei undeutlichen, schwärzlichen Längslinien. Die Beine hellbräunlichgelb, in der Mitte des Schenkel und Tibia ein undeutlicher schwärzlicher Ringfleck.

Fem. Das Weibchen ebenso gefärbt und gezeichnet wie das Männchen, nur ist der Kopftheil vorn stärker verdunkelt, die Mandibeln dunkelrothbraun, Maxillen und Lippe gelblichbraun; die Flecken an den Beinen sind ganz undeutlich, die Metatarsen und Tarsen derselben stärker gebräunt.

Mas.

Der Cephalathorax so lang als Pat. und Tibia IV, nicht so breit als Tibia IV lang, vom Hinterrande steil ansteigend und ebenso in den Seiten abfallend, am Kopftheile oben und seitlich leicht gewölbt, in den Seiten gerundet, über den ersten Hüften abgesetzt mässig verschmälert, an der hintern Abdachung kahl und sehr glänzend, sonst licht mit gelblichweissen, langen, am Kopftheile abstehenden Haaren bedeckt; auch die übrige Fläche glänzend; die Mittelritze tief eingeschnitten, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchenstriche; der Kopftheil seitlich deutlich durch eine Furche abgegrenzt.

Die vordere Augenreihe in Augenbreite vom Kopfrande entfernt, gerade, die Mittelaugen rund, dicht beisammen, nicht

ganz in ihrem Durchmesser von den Seitenaugen entfernt, diese oval, etwas kleiner, mit den hinteren an einem gemeinschaftlichen gebogenen Wulste. Die hintere Reihe breiter, durch Tieferstehen der Seitenaugen stark gebogen, die Mittelaugen in etwas mehr als ihrem Durchmesser von einander, von der seitlichen weiter, aber ebenso weit als von den vordern Mittelaugen entfernt.

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen an der Basis dicker als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande stark gewölbt hervortretend, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, mit langen, herabhängenden Haaren reichlich besetzt.

Die Maxillen gerade vorgestreckt, gewölbt, ohne Eindruck. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, nach vorn verschmälert, am Vorderrande gerade.

Das Sternum dem Umrisse nach spitzeiförmig, glänzend, flach, reichlich mit langen, abstehenden Haaren besetzt, ohne Impressionen am Seitenrande.

Das Abdomen vorn gerundet, die hintere Abdachung des Cepthor. deckend, in der Mitte am breitesten; so breit wie der Cephalathorax, hinten etwas spitz zulaufend, glanzlos, mit kurzen, dicken, weissen Härchen besetzt.

Das Femoralglied der Taster fast gerade und gleichdick, an der vorderen Hälfte oben mit drei Stacheln, der Patellartheil halb so lang als die vordersten Patellen, oben gewölbt, kurz behaart, an der Basis oben mit einer langen Borste, der Körper des Tibialgliedes kaum so lang als der Patellartheil, aussen und innen lang behaart, vorn drei Fortsätze abgebend, der äussere gerade, vorn rundlich stumpf, etwas kürzer als der Körper des Gliedes, hellbräunlichgelb, der mittlere und äussere zusammenhängend, glänzend schwarzbraun, der erstere sehr kurz, breit, bis zur Basis gespalten, der innerste ist der längste, aus breiter Basis in eine feine Spitze endend, stark nach aussen gebogen. Die Tasterdecke gewölbt, dicht mit langen Haaren besetzt, an

der Basis aussen rund ausgeschnitten; längs des Ausschnittes kahl und sehr glänzend.

Die Beine gracil, ziemlich lang, Schenkel I und II oben leicht gewölbt, die Tibien und Metatarsen beider Vorderpaare, sowie alle Schenkel unten lang behaart, alle Tarsen, die Tibien und Metatarsen III und IV, so wie die Schenkel oben aber kürzer behaart. Keine Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1.

Patella ohne Stacheln.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. vorn 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia oben 1. hinten 1. 1. vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia oben 1. hinten 1. 1. vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 1. 1. 2.

Femina.

Der Cephalathorax länger als Pat. und Tibia IV, breiter als Tibia IV lang. Die Mittelaugen der vorderen Reihe in ihrem Halbmesser von einander entfernt (merklich weiter als beim Männchen), von den Seitenaugen in ihrem Durchmesser. Die Mittelaugen der hinteren Reihe in ihrem doppelten Durchmesser von einander, von den Seitenaugen weiter als von den vorderen Mittelaugen entfernt. Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, an der Basis fast nochmal so dick als die Vorder-schenkel. Das Abdomen vorn abgestutzt, hinter der Mitte am breitesten.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt, im letzten Dritttheil oben 1. 1. 2 Stacheln, der Tibialtheil merklich länger als das Patellarglied, der Tarsaltheil länger als das Tibialglied, sehr dicht behaart.

Die Beine dicker als beim Männchen.

Die Epigyne der Quere nach stark gewölbt, sehr glänzend, eine dreieckige Platte vorstellend, deren vorderes Eck abgeschnitten, deren hintere Seite die längste ist; sie ist rings von einer Furche umgeben.

Vorkommen: diese Art wurde bisher nur in England und im südlichen Frankreich beobachtet. Entwickelte Exemplare kommen in England vom Herbste bis in den Frühling den ganzen Winter hindurch vor. Durch gefällige Mittheilung des Rev. O. P. Cambridge erhielt ich im März und Oktober dieses Jahres männliche und weibliche lebende Thiere dieser in England sehr gemeinen Hausspinne.

Amaurobius claustrarius Hahn.

Clubiona claustraria Hahn die Arachn. Bd. I. p. 114. T. 30.
f. 86.

Amaurobius claustrarius C. Koch die Arachn. Bd. X. p. 114.
T. 355. f. 830.

" " L. Koch Corr. Blatt des zool. min.
Vereines zu Regensburg. 1855. p. 167.

Länge des Cephalothorax: mas: 0m 004 femina 0m 0045.			
Länge eines Beines des I. Paares:	"	0m 0135	" 0m 0105.
" " " II.	"	0m 012	" 0m 0095.
" " " III.	"	0m 01	" 0m 0085.
" " " IV.	"	0m 0135	" 0m 01.

M a s.

Der Cephalothorax bräunlichgelb, am Vorderrande dunkler, kürzer als Patella und Tibia IV, nicht so breit als Tibia IV lang, sehr hoch, vom Hinterrande steil ansteigend, in den Seiten leicht gerundet, vorn mässig verschmälert, nach den Seiten sehr steil abfallend, am Kopftheile oben und in den Seiten leicht gewölbt, glänzend, licht im anliegenden Härchen bedeckt, dazwischen einzelne aufrechte Haare eingestreut. Die Mittelritze eine lange, tiefe Grube bildend, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchen, die den Kopftheil abgrenzende Furche sehr undeutlich.

Die vordere Augenreihe im Durchmesser eines Auges vom Kopfrande entfernt, gerade, die Mittelaugen fast aneinanderstossend, rund, in ihrem Durchmesser von den seitlichen entfernt, diese oval, etwas grösser, mit den hinteren an einem gebogenen Wulste; die hintere Reihe breiter, über die vordere leicht gebogen, die Mittelaugen etwas weiter von den seitlichen, als von einander entfernt.

Die Mandibeln bräunlichgelb, doch dunkler als der Cephalothorax, so lange als die vordersten Patellen, dicker als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieeartig hervortretend, dann senkrecht abfallend, etwas divergirend, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, mit langen, herabhängenden Haaren reichlich besetzt.

Die Maxillen vorgestreckt, aussen lang behaart, gewölbt, ohne Eindruck.

Das Sternum bräunlichgelb, mit schmalem, schwarzem Randsaume, länglich herzförmig, etwas gewölbt, sehr glänzend, mit langen, abstehenden, schwarzen Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen dunkelgraubraun, oben mit einem gelblichen, seitwärts ausgezackten Rückenfelde, in diesem an der vorderen Hälfte ein graubrauner Längsstrich, hinter diesem 4. 5 Winkel-flecken von derselben Farbe; an der Unterseite vier gelbliche Längslinien, die beiden äusseren gebogen, die beiden inneren kürzer und gerade. Das Abdomen ist vorn abgestutzt, nicht breiter als der Cephalothorax, oben flach, in der Mitte am breitesten, hinten spitz zulaufend, glanzlos, licht behaart.

Das Femoral- und Patellarglied der Taster bräunlichgelb, der Tibialtheil röthlichbraun, die Tasterdecke bräunlichgelb. Das Femoralglied wenig gebogen, fast gleich dick, an der vorderen Hälfte oben 1. 1. 1. Stacheln; die Patella halb so lang als die vordersten Patellen der Beine. Der Körper des Tibialtheiles glockig, mit drei Fortsätzen, der äusserste gebogen (nach innen), der mittlere gerade, so lang als der äussere, der innere viel länger als die beiden anderen, nach aussen gebogen, in eine feine Spitze endend. Die Tasterdecke gewölbt, lang behaart,

an der Basis aussen rund ausgeschnitten und in eine Ecke vorgezogen, dann gerade bis zur Spitze, diese gerundet, der Innenrand etwas gerundet.

Die Beine glänzend, gracil, die Schenkel oben wenig gewölbt, die drei Vorderpaare mässig lang behaart, das hinterste mit Ausnahme der Schenkel aber kürzer. Keine Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. 1. hinten 1. 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. 1. hinten 1. 1.

Patella hinten 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Femina.

Der Cephalothorax gelbbraun, vorn ins Röthlichbraune, um die Augen schwarzbraun gefärbt, um Bedeutendes länger als Pat. und Tibia IV, breiter als Tibia IV lang, sonst wie beim Männchen geformt; die vordere Augenreihe etwas weiter vom Kopfrande entfernt, die Mittelaugen weiter von einander und weiter von den seitlichen entfernt, als beim Männchen, die hintere Reihe breiter und wie beim Männchen gebogen.

Die Mandibeln schwarzbraun, an der Basis stark knieartig vortretend, wenig divergirend, noch einmal so dick als die Vorderschenkel. Maxillen und Lippe schwarzbraun, das Sternum bräunlichgelb, sonst wie beim Manne.

Das Abdomen wie beim Männchen gezeichnet.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, im letzten Dritttheil an der Innenseite 1. 1. Stacheln. Das Tibialglied länger als der Patellartheil.

Der Femoral- und Patellartheil bräunlichgelb, die beiden Endglieder rothbraun.

Die Beine kürzer und dicker als beim Männchen, die Schenkel oben an der Basis deutlich gewölbt.

Vorkommen: Bisher wurde diese Art nur in Deutschland und in Siebenbürgen gefunden. Ich besitze Exemplare aus Bayern und Tirol. In den Alpen kommt sie bis zu einer Höhe von 5000' vor. (Ausserer, die Arachniden Tirols in den Verhandl. der zool. bot. Gesellsch. in Wien. XVII. Bd. p. 151). Sie lebt unter Steinen in düsteren Waldungen. Reife Männchen findet man vom August an den ganzen Herbst hindurch; entwickelte Weibchen zur gleichen Zeit und noch in den ersten Frühlingsmonaten.

Amaurobius Erberii Keyserl.

Ciniflo Erberii, E. Keyserling in den Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1863. p. 373.

Länge des Cephalothorax:		mas:	0m 0035	femina	0m 004.
Länge eines Beines des I. Paares:		"	0m 0125	"	0m 0095.
"	"	"	II. "	"	0m 0075.
"	"	"	III. "	"	0m 007.
"	"	"	IV. "	"	0m 009.

Mas.

Der Cephalothorax bräunlichgelb, die Mandibeln dunkelrothbraun, Maxillen und Lippe von der Farbe des Thorax, beide vorn weisslich; das Sternum blassgelb. Das Abdomen oben grauschwarz, an der Basis mit zwei parallelen blassgelben Längsflecken, einen länglich viereckigen Flecken der Grundfarbe einschliessend, hinter diesen eine Längsreihe von blassgelben Winkelflecken, welche sich in den Seiten nach vorn in schrägen Linien fortsetzen. Die Bauchseite grauschwarz, unregelmässig blassgelb gefleckt, mit zwei parallelen blassgelben Längslinien. Die Beine bräunlichgelb, an den Schenkeln, Tibien und Metatarsen undeutliche, schwärzliche Ringflecken in der Mitte und am Ende. Die Taster bräunlichgelb, die Fortsätze der Tibialglieder und theilweise die Sexualorgane rothbraun,

Femina.

Der Cephalothorax bräunlichgelb, am Kopftheil etwas dunkler gefärbt. Die Mandibeln rothbraun; die Lippe und die Maxillen gelbbraun, vorn weisslich, das Sternum bräunlichgelb; das Abdomen wie beim Manno gefärbt und gezeichnet, nur ist der viereckige schwärzliche Fleck an der Basis in der Mitte durch einen gelblichen Strich getheilt. Die Schenkel bräunlichgelb, die übrigen Glieder dunkler gefärbt, ebenso gefleckt wie beim Männchen. Das Femoral- und Patellarglied der Taster bräunlichgelb, die übrigen röthlichbraun.

Mas.

Der Cephalothorax so lang als Pat. und Tib. des 4. Paares zusammen, nicht so breit als Tib. IV lang, hinten steil ansteigend und seitlich ebenso abfallend, an den Seiten gerundet, vorn-mässig verschmälert, der Kopftheil oben und seitlich gewölbt. Die ganze Fläche glänzend, glatt, licht mit anliegenden, feinen, einfachen Haaren bedeckt; die Mittelritze breit und tief einschneidend; an der Seitenabdachung des Brusttheils zwei abgekürzte Furchen; der Kopftheil seitlich durch eine undeutliche Furche abgesetzt.

Die vordere Augenreihe im Durchmesser eines Auges vom Kopfrande entfernt, gerade; die Mittelaugen rund, nicht in ihrem Durchmesser von einander, von den seitlichen aber in demselben entfernt, letztere grösser, oval, mit den hinteren auf einem gemeinschaftlichen Wulste, doch etwas von ihnen entfernt. Die hintere Reihe breiter, durch das Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, diese von den vorderen Mittelaugen und den Seitenaugen gleichweit, von einander mehr als in ihrem Durchmesser entfernt.

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, an der Basis so dick als die Vorderschenkel, vorn nur an der Basis etwas gewölbt, dann senkrecht abfallend, nicht divergirend, nur innen am untersten Ende kurz schräg abgeschnitten, etwas glänzend, der Quere nach fein gefurcht, reichlich mit langen, herabhängenden Haaren besetzt.

Das Sternum eierzförmig, gewölbt, sehr glatt und glänzend, licht mit langen, abstehenden Haaren besetzt, am Seitenrande schwache Impressionen.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck; die Lippe um $\frac{1}{4}$ kürzer als die Maxillen, an der Basis und gegen das Ende verschmälert, in der Mitte am breitesten, vorn abgestutzt.

Das Abdomen vorn abgestutzt, in der Mitte am breitesten, doch nicht breiter als der Cephalothorax, hinten gerundet, oben flach, glanzlos. (Behaarung meist abgerieben).

Die Beine gracil, die Schenkel oben leicht gewölbt. Keine Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 1. (Ende).

Patella ohne Stacheln.

Tibia oben 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia oben 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur vorn 1. hinten 1. (Spitze).

Patella vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 1. 1. 2.

Das Femoralglied der Taster leicht gebogen, gegen das Ende etwas verdickt, am letzten Dritttheil oben 1. 1. oder 1. 1. 1. Stacheln, unten lang behaart; die Patella kaum länger als dick, oben stark gewölbt, am Ende oben mit einer langen Borste; das Tibialglied unten sehr lang behaart, sein Körper kurz, in vier längere Fortsätze endend, der innere mit kurzer, gerader Spitze, der obere mit hochgewölbtem Basaltheile, welcher in eine feine, vorn winkelig nach aussen gebogene, lange Spitze endet, der obere äussere gerade, an der Spitze abgestumpft, kürzer als der obere; diese drei Fortsätze sind schwarzbraun, glatt und

glänzend, die Spitze des oberen röthlich durchscheinend. Der untere äussere Fortsatz kurz, vorn gerundet, gewölbt, behaart.

Die Tasterdecke stark gewölbt, lang behaart, die Baselseite aussen rund ausgeschnitten, wodurch sich eine vorstehende Ecke bildet.

Femina.

Das Weibchen unterscheidet sich durch folgende Merkmale:

Der Cephalothorax länger als Pat. und Tibia IV zusammen, breiter als Tib. IV lang, hinten weniger steil ansteigend, die Mittelritze feiner; die Mittelaugen der vorderen Reihe weiter von einander entfernt, der Clypeus höher als der Durchmesser eines Auges der vorderen Reihe; die Mandibeln etwas länger als die vordersten Patellen und an der Basis knieartig stark hervorgewölbt, auch mehr divergirend. Das Abdomen vorn gerundet, in der Mitte am breitesten, hinten etwas spitz zulaufend, gewölbt.

Die Area der Epigyne queroval, die Platte dreimal so breit als lang, vorn gerade, hinten gerundet, halbkreisförmig, vorn und seitlich von einem entsprechenden Ausschnitte der Area umgeben.

Die Beine dicker, die Metatarsen unten dicht behaart.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, oben gegen das Ende zu 1. 1. 1. Stacheln, der Tibialtheil länger als die Patella, der Tarsaltheil so lang als die beiden vorhergehenden zusammen, bestachelt und unten dicht behaart.

Auf den Inseln Lesina und Syra. Von Herrn Erber im März 1862 gesammelt. Auch in den Pyrenäen von Herrn E. Simon gefunden.

Amaurobius jugorum nov. spec.

Femina:

Länge des Cephalothorax: 0m 006.					
Länge eines Beines des I. Paares: 0m 015.					
"	"	"	"	II.	" 0m 0125.
"	"	"	"	III.	" 0m 011.
"	"	"	"	IV.	" 0m 014.

Der Cephalothorax röthlichbraun, am Kopftheile vorn verdunkelt, um ein Bedeutendes länger als Pat. und Tibia IV, breiter als Tibia IV lang, an der hintern Abdachung etwas ausgehöhlt, kahl, in die Seiten steil abfallend, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, licht mit anliegenden, langen Haaren bedeckt, dazwischen aufrechte Borsten. Die Fläche etwas glänzend, die Mittelritze eine breite tiefe Grube bildend, hinter ihr beiderseits eine rundliche Impression, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchenstriche, die den Kopftheil seitlich abgrenzende Furche sehr undeutlich.

Die vordere Augenreihe deutlich weiter als im Durchmesser eines Auges vom Kopfrande entfernt, gerade, die Mittelaugen rund, nicht ganz in ihrem Durchmesser von einander, von den seitlichen aber doppelt so weit entfernt; letztere grösser, mit den hinteren Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen gebogenen Wulste. Die hintere Reihe breiter, über die vordere gebogen; die Mittelaugen von den seitlichen fast noch einmal so weit als von einander entfernt.

Die Mandibeln schwarzbraun, so lang als die Tibia des zweiten Beinpaares, unter dem Kopfrande knieartig hervortretend, dann senkrecht abfallend, dicker als die Vorderschenkel, vorn und seitlich gewölbt, etwas glänzend, dicht mit langen Haaren besetzt.

Die Maxillen gerade vorgestreckt, aussen lang behaart, gewölbt, ohne Eindruck, vorn gerundet. Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, über der Basis eingeschnürt, nach vorn allmählich verschmälert.

Das Sternum gelblichbraun, länglich herzförmig, glänzend, wenig gewölbt, reichlich und lang behaart, mit schwachen Impressionen am Seitenrande.

Das Abdomen oben dunkelgraubraun, an der hintern Hälfte mit 5—6 Paar gelblichen Schiefleckchen, unten wie oben gefärbt, mit vier parallelen gelblichen Längsstreifen; der Form nach ist das Abdomen vorn gerundet, die hintere Abdachung des Cepha-

lothorax deckend, in der Mitte am breitesten, hinten etwas spitz zulaufend, mit angedrückten, kurzen Haaren licht bedeckt. Die Epigyne wie bei *Am. ferox* gebildet, aber hinten fast eben so breit wie an der Basis, während sie bei *A. ferox* hinten sehr verschmälert ist.

Das Femoral- und Patellarglied der Taster bräunlichgelb, die beiden Endglieder röthlichbraun, der Femoraltheil stark gebogen, an der vorderen Hälfte oben 1. 1. 1. Stacheln, der Tibialtheil etwas länger als das Patellarglied.

Die Beine braungelb, besonders an der Unterseite lang behaart, ohne eigentliche Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. vorn 1. (Ende.)

Patella ohne Stacheln.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2 hinten 1. 1.

II. Femur oben 1. vorn 1. (Ende.)

Patella vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella hinten 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. hinten 1. (Ende.)

Patella hinten 1. vorn 1.

Tibia hinten 1. 1. unten 1. 1. 2.

Vorkommen: Bisher nur in Tirol beobachtet, in dessen nördlichen wie südlichen Gegenden diese Art bereits gefunden wurde. Von der Ebene bis zu 4000'. (Ausserer, die Arachniden Tirols.)

***Amaurobius pallidus* nov. spec.**

Femina:

Länge des Cephalothorax: 0m 0045.

Länge eines Beines des I. Paares: 0m 0115.

" " " " II. " 0m 0095.

" " " " III. " 0m 009.

" " " " IV. " 0m 011.

Der Brusttheil des Cephalothorax hellbräunlichgelb, der Kopftheil röthlichbraun, vorn ins Schwarzbraune übergehend, die

Mandibeln schwarzbraun, Maxillen und Lippe röthlichbraun, vorn weisslich; das Sternum blassbräunlichgelb, das Abdomen gelblichgrau, an der Basis oben ein schwarzgesäumter, hinten spitzer Längsstreifen, hinter diesem eine Längsreihe von Winkelfleckchen, in den Seiten Bogenstreifen aus schwarzen Punktfleckchen gebildet, die Spinnwarzen gelblichgrau, die Epigyne röthlichbraun. Die Palpen hellbräunlichgelb mit rothbraunem Tarsalgliede. Die Beine bräunlichgelb, die Tibien, Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare röthlichbraun, die Tibien des III. und IV. Paares mit zwei undeutlichen schwarzen Ringflecken.

Der Cephalothorax länger als Patella und Tibia IV, in der Mitte breiter als Tibia IV lang, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, in den Seiten gerundet.

Die vordere Augenreihe dem Kopfrande sehr nahe, gerade, die Mittelaugen rund, klein, einander etwas näher als den seitlichen, letztere grösser, oval, mit den hintern Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen schrägen Wulste, letztere rund, kleiner als die vordere und von ihnen in ihrem Halbmesser entfernt. Die hintere Reihe breiter, durch Tieferstehen der Seitenaugen stark gebogen, die Augen gleichgross; die Mittelaugen einander deutlich näher als den Seitenaugen.

Die Mandibeln von der Basis an vorn herab gewölbt, länger als die vordersten Patellen, viel dicker als die Vorderschenkel, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, licht mit langen, hängenden Haaren besetzt.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, innen der Lippe entsprechend ausgehöhlt, vorn aussen gerundet; die Lippe über der Basis etwas eingeschnürt, am Seitenrande leicht gerundet, vorn gerade abgestutzt, in der Mitte der Länge nach gewölbt, mehr als halb so lang als die Maxillen.

Das Sternum oval, hinten spitz, glänzend, flach, ohne seitliche Impressionen, licht mit abstehenden Haaren besetzt.

Das Abdomen gewölbt, vorn und seitlich gerundet, hinten etwas spitz zulaufend, um $\frac{1}{3}$ länger als breit, glanzlos, licht mit kurzen, einfachen Haaren bedeckt.

Das unterste Paar der Spinuwarzen dicker und etwas länger als das oberste.

Der Tibial- und besonders der Tarsaltheil der Palpen dicht behaart.

Die Beine stämmig, glänzend.

Die Tarsen und die Tibien der drei Vorderpaare unten der ganzen Länge nach, die Tibien des IV. Paares nur an der Spitze gleichmässig dicht behaart.

Bestachelung: Femur I oben 1. vorn 1.

" " II vorn 1. oben 1. 1.

" " III oben 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

" " IV oben 1. 1. hinten 1.

Die Form der Epigyne hat grosse Aehnlichkeit mit jener von Am. Erberi Keys. Die Area zeigt in einem Querausschnitt des Hinterrandes die in Form eines Querwulstes sich darstellende Platte. Dieser Wulst ist gleichdick, während die Platte bei A. Erberi halbkreisförmig ist.

Bei Mehadia, von Herrn Dr. Palliardi gesammelt.

Amaurobius obustus nov. spec.

Länge der Cephalothorax: mas: 0m 003. femina: 0m 003.

Länge eines Beines des I. Paares:	"	0m 01.	"	0m 0065.
" " " II.	"	0m 008.	"	0m 006.
" " " III.	"	0m 007.	"	0m 0055.
" " " IV.	"	0m 008.	"	0m 0065.

Mas.

Der Cephalóthorax bräunlichgelb, die Mandibeln mehr röthlichbraun, in den Seiten und gegen die Spitze leicht schwarz angelaufen; Maxillen, Lippe und Sternum unrein braungelb; die Grundfarbe des Abdomen hellgraugelb, die Seiten schwarz gestrichelt, oben an der Basis ein länglich viereckiger, schwarzer Flecken, an welchen sich hinten ein bis zu den Spinnwarzen reichender, seitlich verzweigter, grünlichbrauner Streifen ansetzt. Die Bauchseite mehr schwärzlich als gelb gefärbt. Die Beine bräunlichgelb, an der Untenseite der Schenkel in der Mitte und

und am Ende, ebenso an die Tibien der beiden Hinterpaare je ein undeutlicher schwärzlicher Flecken, an den Tibien der beiden Vorderpaare drei solche Flecken. Das Femoral- und Patellarglied der Taster hellbräunlichgelb, ebenso die Tasterdecke, letztere schwarz behaart; der Körper des Tibialgliedes röthlichbraun, ebenso der äussere Fortsatz, die beiden andern dunkelrothbraun.

Femina.

Der Brusttheil des Cephalothorax hellbräunlichgelb, hinten und in den Seiten grünlich angelaufen, der Kopftheil ebenfalls hellbräunlichgelb, seitlich und vorn ins Schwarzbraune übergehend; die Mandibeln dunkelrothbraun; Maxillen und Lippe bräunlichgelb, vorn gelblich weiss; das Sternum bräunlichgelb, stark schwärzlich angelaufen; das Abdomen olivengrün, mit derselben Zeichnung wie das Männchen. Die Beine bräunlichgelb, ebenso, aber noch undentlicher gefleckt als beim Männchen. Das Femoral- und Patellarglied der Taster blassbräunlichgelb, die beiden anderen Glieder mehr röthlichbraun.

Mas.

Der Cephalothorax so lang als Pat. und Tibia IV zusammen, so breit als Tibia IV lang, vom Hinterrande steil ansteigend und ebenso nach den Seiten abfallend, am Kopftheile oben und seitlich gerundet, vorn mässig verschmälert, mit schwachgerundeten Seiten. Der Kopftheil seitlich durch eine Furche deutlich abgesetzt; die Mittelritze breit; an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchenstriche. Die ganze Oberfläche glatt, etwas glänzend, mit langen, anliegenden Haaren licht bedeckt.

Die vordere Augenreihe im längern Durchmesser eines Seitenauges vom Kopfrande entfernt, gerade, die Augen gleich weit von einander entfernt, die mittleren rund, die seitlichen oval, die hintere Reihe breiter, durch Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, die Mittelaugen in mehr als ihrem Durchmesser von einander, von den seitlichen weiter als von den vordern Mittelaugen entfernt. Die Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen gebogenen Wulste; nicht dicht beisammen.

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, vorn

sehr wenig gewölbt, senkrecht abfallend, nicht divergierend, etwas glänzend, licht mit langen herabhängenden Haaren besetzt.

Das Sternum herzförmig, gewölbt, glänzend, glatt, spärlich mit abstehenden Haaren besetzt, ohne Impressionen am Seitenrande.

Das Abdomen vorn gerundet, nach hinten zu breiter werdend, hinten etwas spitz zulaufend, oben wenig gewölbt, glanzlos. (Die Behaarung abgerieben.)

Das Femoralglied der Taster an der Basis seitlich etwas zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt, oben 1. 1. 1. Stacheln, von denen der unterste sehr lang, die Patella oben gewölbt, merklich länger als dick, an der Basis oben und am Ende je eine längere Borste, der Körper des Tibialtheiles kurz, aussen einen vorn abgerundeten, geraden, breiten, etwas gewölbten, behaarten Fortsatz abgebend, über demselben ein zweiter, an der Basis dicker, glatter, glänzender, kahler, nach innen sich drehender, in eine dünne, am Ende abgerundete Spitze verlängerter Fortsatz, zwischen beiden ein kürzeres, am Ende umgebogenes, dünnes, griffelartiges Stielchen. Die Tasterdecke an der Basis aussen rund ausgeschnitten, stark gewölbt, gegen die Spitze dicht behaart.

Die Beine gracil, etwas glänzend, spärlich behaart, nur an den Metatarsen feine, längere Härchen.

Bestachelung: I. Femur oben 1. vorn 1. hinten 1.

Patella ohne Stacheln.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur wie bei I.

Patella vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur wie bei I.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur wie bei I.

Patella ohne Stacheln.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Femina.

Das Weibchen unterscheidet sich durch Folgendes vom Männchen: Der Cephalothorax länger als Pat. und Tibia IV, breiter als Tibia IV lang, von hinten sanft schräg ansteigend, am Kopftheile oben viel stärker gewölbt; Kopf und Brusttheil gehen fast unmittelbar in einander über, wenigstens ist die Abgrenzungsfurche sehr undeutlich. Die Mittelaugen der vorderen Reihe einander mehr genähert, als den seitlichen; letztere etwas grösser.

Die Mandibeln viel stärker gewölbt, dicker als die Vordersehenkel, divergirend.

Das Abdomen hochgewölbt, vorn gerundet, hinten etwas spitz zulaufend, in der Mitte am breitesten, glanzlos. Die Behaarung abgerieben.

Die Area der Epigyne vorn bogig ausgeschnitten und von da an in zwei spitze, seitliche Zipfel verlängert, zwischen diesen die länglich viereckige Platte.

Die Beine kürzer und etwas kräftiger als beim Manne.

Von Herrn Dr. J. Milde bei Meran entdeckt.

Arten anderer Autoren:

Ciniflo mordax Blackw. Spid. of Great Brit. and Irel. P. I. p. 144.
Pl. IX. f. 91.

Ciniflo humilis Blackw. Spid. of Great Brit. and Irel. P. I. p. 145.
Pl. IX. f. 92; ist sicher eine *Dictyna*.

Amaurobius Kochii Ausserer die *Arachniden Tirols* in den Verhandl. der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XVII. (1867) p. 162. T. VII. f. 5., nach des Verfassers eigener Ansicht wohl generisch von *Amaurobius* verschieden. Auffallend ist bei dieser Art die Bestachelung an der Unterseite der Tibien; es findet sich nämlich an denselben eine Doppelreihe von je acht kurzen messerförmigen Stacheln. Auch die Bildung der Mandibeln weist dieselbe in eine andere Gattung.

Caelotes. Blackw.

Der Cephalothorax so lang oder länger als Patella und Tibia eines Beines des vierten Paares, der Kopftheil oben und seitlich meist stark gewölbt, mit einfachen Haaren und Borsten besetzt. Eine Mittelritze ist immer vorhanden.

Die vordere Augenreihe wenigstens im Durchmesser eines Auges, meist aber weiter vom Kopfrande entfernt, gerade oder durch Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, die Augen gleichweit von einander entfernt, gleichgross oder die Seitenaugen etwas grösser; die mittleren rund, die seitlichen oval, mit den hinteren Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen Wulste, etwas entfernt von ihnen.

Die hintere Reihe durch Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, breiter, die Augen gleichgross, gleichweit von einander entfernt oder die Mittelaugen einander genähert.

Die Mandibeln so lang oder länger als die vordersten Pattellen, an der Basis knieartig hervorgewölbt, behaart, so dick oder dicker als die Schenkel des ersten Beinpaares.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, innen der Lippe entsprechend ausgehöhlt.

Die Lippe der Länge nach in der Mitte erhöht, über der Basis eingeschnürt, verschmälert zulaufend, am Vorderrande gerade.

Der Sternum breit, ei- oder herzförmig, ohne seitliche Impressionen, meist reichlich behaart.

Das Abdomen mit einfachen Haaren und Borsten besetzt.

Das oberste Paar der Spinnwarzen zweigliederig; das zweite Glied so lang oder nicht viel kürzer als das erste. Kein Cribellum.

Die Beine ohne Calomistrium; bei einzelnen Arten ist eine Scopula vorhanden, bei anderen fehlt sie gänzlich. Eine Afterklaue an den Tarsen ist immer vorhanden. Die Beine stehen in folgendem Längenverhältnisse:

4. 1. 2. 3. oder 4. 1. 2. 3. oder 4. 1. 2. 3.

Uebersicht der Arten:

Feminae:

1	{	Beiderseits der Epigyne ein schräg nach innen gerichteter Zahn	2
		Kein solcher Zahn an den Seiten der Epigyne	bucculentus
2	{	Der Vorderrand der Epigyne nicht frei vorstehend, mit der Platte verwachsen . . .	solitarius
		Der Vorderrand der Epigyne frei vorstehend .	3
3	{	Vor der Platte eine rundliche Oeffnung . . .	inermis
		Keine Oeffnung vor der Platte der Epigyne	4
4	{	Der bogige Vorderrand der Epigyne in der Mitte in einer Ecke vorgezogen (doppelbogig) . .	roscidus
		Der Vorderrand der Epigyne gerade	terrestris.

Mares:

Am Patellartheil der Palpen kein Fortsatz . . .	inermis
Am Patellartheil der Palpen aussen ein langer Fortsatz	terrestris.

Caelotes inermis L. Koch.

Amaurobius inermis L. Koch „zur Charakteristik des Artenunterschiedes bei den Spinnen im Allgemeinen und besonders der Gattung *Amaurobius* im Correspondenzblatt des zool. min. Vereins in Regensburg 1855. p. 161.

Länge des Cephalothorax : mas: 0m 0045. femina 0m 0045.					
Länge eines Beines des I. Paares	„	0m 012.	„	0m 009.	
„ „ „ II.	„	0m 0105.	„	0m 0085.	
„ „ „ III.	„	0m 0095.	„	0m 0085.	
„ „ „ IV.	„	0m 0125.	„	0m 0095.	

Mas.

Der Cephalothorax gelbbraun, am Kopftheile vorn verdunkelt, länger als Patella und Tibia des IV Beinpaares, so breit als die Tibia desselben lang, vom Hinterrande sanft schräg ansteigend, seitlich etwas steiler abfallend, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, glänzend, licht mit kurzen, angedrückten, feinen Haaren besetzt, in der Mittellinie des Kopftheiles eine Längsreihe längerer Borsten.

Die Mittelritze lang, zwei abgekürzte Furchen in jeder Seitenabdachung; der Kopftheil durch eine Furchen abgegrenzt.

Der Clypeus in der Mitte in eine Spitze herabgezogen, von der vordern Augenreihe senkrecht abfallend, höher als der Durchmesser eines Auges der vorderen Reihe, reichlich mit langen Borsten besetzt.

Die vordere Augenreihe gerade, die Augen in gleicher Entfernung von einander und gleichgross, die mittleren rund, die seitlichen oval; die hintere Reihe schwach über die vordere gebogen, breiter, die Mittelaugen rund, einander näher als die seitlichen, letztere oval, so gross als die mittleren, mit den vorderen Seitenaugen auf einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste.

Die Mandibeln dunkelrothbraun, kürzer als die vordersten Tibien, so dick als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieartig stark hervortretend, dann senkrecht abfallend und nicht gewölbt, seitlich leicht gewölbt, etwas divergirend, glänzend, vorn der Quere nach fein gerunzelt, mit langen, auf Knötchen sitzenden Borsten spärlich besetzt; der vordere Rand des Klauenfalzes lang befrant, mit drei Zähnen, am hinteren Rande ebenfalls drei Zähne.

Maxillen rothbraun, vorn röthlichweiss, gewölbt, ohne Eindruck, aussen gerundet, innen der Lippe entsprechend ausgehöhlt, mit langen, starken Borsten besetzt; die Lippe rothbraun, vorn röthlichgelb, etwas mehr als halb so lang, als die Maxillen.

Das Sternum röthlichbraun, länger als breit, oval, gewölbt, ohne Impressionen am Seitenrande, glänzend, mit vorwärts gerichteten Haaren und Borsten licht besetzt.

Das Abdomen oben schwarz, auf der hinteren Hälfte mit 5—6 gelblichen Winkelfleckchen, die Seiten graugelb, mit schwarzen Fleckenstreifen, die Bauchseite graugelb, schwarz gefleckt. Das Abdomen ist vorn gerundet, im hintersten Drittheil am breitesten, schwach fettartig glänzend, mit kurzen abstehenden Haaren licht besetzt.

Die Spinnwarzen bräunlichgelb, das oberste Paar das längste, zweigliederig.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammenge-

drückt, am Ende verdickt, oben an der vordern Hälfte 1. 1. 1. Stacheln. Das Patellar- und Tibialglied gleichlang, ersteres oben leicht eingedrückt, letzteres aussen mit einem oberen kürzeren und einem unteren längeren ohrförmigen Anhang; die Tasterdecke sehr lang, vorn abwärts gedrückt, reichlich mit langen Borsten besetzt, an der Basis aussen der Rand furchenartig bis zu einem Dritttheil der Länge tief ausgehöhlt.

Die Beine braungelb, die Tibien, Metatarsen und Tarsen der 2 Vorderpaare und die Metatarsen und Tarsen der beiden Hinterpaare rothbraun. An den Tarsen der beiden Vorderpaare eine lichte Scopula. Die Beine sind glänzend, die Metatarsen der beiden Vorderpaare lang, die übrigen Glieder dieser, sowie die beiden Hinterpaare kürzer behaart.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 2.

Tibia unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1., hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia hinten 1. 1. vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Femina.

Der Cephalothorax etwas breiter als die Tibia lang; die Mandibeln so lang als die vordersten Tibien. Das Tibialglied der Taster um die Hälfte länger als der Patellartheil; das Tarsalglied gebogen, stark behaart. Die Beine bei gleicher Körpergrösse merklich kürzer, als jene des Männchens. In allem Uebrigen stimmen beide Geschlechter mit einander überein.

Aus Mehadia erhielt ich durch Herrn Dr. Palliardi mehrere Exemplare, welche mit unseren übereinstimmen, nur ist die Epigyne im ganzen viel breiter und der die vordere Oeffnung abgrenzende Bogen merklich breiter als hoch. Männliche Thiere kenne ich

noch nicht, und muss es vorläufig dahin gestellt sein lassen, ob wir es mit einer eigenen Art oder einer Varietät zu thun haben.

Vorkommen: *Caelotes inermis* scheint weit verbreitet zu sein; ich fand ihn bei Nürnberg und erhielt Exemplare von Razzes in Tirol durch Herrn Dr. Milde, aus Montenegro und der Umgebung Wien's durch Herrn Erber; in Galizien wurde er von Herrn Wajgiel gefunden; in den bayerischen Alpen sammelte ich ihn selbst.

Er lebt unter Steinen in dunklen Wäldern, in unseren Gegenden findet man beide Geschlechter im August und September, in den Alpen schon Ende Juli vollkommen entwickelt.

Caelotes bucculentus. nov. spec.

Länge des Cephalothorax: 0m 005.					
Länge eines Beines des I. Paares: 0m 0125.					
"	"	"	" II.	"	0m 011.
"	"	"	" III.	"	0m 011.
"	"	"	" IV.	"	0m 0145.

Der Cephalothorax hellbräunlichgelb, am Kopftheil etwas dunkler, die Mandibeln, Maxillen und Lippe röthlichbraun, beide letztere am Abschnitte vorn weisslich, das Sternum, die Beine und Palpen hellbräunlichgelb, letztere mit röthlichbraunem Tarsalgliede. Das Abdomen oben olivenbraun, an der Basis ein röthlichweisser, seitwärts zackiger Spiessfleck, hinter diesem eine Längsreihe von gelben Winkellinien; die Bauchseite und die Spinnwarzen blassgelb. Die Schenkel der Beine mit undeutlichen, schwarzen Ringflecken.

Der Cephalothorax so lang als Tibia und Patella eines Beines des IV. Paares, so breit als Tibia IV lang, vom Hinterrande schräg ansteigend, am Kopftheile oben hinter den Augen und seitlich gewölbt, in den Seiten gerundet, vorn abgesetzt, jedoch nicht sehr viel verschmälert, glänzend, besonders am Hinterrande, sehr licht behaart. Der Kopftheil seitlich durch

eine Furche abgesetzt, am Brusttheil beiderseits drei Bogenfurchen. Die Mittelritze lang, tief einschneidend.

Die vordere Augenreihe weiter als die Entfernung der der vordern und hintern Mittelaugen beträgt, vom Kopfrande entfernt, durch Tieferstehen der Seitenaugen etwas gebogen, die Augen gleichweit von einander entfernt, fast gleichgross, die mittleren rund, die seitlichen oval, mit den hinteren Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen Wulste sitzend, nicht ganz in ihrem grössern Durchmesser von diesen entfernt. Die hintere Reihe wie die vordere gebogen, breiter, die Augen gleichgross und gleichweit von einander entfernt.

Die Mandibeln bedeutend länger als die vordersten Patellen, unter dem Kopfrande knieartig stark hervorgewölbt, dann senkrecht abfallend, dicker als die Vorderschenkel, etwas divergirend, glänzend, mit langen, hängenden Haaren reichlich besetzt.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, über die Lippe gebogen, aussen mit langen, abstehenden Borsten besetzt, die Lippen über der Basis eingeschnürt, nach vorn allmählich verschmälert, in der Mitte der Länge nach erhöht, vorn gerade abgeschnitten.

Das Sternum breit eiförmig, flach, glänzend, ohne seitliche Impressionen, mit langen, abstehenden Borsten reichlich besetzt.

Das Abdomen an der Basis rundlich abgestutzt, nach hinten allmählich breiter, glanzlos, mit abstehenden Borsten besetzt und mit einfachen kurzen Haaren bewachsen.

Die obersten Spinnwarzen zweigliedrig, das unterste Paar kurz und dick.

Die Epigyne stellen zwei querovale Oeffnungen dar. Der Femoraltheil der Palpen gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, oben im vordersten Drittheil ein Stachel, ebenso am Ende. Der Tarsaltheil rings dicht behaart und mit langen Stacheln bewehrt.

Die Schenkel oben der Länge nach gewölbt. Keine Scopula, die Tarsen aber unten dicht behaart,

Bestachelung: unbeständig an einem und demselben Thiere.

- I. Femur oben 1. 1. vorn 2. (Spitze)
- II. Femur oben 1. 1. vorn 2. (Spitze)
- III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.
- IV. Femur hinten 1. vorn 1. (Spitze).

Aus Spanien. (Escorial). Sammlung des Herrn Eugène Simon in Paris.

Caelotes solitarius nov. spec.

Femina.

Länge des Cephalothorax: 0m 0045.					
Länge eines Beines des I. Paares: 0m 011.					
"	"	"	"	II.	" 0m 01.
"	"	"	"	III.	" 0m 009.
"	"	"	"	IV.	" 0m 012.

Der Brusttheil des Cephalothorax gelbbraun, der Kopftheil rothbraun, Mandibeln, Maxillen, Lippe und Sternum dunkelrothbraun, das Abdomen oben schwarz, bräunlichgelb gefleckt, in der Mittellinie an der hintern Hälfte bildet die bräunlichgelbe Färbung eine Längsreihe von 6 — 7 Paaren schräg gestellter Laubfleckchen. Die Bauchseite bräunlichgelb, schwärzlich gefleckt. Schenkel und Patellen braungelb, die übrigen Glieder röthlichbraun. Das Femoral- und Patellarglied der Taster braungelb, die übrigen Glieder röthlichbraun. Die Spinnwarzen bräunlichgelb.

Der Cephalothorax länger als Patella und Tibia des vierten Beinpaares, breiter als Tibia IV lang, vom Hinterrande sanft ansteigend, an der Seitenabdachung nicht steil, am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, wenig glänzend, am Brusttheile spärlich und kurz, am Kopftheile länger und reichlicher behaart. Die Mittelritze lang und tief eingeschnitten.

Der Clypeus nicht höher als der Längendurchmesser eines vorderen Seitenauges, mit langen Borsten besetzt. Die vordere Augenreihe durch das Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, die Augen gleichweit von einander entfernt, die mittleren rund, die

seitlichen oval und merklich grösser. Die hintere Reihe wie die vordere gebogen, etwas breiter, die Augen gleichweit von einander entfernt. Die Seitenaugen mit der vordern an einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste.

Die Mandibeln so lang als die vordersten Tibien, an der Basis dicker als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieartig stark hervortretend, dann senkrecht abfallend, vorn nur wenig gewölbt, stark divergirend, reichlich mit langen, ange-drückten Haaren besetzt, glänzend. Am vordern und hintern Falzrande je drei Zähne.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, innen der Lippe entsprechend ausgehöhlt, aussen gerundet; reichlich mit langen, abstehenden Borsten besetzt. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, an der Basis breiter als am Ende, vorn gerade, ebenfalls mit zahlreichen Borsten besetzt.

Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, ohne Impressionen am Seitenrande, mattglänzend, mit langen, abstehenden Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen vorn verschmälert, hinter der Mitte am breitesten, hinten gerundet, fast glanzlos, spärlich und kurz behaart.

Die Epigyne länger als breit, ohne vorspringenden Vorder- rand, der Rand mit der Platte verwachsen, zu beiden Seiten, in der Mitte der Länge ein nach innen schräg gerichteter Zahn.

Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammen- gedrückt, am Ende verdickt, oben im letzten Dritttheil drei Stacheln; der Tibialtheil um $\frac{1}{3}$ länger als das Patellarglied. Die Beine dicht behaart, an den Schenkeln unten sehr lange Haare. Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 1.

Tibia unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella hinten 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. vorn 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Vorkommen: *Cael. solitarius* wurde bisher nur in Tirol bei Bad Razzes von Herrn Dr. J. Milde und in Siebenbürgen von Herrn Dr. G. Seidlitz gefunden.

Caelotes roscidus C. Koch.

Amaurobius roscidus C. Koch „Die Arachn.“ Bd. X. S. 123.
T. CCCLV f. 829.

Femina.

Länge des Cephalothorax: 0^m 007.

Länge eines Beines des I. Paares: 0^m 0165.

„ „ „ „ II. „ 0^m 0155.

„ „ „ „ III. „ 0^m 0145.

„ „ „ „ IV. „ 0^m 018.

Diese Art ist sehr mit *Caelotes terrestris* verwandt, von dieser aber leicht zu unterscheiden, indem sie merklich grösser ist, die Beine dichter behaart sind und der freie Vorderrand der Epigyne in der Mitte eine vorspringende Ecke hat, während derselbe bei *C. terrestris* ganz gerade ist.

Der Cephalothorax rothbraun, am Kopftheile vorn stark verdunkelt, merklich länger als Pat. und Tibia des 4. Beinpaar; zwischen dem II. und III. Beinpaare breiter als Tibia IV lang. Vom Hinterrande steil ansteigend, nach den Seiten ebenfalls steil abfallend, am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, glänzend, spärlich mit aufrechten Haaren besetzt. Die Mittelritze lang, — der Kopftheil seitlich durch eine Impression abgegrenzt, an der Seitenabdachung zwei undeutliche abgekürzte Furchen. Die Höhe des Clypeus ungefähr die doppelten Durchmesser eines der vordern Seitenaugen betragend.

Die vordere Augenreihe fast gerade, die Augen in gleicher Entfernung von einander, gleichgross, die mittlere rund, an einer leichten Hervorragung; die seitlichen oval. Die hintere Reihe breiter, durch das Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, die

Mittelaugen etwas mehr einander genähert als die Seitenaugen, die Augen übrigens gleichsoss, rund. Die Seitenaugen sitzen an einem gemeinschaftlichen schrägen Wulste.

Die Mandibeln schwarz, so lang als die vordersten Tibien, an der Basis fast noch einmal so dick als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande stark knieartig hervortretend, dann senkrecht abfallend, etwas divergirend, glänzend, vorn der Quere nach sehr fein gerunzelt, reichlich mit kurzen, auf Knötchen sitzenden Borsten besetzt. Am hinteren und vorderen Falzrande je drei kräftige Zähne.

Maxillen und Lippe schwarzbraun mit röthlichweissem Vordersaume. Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, aussen gerundet, innen der Lippe entsprechend gebogen, vorn schräg abgeschnitten, mit sehr langen Borsten reichlich besetzt.

Das Sternum röthlichbraun, herzförmig, leicht gewölbt, ohne Eindrücke am Seitenrande, glänzend, glatt, mit langen, abstehenden Haaren besetzt.

Das Abdomen oben schwarz, mit zahlreichen bräunlichgelben Punktflecken besät, (an manchen Exemplaren auf der hintern Hälfte eine Reihe von Winkellinien), unten schwärzlich-grau, ebenfalls punktirt gefleckt, vorn gerundet, die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, in der Mitte am breitesten, hinten etwas spitz zulaufend, hochgewölbt, mit schwachem, fettartigen Glanze, licht mit kurzen, angedrückten Haaren bedeckt.

Die Spinnwarzen rothbraun, zuweilen braungelb, das oberste Paar das längste. Der frei vorstehende Vorderrand der Epigyne in der Mitte in eine Ecke vorgezogen, an den Seitenrändern ein Zahn wie bei *A. terrestris*.

Das Femoralglied der Taster stark gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, im letzten Dritttheil oben mit drei Stacheln, der Tibialtheil merklich länger als das Patellarglied, der Tarsaltheil gekrümmt, stark behaart. Die Beine gelbbraun, dichter behaart als bei *Caelotes terrestris*. An den Tarsen der drei Vorderpaare eine lichte Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 2. oder 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1. 1. hinten 1.

Patella hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

Vorkommen: im südlichen Europa, — nach C. Koch wahrscheinlich bei Triest, — Herr Dr. Seidlitz fand diese Art häufig in den Pyrenäen, jedoch nur weibliche Exemplare.

Clubiona ferox nigra Walck. Hist. nat. des ins. apt. T. I. p. 607 wäre ich versucht hierher zu ziehen, wenn nicht die ganz bestimmt beschriebene Form der Epigyne sie als eine andere Art bezeichnete.

***Caelotes terrestris* Wid.**

Aranca terrestris Wider. Mus. Senckenb. Bd. I. p. 215. t. 14.
f. 10.

Amaurobius subterraneus C. Koch Übers. des Ar. Syst. Hft. I. p. 15.

„ *tigrinus* C. Koch Übers. des Ar. Syst. Hft. I. p. 16.

„ *terrestris* C. Koch. Die Arachn. Bd. VI. p. 45.

T. CXCH. f. 463. 464.

„ „ L. Koch. Corresp. Bl. des zool. min. Ver.
in Regensb. 1855. p. 163.

Caelotes saxatilis Blackwall Spid. of Great Brit. and Irel. P. I.
p. 169. Pl. XII. f. 109.

„ „ Blackwall Ann. and Mag. of Nat. Hist. second
ser. vol. VIII. p. 334.

„ „ Blackw. Linn. Trans. vol. XVIII. p. 618. T. 39.
Fig. 6—8.

Clubiona saxatilis Blackw. Lond. and Edinb. Phil. Mag. third
ser. vol. III. p. 436.

Drassus saxatilis Blackw. Research. in Zool. p. 332.

Länge des Cephalothorax:				mas:	0m 005	femina	0m 0055.
Länge eines Beines des I. Paares:				„	0m 015	„	0m 0125.
„	„	„	„ II.	„	0m 0135	„	0m 0115.
„	„	„	„ III.	„	0m 012	„	0m 0105.
„	„	„	„ IV.	„	0m 0155	„	0m 0145.

Mas.

Der Cephalothorax gelbbraun, am Kopftheile vorn ins Schwarzbraune verdunkelt, so lang als Patella und Tibia des letzten Beinpaares, zwischen dem 2. und 3. Beinpaare breiter als die Länge der Tibia IV beträgt, vom Hinterrande kurz steil ansteigend, am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, am Brusttheile in die Seiten ziemlich steil abgedacht, am Seitenrande leicht gerundet, die Fläche ziemlich glänzend, spärlich mit zerstreuten Borsten besetzt. Die Abgrenzung des Kopftheils durch eine Furche angedeutet, an jeder Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchen. Die Mittelritze lang.

Die vordere Augenreihe ungefähr im längeren Durchmesser eines der Seitenaugen vom Kopfrande entfernt, fast gerade, die Augen in gleicher Entfernung von einander, die mittleren rund, an einem kleinen Höckerchen sitzend, die seitlichen oval, grösser als die mittleren, mit den hintern Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen schrägen Wulste. Die hintere Reihe breiter, schwach über die vordere gebogen, dieser ziemlich genähert, die Augen in gleicher Entfernung von einander, ziemlich gleichgross, rund.

Die Mandibeln schwarzbraun, etwas kürzer als die vordersten Tibien, an der Basis dicker als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieartig stark hervortretend, dann fast senkrecht abfallend, innen stark divergirend, etwas glänzend, vorn der Quere nach gerunzelt, mit langen Borsten reichlich besetzt. Am vorderen und hinteren Falzrande je drei Zähne.

Maxillen und Lippe schwarzbraun, vorn röthlichweiss gesäumt, erstere gewölbt, ohne Eindruck, aussen gerundet, innen über die Lippe gebogen, vorn nach innen schräg abgeschnitten,

Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, vorn gerade abgeschnitten, der Form nach länglich viereckig.

Das Sternum oval, hinten in eine kurze Spitze auslaufend, gelbbraun, glänzend, leicht gewölbt, ohne Impressionen am Seitenrande, reichlich mit abstehenden, langen Borsten besetzt.

Das Abdomen oben grauschwarz, mit einem bis zur Mitte der Länge reichende Spiessfleck und hinter diesem mit 6—7 in eine Längsreihe gestellten Winkelflecken, von bräunlichgelber Farbe, die Seiten bräunlichgelb gemischt. Das Abdomen ist vorn gerade abgeschnitten, die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, oben wenig gewölbt, in der Mitte am breitesten, hinten gerundet, glanzlos, mit langen, abstehenden Borsten licht besetzt.

Die Spinnwarzen bräunlichgelb, das oberste Paar das längste, zweigliedrig; sie sind sehr lang und dicht behaart.

Das Femoralglied der Taster stark gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende etwas verdickt, oben im letzten Drittheil mit drei, in eine Reihe gestellten Stacheln; der Patellartheil endet vorn an der Aussenseite in einen langen, geraden, rinnenartig ausgehöhlten Fortsatz. Der Tibialtheil so lang als der Patellartheil, er trägt unten am vordern Ende einen kurzen, vorwärts gerichteten, zahnartigen Fortsatz. Die Tasterdecke so lang als die beiden vorhergehenden Glieder zusammen, aus breiter Basis in einen langen Schnabel vorgezogen, an der Basis oben sehr gewölbt, überall mit sehr langen Borsten reichlich besetzt.

Die Beine braungelb, mit rothbraunen Metatarsen und Tarsen; stark behaart, besonders an den Metatarsen, am Tarsus der drei Vorderpaare eine dünne Scopula.

Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. vorn 1 (am Ende) zuweilen 2.

Tibia unten 2. 2. 2.

II Femur oben 1. 1. vorn 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella vorn 1. hinten 1.

Tibia vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 2. 2. 2.

IV. Femur oben 1 1. vorn 1. hinten 1.

Patella } wie bei III.
Tibia }

Femina.

Der Cephalothorax merklich länger als Patella und Tibia IV, vom Hinterrande weniger steil ansteigend als beim Männchen, sonst wie bei diesem gebildet und gefärbt.

Die Augenstellung wie beim Männchen. Die Mandibeln so lang als Tibia I, sonst wie beim Männchen.

Das Abdomen eiförmig, vorn gerundet und die hintere Abdachung des Cepthor. deckend, hinten ebenfalls gerundet, in der Mitte am breitesten Das Femoralglied der Taster gebogen, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, oben im letzten Dritttheil drei Stacheln, der Tibialtheil länger als das Patelarglied.

Die Beine des Weibchens sind auffallend kürzer als jene des Männchens (bei gleicher Körpergrösse).

Alle übrigen Theile wie beim Männchen.

(Die Bestachelung der Beine sehr unbeständig bei den einzelnen Exemplaren).

Der frei vorspringende Vorderrand der Epigyne gerade.

Vorkommen: diese Art findet sich in Frankreich, England, durch ganz Deutschland, in Galizien und Siebenbürgen. In den Alpen wurde sie von Herrn Ausserer bis zu einer Höhe von 7000' gefunden. Sie lebt unter Steinen, wie auch in röhrenförmigen langen Erdlöchern, welche sie mit dichtem, weissem Gewebe überzieht; sie baut solche Wohnungen am liebsten zwischen Baumwurzeln, die Oeffnung dieses Ganges erweitert sich meist trichterähnlich, ihre nächste Umgebung ist gewöhnlich auch noch überwoben. — Der Aufenthalt des *Caelotes terrestris* ist immer in ganz dunklen Waldungen. In den Alpen sind beide Geschlechter schon im Juli, in ebenen Gegenden erst im September entwickelt.

Das Weibchen bewacht bis zum Ausschlüpfen der Jungen den Eiersack und stirbt erst, wenn die Brut, welche sie hütet, schon ziemlich entwickelt ist. Der Eiersack ist reinweiss, der Form nach rund, er ist mit planer Fläche an einen Stein etc. befestigt, die andere Fläche ist gewölbt.

Mir unbekannte Arten anderer Autoren:

Die nachfolgenden Arten gehören wahrscheinlich alle zu *Caelotes*.

Clubiona ferox nigra Walck. Hist. nat. des Jns. Apt. T. I.
p. 607.

Drassus atropos Walck. Hist. nat. des Jns. Apt. T. I. p. 627.

Drassus trucidator Walck. Hist. nat. des Jns. Apt. T. I. p. 629.

Amaurobius montanus C. Koch die Arachniden. Bd. VI. p. 48.
T. 192. f. 465.

Cybaeus. nov. gen.

Der Cephalothorax entweder so lang als Patella und Tibia eines Beines des vierten Paares (mas.) oder länger (femina), so breit als Tibia IV lang (mas.) oder breiter (femina), in den Seiten leicht gerundet, vorn mässig verschmälert, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt. Eine Mittelritze ist immer vorhanden.

Die vordere Augenreihe im doppelten Durchmesser eines Auges vom Kopfrande entfernt, gerade, die Augen gleichweit von einander entfernt, die mittleren rund, die seitlichen oval, grösser; letztere mit den hintern Seitenaugen an einer gemeinschaftlichen Erhöhung, etwas entfernt von ihnen

Die hintere Reihe durch Tieferstehen der Seitenaugen gebogen, gleichgross, die Augen gleichweit oder die Mittelaugen weiter von einander als von den Seitenaugen entfernt.

Die Mandibeln an der Basis knieartig hervorgewölbt, so dick oder dicker als die Vorderschenkel

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, die Lippe fast quadratisch, vorn leicht rund ausgeschnitten.

Das oberste Paar der Spinnwarzen eingliedrig. Kein Cribellum.

Kein Calamistrum an den Metatarsen des vierten Beinpaares; keine Scopula. An den Tarsen eine Afterklaue. Längenverhältniss 4. 1. 2. 3 oder 1. 4. 2. 3. (tetricus mas)

Cybaeus angustiarum nov. spec.

Der Cephalothorax blassröthlichbraun, am Kopftheile vorn ins Schwarzbraune verdunkelt, mit schwärzlichen Flecken in den Furchen der Seitenabdachung und zwei, nach vorn divergirenden Flecken am Hinterwinkel des Kopftheiles.

Die Mandibeln dunkelrothbraun; Maxillen und Lippe röthlichbraun mit hellerem Vordersaume; das Sternum röthlichbraun, schwarz behaart. Die Beine durchscheinend blassröthlichbraun, zwei schwarze Ringflecken an den Schenkeln und Tibien. Die Palpen röthlichbraun, ungefleckt.

Das Abdomen oben schwarz, an der vorderen Hälfte oben vier im Quadrat stehende röthlichgraue Flecken; auf der hinteren Hälfte eine Reihe von vier röthlichgrauen Winkelflecken. Die Seiten des Abdomen röthlichgrau, schwarz gesprenkelt. Die Bauchseite röthlichgrau, schwarz behaart. Die Spinnwarzen röthlichbraun

Länge des Cephalothorax: mas: 0m 0035				femina 0m 004.
Länge eines Beines des I. Paares: „ 0m 0105				„ 0m 01.
„	„	„	II. „	0m 0105 „ 0m 0095.
„	„	„	III. „	0m 0095 „ 0m 008.
„	„	„	IV. „	0m 0115 „ 0m 011.

Femina.

Der Cephalothorax länger als Patella und Tibia IV, zwischen dem II. und III. Beinpaare etwas breiter als Tibia IV lang ist, in den Seiten leicht gerundet, vorn mässig verschmälert, vom Hinterrande schräg ansteigend, nach den Seiten steil abfallend, am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, sehr glänzend und glatt, der Kopftheil spärlich behaart. Die Mittelritze lang, der Kopftheil seitlich durch eine Impression abgegrenzt, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchen.

Die vordere Augeureihe wenigstens in doppelter Augenbreite vom Kopfrande entfernt, gerade, die Augen in gleicher Entfernung von einander; die mittleren rund, die seitlichen oval und merklich grösser. Die hintere Reihe breiter, leicht über die vordere gebogen, die Augen ebenfalls in gleicher Entfernung von einander und gleichgross. Die Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste.

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Tibien, dicker als Vorderschenkel, an der Basis knieartig hervortretend, dann senkrecht abfallend, an der Aussenseite gewölbt, innen wenig divergirend, sehr glänzend, vorn sehr fein der Quere nach gerunzelt, mit feinen Borstchen licht besetzt. Am vorderen Falzrande drei Zähne, von denen der mittlere grösser ist, am hinteren 4—5 kurze, gleichlange Zähnnchen.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, aussen gerundet, innen der Lippe entsprechend ausgeschnitten, mit langen Borsten besetzt.

Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, gewölbt. Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, sehr glänzend, ohne Impressionen am Seitenrande, licht mit langen, abstehenden Borsten besetzt, glatt.

Das Abdomen oben sehr hoch, vorn und hinten gerundet, im letzten Drittheil am breitesten, vorn die hintere Abdachung des Cepthor. deckend, etwas fettartig glänzend, mit kurzen, einfachen, abstehenden Haaren ziemlich dicht bekleidet. Das oberste Paar der Spinnwarzen eingliedrig.

Das Femoralglied der Taster gekrümmt, seitlich zusammengedrückt, am Ende verdickt, im letzten Drittheil oben zwei Stacheln. Am Patellartheil aussen ein kleines, vorspringendes Eckchen, der Tibialtheil merklich länger als der vorhergehende, der Tarseltheil leicht gebogen.

Die Beine glänzend, kurz und licht behaart, keine Scopula. Bestachelung: I. Femur oben 1. 1. 1. vorn 2 oder 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

II. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Tibia vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.

III. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1.

Patella oben 1. (am Ende).

Tibia oben 1. vorn 1. 1. 1. hinten 1. 1. 1.
unten 2. 2. 2

IV. Femur oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1.

Patella oben 1 (am Ende).

Tibia oben 1. vorn 1. 1. 1. hinten 1. 1. 1. un-
ten 2. 2. 2.

Das unterste Paar der Spinnwarzen das längste.

Beim Männchen (von Herrn Wajgiel in Galizien gesammelt) ist der Cephalothorax bräunlichgelb, sonst wie beim Weibchen gezeichnet; der Kopftheil aber nicht ins Schwarzbraune verdunkelt; die Mandibeln hellröthlichbraun, ebenso die Maxillen und die Lippe; das Sternum bräunlichgelb, sonst wie beim Weibchen.

Der Cephalothorax so lang als Patella und Tibia IV, zwischen dem II. und III. Beinpaar so breit, als Tib. IV lang; sonst wie beim Weibchen; ebenso die Augenstellung, die Mandibeln, Maxillen, die Lippe, das Sternum und Abdomen.

Das Femoralglied der Palpen wenig gebogen, gegen das Ende etwas verdickt, oben im letzten Dritttheil 1. 1. Stacheln; der Patellartheil und das Tibialglied gleich lang; ersterer aussen mit einem daumenähnlichen, etwas gebogenen, dicken, oben mit Stachelwärtchen besetzten Fortsatz; der Tibialtheil oben und innen sehr lang behaart, aussen kahl und sehr glatt, mit einem vorspringenden Kiele an der unteren Seite, welcher sich nach aufwärts zieht und vorn in eine Ecke endet; die Tasterdecke lang, aus eiförmiger Basis vorn schnabelartig verlängert, licht mit langen, abstehenden Haaren besetzt, am Aussenrande zwei, am Innenrande 4—5 längere Stacheln.

Vorkommen: Diese Art lebt unter Steinen in feuchten, dunklen Schluchten; sie wurde von mir bisher nur im fränkischen Jura, und in Galizien von Herrn L. Wajgiel gefunden. Mitte August sind die Weibchen vollkommen entwickelt.

Cybaeus angustiarum ist grösser als *C. tetricus*, die Augen der hinteren Reihe sind gleichweit von einander entfernt, an den

Schenkeln des ersten und zweiten Beinpaares sind oben 1. 1. 1. Stacheln.

Cybaeus tetricus C. Koch.

Amaurobius tetricus C. Koch: „Die Arachn.“ Bd. VI. S. 43.
T. CXCI. f. 462.

L. Koch: „Corresp.-Blatt des zool.-miner. Vereins in Regensburg 1855“ p. 164.

Länge des Cephalothorax:		mas:	0m 003	femina	0m 0035.
Länge eines Beines des I. Paares:		„	0m 0105	„	0m 01.
„	„	„	„ II.	„	0m 009
„	„	„	„ III.	„	0m 008
„	„	„	„ IV.	„	0m 001
				„	0m 0105.

Mas.

Der Cephalothorax, das Sternum und die Beine bräunlichgelb, die Mandibeln, Maxillen und Lippe mehr röthlichbraun. Das Abdomen graugelb, schwärzlich bestäubt, oben mit einer Längsreihe von 5—6 blassgelben Winkelfleckchen. Die Spinnwarzen bräunlichgelb. Das zweite Glied der Taster, sowie die Decke der eigentlichen Sexualorgane bräunlichgelb, das Patellar- und Tibialglied mehr röthlichbraun.

Femina.

Das Weibchen ist wie das Männchen gefärbt und gezeichnet. Die Taster bräunlichgelb.

Mas.

Der Cephalothorax nach hinten und den Seiten gleichmässig steil abfallend, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, so lang als Patella und Tibia IV zusammen, in der Mitte so breit als Tibia IV lang, glänzend, glatt, sehr spärlich behaart, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert. Die Mittelritze breit, an der Seitenabdachung zwei abgekürzte Furchen, der Kopftheil vom Brusttheil seitlich deutlich abgesetzt.

Der Clypeus etwas höher als die Entfernung der vorderen und hinteren Mittelaugen beträgt, unter der vorderen Augenreihe der Quere nach leicht ausgehöhlt, senkrecht abfallend. Die vor-

dere Augenreihe gerade, die Mittelaugen an einem leichten Vorsprunge, rund, in ihrem Durchmesser von einander und von den seitlichen entfernt; diese oval, merklich grösser, mit den hinteren Seitenaugen an einem gemeinschaftlichen Wulste, doch ziemlich entfernt von ihnen. Die hintere Reihe durch Tieferstehen der Seitenaugen leicht gebogen, die Augen gleichgross, die mittleren rund, von einander etwas mehr als von den seitlichen entfernt; letztere oval.

Die Mandibeln etwas länger als die vordersten Patellen, unter dem Kopfrande knieartig hervortretend, an der Basis so dick als die Vorderschenkel, gegen das Ende viel dünner, in der unteren Hälfte stark divergirend, etwas glänzend; der Quere nach fein gerunzelt, spärlich behaart.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck; die Lippe fast quadratisch, gewölbt, der vordere Rand leicht rund ausgeschnitten.

Das Sternum breit, herzförmig, gewölbt, glänzend, ohne Impressionen am Seitenrande, licht mit langen, abstehenden Haaren besetzt.

Das oberste Paar der Spinnwarzen kürzer und dünner als das unterste; eingliederig.

Die Beine wenig glänzend, licht kurz behaart, ohne Scapula, die Schenkel oben der Länge nach gewölbt.

Das Femoralglied der Taster gebogen, noch einmal so lang als die vordersten Patellen, am Ende oben ein Stachel. Der Patellartheil aussen mit einem kurzen, vorwärts gerichteten, am Ende gerundeten, an seiner oberen, inneren Fläche dicht mit schwarzen Körnchen besetzten Fortsatze, so lang, als mit dem Fortsatze breit. Das Tibialglied sehr kurz, kaum länger als dick, lang behaart, oben gewölbt, unten an der Aussenseite am Ende mit einer vorspringenden Ecke. Die Tasterdecke die Genitalien nicht vollkommen deckend, gewölbt, an der Basis gerundet, breit, nach vorn schnabelähnlich verlängert, licht mit langen Haaren und Stachelborsten besetzt.

Bestachelung der Beine:

- I. Femur: oben 1. 1. vorn 1.
 Patella: oben an der Basis und am Ende eine Borste.
 Tibia: vorn 1. 1. unten 2. 2. 2.
- II. Femur: }
 Patella: } wie bei I.
 Tibia: }
- III. Femur: oben 1. 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1.
 Patella: wie bei I.
 Tibia: oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 1. 1. 2.
- IV. Femur: oben 1. 1. hinten 1.
 Patella: wie bei I.
 Tibia: oben 1. 1. vorn 1. 1. hinten 1. 1. unten 1. 1. 1.

Femina:

Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch folgende Merkmale:

Der Cephalothorax ist länger als Patella und Tibia IV, etwas breiter als Tibia IV lang, die hintere Abdachung ist weniger steil, der ganze Rücken des Cephalothorax aber viel stärker gewölbt.

Die Mandibeln dicker, weiter herab und stärker gewölbt, mit mehr Glanz.

Die Beine bei fast gleicher Länge stämmiger, etwas glänzender.

Die Epigyne mit dachartig vorspringender Area, an deren beiden Enden eine schräge, ovale Oeffnung.

Das Femoralglied der Taster gebogen, gleich dick, am Ende oben ein Stachel, der Tibialtheil um $\frac{1}{3}$ länger als das Patellarglied; der Tarsaltheil kurz behaart, mit langen Stacheln besetzt.

Vorkommen: in den Alpen (Kärnthen, bayerische Alpen [Benediktenwand]). Beide Geschlechter fand ich Anfangs August vollkommen entwickelt.


Ueber

sacktragende Motten-Arten.

Vortrag, gehalten den 29. April

von

Ernst Hofmann.



So bekannt die grösseren Formen der Schmetterlinge, deren Jagd ja die Belustigung unserer Knabenzeit ist, wohl einem Jeden sind, so überraschend dürfte es für die Meisten sein, wenn sie sehen würden, wie die Natur eine weit grössere Anzahl von Miniatur-Schmetterlingen geschaffen hat, welche in Form- und Farbenpracht die grösste Mannichfaltigkeit, und in ihrer Entwicklungsgeschichte das grösste Interesse darbieten. Unter diesen Miniatur-Geschöpfen stellt das Geschlecht der sogenannten Motten oder Schaben, Tineiden, das grösste Contingent und enthält die auffallendsten und allerkleinsten Formen, deren Lebensweise die grösste Abwechslung darbietet. Wir haben ebenso wie bei ihren grösseren Verwandten natürlich auch bei diesen kleinsten Faltern die vier Entwicklungsstufen, als Ei, Raupe, Puppe und Schmetterling zu unterscheiden.

Im Raupenzustande finden wir nun die bei weitem grössere Anzahl der verschiedenen Motten-Arten an Pflanzen lebend, indem sie die verschiedensten Theile dieser letzteren als Nahrung und Wohnung sich auswählen. So finden wir die Raupen mancher Arten in Wurzeln oder in den Stengeln, andere in Blattknospen, in oder an den Blättern, wieder andere in den Blüten und Früchten.

Dabei ist der Umstand sehr bemerkenswerth, dass jedes Individuum ein und derselben Art seine Wohnung genau auf dieselbe Weise, wie nach einem gemeinsamen Bauplane anlegt. Viele Arten sind durchaus keine Kostverächter, sondern greifen Pflanzen aus den verschiedensten Familien mit gleichem Appetit an, andere beschränken sich in ihrer Auswahl nur auf Pflanzen

einer natürlichen Familie, und wieder andere sind so wählerisch, dass sie nur eine bestimmte Pflanze zu ihrer Nahrung nehmen und jede andere Kost verschmähen. Es ist daher möglich, aus dem Auffinden solcher Monophagen einen untrüglichen Schluss auf das Vorhandensein gewisser Pflanzen zu machen, und da diese Pflanzen nicht selten an gewisse Bodenverhältnisse gebunden sind, so ist es leicht erklärlich, dass manche unserer Schaben-Arten nur ein genau beschränktes Vorkommen haben, und es zeigt sich auch bei der Beobachtung dieser winzigen Organismen das Abhängigkeitsverhältniss wie der Pflanzen, so auch der Thiere von den Bodenverhältnissen recht deutlich.

Während, wie schon erwähnt, die meisten Mottenraupen sich von lebenden Pflanzen ernähren, gibt es doch auch eine kleine Anzahl von solchen, welche trockene Stoffe, theils pflanzlichen, theils aber auch thierischen Ursprunges zur Nahrung und Wohnung sich erwählen, z. B. faules Holz, trockene Pflanzen und Früchte, Thierfelle, verschiedene Wollstoffe etc., und unter diesen sind mehrere Arten, welche den Menschen empfindlichen Schaden zuzufügen im Stande sind, und deesshalb unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Unter den pflanzenfressenden Arten (Phytophagen) sind nur wenige als schädlich zu bezeichnen und diese nur wegen ihres oft massenhaften Auftretens, indem die einzelnen Thierchen zu klein sind, um erheblichen Schaden anrichten zu können. Forschen wir nun weiter nach der Lebensweise der verschiedenen Mottenraupen, so finden wir, dass ein Theil derselben sich feste Wohnungen an den verschiedenartigsten Theilen der Pflanzen anlegt, oder auch frei auf ihnen lebt, während dagegen andere kunstvolle transportable Wohnungen bauen, die von der Raupe beständig mit herumgeschleppt werden, wie das Schneckenhaus von der Schnecke, indem die Raupe mit dem Hintertheile ihres Leibes in der Wohnung (Futteral oder Sack genannt) steckt und die drei Brustfüsse mit den drei Paar Brustfüssen herausstreckt, um sich fortzubewegen, sich aber auch nach Belieben gänzlich in dieselbe zurückziehen kann.

Diese Raupen werden „Sackträger“ genannt und sind von allen gewiss die interessantesten. Sie verfertigen sich ihre Säcke theils aus ihrem eigenen Gespinnst, welches manche noch äusserlich mit verschiedenen Pflanzentheilen bedecken, theils schneiden sie sich dieselben sehr kunstvoll aus Blattstücken zurecht.

Dabei halten sich die Individuen einer Art (species) immer streng an ein und dieselbe Form, so dass wir schon aus dem Gehäuse der Raupe mit wenigen Ausnahmen auf die species des Falters mit Sicherheit schliessen können.

Welche Mannichfaltigkeit der Form an diesen Gehäusen zu finden ist, lehrt uns am besten die Mottengattung *Coleophora*, von welcher schon über 100 europäische Arten bekannt sind, die fast sämmtlich nach ihren charakteristisch geformten Raupensäcken bestimmt werden können. Ich habe mir für diessmal die Sackbildung bei den Gattungen *Tinea*, *Incurvaria*, *Nematois* und *Adela* ausgewählt, und werde der wichtigsten Gattung, *Coleophora*, vorläufig nur im Allgemeinen erwähnen.

I. *Tinea* Z.

Bei dieser Gattung ist die Sackbildung vereinzelt; die meisten leben in Baumschwämmen und faulem Holz.

Doch gehören hieher die am meisten gefürchteten Sackträger, die unter den Namen Kleider-Motten oder Pelzschaben bekannt sind.

Es lassen sich zwei Arten unterscheiden: *Tinea tapetiella* L. und *pellionella* L. Beide verfertigen sich ihre Säcke aus dem Material, welches ihnen gerade bei der Hand ist, z. B. aus den von Tapeten, Fellen, Pelzen und Wollstoffen abgenagten Theilchen.

Im Juni bis August fliegen die Falter und legen ihre Eier in die betreffenden Gegenstände. Die aus dem Ei entwickelten Räumchen verfertigen sich sogleich ein kleines Säckchen, das sie durch allmähliges Hinzusetzen von neuem Material erweitern, und in welchem sie ihre Zerstörungen bis zum Frühjahr fortsetzen.

Das beste Mittel gegen diese lästigen Insekten ist, die Stoffe um die Flugzeit des Falters vollkommen von der Aussenwelt abzusperren, damit keines dieser kleinen Thierchen dazu kommen kann, seine Eier an diesen Gegenständen abzulegen; ausserdem sind stark riechende Stoffe, wie Campher, Benzin geeignet, dieselben von ihrem Besuch abzuhalten.

Sind dieselben schon eingedrungen, so kann man die Rupchen durch starkes Ausklopfen meist entfernen, was aber nur im August und September geht, so lang die Raupen noch jung sind und leicht herausfallen. Mit den eben genannten stark riechenden Stoffen oder mit Insektenpulver einzustreuen, hilft nichts mehr, wenn schon grossere Raupen vorhanden sind.

Hier reiht sich eine Art *Tineola biseliella* an, die ebenso einen Sack aus abgenagten Theilchen von Wollenstoffen, getrockneten Insekten in Sammlungen, oder von Haaren, Federn und Pelzwerk verfertigt und welche fast das ganze Jahr zu finden ist.

Es sind mir nur noch zwei Sacktrager vom Genus *Tinea* kannt.

1) *Tinea vinculella* H. S. Das Rupchen lebt an Felsen, besonders gern an Dolomit, in einem weisslichen, flachen Sack, der an den beiden Enden etwas gekrummt ist und sich schwer von der Farbe des Felsens unterscheiden lasst, und nahrt sich von den Flechten.

2) *Tinea parietariella* Brunad. Herr von Heyden fand den ziemlich langen, gleich breiten; nach hinten flach niedergedruckten, mit feinen Kalktheilchen bedeckten Sack an Weinbergsmauern. V. Stett. ent. Zeit. 1861.

II. Genus *Incurvaria* Hw.

Fast alle, mit Ausnahme von *capitella* sind Sacktrager, ihre Lebensweise ist sehr interessant, indem sie sich nicht mit einem Sack begnugen, sondern einen dreifachen sich anfertigen, von denen aber der erste meist verzehrt wird. Fast alle miniren in der Jugend, schneiden sich dann einen Sack aus Blattstucken aus,

den sie von frischen Blättern vergrössern, und leben später am Boden.

1) *Incurv. Zinkenii* Zell. Diese minirt die Blätter der Birken und Haseln in kleinen Fleckenminen, die sich oft zu 40 bis 50 in einem Blättchen befinden; hierauf beisst jedes Räumchen die Mine kreisförmig ab, so dass das Blatt oft siebförmig durchlöchert ist, und besitzt nun ein kleines linsenförmiges Säckchen; wird ihr dasselbe zu eng, so spinnt sie es an ein Blatt und schneidet sich ein grösseres Blattstück aus, welches nun die eine Seite des neuen Sackes bildet. Die andere Hälfte wird ebenso verfertigt und dieses Verfahren später noch einmal wiederholt. Bis dorthin skeletiren sie die Blätter; haben sie jedoch ihre vollkommene Grösse erreicht, so leben sie am Boden von altem Laub vom Juni bis zum nächsten Frühjahr, wo sich der Falter im April entwickelt.

2) *Incurv. mascullella* Hbn. Soll ähnlich an *Quercus* leben, doch von uns noch nicht in ihren früheren Zuständen aufgefunden. V. Kaltb. *Quercus*. Seite 26.

3) *Incurv. Koerneriella* Zell. Lebt ganz ähnlich wie *Zinkenii* an *Fagus sylv.* und *Tilia europ.* Doch ist der Sack doppelt so gross wie jener und schön braun. Man findet denselben unter grossen Buchenbäumen unter Laub.

4) *Incurv. Oehlmaniella* Tr. Die Minen entdeckten wir auf einer Fussreise am Arber; sie sind ähnlich wie bei *Zinken.* auf *Vaccin. Myrtillus.* Lebensweise ganz dieselbe, der Sack ist etwas glatter, kleiner und länglicher.

5) *Incurv. vetulella* Zett. Den Sack fand ich einmal in Oberaudorf an *Vaccin. Myrtillus.* In der Grösse steht er zwischen *Zink.* und *Koerneriella.*

6) *Incurv. rupella* H. Soll auf *Cacalia* vorkommen; ich fing den Falter auf dem Wendelstein bei Bairischzell und auf dem Kaiser bei Kufstein, doch konnte ich trotz allen Suchens an *Cacalia* keine Minen finden.

7) *Incurv. trimaculella* H. S. Eine seltene Art, deren Entwicklungsgeschichte ich in Oberaudorf entdeckte. Sie minirt die Blätter von *Saxifraga rotundifolia*, nicht aber wie

ihre Vorgänger in Fleckenminen, sondern in langen geschlängelten Gängen, die sich im Blatte oft vielfach kreuzen. Am Ende derselben schneidet sie ihr rundes Säckchen aus, und lebt dann am Boden. Die im Frühjahr gesammelten Minen ergeben noch in demselben Jahr meist den Falter, einige überwintern auch.

8) *Incurv. prosectella* Heyd. Ich erzog dieses schöne Thier, einmal im Frühjahr in Oberaudorf aus den einem Raupenkasten, in welchem leider kein Sack zu finden war.

III. Genus *Nematois* Hb.

Die Falter dieser Gattung schwärmen meist an Blumen, in deren Samen sie auch ihre erste Entwicklungsperiode als Ranpen zubringen; später leben dieselben am Boden unter Laub.

Die Meisten sind bekannt.

1) *Nemat. scabiosellus* Scop. Im Juni und August sieht man häufig das schöne goldglänzende Thierchen mit seinen langen Fühlern auf der *Scabiosa arvensis* sitzen. Dr. Ottmar Hofmann brachte ein Pärchen in einen mit Scabiosen-Blumen gefüllten Kasten, auf welche sie ihre Eier auch legten, und bald die Räumchen sich entwickelten. Diese benützen anfangs den Samen zu ihrer Wohnung, setzen später an der Vorderseite zermahlte Pflanzentheilchen an, wodurch sie ihren Sack allmählig vergrößern und endlich den Samen abbeissen. Der Sack stellt dann eine unregelmässig ovale, in der Mitte etwas eingebogene Form dar, lebt unter Laub, überwintert, und ergibt den Falter meist in Mai oder Juni des nächsten Jahres; einige leben jedoch noch ein Jahr lang.

2) *Nemat. violellus* S. V. Trägt man im Herbst die Blüthen von *Gentiana Pneumonanthe* und *asclepiadea* ein, so wird man öfters in den unreifen Samenkapseln kleine, weisse Räumchen bemerken, die sich aber bald kleine, längliche Säckchen verfertigen. Diese lassen sich dann zur Erde fallen und erweitern ihren Sack, der flach, mit Sandkörnchen bedeckt ist und allmählig eine birnförmige Gestalt annimmt. Die Entwicklung ist nun ganz ähnlich der vorhergehenden Art.

3) *Nemat. cupriacellus* H. soll ebenfalls in der Jugend an *Succisa pratensis* sich aufhalten.

4) *Nemat. Pfeifferellus* H. Nach Dr. Wooke lebt derselbe anfangs auch an *Succisa pratensis*.

5) *Nemat. Schiffermüllerellus* S. V. Nach Anton Schmid lebt die Raupe anfangs in *Ballota nigra* Blüthen. Der Sack ist filzig, abgerundet, in der Mitte verengt. V. Berlin. ent. Zeitung. 1860.

6) *Nemat. minimellus* S. V. Trägt man die Blumen von *Succisa pratensis* im Späthsommer ein, so wird man bald unter denselben kleine dunkelbraune Säckchen finden, welche in der Mitte eingebogen sind. Dieselben verändern auch ihre Gestalt nicht mit dem Vergrössern des Sackes.

7) *Nemat. Dumeriliellus* Dup. Den Sack fand ich in Wörth bei Regensburg am Boden; er ist ähnlich der vorigen Art und lebt in der Jugend wahrscheinlich in den Blüthen von *Hypericum perforatum*.

IV. Genus *Adela* Lart.

Die Raupen dieser Gattung leben in der Jugend in Samen und bereiten sich auch ihre Säckchen aus Samentheilchen. Später verlassen sie dieselben, gehen auf die Erde und leben nun am Boden. Sie sind nur wenig bekannt.

1) *Adela fibulella* S. V. Die Falter legen ihre Eier in die Blüthen von *Veronica officinalis*; diese Eier entwickeln sich dann in den Samenkapseln, in denen sich die Räupchen ihre kleinen Säckchen verfertigen; später gehen sie zur Erde und leben unter Laub. Die Säckchen werden anfangs gesponnen und dann mit Samentheilchen, später mit feinen Sandtheilchen bedeckt. Erwachsen sind sie fast gleichbreit, fast 3''' lang, etwas gewölbt, ergeben den Falter nach der Ueberwinterung im Mai und Juni.

2) *Adela Frischella* H. Anton Schmid entdeckte die Raupe zuerst in den Samen von *Sisymbrium alliaria*. Ich fand dieselbe in Oberaudorf in den Schoten von *Lunaria rediviva*, in denen sie von den Samen lebten und sich ihre Säckchen ver-

fertigten. Dieselben sind fast noch einmal so breit, als die der vorhergehenden Art und nach vorn meist weisslich, da die Raupen später von den zarten Zwischenwänden der Schoten leben und auch von diesem Material ihren Sack vergrössern.

4) *Adela Degeerella* L. Der früheste Jugendzustand dieses verbreiteten Thierchens ist noch unbekannt. Der Sack ist nach Treitschke ausgebogen, hinten breit, vorn schmaler und aus mehreren Blättern zusammengesetzt. Er soll auf *Anemone nemorosa* und *Alsine media* leben, von denen er nur das Blattgrün frisst.

5) *Adela Ochsenheimerella* H. Den Sack fand Herr von Heyden unter losen Steinen; derselbe soll von dem der *Nemophora pilulella* nicht zu unterscheiden sein. V. Stettin ent. Zeit. 1862.

6) *Adela Sulzeriella* Z. Herr Mühlich fand den Sack unter *Ligustrum* Hecken, unter Laub, er ist erdfarben, $3\frac{1}{2}$ '' lang und mit Sandkörnchen bedeckt. V. Berl. ent. Zeit. 1863.

V. Genus *Coleophora* Z.

Eine der schönsten Gruppe der Tineiden, welche sowohl durch die entwickelten Thiere, als auch durch die Lebensweise der Raupen streng abgeschieden ist, bilden die Coleophoren. Alle sind Sackträger und bei ihnen ist die Sackbildung die mannichfaltigste. Die Meisten miniren in ihrer Jugend und verfertigen sich ihre Säcke aus den Blattheilen, die ihnen vorher als Nahrung gedient haben. Andere spinnen ihren Sack (Samenfresser) und bedecken denselben mit verschiedenem Material.

So sehen einige den Blättern, andere den Samen ähnlich, und sind oft schwer von der Pflanze, auf der sie leben, zu unterscheiden.

Die in den Blättern befindlichen Minen, in denen man gewöhnlich den Anheftungsring des Sackes bemerkt, verrathen am ersten ihre Anwesenheit.

Eine einzige von den vielen Coleophoren-Arten tritt schädlich auf, welche ich kurz anführen will, es ist diess:

Coleophora laricella H.

Ein ganz kleines, grauglänzendes Thierchen, das aber durch sein massenhaftes Auftreten den Lärchen so empfindlichen Schaden verursachen kann, dass ganze Waldungen im Frühjahr ein krankhaftes Ansehen erhalten, welches sich erst später wieder durch frische Triebe verliert. Das kleine Räumchen minirt anfangs die Nadeln, die sich dadurch kräuseln und absterben, benützt zuerst einen abgebissenen Theil der Nadel zu seinem Säckchen, welches es dann beständig mit sich trägt. Später erweitert es dasselbe, bohrt sich mit dem Vordertheile in die Nadeln ein, und zerstört dadurch viele Nadeln. Zur Verpupung spinnt es sich an den Nadeln fest und entwickelt sich im Herbst als Falter.

Statt einer speciellen Aufzählung der einzelnen Arten verweise ich auf folgende Arbeiten über Coleophoren.


1) Dr. Herrich. Schäfer: Ueber Eintheilung der Säcke. V. Correspondenzblatt für Sammler von Insekten. Seite 158.

2) Stainton: Ueber Naturgeschichte der Tineiden. Band IV, in welchem 24 Arten beschrieben sind.

3) Zeller; *Linnaea entomologica* in den frühern Jahrgängen.

4) Kaltenbach. *Phytophagen Deutschlands*. V. Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der Rheinlande, bei den einzelnen Pflanzen.

5) Auf einen demnächst in der Stettiner entomol. Zeitung erscheinenden Aufsatz von Dr. Ottmar Hofmann über Preisselbeer-Coleophoren.



Meteorologische Beobachtungen in Herrieden,

in Verbindung mit den herrschenden Krankheiten

im Etatsjahre 1866—67, resp. Kalenderjahr 1867

von

Dr. Heldenschreider, prakt. Arzt.

(Hiebei eine graphische Tafel.)



A. Ganzes Jahr.

Die tägliche, mittlere Luftbewegung im Kalenderjahre 1867 war einem Drucke von 4.38^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend; der mittlere Barometerstand 762.82^{mm}, um 0.19^{mm} über dem 28jährigen Durchschnitt. Der höchste war am 24. November 1867. Nachmittags 1 Uhr mit 776.83^{mm}; der tiefste am 2. Dezember 1867. Morgens 7 Uhr: 742.67^{mm}. Die Differenz zwischen Maximum und Minimum betrug daher 34.16^{mm}, fast den 22. Theil des Gesamtdruckes der auf unserer Erde ruhenden Luftsäule.

Die mittlere Temperatur des Kalenderjahres 1867 war 9.83° C (7.87° R), um 0.04° C (0.03° R) unter dem 56jährigen Durchschnitt. Der höchste Thermometerstand war am 20. August mit 30.3° C (24.3° R), der tiefste am 10. Dezember mit —26.6° C (—21.3° R). Die Aufeinanderfolge der einzelnen Monate des Kalenderjahres 1867 in Rücksicht auf ihre mittlere Temperatur war: Dezember —1.55°, Januar —0.10°, November 2.42°, März 3.89°, Februar 4.26°, Oktober 8.49°, April 9.17°, Mai 16.16°, September 16.36°, Juli 18.55°, Juni 19.09°, August 21.39°. Ueber 25° stand das Thermometer im Laufe des Jahres an 37 Tagen, unter 0° stand das Thermometer an 147 Tagen.

Der Niederschlag ergab eine Höhe von 736.1^{mm}, um 73.3^{mm} über dem 10jährigen Durchschnitt. In Hinsicht der Höhe des wässerigen Niederschlages war die Aufeinanderfolge der Monate: Juli 82.9^{mm}, März 80.9, Februar 78.3, Mai 76.8, Juni 73.8, Dezember 73.4, Januar 72.2, Oktober 66.8, April

47.6, August 33.0, November 32.7, September 17.9^{mm}. Die Grundwassermessungen entzifferten eine mittlere Entfernung des unterirdischen Wassers von der Erdoberfläche in Betrag zu 4'10''7''' , um 9''0''' weniger als im 10jährigen Durchschnitt. Der höchste Stand war am 1. Januar mit 2'5''0''' , der tiefste am 1. September mit 7'8''6''' Abstand. Die Schwankung war somit 5'3''6''' , während sie im vorigen Jahre nur 4'7''6''' betragen hatte. Die Aequatorialluftströmung war, wie gewöhnlich in unseren Regionen, vorherrschend. Auf dieselbe treffen 219 Tage, während die Polarströmung nur 136 Tage umfasst. Von einzelnen Windrichtungen wurde W. an 106, NW. an 45, SO. an 41, SW. an 40, NO. an 38, O. an 36, S. an 32, und N. an 27 Tagen aufgezeichnet.

Gewitter hatten wir 18; 6 mehr als im 28jährigen Durchschnitt, und zwar 1 im Februar, 1 im März, 3 im Mai, 5 im Juni, 7 im Juli, und 1 im September.

Wetterleuchten beobachtete ich 30 Mal, 1 Mal im März, 4 Mal im April, 3 Mal im Mai, 5 Mal im Juni, 7 Mal im Juli, 6 Mal im August und 4 Mal im September. Die Zeit, in welcher das Minimumthermometer nicht unter den Gefrierpunkt fiel, war vom 18. April bis 27. September, eine Zeit, die genau dem 14jährigen Durchschnitt entspricht.

Die mittlere Bevölkerung des Kalenderjahres 1867 war 56.25^{0/0}, um 12^{0/0} mehr als im Durchschnitt. Die heitersten Monate waren der Juni und der August mit 32.0^{0/0}, der trübste der Oktober mit 81.5^{0/0}. Im Allgemeinen waren 85 Tage heiter und je 140 Tage gemischt und trüb.

Regen fiel an 138 Tagen, am meisten im Februar (an 19) am wenigsten im August (an 5 Tagen). Regen und Schnee fiel an 12 Tagen, Schnee an 19 Tagen, so dass nur 196 Tage nie-schlagsfrei waren. Nebel wurde an 37, Höhenrauch an 8 Tagen beobachtet.

Der Krankenstand des Kalenderjahres 1867 war im Allgemeinen geringer als im Durchschnitt; mit Ausnahme des Frühjahres hielten sich alle Jahreszeiten unter dem Mittel, wozu

hauptsächlich der höhere Stand des Grundwassers und die geringeren Bewegungen derselben, der häufige Niederschlag, der hohe Ozongehalt der Luft und der schwächere durchschnittliche Wellenschlag des europäischen Luftoceans, sowie die dem Mittel sehr genäherte Jahrestemperatur beigetragen haben werden.

Von den einzelnen 15 Monaten des Etatjahres 1866 67 waren 5, der Januar, Juni, Juli, September und Oktober 1867 unter, die übrigen über dem mittleren, procentalen Jahreskrankenstand. Die Extreme bilden der April und der Oktober 1867. Der erstere hielt sich 2.3% über, der letztere 2.0% unter dem Mittel. Die monatlichen Jahresschwankungen waren somit 4.3% , gegen 5.5% mit 17jährigen Durchschnitt. Mithin waren die Extreme um 1.2% mehr genähert, als im Durchschnitt. Die Asthenie der Krankheiten, die etwa um die Mitte der 50er Jahre die grösste Intensität erreicht hatte, verringert sich allmählig wieder.

B. Jahreszeiten.

a. Herbst 1866.

Die vorjährigen Herbstmonate September, Oktober, November 1866 hatten ein ziemlich unruhiges Luftmeer. Die mittlere Bewegung betrug 4.2mm Druck auf die Quecksilbersäule. Der mittlere Barometerstand war 762.79mm , um 0.16mm über dem Durchschnitt. Der tiefste am 25. November Abends 751.0mm , der höchste am 7. Oktober 773.1mm .

Die mittlere Temperaturbewegung war 10.32° , der mittlere Thermometerstand 10.39° , um 0.74° über dem Durchschnitt. Der höchste Thermometerstand war am 8. September mit 26.1° , der tiefste am 28. Oktober mit -8.9° .

Die Regenmenge war 137.7mm , um 6.9mm über dem Mittel.

Der Grundwasserstand war um $1'1''3'''$ höher, als im Durchschnitt.

Die vorherrschende Luftströmung war aequatorial; Verhältnisse derselben zur Polarströmung = 44:37.

Bedeckung des Himmels 50.08% , um 6.80% unter dem Mittel.

Krankenstand 0.6% über dem Mittel. Krankheitsformen sehr gemischt.

b. Winter 1866/67.

Die Wintermonate 1866/67 Dezember, Januar und Februar hatten eine mittlere Luftbewegung von 4.3mm , was wieder ein sehr unruhiges Luftmeer anzeigt. Der mittlere Barometerstand war 762.81mm , um 0.19mm über dem Durchschnitt. Höchster am 21. Februar 776.3mm , tiefster am 6. Februar 743.4mm .

Die mittlere tägliche Temperaturbewegung war 5.52° , der mittlere Thermometerstand 2.41° , um 2.51° über dem Mittel. Höchster Stand des Thermometers am 16. Februar 12.4° , tiefster am 20. Januar -15.9° .

Die Regenmenge war 268.7mm , um 116.3mm über dem Durchschnitt.

Der Grundwasserstand war um $1'9''4'''$ über dem Durchschnitt.

Die Aequatorialströmung herrschte vor; das Verhältniss derselben zur Polarströmung war wie $68:22$.

Bewölkung 71.75% , um 1.75% über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.1% unter dem Durchschnitt. Krankheitsformen katarrhalisch, rheumatisch.

c. Frühling.

Die Frühlingsmonate März, April, Mai hatten ein mässig bewegtes Luftmeer, welches im Mittel einen täglichen Druck von 4.1mm auf die Quecksilbersäule ausübte. Der mittlere Barometerstand war 759.99mm , um 2.64mm unter dem Durchschnitt. Höchster am 2. März 775.9mm , tiefster am 19. März 748.1mm .

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 6.63° , mittlerer Thermometerstand 9.89° , um 0.09° über dem Durchschnitt. Höchster am 12. Mai 28.2° , tiefster am 5. März -7.0° .

Mittlerer Ozongehalt 79.8 ‰.

Mittlere Feuchtigkeit der Luft 74.2 ‰.

Die Regenmenge war 205.1^{mm}, um 84.4^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserhöhe 8'' 11''' über dem Durchschnitt.

Vorherrschende Luftströmung äquatorial; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 52:40.

Bewölkung 56.75 ‰; um 6.75 ‰ über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 1.2 ‰ über dem Mittel. Krankheitsformen katarrhalisch, rheumatisch.

d. Sommer.

Die Sommermonate Juni, Juli, August hatten ein mässig bewegtes Luftmeer, welches eine tägliche Veränderung der Quecksilbersäule von 2.7^{mm} entzifferte. Der mittlere Barometerstand war 764.04^{mm}, um 1.41^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 27. Juni 771.62^{mm}, tiefster am 15. Juni 755.10^{mm}.

Die mittlere Temperaturbewegung war 11.56°, der mittlere Thermometerstand 19.19°, um 0.10° unter dem Durchschnitt. Höchster am 20. August 30.3°, tiefster am 10. Juli 3.4°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 77.6 ‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 74.5 ‰.

Regenmenge 189.7^{mm}, um 38.5^{mm} unter dem Durchschnitt.

Grundwasserstand 1'' 6''' höher als im Durchschnitt.

Vorherrschende Luftströmung äquatorial; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 57:35.

Bewölkung 36.75 ‰, um 5.75 ‰ weniger als im Durchschnitt.

Krankenstand 0.5 ‰ unter dem Mittel; Krankheitsformen gastrisch.

e. Herbst.

Die Herbstmonate September, Oktober, November hatten ein mässig bewegtes Luftmeer, welches im Mittel einen täglichen Druck von 3.5^{mm} auf die Quecksilbersäule ausübte. Der mitt-

lere Barometerstand war 765.61^{mm} , um 2.98^{mm} unter dem Durchschnitt. Höchster am 24. November 776.83^{mm} . tiefster am 8. Oktober 749.75^{mm} .

Die tägliche, mittlere Temperaturbewegung war 776° ; der mittlere Thermometerstand 8.93° , um 0.72° unter dem Mittel. Höchster am 2. September 28.2° , tiefster am 24. November -10.7° .

Der mittlere Ozongehalt der Luft war 80.8% .

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 82.6% .

Niederschlagshöhe 115.4^{mm} , um 15.4^{mm} unter dem Mittel.

Grundwasserhöhe $1'2''3'''$ unter dem Durchschnitt.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 60:31.

Bewölkung 61.75% , um 4.25% über dem Mittel.

Krankenstand 0.6% unter dem Durchschnitt Krankheitsformen gemischt.

C. Einzelne Monate.

Okttober 1886.

Luftmeer ziemlich ruhig; dessen mittlere tägliche Bewegung einem Druck von 2.2^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 765.19^{mm} , um 2.56^{mm} über dem 28jährigen Durchschnitt. Höchster am 7. 773.1^{mm} , tiefster am 26. 757.3^{mm} .

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 12.70°C . Mittlerer Thermometerstand 10.18° , um 0.27° unter dem 56jährigen Durchschnitt. Höchster am 1. 21.3° , tiefster am 28. -8.9° .

Regenhöhe nur 5^{mm} , um 30.6^{mm} unter dem 14jährigen Durchschnitt.

Grundwasserentfernung von der Erdoberfläche im Mittel $7'3''1'''$, um $1'8'''$ unter dem 11jährigen Mittel.

Polarströmung vorherrschend; Verhältniss zur Aequatorialströmung wie 24:7.

Bedeckung des Himmels 22.5% , um 32.5% unter dem 14jährigen Durchschnitt.

Krankenstand um 0.8% über dem 18jährigen Mittel des

Jahresstandes. Erhöhung durch die fast ununterbrochene Einwirkung des trocken kalten Passates. Krankheitscharakter von gastrischen in den katarrhalischen und entzündlichen übergehend. Keuchhusten unter den Kindern, zahlreiche Typhusfälle.

November 1866.

Luftmeer äusserst unruhig. Mittlere tägliche Bewegung desselben einem Druck von 7.0^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 762.48^{mm}, um 0.15^{mm} unter dem Durchschnitt. Höchster am 7. Morgens mit 770.5^{mm}, tiefster am 25. Abends mit 751.0^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 7.10° C. Mittlerer Thermometerstand 3.61°, um 0.42° über dem Durchschnitt. Höchster am 13. 12.8°, tiefster am 18. —4.8°.

Regenhöhe 88.2^{mm}, um 36.4^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung von der Erdoberfläche 8' 4" 3"', um 1' 2" 5"' unter dem Durchschnitt.

Polarströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Aequatorialströmung wie 26 : 4.

Bedeckung des Himmels 75.0 %₀, um 2.5 %₀ über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.8 %₀ über dem 17jährigen Jahresdurchschnitt. Erhöhung durch die heftige Revolution in der Atmosphäre. Krankheitsformen so veränderlich wie die Witterung, katarrhalisch, entzündlich, gastrisch, rheumatisch, exanthematisch, Alles durcheinander.

Dezember 1866.

Luftmeer unruhig; dessen mittlere tägliche Bewegung einem Druck von 4.2^{mm} auf die Quecksilbersäule ausübend. Mittlerer Barometerstand 764.26^{mm}, um 1.63^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 20. 775.9^{mm}, tiefster am 16. 749.4^{mm}.

Die mittlere tägliche Temperaturbewegung betrug 4.50°; die mittlere Tagestemperatur war 2.25°, um 2.44° über dem Durchschnitt. Höchste am 6. 9.7°; tiefste am 25. —5.3°.

Regenhöhe 118.2^{mm}, um 71.4^{mm} über dem Mittel.

Grundwasserentfernung 5' 6" 3"', um 2' 4' 5"' über dem Mittel.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss zur Polarströmung wie 25:6.

Bedeckung des Himmels 70.0 % „, um 5.0 % „ unter dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.2 % „ über dem monatlichen Jahresdurchschnitt. Erhöhung durch eine gutartige Masernepidemie verursacht. Dieselbe nahm ihren Lauf von SW. nach NO., wie es in unserer Gegend gewöhnlich der Fall ist, während der Altmühlfluss die nördliche Grenze bildete. Krankheitsform vorzugsweise rheumatisch-katarrhalisch — veranlasst durch die ungewöhnlich grosse Feuchtigkeit des Monats.

Januar 1867.

Luftmeer unruhig; tägliche mittlere Bewegung desselben einem Druck von 4.2^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 757.40^{mm}, um 5.13^{mm} unter dem Durchschnitt; höchster am 26. Nachmittags 767.1^{mm}, tiefster am 1. Morgens 744.9^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 6.02°; mittlerer Thermometerstand 0.10°, um 0.94° über dem Durchschnitt. Höchster am 28. 9.2°, tiefster am 20. —15.9°.

Regenhöhe 72.2^{mm}, um 9.7^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung von der Erdoberfläche im Mittel 2' 1" 0" geringer als im Durchschnitt.

Vorherrschende Luftströmung vom Aequator; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 22:9.

Bedeckung des Himmels 75.0 % „, dem Durchschnitte entsprechend.

Krankenstand 1.0 % „ unter dem monatlichen Jahresmittel. Verringerung desselben vorzugsweise dem hohen Stande des unterirdischen Wassers zuzuschreiben. Krankheitsformen wenig ausgeprägt, die katarrhalische etwas vorherrschend.

Februar.

Luftmeer ziemlich unruhig; mittlere tägliche Bewegung desselben eine Veränderung von 4.4^{mm} auf die Quecksilbersäule ausübend. Mittlerer Barometerstand 766.80^{mm}, um 4.17^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 21. Morgens 776.3^{mm}, tiefster am 6. 1½ Uhr Nachmittags 743.4^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 8.34°, mittlerer Thermometerstand 5.08°, um 4.12° über dem Durchschnitt. Höchster am 16. 12.4°, tiefster am 4. —3.3°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 82.0^{0/10}.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 91.0^{0/10}.

Niederschlagshöhe 78.3^{mm}, um 35.2^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 10'' 8''' weniger als im Durchschnitt.

Vorherrschende Luftströmung Aequatorial; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 21:7.

Bedeckung des Himmels 70.0^{0/10}, um 7.5^{0/10} über dem Durchschnitt.

Krankenstand 0.4^{0/10} über dem monatlichen Jahresmittel. Krankheitsformen vorzugsweise katarrhalisch-rheumatisch, durch die feuchtwarme Witterung verursacht; mehrere Typhuskranken, wahrscheinlich in Folge des sinkenden Grundwassers.

März.

Luftmeer unruhig; mittlere tägliche Bewegung desselben einem Druck von 4.0^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 758.12^{mm}, um 4.51^{mm} unter dem Mittel. Höchster am 2. Nachmittag 1 Uhr 775.9^{mm}, tiefster am 19. Morgens 748.1^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturextreme 7.19°, mittlere Tages-Temperatur 3.76°, um 0.65° unter dem Durchschnitt. Höchster Thermometerstand am 26. 17.1°, tiefster am 5. —7.0°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 78.0^{0/10}.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 83.6^{0/10}.

Regenhöhe 80.9^{mm}, um 26.8^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 4'' 9''' höher als im Durchschnitt.

Vorherrschende Luftströmung polar; Verhältniss derselben zur Aequatorialströmung wie 19:12.

Bedeckung des Himmels 67.5%, um 10.0% über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.6% über dem monatlichen Jahresmittel. Erhöhung namentlich durch den geringen Ozongehalt der Luft und die grössere Niederschlagsmenge, sowie durch den tiefen Stand des Luftmeeres verursacht.

Krankheitscharakter rheumatisch und katarrhalisch; mehrere raschtödtende Croupfälle unter den Kindern.

April.

Luftmeer sehr unruhig; täglich mittlere Bewegung einem Druck von 5.6^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 760.22^{mm}, um 2.11^{mm} unter dem Durchschnitt. Höchster am 2. Morgens 771.0^{mm}, tiefster am 8. 1 Uhr Nachmittags 749.6^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 8.50°. Mittlerer Thermometerstand 9.67°, um 0.32° unter dem Durchschnitt. Höchster am 19. 21.3°, tiefster am 13. —1.9°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 81.5%.

Mittlerer Feuchtigkeitsgrad derselben 76.4%.

Regenhöhe 47.6^{mm}, um 21.2^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung um 8'' 3''' über dem Mittel.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 24:6.

Bewölkung 65.0%, um 17.5% über dem Durchschnitt.

Krankenstand der höchste des Jahres 2.3% über dem monatlichen Jahresmittel. Erhöhung vorzüglich durch den gelinderen Winter mit dem vorherrschenden Antipassat veranlasst, indem hier die Kulmination der Erkrankungen um einige Wochen hinausrückt und statt in den März in den April fällt. Krankheitsformen vorzugsweise katarrhalisch und rheumatisch, wie diess gewöhnlich bei vorherrschender niederschlagsreicher Aqua-

torialströmung der Fall ist. Einzelne Scharlachfrieselfälle unter den Kindern.

Mai.

Luftmeer sehr ruhig; tägliche mittlere Bewegung einem Druck von 2.6^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 761.63^{mm}, um 1.00^{mm} unter dem Durchschnitt. Höchster am 5. Morgens 768.7^{mm}, tiefster am 12. Abends 751.7^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 11.99°, mittlerer Thermometerstand 16.16°, um 0.65° über dem Durchschnitt. Höchster am 12. 28.2°, tiefster am 26. 0.1°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 80‰.

Mittlere, relative Feuchtigkeit der Luft 72.6‰.

Regenhöhe 76.6^{mm}, um 36.4^{mm} über dem Mittel.

Grundwasserentfernung um 1' 1" 9''' weniger als im Durchschnitt.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 18 : 11.

Bewölkung 37.5‰, um 7.5‰ unter dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.4‰ über dem monatlichen Jahresmittel. Erhöhung durch die in der ersten Hälfte des Monats noch nachwirkenden, ungünstigen Witterungsverhältnisse des April veranlasst. Krankheitscharakter anfangs vorzugsweise katarrhalisch, gegen das Ende des Monats mehr gastrisch.

Juni.

Luftmeer mässig bewegt; mittlerer täglicher Druck der Luftwellen auf die Quecksilbersäule 3.6^{mm}. Mittlerer Barometerstand 764.65^{mm}, um 2.02^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 27. Morgens 771.62^{mm}, tiefster am 15. Morgens 755.10^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 10.95°, mittlere Temperatur 19.09°, um 0.30° über dem Durchschnitt. Höchster am 2. 28.8°, tiefster am 9. 4.1°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 74.1‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt 82.3%.

Regenhöhe 73.8^{mm}, um 0.4^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 9'' 9''' geringer als im Durchschnitt.

Polarströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Aequatorialströmung 20:10.

Bewölkung 32.5%, um 12.5% unter dem Durchschnitt.

Krankenstand nm 1.2% unter dem Durchschnitt. Verminderung in dem regelmässigen Wechsel der beiden Hauptluftströmungen, dem grossen Ozongehalt der Luft, sowie dem hohen Grundwasserstand zu finden. Der Form nach waren die gastrischen Erkrankungen vorherrschend, aber auch Gicht und Rheuma stark vertreten. Die grosse Hitze der drei ersten Tage des Monats bewirkte einzelne Insolationen.

Juli.

Luftmeer wenig bewegt; mittlerer täglicher Wellendruck 2.4^{mm} auf die Quecksilbersäule. Mittlerer Barometersand 762.98^{mm}, um 0.35^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 9. Morgens 767.89^{mm}, tiefster am 19. Morgens 755.87^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 10.75°, mittlerer Thermometerstand 18.55°, um 2.41° unter dem Durchschnitt. Höchster am 22. 28.8°, tiefster am 10. 3.4°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 82.5%.

Mittlere Feuchtigkeit der Luft 68.0%.

Regenhöhe 82.9^{mm}, um 0.6^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 3''' geringer als im Mittel.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 21:10.

Bewölkung 45.0%, um 5.0% über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 1.2% unter dem Mittel. Ursache der günstigen Gesundheitsverhältnisse die kühle Temperatur bei mässiger Regenmenge, der reichliche Ozongehalt der Luft, sowie der wenigstens im ersten Drittheile noch immer hohe Grundwasserstand. Krankheitsformen meistens gastrisch, doch auch Gicht und Rheuma ziemlich vertreten. Gegen Ende des Monats,

wahrscheinlich in Folge des zurückweichenden Grundwassers, mehrere Typhusfälle.

August.

Luftmeer sehr ruhig; mittlere tägliche Bewegung desselben einem Druck von 2.0^{mm} auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 764.50^{mm}, um 2.37^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 29. Morgens 769.32^{mm}, tiefster am 2. Morgens 756.35^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 12.97°, mittlerer Thermometerstand 21.39°, um 1.82° über dem Durchschnitt. Höchster am 20. 30.3°, tiefstes am 5. 6.0°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 76.3‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 74.1‰.

Regenhöhe nur 33.0^{mm}, um 39.5^{mm} unter dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung um 5'' 5''' grösser als im Durchschnitt.

Aequatorialströmung nur wenig vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 16:15.

Bewölkung 32.5%, um 10.0% unter dem Durchschnitt.

Krankenstand um 1.0% über dem Mittel. Erhöhung durch die zu langsame Luftbewegung, den tiefen Stand des Grundwassers und die durch den Scirocco bewirkte grosse Hitze veranlasst. Krankheitscharakter entschieden gastrisch, viele Cholerinefälle.

September.

Luftmeer wenig bewegt, täglicher mittlerer Druck desselben 2.2^{mm} auf die Quecksilbersäule. Mittlerer Barometerstand 765.98^{mm}, um 3.35^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 27. 773.76^{mm}, tiefster am 24. 760.91^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 10.47°, mittlerer Thermometerstand 16.36°, um 1.06° über dem Durchschnitt. Höchster am 2. 28.2°, tiefster am 27. —5.4°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 73.1‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 83.5‰.

Regenhöhe 17.9mm, um 25.8mm unter dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 1' 11" 8''' grösser, als im Mittel.

Beide Luftströmungen genau gleich.

Bewölkung 40.0‰, um 5.0‰ unter dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.1‰ unter dem Mittel. Die günstigen Gesundheitsverhältnisse vorzugsweise dem steten Wechsel der Passate zuzuschreiben. Krankheitscharakter zu Anfang des Monats in Folge der grossen Hitze gastrisch. Vereinzelte, sehr intensive Cholerinefälle, sowie mehrere Ruhrerkrankungen unter den Kindern in Folge unzeitigen Obstgenusses. Gegen Ende des Monats wegen raschen Temperaturwechsels katarrhalischer Krankheitscharakter vorherrschend. Keuchhusten unter den Kindern.

Oktober.

Luftmeer sehr unruhig; tägliche mittlere Bewegung derselben einer Veränderung der Quecksilbersäule von 4.4mm entsprechend. Mittlerer Barometerstand 762.71mm, um 0.08mm über dem Durchschnitt. Höchster am 26. 773.13mm, tiefster am 8. 749.75mm.

Mittlerer tägliche Temperaturbewegung 7.20°. Mittlerer Thermometerstand 8.49°, um 2.45° unter dem Durchschnitt. Höchster am 15. 17.2°, tiefster am 10. —1.1°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 80.8‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 79.2‰.

Regenhöhe 66.8mm, um 31.2mm über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 1' 6" 5''' grösser als im Durchschnitt.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung wie 25 : 6.

Bewölkung 82.5‰, um 27.5‰ über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 2.0‰ unter dem Mittel. Krankheitsformen verschieden; kein bestimmter Krankheitsgenius ausgeprägt. Typhus ziemlich zahlreich, hauptsächlich durch den tiefen Stand des Grundwassers hervorgerufen.

November.

Luftmeer mässig bewegt; täglicher mittlerer Wellenschlag einem Druck von 3.8^{mm}, auf die Quecksilbersäule entsprechend. Mittlerer Barometerstand 767.94^{mm}, um 5.31^{mm} über dem Durchschnitt. Höchster am 24. Abends 776.83^{mm}, tiefster am 17. Morgens 753.44^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 5.60°. Mittlerer Thermometerstand 2.42°, um 0.77° unter dem Durchschnitt. Höchster am 1. 15.2°, tiefster am 24. —10.7°.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 86.2‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt 85.2‰.

Regenhöhe 32.7^{mm}, um 18.8^{mm} unter dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung 3'' 5''' grösser als im Mittel.

Aequatorialströmung vorherrschend; Verhältniss zur Polarströmung 20 : 10.

Bewölkung 62.5‰, um 10.0‰ unter dem Mittel.

Krankenstand um 0.3‰ über dem monatlichen Jahresmittel. Erhöhung durch die wechselvolle Witterung. Krankheitscharakter katarrhalisch, rheumatisch, Typhus in Folge des tiefen Grundwasserstandes noch ziemlich zahlreich.

Dezember.

Luftmeer ziemlich unruhig, mittlere tägliche dadurch bewirkte Quecksilberveränderung 4.6^{mm}. Mittlerer Barometerstand 769.88^{mm}, um 1.74^{mm} unter dem Durchschnitt. Höchster am 25. Morgens 771.87^{mm}, tiefster am 2. Morgens 742.64^{mm}.

Mittlere tägliche Temperaturbewegung 5.27°, mittlerer Thermometerstand —1.55°, um 1.36° unter dem Durchschnitt. Höchster am 2. 8.7°, tiefster am 10. —26.6° C.

Mittlerer Ozongehalt der Luft 87.0‰.

Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt derselben 91.6‰.

Regenhöhe 73.4^{mm}, um 26.6^{mm} über dem Durchschnitt.

Grundwasserentfernung um 5'' 7''' unter dem Mittel.

Aequatorialströmung nur schwach vorherrschend; Verhältniss derselben zur Polarströmung 16 : 15.

Bewölkung 77.5%, um 2.5% über dem Durchschnitt.

Krankenstand um 0.5% über dem Mittel. Erhöhung durch den schroffen Wechsel die beiden Passate zu Anfang und dem vorherrschenden asiatischen Luftstrom zu Ende des Monats. Krankheitscharakter Anfangs gemischt und asthenisch, zu Ende mehr entzündlich und torpid. Typhusfälle im Abnehmen, wahrscheinlich wegen des steigenden Grundwassers. Einzelne rasch tödtende Croupfälle unter den Kindern; dagegen gutartig verlaufende Varizellen.

Der Salmiak

als Ersatzmittel für die Salzsäure bei der von v. Liebig angegebenen Bereitung des Kleienbrodes.

Von

C. Puscher in Nürnberg.

Ein kürzlich von v. Liebig wieder angeregtes Verfahren, billigeres und nahrhafteres Brod zu bereiten, beruht einerseits darauf, durch den ganzen Kleiengehalt dem Mehle mehr stickstoffhaltige, also nahrhaftere Bestandtheile zuzuführen, andererseits die zum Aufgehen des Brodes nothwendige Kohlensäureentwicklung, nicht wie seither üblich war, durch Gährung, wodurch ein mehrere Procente betragender Verlust an Mehl bedingt ist, sondern mittelst Salzsäure und doppeltkohlensauren Natron herzustellen.

Der hiesige Gewerbeverein sah sich dadurch veranlasst, einige Backversuche anzustellen, die in meiner und des Gewerbereferenten Herrn Dr. Hiller Gegenwart in einer hiesigen Bäckerei ausgeführt, nachfolgende Resultate ergaben. Da das von v. Liebig vorgeschriebene Schrotmehl (2 Theile Roggen, 1 Theil Waitzen) hier nicht vorrätbig zu haben war, so wurden zu den ersten Versuchen, um dem Mehle seinen ganzen Kleiengehalt einzuverleiben, die dem Brodraitungsmehle noch fehlende 20 % Kleie beigemischt. Nachdem dann diesem Mehle die von v. Liebig bestimmten Mengen doppeltkohlensaures Natron und Kochsalz in Pulverform zugegeben war, wurde der 5. Theil dieses Gemenges herausgenommen und vorläufig beiseite gestellt. Die übrigen $\frac{4}{5}$ Mehl mit der vorgeschrie-

benen Menge mit Wasser verdünnter Salzsäure zum gleichförmigen Teige verarbeitet, gaben nach Hinzufügung des zurückbehaltenen $\frac{1}{5}$ Mehls und vollständiger Durchknetung, schön geformte Laibe, die sofort dem Backofen übergeben etwa eine Stunde längere Zeit, als wie das gewöhnliche Brod, zur Backung bedurften, dabei aber, weil durch die Knetung der grösste Theil der Kohlensäure entwichen war, wenig an Volumen zugenommen hatten. Zugleich zeigte sich gegenüber dem gewöhnlichen Brode eine Gewichtszunahme von $20 \frac{9}{10}$ Wasser. Dieser Kohlensäureverlust, sowie, dass nicht immer im Handel käufliche reine Salzsäure zu haben, das Abmessen der Letztern mittelst Areometer auch durch den Bäcker unsicher ist, veranlassten mich, den Salmiak, der, da er kein Crystallwasser enthält, sich immer gleich bleibt, statt der Salzsäure in Vorschlag zu bringen.

Schon lange wird zu vielen Bäckereien, wie z. B. zu unsern Lebkuchen zum Aufgehen derselben, dem Teige anderthalbkohlensaures Ammoniak (Hirschhornsalz) mit sicherem Erfolge zugesetzt; durch die Wechselwirkung des Salmiaks mit dem doppeltkohlensauren Natron erhält man aber ausser dem Kochsalz ein noch weit wirksameres Salz, das doppeltkohlensaure Ammoniak in Lösung. Deshalb bedarf man dann auch nur höchstens den $\frac{3}{4}$ Theil von den von v. Liebig vorgeschriebenen Mengen doppeltkohlensaurem Natron mit Salmiak zu zersetzen, wodurch zugleich noch eine kleine Kostenersparniss erzielt wird. So würden z. B. 1000 Pfd. Getraideschrot beiläufig fl. 3. 18 kr. doppeltkohlensaures Natron und Salzsäure erfordern, während man mit Anwendung von Salmiak mit fl. 2. 24 kr. dasselbe erreichen würde.

Eine Auflösung von doppeltkohlensaurem Natron und Salmiak nach atomistischen Verhältnissen in der zur Backung einer bestimmten Menge Getraideschrots nöthigen Wasser gelöst, gibt erst beim Erwärmen bis zu 45° R. die ersten Gasblasen von Kohlensäure ab; es geht daher beim Anmachen und Durchkneten des Teiges keine Spur von Kohlensäure verloren, was beim v. Liebig'schen Verfahren nicht der Fall ist. Die daher mit Salmiak wiederholt angestellten Versuche haben, was das Auftreiben anbelangt,

sich vollständig bewährt, während die nach v. Liebig'scher Vorschrift namentlich mit grössern Mengen von Getraideschrot (75 lb) erhaltenen Resultate ein nur wenig aufgegangenes Brod lieferten. Dem Brode, gleich dem Lebkuchen anderthalbkohlensaures Ammoniak zuzusetzen, steht, abgesehen von der grössern Menge Kohlensäure, die das bei Anwendung von Salmiak erzielte doppeltkohlensaure Ammoniak enthält, der mehr denn doppelt so hohe Preis entgegen. Der sich noch zeigende geringe laugenhafte Geschmack des mit Salmiak bereiteten Brodes rührt jedenfalls von der unvollkommenen Backung her. Die Laibe sollten, ehe sie in den Backofen kommen, vorher langsam bis zu 60° R., wodurch ein gleichmässigeres Aufgehen erzielt wird; erwärmt werden; leider fanden wir in der Bäckerei keine Gelegenheit dazu. Denn durch die Hitze des Backofens wird sofort eine feste Kruste auf der Oberfläche des Brodes erzeugt, während die Temperatur im Innern des Brodes wenig zugenommen hat. Die dann später eintretende Kohlensäureentwicklung durchbricht an der schwächsten Stelle die Kruste, wodurch das sogenannte Bersten der Brode entsteht. Würde man den Brodteig statt in Laiben in 1 bis 1½ Zoll hoher Kuchenform backen lassen, so würde man jedenfalls noch ein vollkommeneres Fabrikat erzielen; ein dadurch bedingtes rascheres Austrocknen ist wohl wegen des grössern Wassergehaltes nicht zu befürchten.

Ergebniss von Düngungsversuchen.

Von

Dr. C. Kellermann,

k. Rector der Kreislandwirthschaftsschule in Lichtenhof bei Nürnberg.

Bei dem landwirthschaftlichen Institute zu Lichtenhof bei Nürnberg wurde im Jahre 1866 — in Folge Ausschreibens der agriculturchemischen Versuchsstation München — ein Düngungsversuch mit Stallmist und Phosphaten begonnen, welcher nach der dazu gewählten Rotation (Norfolker Fruchtwechsel),

nehmlich: 1. Jahr: Runkeln,
2. „ Gerste mit Kleeesaat,
3. „ Klee,
4. „ Winter-Roggen

sich auf die Jahre 1866, 1867, 1868 und 1869 auszudehnen hat.

Es wurde ein bayerisches Tagwerk von einem fast eben gelegenen Acker herausgemessen und diese genau fixirte Fläche in 4 gleich grosse Abtheilungen getheilt, die wir mit Nr. I, II, III und IV bezeichnen wollen. Der Acker ist gegen Süden sanft geneigt, besteht in der Krume aus lehmigem Sandboden, im Untergrunde aus kühlem Quarzsande und wurde seit vielen Jahren in gewöhnlicher Weise — mit Hack- und Körnerfrüchten und Futtergewächsen abwechselnd — angebaut.

Die Düngung der einzelnen Parzellen war folgende:

- Nr. I erhielt 75 Ctr. (bayer. Gew.) guten Stallmist;
 Nr. II „ 75 Ctr. „ „ guten Stallmist und $1\frac{1}{2}$ Ctr.
 feinstes Knochenmehl à 4 fl.;
 Nr. III „ 75 Ctr. „ „ guten Stallmist und $1\frac{1}{2}$ Ctr.
 Superphosphat d.i. mit Schwefelsäure aufgeschlossenes Kno-
 chenmehl à 5 fl.;
 Nr. IV erhielt keinen Stallmist, dagegen 3 Ctr. feinstes Knochen-
 mehl à 4 fl.

75 Ctr. Stallmist pro $\frac{1}{4}$ Morgen, oder 300 Ctr. auf den ganzen Morgen, ist eine starke Düngung auf die Zeit von vier Jahren.

Am 8. und 9. Juni 1866 wurde der Stallmist auf Nr. I, II und III untergeackert; am 12. Juni 1866 wurden die 3 Ctr. Knochenmehl auf Nr. IV, am 13. Juni 1866, Vormittags, nachdem es die Nacht vorher geregnet hatte, die Phosphate auf II und III ausgestreut.

Am 13. Juni 1866, Nachmittags, ward die Pflanzung begonnen und innerhalb 3 Tagen auf sämtlichen Parzellen vollendet. Circa 13000 Pflanzen kamen auf den ganzen Morgen. Anfangs August gejätet, Mitte August gehäufelt. Ernte am 5., 6., 7. und 8. Oktober 1866.

Ernte-Resultat.

Auf Abtheilung	Rüben		Blätter	
	Bayerisch Ctr.	Pfd.	Bayerisch Ctr.	Pfd.
Nr. I	63	51	14	29
Nr. II	64	24	12	24
Nr. III	58	73	13	53
Nr. IV	52	61	11	17

Da die Wägungen und Aufschreibungen mit grösster Genauigkeit gemacht wurden, so können die frappanten Ertrags-Differenzen, wonach z. B. mit 75 Ctr. Stallmist allein (Nr. I) mehr Rüben und Blätter producirt wurden, als mit 75 Ctr. Stallmist plus $1\frac{1}{2}$ Ctr. Superphosphat (Nr. III), nicht etwa

einem Mangel an präziser Ausführung des Versuches zugeschrieben werden. Noch auffallender ist das unten folgende Ernte-Ergebniss des Jahres 1867, in welchem das umgerissene Feld rechtzeitig und sorgfältigst und bei feuchter Witterung mit Sommergerste und Klee angesäet wurde. Gerste und Klee gingen dicht auf; erstere litt aber sehr durch den Frost in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 1867. Die meisten Spitzen waren nach dem Froste gelb und welk. Der Klee stand sehr gut bis Mitte August; dann brannte er grösstentheils aus.

Gerste mit noch übrig gebliebenem Klee wurden am 3. und 4. August 1867 geerntet. Und obgleich der Versuch durch die Witterung wesentlich alterirt wurde, so spricht auch dieses Ernte-Ergebniss für die Düngung mit purem Mist, oder für Mist plus Knochenmehl.

Ernte-Resultat.

Auf Abtheilung	An Gerste — Körnern nach Mass	An Gerste-Körnern nach Gewicht		Schffl. — Gew. von jeder Par- celle		Stroh und Klee — Heu	
	bayer. Metzen	bayer. Ctr.	Pfd.	bayer. Ctr.	Pfd.	bayer. Ctr.	Pfd.
Nr. I	3	1	27	2	52	4	11
Nr. II	2 Metz. 19 Mass	1	11	2	58	3	53
Nr. III	2 Metzen	—	84	2	52	3	32
Nr. IV	1 Metz. 26 $\frac{1}{2}$ Mss.	—	74	2	43	3	10

Bei einer Mittel-Ernte liefert Gerste pro bayer. Tagwerk an Körnern 4 Schöffel à 251 Pfund bayer. und an reinem Stroh 14 bayer. Ctr.

Bei solchen durchaus nicht erwarteten Ernte-Ergebnissen sehen wir selbstverständlich den Ernten der Jahre 1868 und 1869 mit Spannung entgegen! —

Abbildung und Beschreibung einiger Käfer

aus der Sturm'schen Sammlung in Nürnberg.

Von

Gottlieb v. Koch.

V o r e r i n n e r u n g .

Hiermit liefert Unterzeichneter die Abbildungen und Beschreibungen einiger Käfer aus der Sturm'schen Sammlung zu Nürnberg. Sollten sich darunter schon anderswo beschriebene und abgebildete Arten befinden, so bittet er zu berücksichtigen, dass er kein Entomologe von Fach ist und die entomologische Literatur nicht kennt.

Für die Bereitwilligkeit, mit der mir die Frau Wittwen der sel. Sturm ihre Sammlung zu Gebot stellten, kann ich nicht umhin, ihnen öffentlich meinen Dank auszusprechen.

G. v. Koch.

Beschreibung der abgebildeten Arten.

Ceroplesis vicina. Sturm.

Tafel A. Fig. 1.

Schwarz, oben blaugrün überlaufen; das Halsschild rostroth bestäubt, vorn und hinten eng quergestreift, in der Mitte quer runzlich, an der Seite mit einem Dorn bewaffnet; die Flügeldecken grob punktirt, mit drei purpurrothen Querbinden, wovon die mittlere und hintere am Aussenrande zusammenhängen.

Länge 11—12, Breite 4—4 $\frac{3}{4}$ Linien.

Vaterland: Westindien?

Von kurzer und breiter Gestalt, doch dadurch in derselben von *C. brevis* St. unterschieden, dass die Deckschilde nach hinten sich verschmälern, welche bei jenem gleichbreit sind. Die Farbe ist schwarz, matt, nur das Halsschild und die Flügeldecken sind metallischgrün überlaufen und glänzend. Der Kopf ist locker punktirt, etwas runzlich, mit rostrothen Schüppchen belegt und mit einer über den Scheitel und die Stirn ziehenden Mittelfurche versehen; die Augen sind schwarz, die Fühler erreichen die Länge des ganzen Körpers. Das Halsschild ist etwas kürzer als breit, leicht gewölbt, nahe hinter dem Vorderrande mit einer eingedrückten Linie und hinter dieser mit mehreren Runzeln querüber besetzt, ebensolche befinden sich auch vor dem Hinterrand. Der Rücken ist mit kurzen Querrunzelchen besetzt, die Seiten nach hinten mit einem Dorn bewaffnet und die ganze Fläche nebst dem Halse mit leicht abreibbaren, rostrothen Schüppchen belegt. Ebenso das stumpf abgerundete Rückenschildchen. Die Flügeldecken sind kurz, an der Schulter beträchtlich breiter als das Halsschild, nach hinten allmählich etwas verschmälert, stumpf abgerundet, leicht gewölbt, vorne sehr grob und runzlich punktirt, nach hinten die Punkte minder stark, vor und hinter der Mitte und an der Spitze mit einer schmalen, purpurroth-

filzigen Querbinde geziert, welche sämmtlich die Naht nicht erreichen und wovon die beiden hinteren am Aussenrande zusammenhängen. Die Brust und der Hinterleib sind mit rost-rothen Schüppchen und die Beine mit einem grau-bräunlichem Staube bedeckt.

Ceroplesis brevis. Sturm.

Tafel A. Fig. 2.

Schwarz, das Halsschild mit rostgelben Schüppchen bedeckt, weitläufig punktirt, an den Seiten mit einem Dorn bewaffnet; die Flügeldecken punktirt, mit rostgelben Schüppchen bestreut und mit drei gelbröthlichen Querbinden geziert, wovon die beiden letzten am Aussenrande zusammenhängen.

Männchen: Länge 8, Breite 4 Linien.

Weibchen: Länge 11, Breite 5 Linien.

Vaterland: Port Natal.

Die Gestalt ist kurz und breit, die Grundfarbe schwarz, nur das Halsschild und die Flügeldecken sind mit schwachem Messingglanze überlaufen. Der Kopf ist punktirt, mit einer zarten Mittelfurche versehen und mit einem gelben Tomentum überzogen. Die Augen schwarzbraun. Die Fühler sind schwarz, beim Männchen länger als der Körper. Das Halsschild ist beträchtlich kürzer als breit und vorn bis zur Breite des Kopfes verengt, flach gewölbt, mit rostgelben Haarschüppchen bedeckt und mit grubchenartigen Hohlpunkten weitläufig übersät. Der Vorderrand leicht bogenförmig, hinter demselben eine eingedrückte Linie, ebenso am Hinterrand. Die Seiten hinten mit einem stumpfen Dorn besetzt. Das Rückenschildchen ist stumpf abgerundet und mit rostgelben Härchen bedeckt. Die Flügeldecken sind verhältnissmässig kurz, breiter als das Halsschild, vollkommen gleichbreit und hinten stumpf abgerundet, sehr leicht gewölbt, vorne mit grubchenartigen Hohlpunkten dicht besetzt, die auf der Mitte in kleinere, locker stehende Punkte übergehen, und gegen die Spitze sich fast ganz verlieren; vor und hinter der

Mitte und an der Spitze mit einer gelbröthlichen Querbinde geziert, wovon die nach hintenstehende mit der an der Spitze am Aussenrande verbunden ist und endlich ist die ganze Fläche der Flügeldecken noch mit Häufchen von rostgelben Haarschüppchen besprengt. Die Brust ist dicht mit rostgelben Haaren bekleidet. Der Hinterleib und die Beine mit Ausnahme der Füße mit gelben Härchen dicht belegt.

Das Weibchen ist von dem Männchen durch bedeutendere Grösse und durch kürzere Fühler unterschieden.

Hololepta procera. Erichs.

Tafel B. Fig. 1.

Länglich, nach hinten verengt, glatt, schwarz glänzend; die Stirn mit einem Höcker; die Flügeldecken an der Basis mit einem kurzen eingedrückten Strich und einem tiefen Randstreifen.

Länge 8, Breite $3\frac{1}{4}$ Linien.

Hololepta procera. Erichson. Klug, Jahrbücher der Insektenkunde I. p. 91. 5.

Vaterland: Java.

Gestalt länglich, vorne breit, nach hinten stark verengt, glatt, schwarz und glänzend. Der Kopf ist kurz, an den Seiten hinter den Augen ein Eindruck sichtbar, der Vorderrand beiderseits und in der Mitte ausgeschnitten, die Ecken der Ausschnitte Zähnechen bildend, die Stirn vorn mit einer Beule besetzt. Die Augen unten an den Seiten, länglichrund; die Kiefern gerade vorgestreckt, einfach, zugespitzt. Die Fühler schwarz. Das Halsschild ist breit, fast $\frac{1}{3}$ kürzer als breit, die Seiten sanft gerundet, schmal, abgesetzt gerandet, die Vorderecken stark gerundet, auf der Mitte des Rückens eine zarte, vorne abgekürzte, eingeritzte Linie und am Aussenrand, in den Vorderwinkeln sehr fein und sparsam punktirt. Das Rückenschildchen sehr klein und dreieckig. Die Flügeldecken sind kaum so lang als das Halsschild, an der Basis so breit als dieses, aber nach hinten verengt, an der Spitze, von aussen nach der Naht zu schief abgeschnitten

am Aussenrande mit einer, von der Schulter bis zur Spitze reichenden Randfurche versehen, an der Basis, neben der Schulter ein kurzer, eingeschnittener Strich. Das vorletzte obere Hinterleibsegment ist noch mehr verengt, als die Flügeldecken, spiegelglatt, doch am Rande sehr fein, zerstreut punktirt; das letzte Segment ist dicht punktirt, die Beine sind schwarz, die Füße pechbraun.

Hololepta parallela. Stürm.

Tafel B. Fig. 2.

Gleichbreit, flach, schwarz, glänzend; die Flügeldecken an der Basis aussen mit zwei kurzen, eingedrückten Strichen, einen gleichen aussen an der Spitze und einen breiten, tiefen Randstreifen.

Länge $5\frac{1}{2}$, Breite $2\frac{3}{4}$ Linien.

Vaterland: Caracas.

Der Körper platt gedrückt, schwarz, glatt und glänzend. Der Kopf ist quer, die Stirn eben, die Kiefern gerade vorgestreckt, zugespitzt, der linke an der Wurzel eingekerbt. Die Fühler sind schwarz, der längliche Kopf mit einem braunen Tomentum überzogen. Das Halsschild ist fast ein Drittel kürzer als breit, die Seiten schwach gerundet, mit einem feinen Rändchen umgeben und nach hinten fein punktirt; die Vorderecken sind abgerundet, ausgeschnitten, innen in ein Zähnchen übergehend; nach vorne, seitwärts auf den Rücken ein Grübchen und in der Mitte, hinten eine zart eingeschnittene Linie. Das Rückenschild klein und rund. Die Flügeldecken sind nicht länger als das Halsschild, die Seiten etwas geschwungen und mit einer breiten und tiefen, hinten abgekürzten Randfurche, welche unter der Schulter beginnt, besetzt und hinten von aussen nach innen schief abgeschnitten; an der Wurzel neben der Schulter sind zwei kurze, etwas schiefe eingeschnittene Striche und noch ein gleicher gerader, an der Spitze, zu bemerken. Das vorletzte obere Hinterleibsegment ist an den Seiten, bis an den Hinterrand fein und locker punktirt. Die vordersten Schienen sind

vierzählig und die beiden letzten fast vereinigt, so dass sie nur durch einen tiefen Einschnitt getrennt sind.

Athyreus soveicollis. Dej.

Tafel B. Fig. 3.

Rostgelb, dicht behaart, oben gekörnt, der Kopf vorn mit drei Höckerchen, das Halsschild oben ausgehöhlt und von einer erhöhten Linie beiderseits begrenzt, mit einer feinen Mittelfurche, in der Mitte, am Vorderrand ein Höckerchen; die Flügeldecken an der Basis mit den Anfängen zweier Doppelstreifen.

Länge $4\frac{1}{2}$, Breite 3 Linien.

Athyreus soveicollis. Dej. bat. ed. 3 p. 165.

Vaterland: Brasilien.

Die Farbe ist oben schön rostgelb, die Unterseite und die Beine bleichgelb, unten dicht, fast zottig, hellgelb behaart, oben mit aufrechten, langen Haaren dicht bekleidet. Der vorne schmale und verlängerte Kopf ist dicht gekörnt, in der Mitte mit zwei dicht hintereinander stehenden Querleistchen besetzt, wovon das vordere geradlinig, das hintere dreieckig und mit drei kleinen Höckerchen versehen ist. Der Kopfrand schwarz, etwas aufgebogen, in der Mitte ausgeschnitten, an den Seiten schwach ausgebuchtet, mit einem Zähnchen; vor den Augen der Rand rechtwinklig erweitert. Die Augen schwarz, glänzend. Die Fühler bleichgelb. Das Halsschild ist überall gleich dicht, schuppig gekörnt, in der Mitte breit, viereckig, aber nicht sehr tief ausgehöhlt, die Aushöhlung oben nicht scharf abgegrenzt, an den Seiten von einer erhöhten, glatten, vorne und hinten abgekürzten Linie begrenzt, von einer zarten Mittelfurche durchzogen und in der Mitte, am Vorderrande mit einem spitzen Höckerchen besetzt; oben, neben dem Ausschnitt des Hinterrandes, ist noch ein kurzes, erhöhtes Leistchen zu bemerken. Das Rückenschildchen ist sehr schmal, lang und zugespitzt. Die Flügeldecken sind schuppig gekörnt und punktiert; das Schulterbeulchen glatt; an der Basis mit den Anfängen zweier Doppellinien. Die vordersten Schienen sind vierzählig, die Zähne an der Spitze schwarz.

Athyru pilosus. Sturm.


Tafel B. Fig. 4.

Rostbraun, dicht behaart; oben dicht gekörnt; der Kopf vorne aufgebogen, ausgerandet, auf der Stirn eine längliche Grube; das Halsschild auf der Mitte ausgehöhlt, hinten von einer erhöhten, zweimal ausgebuchteten Leiste begrenzt, beiderseits und vorne mit einem aufgerichteten Zahn besetzt, die Flügeldecken an der Basis mit den Anfängen schwarzer Furchen versehen.

Länge 5—6, Breite 3—4 Linien.

Vaterland: ?

Von Farbe dunkel rostbraun, oder rostgelb. Der Kopf länglich eiförmig, die Kopfplatte vorne aufgebogen, der Rand an der Spitze schwarz und seicht eingekerbt, fein gekörnt und mit gelben Härchen dicht besetzt; auf der Stirn eine längliche, fast glatte Grube, vor den Augen eine zahnartig vortretende Erweiterung. Die Fühler haben die Farbe des Körpers. Das Halsschild ist dicht gekörnt, mit aufstehenden rostgelben Haaren dicht bekleidet und mit einer grossen und weiten Aushöhlung auf der Mitte versehen, welche fast kahl und nur mit einigen Körnchen bestreut und am oberen Rande von einer erhöhten, zweimal ausgebuchteten Leiste begrenzt ist, welche sich noch an den Seiten herabzieht, gabelförmig theilt und in einen breiten, zusammengedrückten, aufgerichteten, spitzen, rückwärts geneigten, an der Spitze schwarzen Zahn übergeht. In der Mitte dieser beiden Zähne, dem Vorderrande genähert, erhebt sich der dritte, gleichförmige Zahn. Der schmale, flache Vorderrand des Halsschildes ist mit einer Mittelfurche und die Seiten nahe am Hinterwinkel mit einen länglichen Grübchen versehen. Die Flügeldecken sind locker gekörnt, mit langen rostgelben Haaren dicht zottig bekleidet und ausser der an der Naht herabziehenden, tief eingeschnittenen Linie an der Basis die kurzen Anfänge von Furchen zu bemerken. Die ganze Unterseite und die Beine sind mit langem gelbem Haar dicht bedeckt. Die vordersten Schienen sind mit 5 Zähnen besetzt.



I n h a l t.

	Seite
Die Arachnidengattungen Amaurobius, Caelotes und Cybaeus von Dr. L. Koch (mit 2 Tafeln)	1
Ueber sacktragende Motten-Arten. Vortrag, gehalten den 29. April von Ernst Hofmann	53
Meteorologische Beobachtungen in Herrieden, in Verbindung mit den herrschenden Krankheiten im Etatsjahre 1866—67, resp. Kalenderjahr 1867 von Dr. Heidenschneider, prakt. Arzt dortselbst (mit einer graphischen Tafel)	69
Der Salmiak als Ersatzmittel für die Salzsäure bei der von v. Liebig angegebenen Bereitung des Kleienbrodes. Von C. Puscher in Nürnberg	83
Ergebniss von Düngungsversuchen. Von Dr. C. Kellermann, kgl. Rector der Kreislandwirthschaftsschule in Lichtenhof bei Nürnberg	86
Abbildung und Beschreibung einiger Käfer aus der Sturm'schen Samm- lung in Nürnberg. Von Gottlieb v. Koch (mit 2 Ta- feln A und B)	89



Erklärung der Abbildungen


zu


Arachnidengattungen von Dr. L. Koch.

- Fig. 1. Epigyne von *Amaurobius atrox* De Géer.
" 2. Männliche Palpe derselben Art.
" 3. Epigyne von *Amaurobius ferox* Walek.
" 4. Männliche Palpe dieser Species.
" 5. Epigyne von *Amaurobius similis* Bl.
" 6. Männliche Palpe derselben Art.
" 7. Epigyne von *Amaurobius claustrarius* Hahn.
" 8. Männliche Palpe dieser Art.
" 9. Epigyne von *Amaurobius Erberii* Keys.
" 10. Männliche Palpe dieser Art.
" 11. Epigyne von *Amaurobius jugorum* L. Koch.
" 12. Epigyne von *Amaurobius pallidus* L. Koch.
" 13. Epigyne von *Amaurobius obustus* L. Koch.
" 14. Männliche Palpe derselben Species.
" 15. Epigyne von *Caelotes inermis* L. Koch.
" 16. Männliche Palpe derselben Art.
" 17. Epigyne von *Caelotes bucculentus* L. Koch.
" 18. Epigyne von *Caelotes solitarius* L. Koch.
" 19. Epigyne von *Caelotes roscidus* C. Koch.
" 20. Epigyne von *Caelotes terrestris* Wid.
" 21. Männliche Palpe von derselben Art.
" 22. Epigyne von *Cybaeus angustiarum* L. Koch.
" 23. Männliche Palpe derselben Art.
" 24. Epigyne von *Cybaeus tetricus* C. Koch.
" 25. Männliche Palpe derselben Art.


Berichtigung:

Durch ein Versehen wurden die Figuren 3, 10 und 14 verkehrt lithographirt. —





VI



IX



X



VIII



II



XIII



XIV



XI



XV



XVI



XV



XVII



XIX



XVIII



XXI



XX



XXII



XXIV




XXIII






XXV





Graph. Kardenschreiber, pr. Arzt i. Herrieden (Bayern)







G. K. del.



ABHANDLUNGEN
DER
NATURHISTORISCHEN
GESELLSCHAFT
ZU
NÜRNBERG.

V. BAND.

MIT ZWEI KUPFERTAFELN.



NÜRNBERG.
HERMANN BALLHORN.
(v. EDNER'SCHE BUCHHANDLUNG.)
1872.

VORWORT.

Der vorliegende V. Band unserer Abhandlungen hätte eigentlich schon im Jahre 1870 erscheinen sollen, allein es war aus leicht erklärlichen Ursachen unmöglich. Während des Sichtens der Manuscripte kam der ewig denkwürdige Juli dieses Jahres voll Leid und Freude und alle ruhige Thätigkeit war von den Wogen der Zeit verschlungen. Die Gesellschaft setzte zwar ihre allwöchentlichen Zusammenkünfte fort, allein oft genug wurde Kriegswissenschaft statt Naturwissenschaft getrieben und die Redigirung der Abhandlungen wurde sistirt. Um nun das regelmässige Erscheinen in zweijährigen Abschnitten einzuhalten, erscheint der Band erst jetzt.

Zur Charakterisirung unseres Vereinslebens möge Folgendes dienen. Die Gesellschaft besteht zur weitaus grössten Zahl aus Dilettanten der Naturwissenschaften, denen Zeit und Mittel eigene Arbeiten zu liefern, nicht immer gegeben sind. Es beschränkt sich die Productivität deshalb auf die wenigen Leute vom Fach. Wir können deshalb auch nicht Anspruch machen mit andern Gesellschaften gleicher oder verwandter Art zu konkurriren, vielmehr hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr die Tendenz geltend gemacht, unsere Mitglieder mit den Fortschritten der Wissenschaft bekannt zu machen und sie au courant zu halten. In den nachfolgenden Blättern ist Einiges von dem zusammengestellt, was geboten werden konnte und freuen wir uns, eine erhebliche Zunahme des Interesses und des Besuches unserer Gesellschaftsabende konstatiren zu können. Die v. Ebner'sche Buchhandlung versah uns in liberalster Weise mit den erscheinenden Novitäten, so dass ein oft sehr reichhaltiger Büchertisch

•

den Anwesenden Gelegenheit gab, auch die Erscheinungen kennen zu lernen, welche keiner besonderen Besprechung unterzogen wurden. Ausserdem wurden zwei Lesezirkel eingerichtet, ein wissenschaftlicher und ein populärer. Die cirkulirenden Zeitschriften, Brochuren etc. werden den Theilnehmern wöchentlich zweimal ins Haus gebracht und wieder abgeholt. Abgesehen von kleinen, unvermeidlichen Störungen sind wir bis jetzt, seit drei Jahren, von den unangenehmen Erfahrungen, welche man so oft bei Lesezirkeln zu machen hat, verschont geblieben. Es ist durch diese Einrichtung das Lesezimmer, welches sich trotz aller günstigen Umstände, keines rechten Lebens erfreuen konnte, entbehrlich geworden. Wir hatten nämlich seit mehreren Jahren unsere Bibliothek nebst Lesezimmer in den zu demselben Zweck dienenden Räumen des hiesigen Gewerbevereines, jetzt aber, nachdem diese an das neugegründete Gewerbe-Museum übergegangen sind, wurde diese Mitbenützung unsererseits durch Raum-mangel unmöglich.

Unsere Büchersammlung findet nun künftig in den Räumen der Stadtbibliothek Aufstellung. Die Erlaubniss hierzu wurde uns von dem hochlöblichen Magistrat auf Antrag unseres thätigen Mitgliedes Herrn Kaufmann Fr. Hertel, mit grösster Bereitwilligkeit gewährt und wird der Custos der Stadtbibliothek, Herr J. Priem das Ausleihen der Bücher unserer Sammlung zu den gewöhnlichen Amtsstunden mit besorgen.

Möge es uns gelingen, die Gesellschaft auch in Zukunft in ihrer Fortentwicklung zu fördern, der Wunsch und Wille sind gut.

Nürnberg, Mai 1872.

Dr. G. Seelhorst,

z. Z. Director d. Naturhist. Gesellschaft.

Vereinsthätigkeit.

Es sind hier nur die umfangreicheren Referate, Vorträge oder Mittheilungen und Vorlagen erwähnt.

1868.

Oktober.

Dr. Seelhorst: Ueber Pfahlbauten.

Dr. Hiller: Betrachtungen über farbiges Licht, nach Schultze.

Dr. Hiller: Die Spectralanalyse der Himmelskörper nach Huggins.

Dr. Neger, das Sonnensystem der Vorzeit, nach Frauenholz.

Dr. Seelhorst über: Wild, Eiszeit, Föhn und Scirocco.

November.

Dr. Baierlacher über: Hobrecht, öffentl. Gesundheitspflege.

Herr Voit über: Beta, Bewirthschaftung des Wassers.

December.

Oberlehrer Bauer: Leben der Vögel.

Dr. Seelhorst über: Desor, Pfahlbauten im Neufchateller See.

Dr. Baierlacher über Pettenkofer's Respirationsapparat.

Dr. Neger über Gümbel, Phosphate.

Dr. Ebermaier über: Vogel, Löslichkeit einiger Silikate.

Dr. v. Pechmann über: Kuhn, Blitzschläge.

Rector Dr. Kellermann über: v. Liebig, Seidenraupenkrankheit.

VI

1889.

April.

Generalversammlung, Rechnungsablage und Vorstandswahl. Es wurden gewählt:

Zum Director: Dr. G. Seelhorst.

„ I. Sekretär: Dr. J. Neger.

„ II. „ Dr. E. Ebermayer.

„ Bibliothekar: Prof. Dr. Weger.

„ Conservator: Oberlehrer Bauer.

„ Cassier: Kaufm. Klinger.

Darauf folgte Rechnungsablage und Dechargeertheilung, sowie Feststellung des Budgets für 1889.

April.

Die Gesellschaft besprach in Folge einer Aufforderung des Stadtmagistrats die Frage, über die Vortheile und Nachtheile der Besprengung der Strassen mit einer verdünnten Chlorcalciumlösung zur Verhütung des Staubes. Nach Einholung eines Gutachtens aus Hannover, wo man bezügliche Versuche angestellt hatte, entschied sich nach längerer Debatte die Versammlung gegen Ausführung des Projectes.

Juni.

Herr Puscher, über Böttger's Vorschlag, Alkanna statt Lackmus zu gebrauchen. 2) Ueber Tessié du Mothay's Beleuchtungsmethode mit Wasserstoff und Sauerstoff. Gewinnung von Sauerstoff aus der Luft durch Absorption der Kohle, (sie nimmt 47% O auf) und nachheriges Befeuchten und Erhitzen derselben.

Dr. Neger verliest eine Einladung zur Zusammenkunft mit der Bamberger naturhistorischen Gesellschaft.

Juli.

Dr. Seelhorst zeigt mehrere Vorlesungsversuche nach A. W. Hofmann.

VII

Herr Voit über Fick: Wechselwirkung der Naturkräfte.

Dr. Seelhorst bespricht die Vorgänge in der Academie francaise mit Prof. Chasles die Briefe Pascal's betreffend. Das Trevelyaninstrument wird gezeigt und erklärt.

August.

Vortrag von Herrn Lehrer Lotter: Ueber das Zeidlerwesen im Mittelalter.

Nach kurzer Einleitung über Production der Bienen wies Redner auf die wichtige Rolle hin, welche der Honig zu einer Zeit, welche weder indischen noch einheimischen Zucker kannte, spielen musste. Durch besondere Vorschriften war der Verkauf und Verbrauch desselben besonders in unserer alten Reichsstadt Nürnberg geregelt und Uebertretungen wurden mit schwerer Geldstrafe geahndet. Eine der wichtigsten Anwendungen, besonders in Norddeutschland war die Methbereitung. Auch hierfür bestanden besondere Gerechtigkeiten und scheint dieses Getränk von manchen Städten aus einen bedeutenden Handelsartikel gebildet zu haben. Dass es in gehörigen Quantitäten konsumirt wurde, ist bekannt. Redner gedenkt dann der Wichtigkeit des Wachses, was in alter Zeit in kolossalen Quantitäten besonders als Opfermaterial verwendet wurde. Nicht nur in Form von mehr oder weniger grossen Kerzen wurde es auf den Altären der Heiligen als Dank niedergelegt, es ist auch bekannt, dass Abformungen von kranken Gliedern, Thieren etc. in Wachs geopfert sichere Heilung erzielten. Bei den Gelagen der geistlichen und weltlichen Grossen strahlten oft Tausende von Wachskerzen und der Luxus, der bei Hochzeiten und andern Gelegenheiten mit Wachsfackeln getrieben wurde, rief besondere Verbote hervor. Naturgemäss musste so starker Verbrauch der Producte der Bienenkultur förderlich wirken und als durch Einführung des indischen

VIII

Zuckers dem Honig eine starke Concurrenz entstand, sorgten die weltberühmten Lebkuchenbäcker besonders Nürnberg's dafür, die köstliche Gabe in neuer schmackhafter Form der süsseliebenden Welt darzubieten. Vor Beginn des Vortrags zeigte Redner die Geschlechtstheile der Drohen vor, welche durch ihre sonderbare Gestalt wie ein Ziegenkopf mit Hörnern, und ihre Grösse allgemeines Interesse erregten. Der durch Drücken entleerte Same liess bei 200 bis 250 facher Vergrösserung aufs Schönste Millionen sich munter bewegender Spermatozoen erkennen, welche indess nach wenigen Minuten abstarben. Herr Lotter beschrieb währenddem den höchst eigenthümlichen Zeugungsact der Bienen, welcher bekanntlich nur einmal stattfindet und der Drohne durch Verlust des Penis das Leben kostet.

Nach Beendigung des Vortrags zeigte Herr Dr. Seelhorst die hier als essbar verkauften Schoten des japanischen sogenannten *Raphanus caudatus* vor. Die Anwesenden überzeugten sich, dass deren Genuss wegen ihrer Geschmacklosigkeit kaum möglich ist. Derselbe zeigte ferner eine Pflanze aus Mexiko, *Selaginella lepidophylla* im getrockneten Zustande, welche nach Art der Rose von Jericho ganz eingerollt, nach mehrstündigem Liegen im Wasser sich völlig entfaltete.

September.

Die mikrocephale Helene Becker aus Offenbach wurde vorgeführt und Einiges über diese Missbildung und die Vogt'schen Ansichten mitgetheilt.

Am 12. September beging die Gesellschaft im Anschluss an den Gewerbeverein und den ärztlichen Verein die Säcularfeier Alex. v. Humboldt's mit einer Festrede im festlich decorirten Saale des Gewerbevereins. Der Redner, Dr. Seelhorst, hob nach einem allgemeinen Blick auf Hum-

IX

boldt's Leben und Wirken besonders die Verdienste desselben um die Popularisirung der Naturwissenschaften durch öffentliche Vorträge hervor.

Die Gesellschaft beschloss ferner die Absendung des Directors zur Naturforscherversammlung nach Innsbruck. Nach seiner Rückkehr von dort berichtete derselbe am 6ten

October

über die drei allgemeinen Versammlungen und am 20. über die Thätigkeiten der Sektionen für Astronomie, Mineralogie, Botanik und über Dr. Arendt's pädagogische Vorschläge. Das Tageblatt der Versammlung cirkulirte.

Dr. Hiller über: die Theorie der Lösungen.

Prof. Krafft über: die Entdeckung der Nilquellen.

November.

Mechanikus Schmidt aus Dresden zeigte seine Experimente mit Kreiseln.

Dr. Neger: Biographisches von William Herschel.

Dr. Baierlacher über: Wärmeentwicklung im Muskel. Derselbe zeigt Versuche mit dem blinden Fleck im Auge.

Dr. Fuchs über: Zuckerbildung in der Leber; über den Sitz der Seele.

December.

Herr Voit: Geognostische Reiseskizzen aus Tyrol.

Dr. Seelhorst: Einiges aus der Thermochemie;
über Wärmestrahlung des Mondes, Arbeiten von Secchi.

Lehrer Lotter: Die Wachsbereitung der Bienen.

Mechanikus Heller zeigt die Spectren der Gase in Plückerschen Röhren mit 2 Spectralapparaten eigener Arbeit.

1869

Januar.

Herr Puscher legt die sogenannten Pflanzendaunen vor.

Herr Knapp legt die getrockneten Körper eines westindischen

X

Weichthieres spanisch Velleda mollusca nebst mehreren Exemplaren von Chiton Blainvilli vor.

Dr. Seelhorst berichtet über das Vorkommen von Fischeiern in den Kiemen von Unio und Anodonta.

Dr. Neger über: Roemer, die ältesten Formen des organ. Lebens.

Vorlage einer interessanten Suite zufälliger Formen von Mineralien (Pseudopetrefacten) durch Dr. Seelhorst.

Herr Knapp bringt verschiedene Seeigel, nebst Zahngerüsten zur Ansicht.

Herr Puscher über Benzolgewinnung auf Kosten der Gasausbeute.

Dr. Solger über: Ullersberger, Reiskultur.

Dr. Seelhort: Synthese organischer Verbindungen; derselbe über ein neues Gefühlsorgan bei Fischen von Leidig und Schulze;

über Sorby's Absorptionsspectren.

Oberlehrer Bauer über: Grube, Bedeutung der Thierwelt für den Menschen.

Dr. Solger über Blutegelzucht.

Februar.

Dr. Seelhorst über: Rüttimeyer, Grenzen der Thierwelt; über die Bestätigungen der Bessel'schen Messungen durch Rutherford's Sternphotographieen.

Prof. Krafft über den selbstständigen Werth des Wissens.

Dr. Neger über die Palmen.

März.

Mechanikus Heller legt die Typenformen der Edelsteine als Glasmodelle vor.

Herr Dr. Specht aus Coburg las einige Kompilationen über die Darwinsche Theorie vor.

XI

Dr. Neger: über Cometen und Sternschnuppen.

Dr. Baierlacher über die Entwicklung des thierischen Eies.

Oberförster Eisen über rationelle Anlegung von Hopfengärten.

Dr. Seelhorst über die modernen Theorien der Chemie.

April.

Derselbe über die Verhandlungen der Sectionen für Chemie und Physik auf der Naturforscherversammlung in Innsbruck.

Am 13. April 1870 Generalversammlung und Vorstandswahl. Sämmtliche Mitglieder des Directoriums werden wiedergewählt und nehmen die Wahl an.

Darauf Rechnungsablage, Dechargirung und Feststellung des Budgets für 1879.

Das Directorium beantragt auf die Errichtung einer meteorologischen Station am hiesigen Orte zu wirken.

Herr Hertel legt Wohlgerüche in Paraffin eingeschlossen vor.

Vorführung einer La Tour'schen Sirene von Mechanikus Heller.

Mal.

Dr. Seelhorst über die Zunge des Spechtes.

Dr. Ebermayer, chemische Mittheilungen.

Dr. Neger über Schmerz und Schmerzstillung.

Juni.

Die Spectren von Thallium, Indium, Cäsium, Rubidium, Lithium und Selen werden gezeigt.

Herr Voit zeigt die *Selaginella lepidophylla* vor, welche wie die Jerichorose sich schliesst und öffnet.

Herr Grieser legt in Nürnberg gezogenes Edelweiss, *Leontopodium umbellatum* vor.

Optikus Pretscher zeigt ein Phantom zur Erläuterung der Sehtätigkeit, ferner eine Magnesiumlampe vor.

XII

Juli.

Dr. Seelhorst über: Jacob, *Traité élémentaire de chimie*.

August.

Vorzeigung eines Eies, welches sich an Stelle des Dotters eines Hühnereies fand. Es enthielt einen Embryo und Eiweiss, aber keinen Dotter.

October.

Dr. Seelhorst über: Kolbe; Zustand der Chemie in Frankreich, ebenso Volhard und Wurtz besprochen. Vorführung einiger von A. W. Hofmann angegebener Vorlesungsapparate, sowie einiger andern instructiven kleinen Apparate für Optik und Lehre vom Galvanismus.

November.

Herr Lehrer Martin über: Schulze, Thierseele.

Zur Ansicht: Photographieen von Petrefacten und Mineralien. Photographieen mikroskopischer Präparate. Eine Suite prachtvoll konservirter Algen aus den Lagunen Venedigs, Geschenk von † Herrn Apotheker Engelhardt.

Herr Puscher zeigt neue von ihm gefertigte Pharaoschlangen aus einem Gemisch von 3 Theilen doppelt chromsaurem Kali $1\frac{1}{2}$ Theil Salpeter und 3 Theile Zucker vor.

December.

Dr. Seelhorst über Tyndall, Faraday.

Dr. Neger über: Hansen, Sonnenparallaxe.

1871.

Januar.

Hofbibliothekar Dr. Barak fordert zu Beiträgen für die Strassburger Universitätsbibliothek auf. Die Gesellschaft beschliesst ihre Abhandlungen zu schicken. Einiges aus Radenhausen, Isis kommt zur Besprechung.

XIII

Februar.

Dr. Seelhorst zeigt den Wöhler'schen Diffusionsversuch und die Verbrennung des Magnesiums in Kohlensäure, ferner das Browning'sche Mikrospektroskop. Diskussion über den Einfluss der Electricität auf die Weinbereitung. Die französischen und böhmischen Versuche werden besprochen.

Herr Puscher bespricht einen französischen Löthrohrapparat mit Gebläse, Brennmaterial Petroleumäther, und dessen Anwendung zum Hartlöthen.

März.

Dr. Seelhorst über: Grove, Verwandtschaft der Naturkräfte.

Herr Weigel zeigt diverse kleine aus Schilfrohr (*Phragmites communis*) gefertigte Gegenstände, Federhalter, Nadelbüchsen, Cigarrenspitzen etc. vor.

Herr Knapp legt Hörner vom indischen Nashorn sowie ein eigenthümlich gemasertes Holzstück vor.

April.

Generalversammlung zum Zweck der Rechnungsablage und Vorstandswahl. Sämmtliche Mitglieder des Directoriums werden wiedergewählt und nehmen die Wahl an. Darauf Rechnungsablage Dechargirung und Feststellung des Budgets für 187 $\frac{1}{2}$.

Mal.

Prof. Krafft referirt über die zweite deutsche Polarfahrt. Vorgelegt wurde eine Orange, welche an einer Seite ein ganz helles Segment zeigte. Referate über die Versuche des Earl of Rosse über die Wärme des Mondes, über den Venusdurchgang von 1874; über Barakenlazarethe etc. Zur Ansicht und Probe wurde eine neue Art Papiercigarren vorgelegt.

XIV

Junl.

Herr Puscher berichtet über künstlichen Himbeersaft wie derselbe jetzt häufig in den Handel kommt. Derselbe enthält einen Fruchtsäther und ist mit Fuchsin gefärbt. Die Erkennung des Farbstoffes erfolgt leicht durch Eintauchen eines Fadens von Wolle oder Seide. Die Färbung durch natürlichen Himbeersaft wäscht sich völlig wieder in Wasser aus, mit Fuchsin versetzter Saft dagegen färbt bleibend rosa. Solcher wird durch Ammoniak entfärbt.

Dr. Seelhorst zeigt das Dasymeter oder Baroskop unter dem Recipienten der Luftpumpe und erläutert dessen mögliche Verwendung zum Barometer, unter Mitankwendung der Weber-Gauss'schen Spiegelablesung. Derselbe erwähnt ferner Zöllner's neueste Arbeiten, die Mittheilung Kenngott's über den Salzhagel auf der Gotthardtstrasse und eine Notiz über die Färbung der Rauchtöpfe.

Juli.

Zur Vorlage und Besprechung kamen: eine Karte über Goldminen unter Sesostris, Secchi's Werk über die Sonne. Ferner conservirte Fleischsorten, welche für den Feldzug angekauft waren. Darunter befand sich australisches Hammelfleisch, vor drei Jahren eingelegt, in delicatem Zustand.

August.

Herr Weigel bespricht und zeigt das Veredeln von Bäumen nach den verschiedenen Methoden. Lebhaftige Besprechung der Desinfectionsfrage und Prüfung der verschiedenen Desinfectionsmittel, namentlich des Günther'schen Desinfectionspulver's durch Herrn Puscher. Dasselbe muss nach der Analyse als sehr geringwerthig bezeichnet werden. Dasselbe gilt von dem so pomphaft angepriesenen Chloralum. Es wird die Nothwendigkeit betont, auch die Luft zu desinficiren und Carbonsäure und schwefelige Säure dazu empfohlen.

XV

September.

Mittheilungen aus der „Gaea“ über den naturwissenschaftlichen Unterricht in den Schulen von Dr Seelhorst. Vorzeigung eines Nestes, in einem Blauholzstamm gefunden von Herrn Apotheker Weyssel.

October.

Herr Lotter stellt 15 Pfd. schwere Honigwaben aus und referirt über die 17 Wanderversammlungen deutscher Bienenwirthe in Kiel.

Herr Photograph Wegelin legt Relief-Emailphotographieen vor. Berichte über die Naturforscherversammlung in Rostock nach deren Tagblatt.

November.

Dr. Neger legt seine neue Excursionsflora von Deutschland als Geschenk für die Bibliothek vor.

Vortrag von demselben über das Verhältniss der humanistischen Gymnasien zu den Naturwissenschaften.

Vortrag von Dr. Seelhorst über den gegenwärtigen Stand unserer Naturerkenntniss.

Herr Puscher referirt über javanisches Fleisch-, Fisch- und Krebsextract.

Dezember.

Vorführung der Spectralreaction von frischem und mit Kohlenoxydgas vergiftetem Blut und Referat über einen Vergiftungsfall.

Herr Oberlehrer Bauer hält einen Vortrag über den Lämmergeier unserer Alpen.

Herr Optikus Pretscher legt ein sehr schönes Aneroidbarometer zur Ansicht vor.

Herr Rechtsrath Engelhardt trägt vor: Ueber schwarze Kunst im Mittelalter.

XVI

Herr Pusch er berichtet über ein Erkennungsmittel von Petroleumäther in Petroleum und über Kalksacharat.

1872.

Januar.

Vortrag von Herrn Dr. Neger über Abbé Paramelle den Quellenfinder. Vortrag von Herrn Oberlehrer Bauer über Land und Leute in Slavonien.

Februar.

Herr Kaufmann Ammon legt mexikanische in Gräbern gefundene Gold-, Silber- und Thongegenstände, sowie mehrere Kästen mit amerikanischen Insecten vor. Vorzeigung und Besprechung der Cundurango-Wurzel von Herrn Kaufmann Hertel. Besprechung des Apomorphin's und des Xylol's.

März.

Die Schriften von F. Cohn „die Entwicklung der Naturwissenschaften in den letzten Jahren“ und von Fitzinger „Versuch einer Erklärung der Entstehung der organischen Körper“ werden vorgelesen und besprochen.

April.

Die Vorlesungen von Dr. L. Büchner geben Stoff zur Besprechung seiner Werke. Eine Biographie B's wird gegeben. Im Hinblick auf die grossen Verdienste B's als muthiger Vorkämpfer für Wahrheit und Licht beschliesst die Gesellschaft auf Antrag des Director's, Büchner als Zeichen ihrer Sympathie und Anerkennung das Diplom als Ehrenmitglied zu überreichen.

Mai.

Vortrag von Dr. Neger: „Ueber die Bedeutung des Waldes im Haushalt der Natur.

Dr. Seelhorst referirt über „Vergangenheit und Zukunft des Weltalls.“

XVII

Am 27. hatten die Gesellschaft Gelegenheit den Tätowirten von Birma, Mr. Constantin auf seiner Durchreise von München nach Berlin, zu sehen. Die äusserst interessante Erscheinung dieses, binnen drei Monaten in täglich drei Stunden am ganzen Körper tätowirten Mannes erregte wie überall, auch hier das höchste Erstaunen. Man hat 388 Figuren von Menschen, Thieren, phantastischen Gestalten jeder Art, und noch eine sehr grosse Menge birmanischer Schriftzeichen in langen Linien gereiht, gezählt. Der darauf bezügliche Aufsatz aus der Wiener medicinischen Wochenschrift wurde zur Erläuterung vorgelesen.

♦♦

B e r i c h t

über

den Stand der Vereinsbibliothek.

Die Bibliothek der naturhistorischen Gesellschaft hat sich in den letzten 3 Jahren wiederum bedeutend vermehrt und erweitert, und zwar theils durch Anschaffungen, theils durch Geschenke, aber insbesondere durch den Tausch mit andern Gesellschaften, Vereinen etc.

I. Anschaffungen für die Bibliothek.

An Zeitschriften wurden gehalten:

Botanische Zeitung von Mohl und de Bary.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie von Köllicker und
v. Siebold.

Zeitschrift für Ethnologie von Bastian und Hartmann.

Gaea, Natur und Leben.

Mittheilungen aus J. Perthes' geographischer Anstalt von A.
Petermann.

Die Natur von Müller und Ule.

Der Naturforscher von W. J. Sklareck.

Jahrbuch für Mineralogie von Leonhardt und Geinitz.

Sammlung von gemeinverständlichen, wissenschaftlichen Vorträgen
von R. Virchow u. F. v. Holzendorff, Bd. I—VII.

XIX

- Mousson, die Grundwahrheiten.
Beyer, der Kampf um's Dasein.
Niemeyer, die Eigenwärme.
Kiepert, Karte der Nordpolländer.
Grube, Bedeutung der Thierwelt.
Spörer, Reise nach Indien.
Rohlfss, Afrikareisen.
Rutherford, Mondphotographie.
Fick, Naturkräfte in ihrer Wechselwirkung.
Zehfuss, kosmische Bedeutung der Aërolithen.
Ule, Alex. v. Humboldt.
Benfey, Alex. v. Humboldt.
Schaffhausen, Urform des menschlichen Schädels.
Büchner, die Stellung des Menschen.
Thomassen, Natur u. Bibel.
Klein, Handbuch der Himmelserscheinungen.
Lüdner, das Nordlicht.
Rockitansky, der Werth des Wissens.
Gümbel, geognostische Beschreibung der bayrischen Alpen.
Wurtz, Geschichte der chemischen Theorien.
Preyer, die fünf Sinne.
Beta, die Stadtgifte.
Bähr, die Reibungs-Electricität und das Pendel.
Cornelius, über die Entstehung der Welt.
Schlotter, Energie des Luftdruckes.
Voit, über die Entwicklung der Muskelkraft.
Volhard, Begründung der Chemie.
Tyndall, Faraday.
Cabsch, Pflanzenleben der Erde.
Fittig, das Wesen der chemischen Forschung.
Radenhausen, Isis.
Hollander, Geist und Körper.
Eulenburg, über Schmerz und Schmerzstillung.
Helmholtz, Tonempfindungen.
Moleschott, Selbststeuerung des Lebens.

Kolbe, über den Zustand der Chemie in Frankreich.
 Grove, Verwandtschaft der Naturkräfte.
 Stark, psychische Degeration des französischen Volkes.
 Darwin, Abstammung des Menschen.
 Fick, die Welt als Vorstellung.
 Czermak, über das Herz.
 Roscher, die geographische Lage grosser Städte.
 Credner, das Leben in der todten Natur.
 Hagenbach, die Zielpunkte der physikalischen Wissenschaften.
 Oeffentliche Vorträge, gehalten in der Schweiz.
 Kolbe, Moden der modernen Chemie.
 Secchi, die Sonne.
 Thomassen, System der Natur.
 Bender, die Bedeutung der Atomenlehre in der Chemie.
 Rieth, Volumetrie.
 Helmholtz, über die Wechselwirkung der Naturkräfte.

II. Geschenke für die Bibliothek.

v. Bibra, die Bronzen und Kupfer-Legirungen.
 v. Koch, die Tagraubvögel von Mitteldeutschland.
 v. Koch, die Sänger von Mitteldeutschland.
 Clauss, praktische Düngerlehre.
 Leuchs, der Wein aus Wasser.
 Gall's Weinveredlung.
 Gegenbauer, Beiträge zur Entwicklung der Land-Pulmonaten.
 Von Herrn Kaufmann Knapp hier: Sömmering, Versuche
 über die Verschiedenheit der Verdunstung des Wein-
 geistes.
 v. Paula v. Schrank, über die blauen Schatten.
 Gehlen, Bemerkungen über die Eigenthümlichkeit der Ameisen-
 säure.
 Eisen, die rationelle Anlegung der Hopfenpflanzungen.
 Hasskarl, über die indischen Commalinaceen.
 Ullersperger, ein Blick auf die Medicin in Spanien.

- Ullersperger, Geschichte der Pharmacie in Italien.
 Zittel, Denkschrift auf H. v. Meyer.
 Meissner, Denkschrift auf C. Ph. v. Martius.
 Vogel, über die Entwicklung der Agricultur-Chemie.
 v. Koch, die Stellungen der Vögel.
 Schansky, Grundzüge zur Analyse der Molecular-Bewegung.
 Ullersperger, zur Geschichte der Pharmacie.
 Neger, Excursions-Flora von Deutschland.
 v. Frauenfeld, die ausgestorbenen und aussterbenden Thiere
 der jüngsten Erdperiode.

III. Verzeichniss derjenigen Gesellschaften etc., welche mit der naturhistorischen Gesellschaft in Schriften-Austausch getreten sind.

Die verehrlichen Gesellschaften werden gebeten, die Anführungen des nachfolgenden Verzeichnisses als Bescheinigung des Empfanges ihrer Zusendungen anzunehmen und diese schätzbaren Bereicherungen unserer Bibliothek gütigst fortzusetzen.

- Altenburg: Naturforschende Gesellschaft.
 Amsterdam: Genootschap Natura artis magistra.
 Annaberg: Annaberg — Buchholzer Verein für Naturkunde.
 Augsburg: Naturhistorischer Verein.
 Bamberg: Naturforschende Gesellschaft.
 „ Gewerbe-Verein.
 Basel: Naturforschende Gesellschaft.
 Berlin: Deutsche geologische Gesellschaft
 „ Entomologischer Verein.
 „ Gesellschaft naturforschender Freunde.
 Bern: Naturforschende Gesellschaft.
 „ Schweizerische naturforschende Gesellschaft.
 Blankenburg: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.
 Bonn: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und
 Westphalens.
 Boston: Society of natural history.
 „ American Academy of Arts and sciences.
 Bremen: Naturforschender Verein.

- Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.
 Brunn: K. k. mähr. schles. Gesellschaft zur Beförderung des
 Ackerbaues, der Natur- und Landes-Kunde.
 Brunn: Naturforschender Verein.
 Carlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein.
 Christiana: Kong. Universität.
 Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
 Chicago, Ill.: Academy of Sciences.
 Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündtens.
 Danzig: Naturforschende Gesellschaft.
 Darmstadt: Verein für Erdkunde und mittelhheinischer geo-
 logischer Verein.
 Dessau: Naturhistorischer Verein für Anhalt.
 Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft.
 Dresden: Die k. k. Leopold. Carol. deutsche Akademie der
 Naturforscher.
 „ Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
 Dürkheim; Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein der Pfalz.
 Emden: Naturforschende Gesellschaft.
 Erfurt: Königl. Academie gemeinnütziger Wissenschaften.
 Erlangen: Physikalisch-medicinische Societät.
 Florenz; R. Comitato geologico d'Italia.
 Frankfurt a. M.: Physikalischer Verein.
 „ Senckenbergische naturforschende Gesellschaft.
 Freiburg i. B.: Naturforschende Gesellschaft.
 Fulda: Verein für Naturkunde.
 St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
 Giessen, Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
 Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.
 Göttingen: Societät der Wissenschaften.
 Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
 Halle: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.
 Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.
 Hanau: Wetterauische Gesellschaft.
 Hannover: Naturhistorische Gesellschaft.

- Heidelberg: Naturhistorisch-medizinischer Verein.
 Hermannstadt: Verein für siebenbürgische Landeskunde.
 Innsbruck: Ferdinandeum.
 Kassel: Verein für Naturkunde.
 Kiel: Verein nördlich der Elbe.
 Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum für Kärnthen.
 Königsberg: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.
 Landshut: Botanischer Verein.
 Leipzig: K. s. Gesellschaft der Wissenschaften.
 Linz: Museum Francisco-Carolinum.
 Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein.
 Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein.
 Mailand: Reale Istituto lombardo di scienze.
 Mannheim: Verein für Naturkunde.
 Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaft.
 Mitau: Kurländische Gesellschaft für Litoratur u. Kunst.
 Moskau; Société impériale des naturalistes.
 München: König. bayr. Academie der Wissenschaften.
 Neisse: Philomathie.
 Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturwissenschaft in Mecklenburg.
 New-Haven, Co.: Academy of arts and sciences.
 New-York: Lyceum of natural history.
 Nürnberg: Verein „Merkur“.
 Offenbach: Verein für Naturkunde.
 Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein.
 Passau: Naturhistorischer Verein.
 Pest: K. ungar. naturwissenschaftlicher Verein.
 Philadelphia: Americ. philos. Society.
 Prag: K. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften.
 „ K. k. patriotisch-ökonomische Gesellschaft im Königreich Böhmen.
 Reichenbach: Voigtländischer Verein für allgemeine und spezielle Naturkunde.

Riga: Naturforscher-Verein.

Stockholm: Kongl. Svenska Vetenskaps Akademien.

St. Jago in Chili: Mit der dortigen Universität.

Washington: Smithsonian Institution.

„ United States Patent Office.

Wien: K. k. geologische Reichsanstalt.

„ K. k. geographische Gesellschaft.

„ Zool. bot. Gesellschaft.

„ Akademischer Leseverein.

„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.

Wiesbaden: Verein für Naturkunde in Nassau.

Würzburg: Physikalisch-medicinische Gesellschaft.

„ Polytechnische Gesellschaft.

Zürich: Naturforschende Gesellschaft.

Zweibrücken: Naturhistorischer Verein.

Prof. Dr. H. Weger.

z. Z. Bibliothekar.

B e r i c h t

über

den gegenwärtigen Stand unserer Sammlungen.

Erst seit den letzten 2 Jahren haben wir, veranlasst durch einige uns zugehende Geschenke den Beschluss gefasst, überhaupt eine Naturaliensammlung anzulegen. Als grösstes Hinderniss tritt dabei die Platzfrage auf. Da wir über kein eigenes Lokal verfügen können, so hat der unterzeichnete Conservator das Wenige, womit wir den Grund gelegt haben, in einem Zimmer der Lorenzer Knabenschule, der er früher angehörte, untergebracht.

Unsere Sammlung enthält:

95 Stück Mineraliensammlung aus früherer Zeit.

50 Stück dto. Geschenk des Conservators.

2 Stück Braunkohle mit Jahresringen. Geschenk von Herrn
Rechtsrath Engelhardt.

Einige Petrefacten, Conchylien, Corallen, Skeletttheile, Eier etc.

Eine Sammlung von Mikrolepidopteren, Geschenk von Herrn
Conservator E. Hofmann in Stuttgart 55 Stück.

Eine Sammlung von Moosen und Flechten, 155 Stück. Geschenk
von Herrn stud. G. v. Koch.

Eine Suite Algen aus Venedig, 19 Stück, von † Herrn Apotheker
Engelhardt.

Durch Uebersendung von Dupletten in Mineralien, Petrefacten, Conchylien etc. würde man uns zu grossem Danke verpflichtet.

J. F. Bauer,
d. Z. Conservator.

Verzeichniss
der
Mitglieder der naturhistorischen Gesellschaft
zu Nürnberg
im Jahre 1872.

Directorium der Gesellschaft.

Director: Dr. phil. Gg. Seelhorst, Lehrer der Naturwissenschaften an der städtischen Handelsschule.

I. Secretär: Dr. phil. Joh. Neger, Fabrikant chemischer Producte.

II. Secretär: Dr. phil. Ed. Ebermeyer, Chemiker.

Bibliothekar: Dr. phil. H. Weger, königl. Professor am Realgymnasium.

Conservator: J. F. Bauer, quiesc. Oberlehrer.

Cassier: C. H. Klinger, Kaufmann.

Ehrenmitglieder.

Se. kgl. Hoheit Maximilian, Herzog in Bayern.

Herr Dr. A. Bello, Rector der Academie an der Universität zu San Jago in Chili.

„ Dr. C. G. Bischof, kgl. preuss. Geh. Bergrath und ordentl. Professor der Chemie und Technologie in Bonn.

XXVII

Herr Dr. Al. Braun, Prof. der Botanik an der Universität und Director der kgl. bot. Gartens und der kgl. Herbariums in Berlin.

- „ Dr. Ludwig Büchner, prakt. Arzt in Darmstadt.
- „ B. S. Castelanos, Director der kgl. archäologischen Academie und Generaldirector der Normalschulen des Königreichs Spanien zu Madrid.
- „ Jul. Colbeau, Secretär der malacolog. Gesellschaft zu Brüssel.
- „ Theoph. le Compte, Naturforscher zu Lessines.
- „ Dr. J. Domeyko, Professor z. St. Jago in Chili.
- „ J. Douval-Jouve, Inspector der Academie zu Strassburg und Mitglied der botanischen Gesellschaft zu Frankreich.
- „ Dr. L. C. Feuerbach, Privatgelehrter zu Rechenberg bei Nürnberg.
- „ Dr. L. C. Fitzinger in Wien.
- „ Dr. Fel Flügel, Privatgelehrter in Leipzig.
- „ Dr. H. B. Göppert, kgl. preuss. Geh. Medicinalrath, Prof. der Medicin und Botanik, Präses der schles. Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau.
- „ Dr. F. E. Guerin-Meneville, Professor und Director der Cuvierschen Gesellschaft zu Paris.
- „ Dr. W. Ritter v. Haidiger, k. k. Hofrath in Wien.
- „ Dr. L. Freiherr v. Hohenbühl, genannt Heufler zu Rasen, k. k. wirklicher Kämmerer und Ministerialrath im Ministerium für Cultus und Unterricht in Wien.
- „ A. J. Jäckel, k. Pfarrer in Windsheim.
- „ Dr. J. R. L. Comte de Kerkhove, dit van der Varent Präsident der archäologischen Academie Belgiens und Vicepräsident der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zu Antwerpen.
- „ Dr. Fr. v. Kobell, Professor der Mineralogie und Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats an der kgl. Universität zu München.
- „ Fr. Lambrecht, kgl. holländischer Hauptmann in Sumatra.

XXVIII

Herr Prof. Dr. Freiherr J. v. Liebig, Vorstand der kgl. Academie der Wissenschaften etc. in München.

- „ Dr. H. v. Mohl, Professor der Medicin und Botanik an der kgl. Universität und Director des bot. Gartens in Tübingen.
- „ Dr. J. G. Morris, Pastor zu Baltimore.
- „ Dr. J. W. Müller, Privatgelehrter in Paris, vormals k. k. österr. Generalconsul für Centralafrika.
- „ Dr. C. Müller, Privatgelehrter in Halle a. d. Saale.
- „ Dr. M. Pettenkofer, kgl. Professor und Hofapotheker in München.
- „ Dr. R. A. Philippi, Professor an der Academie in St. Jago in Chili.
- „ Dr. J. G. L. Reichenbach, kgl. sächs. Hofrath, Professor der Botanik, Director des k. zoologischen und botanischen Museums und des botanischen Gartens in Dresden.
- „ Dr. C. v. Renard, Excellenz, k. russischer wirklicher Staatsrath und Sekretär der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher in Moskau.
- „ Dr. J. A. Ried, practischer Arzt zu Valparaiso in Chili.
- „ Dr. F. F. Runge, Professor der Gewerbkunde in Osnabrück.
- „ Dr. P. Savi, Professor zu Pisa.
- „ Dr. A. v. Schauss-Kempfenhausen, kgl. griechischer Consul in München.
- „ Dr. H. Freiherr v. Schlagintweit auf Schloss Jägersburg bei Forchheim.
- „ Dr. R. Freiherr v. Schlagintweit in München.
- „ Dr. M. J. Schleiden, grossherzgl. Sachsen-Weimarischer Hofrath und Professor der Botanik zu Frankfurt a. M.
- „ A. Senoner, Bibliothekscustos der k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien.
- „ Dr. C. T. E. v. Siebold, Professor der Zoologie an der kgl. Universität und erster Conservator der zoologischen Sammlungen des Staates zu München.

XXIX

Herr Dr. A. Steinheil, kgl. bayer. Ministerialrath, Conservator der math. physikalischen Sammlungen des Staates und Professor der Mathematik an der kgl. Universität in München.

- „ Dr. C. Stölzel, Professor am Polytechnikum in München.
- „ Dr. W. F. R. Suringar, Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens zu Leyden.
- „ Dr. C. M. Tallaviano, zu Laibach.
- „ K. Freiherr zu Rhein, kgl. bayer. Reichsrath und Regierungspräsident von Oberbayern in München.
- „ Prof. Dr. Carl Vogt in Genf.
- „ Dr. R. Virchow, kgl. Universitätsprofessor in Berlin.
- „ B. L. F. von Voltz, Exc., kgl. bayer. wirkl. Staatsrath in München.

Correspondirende Mitglieder.

Herr A. D. Bache, Professor und Superintendent United States Coast Survey in Washington.

- „ Dr. Spencer F. Baird, Professor und Secretair am Smithsonian-Institut zu Washington.
- „ Dr. A. Besnard, kgl. bayer. Stabs- und prakt. Arzt in München.
- „ Dr. Franz Buchenau, Lehrer in Bremen.
- „ J. F. Cafilich, Professor in Augsburg.
- „ Dr. Calvi, Professor in Genua.
- „ Dr. Steph. della Chiaje, prakt. Arzt und Professor der Medicin an der Universität zu Neapel.
- „ José Maria Latino Coelho, Secretär der kgl. Academie der Wissenschaften in Lissabon.
- „ Dr. H. Döbner, herzogl. Sachsen-Meining'scher Medicinalrath und Hofmedicus in Meiningen.
- „ Dr. O. Döpping, Chemiker in Moskau.
- „ Dr. Th. Dompierre, kgl. bayer. Oberstabsarzt.

Herr L. Dufour zu St. Sever.

- „ Dr. J. Dumas, Professor der Medicin an der Universität zu Montpellier.
- „ K. Ehrlich, Ausschussmitglied und Custos am Museum Francisco-Carolinum in Linz.
- „ Dr. J. A. Erlenmeyer, pr. Arzt, Director und Oberarzt der Privatheilanstalt für Gehirn- und Nervenkrankheiten zu Bendorf bei Coblenz.
- „ Dr. A. L. A. Fée, Professor der Botanik und Pharmacie an der med. Facultät und Director der bot. Garten zu Strassburg.
- „ J. G. Fehr, Lehrer in Gunzenhausen.
- „ Dr. A. Fischer v. Waldheim, wirkkl. kais. russischer Staatsrath und Vicepräsident der kais. Gesellsch. der Naturforscher zu Moskau.
- „ F. Fötterle, k. k. Bergrath, erster Secretär der k. k. geographischen Gesellschaft zu Wien.
- „ Gg. Ritter von Frauenfeld, erster Secretär der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft zu Wien.
- „ Dr. S. Friedmann, quiesc. k. niederländischer Militärarzt und prakt. Arzt in München.
- „ L. Frischmann, kgl. zweiter Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staates in München.
- „ K. Fuchs, Professor zu Hermannstadt in Siebenbürgen.
- „ Dr. K. S. Haldemann, Professor zu Columbia in Pennsylvanien.
- „ J. Hall, Staatsgeolog von Iowa und Paläontolog für die Staaten von New-York, Albany etc.
- „ F. Ritter v. Hauer, Sectionsrath und Director der k. k. geologischen Reichsanstalt.
- „ Dr. Th. v. Heldreich, Director des bot. Gartens und Directionsmitglied des naturhist. Museums zu Athen.
- „ Dr. G. A. W. Herrich-Schäffer, k. Bezirksgerichtsarzt und Director der zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg.

Herr E. Hofmann, Custos am kgl. zoologischen Cabinet in Stuttgart.

- „ Dr. J. Hoffmann, Verlagsbuchhändler in Stuttgart.
- „ A. de Jolis, Botaniker, Stifter, Präsident und beständiger Secretär der kaiserl. naturw. Gesellschaft zu Cherbourg.
- „ H. Koch, früherer Director des zool. Museums zu Triest.
- „ G. v. Koch, Privatgelehrter zu Jena.
- „ Dr. C. R. König, Lehrer an der Realschule und Adjunkt am I. kgl. Univ.-Laboratorium zu Leipzig.
- „ Dr. E. Kratzmann, prakt. Arzt in Marienbad.
- „ Dr. C. H. Küster, Vorstand des Telegraphenamts zu Bamberg.
- „ Dr. W. Lachmann, Professor zu Braunschweig.
- „ J. Lotter, Lehrer und Zeidelmeister in St. Johannis bei Nürnberg.
- „ Dr. J. B. F. Merklein, Professor in Schaffhausen.
- „ Dr. J. Müller, fürstl. waldeckscher Medicinalrath und Vicedirektor des norddeutschen Apotheker-Vereins zu Berlin.
- „ Dr. W. Müller, ordentl. Professor an der Universität Jena.
- „ Dr. A. Mousson, Präsident der naturhistor. Gesellschaft in Zürich.
- „ Dr. G. D. Mardo, Director der k. Findelhäuser in Venedig.
- „ J. Natterer, früherer Custos am k. k. Hofnaturalien-cabinet in Wien.
- „ Dr. A. A. v. Palliardi, fürstl. russ. sleiz. Medicinalrath und Badearzt zu Franzensbad in Böhmen.
- „ Dr. Rehm, prakt. Arzt zu Mkt. Sugenheim.
- „ C. Röhrig, Badearzt zu Wildungen.
- „ V. B. Rosales, chilensischer Generalconsul zu Hamburg.
- „ Dr. P. Savi, Professor und Director des Museums zu Pisa.
- „ Dr. C. H. Schauenburg, prakt. Arzt und Privatdocent an der kgl. Universität zu Bonn.
- „ Dr. A. Schenck, ordentl. Professor der Botanik und der kgl. Universität zu Leipzig.

- Herr Dr. A. Schilling, prakt. Arzt in München.
- „ Dr. F. Schlegel, prakt. Arzt in Altenburg.
 - „ F. J. Schmidt, Privatier zu Schischka bei Laibach.
 - „ Dr. Carlos Segeth, zu St. Jago in Chili.
 - „ Dr. A. Skofitz, Herausgeber der österr. botan. Zeitschrift in Wien.
 - „ T. Fr. Tempsky, Buchhändler in Prag.
 - „ V. Graf v. Trevisan, Privatgelehrter zu Padua.
 - „ Dr. med. Ullersberger, herzogl. leuchtenberg. Leibarzt und prakt. Arzt in München.
 - „ Dr. P. J. Vallez, Director des ophthalmolog. Instituts zu Brüssel.
 - „ Dr. R. Wagner, Hofrath und Professor der Technologie an der kgl. Universität München.
 - „ Fr. Weigel, Kaufmann in Ansbach.
 - „ Fr. Winkler, kgl. Regierungs- und Kreisforstrath in Ansbach.
 - „ Dr. G. C. Wittstein, Professor der Chemie in München.

Ordentliche Mitglieder.

- Herr Dr. Baierlacher, prakt. Arzt.
- „ H. Ballhorn, Buchhändler.
 - „ H. Barbeck, Buchhändler.
 - „ J. A. E. Bäumlcr, Kaufmann.
 - „ J. F. Bauer, quiesc. Lehrer.
 - „ A. F. Beckh, Apotheker.
 - „ Dr. W. Beckh, prakt. Arzt.
 - „ B. Benker, Kaufmann.
 - „ O. Berger, Kaufmann.
 - „ E. Freiherr v. Bibra, Dr. med. et phil. und Rittergutsbesitzer zu Schwebheim in Unterfranken.
 - „ Fr. Bleicher, Kaufmann.
 - „ Ph. Blumröder, Kaufmann.

Herr Fr. Bock, Lehrer.

- „ C. A. Braun, Buchhändler.
- „ Chr. Burger, Stadtpfarrer und geistl. Rath.
- „ Dr. Buttenwieser, prakt. Arzt.
- „ J. Campe, Apotheker.
- „ C. Clericus, Kaufmann.
- „ L. Dengler, Professor an der Kreis-Gewerbschule.
- „ J. P. W. Dietz, Buchdruckereibesitzer.
- „ C. Drechsel, Rechtsanwalt.
- „ Dr. Döderlein, prakt. Arzt.
- „ G. Drittler, Bankbuchhalter.
- „ J. Eberhardt, kgl. Professor an der Kunstschule.
- „ Dr. E. Ebermeyer, Chemiker.
- „ E. Eckart, Besitzer der Spitalapotheke.
- „ S. K. Eisen, quiesc. kgl. Oberförster.
- „ Th. Emmel, Kunst- und Handelsgärtner.
- „ A. Engel, Lehrer am landwirthschaftl. Institut zu Lichtenhof.
- „ C. Engelhardt, quiesc. Rechtsrath.
- „ C. J. A. F. Engelhardt, Privatier.
- „ Dr. Gust. Engelhardt, Augenarzt.
- „ A. Ertheiler, Kaufmann.
- „ J. Falk, Fabrikbesitzer.
- „ J. Förderreuther, Kaufmann.
- „ Chr. v. Forster, Kaufmann.
- „ Dr. J. Fuchs, prakt. Arzt.
- „ J. Fuchs, Kaufmann.
- „ H. Gebhardt, Fabrikbesitzer.
- „ L. Gebhardt, Kaufmann.
- „ Fr. Geith, Kaufmann.
- „ C. v. Gemming, pens. königl. Oberst.

Herr Ludw. Göschel, Apotheker.

„ Dr. Sigm. Günther, Mathematiker.

„ Fr. Grieser, Kunstgärtner.

„ M. Gütermann, Kaufmann.

„ Dr. Hagen, Fabrikbesitzer.

„ Harscher, Kupferwaarenfabrikant.

„ C. v. Haubner, Rittergutsbesitzer.

„ Dr. A. E. Hauck, kgl. Professor am Realgymnasium.

„ Dr. H. Hauck, Lehrer an der Handelsschule.

„ J. G. Hänpler, Oberlehrer.

„ Hector, Sekretär des germ. Museums.

„ Dr. A. Heller, prakt. Arzt.

„ Hemeter, Privatier.

„ A. Heerdegen, Kaufmann.

„ J. Heerdegen, Chemiker.

„ Chr. Heimeran, Privatier.

„ Fr. Hertel, Kaufmann.

„ Fr. Hofmann, Fabrikant chirurgischer Instrumente.

„ J. N. Hofmann, Privatier.

„ H. Holzhausen, Kaufmann.

„ A. Hohenner, Privatier.

„ G. Huber, Lehrer an der kgl. Kreislandwirthschaftsschule
zu Lichtenhof.

„ H. Jungmann, Kaufmann.

„ A. A. Keerl, Kaufmann.

„ Dr. J. Kern, Chemiker.

„ Dr. J. C. Kellermann, Rector der kgl. Kreis-Landwirth-
schaftsschule zu Lichtenhof.

„ Dr. J. G. Kellermann, Professor an der kgl. Kreis-
Landwirthschaftsschule zu Lichtenhof.

„ B. H. Klinger, Kaufmann.

„ Fr. Knapp, Kaufmann.

Herr Dr. L. Koch, prakt. Arzt.

„ A. Kohn, Banquier.

„ J. Kohn, Banquier.

„ Joh. Krafft, Ingenieur.

„ Th. Kraft, kgl. Studienlehrer.

„ A. Krage, Mechaniker.

„ B. Kühn, Lehrer.

„ H. Lambrecht, Kaufmann und Fabrikant.

„ W. Lambrecht, Chemiker.

„ J. Leykam, Kaufmann.

„ Fr. Freiherr v. Löffelholz, kgl. Oberförster.

„ Dr. M. Maas, prakt. Arzt.

„ K. Mahla, Kaufmann und Fabrikbesitzer.

„ K. Mandel, Kaufmann.

„ L. Martin, Lehrer an der Handelsschule.

„ W. Merck, Kaufmann.

„ Sigm. Merkel, Apotheker.

„ Dr. Gottl. Merkel, prakt. Arzt.

„ Dr. W. Merkel, prakt. Arzt.

„ G. Merkel, Fabrikbesitzer.

„ H. Meusel, Patentstiftfabrikant.

„ J. F. Methsieder, Lehrer.

„ F. C. Meyer, kgl. Professor an der Kunstschule.

„ L. Mitzler, Besitzer der St. Johannis-Apotheke.

„ Chr. Münzinger, Kaufmann.

„ A. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.

„ P. Nar, Gutsbesitzer in Zirndorf.

„ A. zur Nedden, Zahnarzt.

„ Dr. Joh. Neger, Fabrikant chemischer Produkte.

„ J. E. Nudinger, Kaufmann.

„ Dr. Th. Oppler, Fabrikant chemischer Produkte.

- Herr R. Pabst, Fabrikbesitzer.
- „ Fr. Pabst, Chemiker.
 - „ Jul. Pabst, Chemiker.
 - „ C. Paraviso, Kaufmann.
 - „ Dr. H. Freiherr v. Pechmann, prakt. Arzt.
 - „ M. G. Pfann, Lehrer.
 - „ C. Pfeiffer, Kaufmann.
 - „ H. Pretscher, Optikus.
 - „ C. Puscher, Privatier.
 - „ W. Puscher, Privatier und Handelsvorstand.
-
- „ Dr. Rauhenzahner, Redakteur.
 - „ J. Reissig, Kaufmann.
 - „ C. Rennebaum, Kaufmann.
 - „ Dr. Reuter, kgl. Bezirks-Gerichtsarzt.
 - „ J. M. Richter, Kaufmann.
 - „ H. Riedner, Studienlehrer.
 - „ Fr. Riemann, Privatier und Gutsbesitzer.
 - „ L. Röder, Studienlehrer.
 - „ M. Rosenschon, Professor an der königl. Kreisgewerbschule.
 - „ Th. Rüll, Buch- und Kunsthändler.
 - „ C. F. Rummler, Kaufmann.
 - „ Fr. Rupprecht, Kaufmann.
 - „ L. Schäfer, Oberlehrer.
 - „ Th. Scheidemandel, priv. Apotheker.
 - „ v. Schellerer, k. bayer. Hauptmann.
 - „ A. Schilling, Banquier.
 - „ W. Schmid, Kunst- und Musikalienhändler.
 - „ A. Schmid, Zahnarzt.
 - „ Chr. Schmidmer, Kaufmann.
 - „ L. Schmidmer, Kaufmann.
 - „ F. Schmidt, Kaufmann in Cadolzburg.
 - „ Jac. Schmitt, Banquier.
 - „ Schöberlein, Fabrikdirector.

Herr Hugo Schön, Assecuranz-Inspector.

- „ F. Schönberg, Lehrer an der Handelsschule.
- „ E. Scholl, Kaufmann.
- „ H. Schrag, Buchhändler.
- „ E. J. E. Schrodtt, königl. Regierungs-Rath und Stadt-Commissär.
- „ K. Schwarz, städtischer und Bezirks-Thierarzt.
- „ J. C. D. v. Schwarz, Kaufmann.
- „ Dr. Gg. Seelhorst, Lehrer der Naturwissenschaften an der städtischen Handelsschule.
- „ Gg. Seitz, Fabrikbesitzer.
- „ Seufferheld, Kunstgärtner.
- „ B. Solger, städt. Baurath.
- „ J. Stief, Spielwaarenfabrikant.
- „ H. Strauss, Commis.
- „ E. v. Stromer, Oekonom.

- „ E. Ph. Thies, Kaufmann.
- „ C. Tölke, Kunst- und Handelsgärtner.

- „ M. Völkel, Oberlehrer.
- „ C. Voit, Chemiker.
- „ E. Vollrath, Kaufmann.

- „ Dr. Weber, prakt. Arzt in Streitberg.
- „ Dr. H. Weger, kgl. Professor am Realgymnasium.
- „ Th. Weigle, Apotheker.
- „ Th. Weigel, Commis.
- „ M. Weigel, Kaufmann.
- „ R. Wegelin, Photograph.
- „ C. J. G. Freiherr v. Welser, Rittergutsbesitzer.

- „ J. Werther, Fabrikbesitzer.
- „ J. F. Weyssel, priv. Apotheker.
- „ A. Wolf, Oberlehrer.

- Herr L. K. Wucherer, kgl. Bez.-Maschinenmeister.
- „ K. Wünsch, Commis.
 - „ E. Zahn, Kaufmann.
 - „ J. Zeltner, Fabrikbesitzer.
 - „ J. Zeltner, Fabrikbesitzer.
 - „ Heinr. Zeltner, Fabrikbesitzer.
 - „ J. G. Ziebland, Ingenieur und Assekuranz-Inspector.
 - „ Zöbisch, Chemiker.
-

Systematische Uebersicht

der

Fliegen,

welche in Bayern und in der nächsten Umgebung vorkommen,

z u s a m m e n g e s t e l l t

von

Georg Kittel

und

Dr. Kriechbaumer,

Adjunct an der zoologischen Sammlung des Staates.

Hiemit übergeben wir den ersten Theil des Verzeichnisses der in Bayern vorkommenden Fliegen der Oeffentlichkeit; dasselbe ist nicht erschöpfend, dürfte jedoch eine Anregung zu fernerm Forschen sein. Die Zusammenstellung erfolgte nach: *Fauna austriaca*, die Fliegen von *Rudolph Schiner*, Wien 1862. Ferner wurde dabei benützt: *Fauna Ratisbonensis* von *K. L. Koch*, *Dr. A. Herrick-Schäffer* und *F. Forster*, Regensburg 1840; *Patriz Trost*, kleiner Beitrag zur Entomologie in einem Verzeichnisse der eichstädtischen bekannten und neuentdeckten Insekten, Erlangen 1801; *Schrank*, *Fauna Boica*, III. Theil, 1803; *Stettiner Entomol. Zeitung*, 25. Jahrgang 1864. p. 145 u. s. f., einige neue Dolichopoden aus dem bayerischen Hochgebirge von *A. Gerstäcker*; *Meigen*, systematische Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insekten 6 Bde. und Supplementband 7, Hamm 1838, worin die von Herrn Professor *Dr. Walzl* bei München entdeckten Dipteren beschrieben sind; Supplementband 8, Beschreibung europäischer Dipteren von *Dir. H. Loew*, Halle 1869, das *Panzerische* Werk, welches unter der Angabe „Nürnberg“ vorzüglich die von *Hersbruck* bei Nürnberg erhaltenen Arten enthält; ferner physikalisch-statistische Beschreibung des Fichtelgebirges von *Dr. August Goldfuss* und *Dr. Gustav Bischof*, Nürnberg 1817.

Herr Professor *Hoffmann* war so gefällig, uns ein Verzeichniss der von ihm bei Aschaffenburg und Bamberg gesammelten Dipteren mitzutheilen. Herr *Karl Koch* in Nürnberg übergab uns ein Verzeichniss der von ihm bei Nürnberg und an

sonstigen Orten gesammelten Fliegen. Herr Direktor *Loew* war so freundlich, die Bestimmung der von Herrn *Kittel* bei Aschaffenburg, Nürnberg und Augsburg gesammelten Fliegen mit Ausnahme der Gattungen *Platypalpus*, *Lonchoptera*, *Hilara* und *Pipunculus* zu übernehmen und uns ein Verzeichniss seiner in Bayern gefangenen Fliegen einzusenden. Sämmtliche von Herrn *Dr. Kriechbaumer* und seinem Sohne gesammelte Arten sind in reichlichen Exemplaren der Staatssammlung einverleibt. Die Angabe der Fundorte und Fangzeit beruht auf regelmässig geführten Tagebüchern, und sind oft gerade die kurzen Angaben die zusammengestellten Resultate zahlreicher einzelner Notizen.

Die Verfasser.

Familie I. STRATIOMYDAE.

A. Pachygastrinae.

1. *Pachygaster* Meigen.

1) *ater* Panz.

Sargus pachygaster Fall. — *Nemotelus ater* Panz.

Nürnberg, Waigelshof und Erlenstegen, z. s., Juli auf Blättern von *Prunus Padus*, Koch; Regensburg n. g.; Freising z. s., Weihenstephan, Giggenhausen, Juli, gekötschert; Starnberg, beim Stationsgebäude Mühlthal den 12. Juli 1864 ein Weibchen gefangen, Kr.

2) *Leachii* Curt.

Pachygaster pallidipennis Macq.

Reichenhall, n. h., August, Loew.

3) *tarsalis* Zetterst.

Frankfurt, von Heyden.

B. Stratiomynae.

2. *Nemotelus* Geoffroy.

1) *pantherinus* Linné.

Nemotelus uliginosus Meig. — *Stratiomys marginata* Fabr. — *Stratiomys mutica* Sebrank. p. 97. n. 2389.

Nürnberg, Mögeldorf und Dutzendteich, s., Juni, auf niederem Gesträuch, Koch; Augsburg h., Kobel, Juni, Lechfeld bei Mering auf Gräsern geschöpft, Juni; Regensburg n. s.; Eichstädt; auf Wiesen bei Ingolstadt, Schrank; Freising h., bei Weihenstephan, August; München, bei Pasing auf Dolden und Chrysanthemum Kr.

2) *uliginosus* Linné.

bifasciatus Meig. — *Stratiomys mutica* F.

Nürnberg s., Mögeldorf, Juni, Koch.

3) *nigrinus* Fall.

nigrinus Panz.

Nürnberg, Schmausenbuck, Juni s., Koch; Augsburg s., Lechfeld bei Mering am 20. Juni; Regensburg s.; Freising n. h., Weihenstephan, August.

4) *fraternus* Loew.

Frankfurt.

3. *Lasiopa* Brullé.

1) *villosa* Meig.

Clitellaria villosa Meig.

Regensburg s. s.

4. *Ephippium* Latreille.

1) *thoracicum* Schiner.

Clitellaria Ephippium Schrank.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg, s. Herrnhütte und Waigelshof, Juni, auf Blättern niederer Gesträuche, Koch; Augsburg s., Lehrer Bischoff; um Regensburg nach Schäffer; ich fand sie bei Burghausen und Neuburg, Schrank p. 94. n. 2379; München um Pasing, Schleissheim auf grösseren Blättern unter Gebüsch, Ende Mai, doch s., Kr.

5. *Oxycera* Meigen.

1) *trilineata* Fabr.

Stratiomys hypoleon Linné.

Nürnberg, s., bei Almoshof, Sigismund von Praun; Herrnhütte, August, auf Blättern niederer Gesträuche, Koch; Regensburg n. s.; an der Schutter um Ingolstadt, Schrank p. 97. n. 2386; München um Lochhausen, Schleissheim, Juni und Juli, doch s., Kr.

2) *leonina* Panz.

Regensburg s.; Freising ein Weibchen am Waldrande bei Gigenhausen gekötschert, 27. Juli 1871. Reichenhall n. h., August, Loew.

3) *amoena* Loew.

Freising, ein Stück bei Weihestephan gekötschert, August.

4) *pulchella* Meig.

hypoleon Stäger. — *rara* Walk.

München in den Gasteiganlagen; Tegernsee an den Spazierwegen über die Anhöhen; Rosenheim in den Innauen bei Hochstädt, überall nur einzeln, auf Blättern sitzend, Juni, Juli und Anfang August, Kr.; um Reichenhall, Schrank p. 96. n. 2385.

5) *Meigenii* Stäger.

hypoleon Fabr. Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg s.; Augsburg ein Weibchen; Regensburg s.; um Starnberg ein Männchen gefangen, Ende Juni, Kr.

6. *Stratiomys* Geoffroy.

1) *longicornis* Scopol.

strigata Fabr. Panz. — *villosa* Meig. — *nubeculosa* Meig.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg, z. h., Waigelshof, Glaishammer, Mai und Juni, auf blühenden Spiräen und anderem Gesträuch, Koch; Augsburg; Regensburg g; Eichstädt, München, Ende Mai bis Mitte Juli n. s., an der Isar sowie an der Würm bis Starnberg, Kr.

2) **Potamida Meig.**

chamaeleon Meig.

Nürnberg n. h.; Regensburg s. s.; München bei Pullach, Mitte Juli, *Kr.*

3) **concinna Meig.**

Regensburg n. g.

4) **equestris Meig.**

München um Schleissheim, Ende Juni und Anfang Juli n. s., *Kr.*

5) **furcata Fabr.**

panthaleon Fall.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August, auf Dolden, *Koch*; Regensburg g.; München, Ende Mai, sowie Juni und Juli um Schleissheim n. s., *Kr.*

6) **riparia Meig.**

strigata Meig.

Regensburg s. s.; bei Gern und Ingolstadt, *Schrank* p. 94. n. 2377.

7) **cenisia Meig.**

Regensburg n. s.; Halblech bei Füssen s., Juli, *Koch.*

8) **chamaeleon Degeer.**

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg h., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August und September auf Dolden, *Koch*; Augsburg; Regensburg g.; Eichstädt; München, von Ende Mai den Sommer hindurch fast überall, die gemeinste Art, *Kr.*; Halblech bei Füssen, Juli, *Koch*; Larve in stillen Wässern, die voll Entengrün (Lemna) sind, *Schrank* p. 93. n. 2376.

9) **tomentosa Schrank.**

Am Wasser um Ingolstadt, *Schrank* p. 94. n. 2378.

7. **Odontomyia Meigen.**

1) **tigrina Fbr.**

Stratiomys nigrita Fall.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg g., Dutzendteich, Tullnau, Mai und Juni, auf Wiesenblumen, *Koch*; Regensburg s.; Dr. Frölich hat sie bei Ingolstadt gefunden, *Schrank* p. 95. n. 2381.

2) **ornata Meig.**

Stratiomys furcata Latr.

München, den 1. Juni 1868, bei Schleissheim von *Ant. Kr.* ein schon etwas abgeflogenes Männchen gefangen; Rosenheim bei Langenpfunzen am 18. Mai 1869 ein Männchen gefangen, *Kr.*

3) **felina Panz.**

Nürnberg s. s.

4) *viridula* Fabr.

canina Panz. — *bimaculata* Meig. — *dentata* Meig. — *subvittata* Meig. — *jejuna* Schrank p. 96. n. 2384. — *interrupta* Loew.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg g., Dutzendteich, Tullnau, August, auf Wiesenblumen, Koch; Augsburg n. s., Lechfeld bei Mering, gekötschert, Juni; Regensburg g., Eichstädt, um Eggenfelden, um Gern, Schrank p. 96. n. 2383; Freising n. s., Attachingen Au, Juli; München, um Schleissheim, Ende Mai und Juni, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

5) *hydroleon* Panz.

vulpina Panz. — *angulata* Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg s., Erlenstegen, Herrnhütte, Juli und August, auf Jasione, Koch; Regensburg g.; München an der Isar und Würm; um Hochstädt; bei Miesbach und Oberwessen im Gebirg Juli und Anfang August ziemlich g., Kr.; die Fliege kommt sparsam in Weidengebüschen vor, Junius, Schrank p. 95. n. 2382.

6) *angulata* Panz.

rußcornis Zetterst. — *brevicornis* Loew.

Nürnberg; Augsburg n. h., Lehrer Bischoff; Eichstädt; München, um Schleissheim, Ende Juni und Juli n. s. s. Kr.

7) *hydropota* Meig.

München, um Schleissheim, Ende Juni und Juli, ziemlich s., Kr.

8) *argentata* Fabr.

Nürnberg n. h., Mai; Augsburg n. h., Wertachufer bei Pfersee auf niederen Pflanzen, Mai; Regensburg s. s.; München, um Schleissheim auf blühenden Weiden Ende April und Anfang Mai ziemlich g., die Männchen flogen wie kleine Silberflocken an, Kr.

9) *microleon* Linn.

hydrodromia Meig.?

Bamberg, Prof. Hoffmann; München den 28. Mai 1870 bei Passing ein Männchen gefangen, Kr.

C. *Sarginae*.

8 *Sargus* Fabricius.

1) *infuscatus* Meig.

auratus Meig. — *cuprarius* Fall. — *Musca iridata* Scop.

Nürnberg n. h.; Augsburg; Regensburg n. g.; Freising n. s.; München, Tegernsee ziemlich g., vom Juni bis Ende Juli, Kr.

2) *cuprarius* Linn.

coeruleicollis Meig. — *Musca violacea* Scopol. — *Nemotelus* Degeer. — ?*Rhagio politus* Schrank p. 99. n. 2394.

Aschaffenburg g.; Würzburg; Fichtelgebirg; Nürnberg g., vom Mai an den ganzen Sommer hindurch auf Blättern niederer Gesträuche, Koch; Augsburg g.; Oettingen; Regensburg; Eichstädt; Freising g.; München, Tegernsee, Juni bis September, Kr.; auf Blüten, Schrank. Reichenhall g., August; Kreuth, August, Loew.

3) *nubeculosus* Zett.

Reichenhall n. h., August, *Loew.*; Kreuth n. h., August, *Loew.*

4) *flavipes* Meig.

München, bei Thalkirchen, Anfang Oktober; Tegernsee, am Weg zum Lieberhof, September, n. s., *Kr.*

9. *Chrysomyia* Macquart.

1) *polita* Linné.

Sargus cyaneus Fabr. — *Sargus splendens* Meig. — *Microchrysa polita* Loew.

Nürnberg g., vom Mai an den ganzen Sommer auf Blättern niederer Gesträuche, *Koch*; Augsburg h., Wertachufer bei Pfersee; Ottingen; Regensburg s.; Freising n. s.; München, in den Isaraueu, um Schleissheim, Juni und Juli n. s. s., *Kr.* Reichenhall g., August, *Loew.*

2) *formosa* Scopol.

enpraria Scopol. — *Sargus xanthopterus* Fabr. Meig. — *Sargus azureus* Loew. — *Nemotelus flavogenuiculatus* Deg. — *Rhagio formosus* Schrank p. 99. n. 2395.

Aschaffenburg; Nürnberg g., vom Mai an den ganzen Sommer auf Blättern niederer Gesträuche, *Koch*; Augsburg h., Spickel Juli, Lechfeld bei Mering, Juni; Regensburg g.; Freising h.; München, Starnberg und Tegernsee, Juni und Juli g., *Kr.*; auf Blüten, Junius, *Schrank.* Reichenhall g., August, *Loew.*

3) *flavicornis* Meig.

Reichenhall n. h., August, *Loew.*

D. *Berinae.*

10. *Acanthomyia* Schiner.

1) *dubia* Zetterst.

Gastein, *Dr. Giraud.*

11. *Beris* Latreille.

1) *clavipes* Linn.

Stratiomys clavipes Panz.

Nürnberg s. s., in Gärten auf Gesträuch, Juni; Augsburg s. h., Schwimmschule, Mai, Kobel, Juni; Regensburg s. s.; Freising n. s., Weihenstephan, Mai; München, an der Isar und Würm n. s., Mai bis Mitte Juni, *Kr.*

2) *vallata* Forster.

Actina clavipes Meig. — *nigritarsis* Latr.

Nürnberg s. s., Waigelshof, Herrnhütte, auf Gesträuch, Juli und August, *Koch*; Augsburg, ein Stück am Fenster der Ablasswirthschaft, Ende Juli; München, zwischen Hesselohle und Pullach an der Isar Mitte Juli ein Weibchen gefangen, *Kr.*

3) *chalybeata* Walker.

Stratiomys sexdentata Fabr. — *Actina atra* Meig. — *flavipes* Macq. — *obscura* Zetterst.

Regensburg s. s.; Tegernsee, Anfang Juni n. s., *Kr.*

4) *fuscipes* Meig.

geniculata Curtis.

Tegernsee, am Albach und in der Söllbachau einzeln, Anfang Juni, Kr.

5) *Morrisii* Dale.

pallipes Loew.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura) auf Gesträuch, Juli, Koch. München in den oberen Isarauen um Hesseloh und Pullach, im Juli n. s., und wie die anderen Arten auf Blättern und Gesträuch; Tegernsee, vom Albach zum Westerhof Ende August ein Weibchen gefangen, Kr. Partenkirchen, Reichenhall g., August; Kreuth n. h., August, Loew.

12. *Actina* Meigen.

1) *tibialis* Meigen.

Freising ein Stück bei Weißenstephan, am 17. August gekötschert.

Familie II. **XYLOPHAGIDAE.**

13. *Xylophagus* Meigen.

1) *ater* Fabr.

compeditus Wiedem.

München, von Herrn Dr. Kriechbaumer aus der Larve gezogen, zwischen Gauting und Petersbrunn bei Starnberg Mitte Juni ein Weibchen gefangen, Kr.

2) *cinctus* Degeer.

Nemotelus cinctus Degeer. — *Pachystomus syrphoides* Schiner. — *Rhagio syrphoides* Panz. — *Empis subulata* Panz.

Bayreuth; Regensburg; Tegernsee in der Sillbachau Ende September ein Weibchen gefangen, Kr.

Familie III. **COENOMYIDAE.**

14. *Coenomyia* Latreille.

1) *ferruginea* Scopol.

Tabanus bidentatus Fabr. — *Tabanus hispidus* Fabr. — *Stratiomys errans* Fabr. — *Sicus ferrugineus* Fabr. — *Stratiomys macroleon* Panz. — *Stratiomys unguiculata* Panz. — *Stratiomys errans* Panz. — *Stratiomys grandis* Schrank p. 92. n. 2373. — *Stratiomys palatina* Schrank p. 93. n. 2375. — *Stratiomys major* Schrank p. 93. n. 2374. — *Sicus unicolor* Meig. — *Sicus bicolor* Meig. — *Sicus aureus* Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg n. h., Juli; Augsburg n. h.; Kaufbeuren, Rektor Buchner; Regensburg n. s.; Eichstädt; um Burghausen, bei Gern und im ehemaligen Donaumoore um Neuburg, Schrank; München, in den oberen Isarauen und an der Würm von Pasing bis Petersbrunn, Juni, manchmal ziemlich g.; Tegernsee, am Albach ein Männchen gefangen, Kr.

Familie IV. **TABANIDAE.**

A. Tabaninae.

15. *Tabanus* Linné.

1) *micans* Meig.

signatus Meig. — *austriacus* Fabr.

Nürnberg, zieml. s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Koch; Starnberg, ein Weibchen Ende Mai von meinem Sohne bei Ambach gefangen, Schliersee bei der Wurzelhütte am Spitzingsee am 24. Juni 1870 mit mehreren der folgenden Arten an Baumstämmen schwärmend 5 Weibchen gefangen, Kr.

2) *auripilus* Meig.

Schliersee, mit dem vorigen in grosser Anzahl gefangen, Kr.

3) *aethiops* Ljungh.

aterrimus Meig.

Schliersee, 4 Weibchen mit den vorigen gefangen, Kr.

4) *gigas* Herbst.

ignotus Rossi. — *albipes* Fabr.

Regensburg s. s.; München, ein Weibchen an einem Strauch bei Maria Einsiedl gefangen, Kr.

5) *tarandinus* Linné.

München, bei Grünwald von Dr. Gemminger gefangen; Tegernsee den 12. Juni 1846 ein Weibchen bei Gmund gefangen, Kr.

6) *luridus* Fall.

tropicus Panz. Schrank p. 154. n. 2533.

Fichtelgebirg; Nürnberg n. h., Schmausenbuck, Dutzendteich, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; Regensburg g.; Eichstädt; München, zwischen Thalkirchen und Pullach s., Schliersee mit Nr. 1, Kr.

7) *tropicus* Linn.

luridus Loew.

Nürnberg, z. s.; Schmausenbuck, Mai bis August, Koch.

8) *quatuornotatus* Meig.

Nürnberg, z. s., Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), auf Dolden und auf Kühen, Juni, Juli, Koch.

9) *pilosus* Loew.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Koch.

10) *rusticus* Linn.

italicus Fabr.

Fichtelgebirg; Nürnberg, z. s., Spitalhof, Juni, Koch; Augsburg n. s.; Regensburg g.; Eichstädt; München, zwischen Thalkirchen und Pullach s.; Schliersee mit Nr. 1, Kr. (Schrank p. 154. n. 2532.)

11) **fulvus** *Meig.*

alpinus Panz. Curt.

Regensburg n. s.; ich fing das Insekt bei Gern, *Schrank* p. 154. n. 2534; München, wie der vorige um Schleissheim, Ende Juni und Anfang Juli, Schliersee mit Nr. 1, *Kr.*

12) **ater** *Fabr.*

morio Fabr. — *fuscatus* Macq.

Nürnberg s. s.; Regensburg s. s.

13) **spodopterus** *Meig.*

Nürnberg g., Pommelsbrunn (fränk. Jura) und Pillenreuth, an Köhen, Juni bis September, *Koch*; Regensburg g.; München, um Schleissheim Ende Juni und Anfang Juli, *Kr.*

14) **sudeticus** *Zeller.*

Nürnberg s., Falznerweiher, Juli und August, *Koch*; München, Tegernsee, Schliersee, nirgends s., *Kr.*

15) **bovinus** *L.*

Ueberall g.; Juni bis Herbst (*Schrank* p. 153. n. 2529.)

16) **infuscatus** *Loew.*

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August, auf Dolden, *Koch.*

17) **cognatus** *Loew.*

Nürnberg s. s., Falznerweiher, September, *Koch.*

18) **glaucopis** *Meig.*

ferrugineus Meig. — *lunulatus* Meig. — *flavicans* Zell.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August, auf Dolden; *Koch*; Augsburg ein Stück.

19) **cordiger** *Meig.*

atricornis Meig. — *laticornis* Zetterst.

Nürnberg, ein Stück.

20) **autumnalis** *Linn.*

autumnatus Scop. *Schrank* p. 153. n. 2530.

Augsburg n. h.; Regensburg g.; Eichstädt.

21) **bromius** *Linn.*

maculatus Degeer.

Aschaffenburg; Würzburg; Nürnberg g., Juni bis August, *Koch*, bei Lichtenhof, September, *Kittel*; Augsburg g.; Oettingen, Regensburg g.; Freising; München, Tegernsee, Rosenheim, die gemeinste Art, *Kr.*

22) **glauescens** *Schiner.*

glaucus Meig.

Regensburg n. s.; München, Schliersee n. s., *Kr.*

16. *Hexatoma* Meigen.

1) *pellucens* Fabr.

Heptatoma bimaculata Meig. — *Tabanus albipes* Schrank p. 154. n. 2531.

Nürnberg s., einigemale gesehen, Koch; Regensburg n. g.; München, ein Männchen Anfang Mai bei Pasing gefangen, ein Exemplar Anfang September in den Isarauen gesehen, aber nicht erhalten, Kr.

17. *Haematopota* Meigen.

1) *italica* Meig.

elongata Curt. — *gymnonota* Brullé. — *longicornis* Macq. — *tenuicornis* Macq. — *grandis* Macq.

Nürnberg n. s., Schmausenbuck, Ende August, Kittel, Pommelsbrunn (fränk. Jura), zieml. s., Koch; Augsburg s.; Oettingen; Freising; München, ob der Meterschwaige nach einem warmen Gewitterregen in Mehrzahl in den aufgespannten Regenschirm geflogen; Hohenschwangau, Kr.

2) *pluvialis* Linn. (Schrank p. 155. n. 2535.)

equorum Fabr. — *hyentomantis* Schrank p. 155. n. 2536. — *crassicornis* Wahlbg.

Aschaffenburg; Würzburg; Fichtelgebirg; Nürnberg den ganzen Sommer, Koch; Augsburg; Oettingen; Regensburg; ich fand diese Bremse bei Gern, Schrank; Freising; München; Tegernsee; Hohenschwangau, Kr.

B. *Pangoninae*.

18. *Chrysops* Meigen.

1) *marmoratus* Rossi.

flavipes Meig. — *fenestratus* Latr. — *italicus* Loew. — *nigriventris* Loew. — *Tabanus salinarius* Scopol.

Regensburg s. s.

2) *rufipes* Meig.

Nürnberg z. s., Dutzendteich, Juli, Koch; Regensburg s.

3) *sepulcralis* Fabr.

Nürnberg s., in Gärten, Mögeldorf, Mai bis Juli, Koch.

4) *quadratus* Meig.

pietus Meig. — *viduatus* Meig.

Nürnberg g., Dutzendteich, Falznerweiher, Juni und Juli, Koch; Regensburg n. s.; München, um Schleissheim Ende Mai bis Anfang Juli ziemlich g., Kr.

5) *caecutiens* Linn.

Tabanus lugubris Linn. — *viduatus* Fabr.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Dutzendteich, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli bis August, Koch; Augsburg n. s., sie fliegt gerne unter dem aufgespannten Regenschirm; Regensburg g.; Eichstädt; Freising n. s., Juni; München allenthalben g., Juni und Juli, Kr.

6) *relictus* Meig.

viduatus Meig. — *caecutiens* Panz.

Nürnberg g., Dutzendteich, Falznerweiher, Juni bis August, Koch; Regensburg n. s.; München allenthalben n. s., Ende Mai, Juni und Juli, Rosenheim, in den Innauen bei Hochstädt, Anfang August, Kr.

19. *Silvius* Meigen.

1) *vituli* Fabr.

Nürnberg s., Falznerweiher und Pommelsbrunn, Juni bis August, Koch; Augsburg ein Stück, März; München, um Schäftlarn, Juni, Tegernsee ziemlich s., Kr.

Familie V. BOMBYLIDAE.

A. Anthracinae.

20. *Anthrax* Scopoli.

1) *fenestrata* Fall.

Asilus morio Linn. — *maura* Meig. — *variegata* Wiedem. — *ornata* Curtis.

Nürnberg g., auf Sand, Juni bis August, Koch; Augsburg; Regensburg s.

2) *maura* Linn.

bifasciata Meig. — *Nemotelus maurus* Deg. — var. *Daemon* Panz.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg g., Mai bis August, Koch; Regensburg g.; München, zwischen Hessel-lohe und Pullach, Juni und Juli, ziemlich s., Kr.

3) *morio* Linn.

semitra Meig.

Aschaffenburg n. s. an sonnigen Abhängen bei Kleinostheim, Juli; Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg g., in waldigen Gegenden auch an Hecken, Mai bis August; Augsburg; Regensburg g.; Eichstädt; München, bei Pullach, Juli, s., Kr.

4) *velutina* Meig.

nycthemera Meig. — *bicincta* Meig. — *holosericeus* Meig.

Nürnberg, einmal gefangen, Juli, Koch.

5) *afra* Fabr.

flimbriata Meig.

Nürnberg n. g., Mögeldorf und Dutzendteich, Juni und Juli, Koch; Regensburg s. s.

6) *Paniscus* Rossi.

cingulata Meig. — *modesta* Meig.

Nürnberg h., bei der Stadt und bei Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, Koch; Regensburg s.; München, um Schleissheim n. s. s., Juli Kr.

7) *scutellata* Meig.

München, Prof. Dr. Walzl.

8) *flava* Meig.

hottentottus Meig.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg g., Juli und August, Koch; Augsburg; Regensburg n. s.; München, in den oberen Isaraueu, um Schleissheim, Juli, n. s., Kr.

9) *hottentotta* Linn.

circumdata Meig. — *cingulata* Ahr. — *Nemotelus hottentottus* Deg.

Nürnberg g., Dutzendteich, Juni bis August, Koch; Augsburg; Regensburg s.; Eichstädt; München, überall, und zuweilen ziemlich g., Ende Juni und Juli, Kr.

21. *Argyromoeba* Schiner.

1) *sinuata* Fall.

Musca Anthrax Schrank. — *Musca morio* Linn. — *Anthrax sinuata* Fall.

Nürnberg s., bei der Stadt und bei Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni bis August, Koch; Augsburg s.; Regensburg s.; München, in den oberen Isaraueu hie und da an Zäunen, Baumstämmen, Holzhaufen, Juni und Juli, Kr.

2) *varia* Fabr.

Nürnberg s., Falznerweiher, Herrnhütte, April bis August, Koch.

22. *Exoprosopa* Macquart.

1) *vespertilio* Wiedem.

Anthrax Megerlei Meig.

Regensburg, einmal.

2) *varia* Fabr.

Nürnberg g., Dutzendteich, Mai bis Juli, Koch.

3) *Pandora* Fabr.

Jochus Fabr. — *Jachus* Fabr. — *Megaera* Meig. — *italica* Meig.

Regensburg n. s.

4) *stupida* Rossi.

Anthrax Rhadamanthus Meig.

Regensburg s. s.

B. Bombylinae.

23. *Lomatia* Meigen.

1) *lateralis* Meig.

Anthrax Belzebul Panz.

Nürnberg, stellenweise häufig, Erlenstegen und Tullnau, Juli, Koch; Regensburg n. s.; Eichstädt; Freising am 17. Juli 1870 in grosser Anzahl an sonnigen Abhängen bei Weißenstephan auf Blüten von *Galium verum*.

24. *Bombylius* Linné.

1) *ater* Scop.

Nürnberg g., Tullnau, Dutzendteich, Mai bis Juli, Koch; Regensburg g.; Eichstädt; um Ingolstadt n. s., Schrank p. 174. n. 2584.

2) *pictus* Panz.

planicornis Fabr.

Nürnberg n. s. s.; Dinkelsbühl s., Pfarrer Wolff; Regensburg s. s.; Herr Jeunet Duval hat ihn bei Dachbetten gefangen, Schrank p. 173. n. 2580.

3) *discolor* Mikan.

medius Meig. Walk. — *concolor* Zell.

Nürnberg n. s., Hersbruck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), April und Mai, Koch; Dinkelsbühl n. s., Pfarrer Wolff; Rosenheim, um Hochstädt, Ende April, Kr.; auf Blüten, Schrank p. 173. n. 2578.

4) *medius* Linn.

concolor Mikan. — *discolor* Macq. — *punctatus* Deg.

Fichtelgebirg; Regensburg n. s.

5) *major* Linn.

sinuatus Mikan. — *variegatus* Deg.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg g., Schmausenbuck, Herrnhütte, März bis Mai, Koch; Regensburg g.; München, bei Hessellohe, Geiseltasteig, Ende April, Tegernsee am Abbach, Mitte April, Kr.

6) *flmbriatus* Meig.

dimidiatus Meig. — *diagonalis* Meig.

Regensburg s.

7) *vernus* Mikan.

holosericeus Meig.

Nürnberg g., Tullnau, Dutzendteich, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Dinkelsbühl h., Pfarrer Wolff; München g., bei Pasing auf *Thymus serpyllum* n. s., Ende Mai, Kr.

8) *canescens* Mikan.

Nürnberg s., Tullnau, Mögeldorf, Erlenstegen, Mai bis Juli, Koch; Freising n. s. s., Weihestephani, Juni.

9) *fugax* Wiedem.

vulpinus Meig. Loew. — *posticus* Meig.

Regensburg s.

10) *cinerascens* Meig.

flavillaceus Meig.

Aschaffenburg; Prof. Hoffmann; Nürnberg g., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch.

11) *fulvescens* Meig.

longirostris Meig. — *apicalis* Meig.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Dutzendteich, Juni und Juli, Koch;
Freising h., Pförer Au, Ende Mai.

12) *minor* Linn.

dilutus Meig. — ♀ *subcinctus* Meig.

Nürnberg s.; Regensburg g.; auf Blüthen, Schrank p. 173
n. 2579.

25. *Systoechus* Loew.

1) *nitidulus* Fabr.

Bombylius diadema Meig. — *Bombylius caudatus* Meig.

Nürnberg h., Erlenstegen, Glaishammer, August, Koch; Regens-
burg s.

2) *sulphureus* Mikan.

Bombylius minimus Fabr. — *Bombylius flavus* Meig. — *B. fulvus* Meig. —
B. etenopterus Walk.

Nürnberg g., Dutzendteich, Falznerweiher, Juni bis August, Koch.

3) *etenopterus* Mikan.

Bombylius aurulentus Meig.

Nürnberg g., Dutzendteich, Mögeldorf, Schmausenbuck, Juni bis
August, Koch; Regensburg s.

26. *Dischistus* Loew.

1) *minimus* Schrank p. 174 n. 2581.

Bombylius sulphureus Fabr.

Nürnberg s., er schwebt auf Blüthen, Schrank.

27. *Ploas* Latreille.

1) *virescens* Fabr.

Bombylius maurus Mikan. — *hirticornis* Latr. — *lurida* Meig.

Nürnberg s., Falznerweiher, Glaishammer, Mai und Juni, Koch;
Regensburg g.

28. *Phthiria* Meigen.

1) *pulicaria* Mikan.

Volucella pygmaea Fabr. — *campestris* Fall. — *nigra* Meig.

Nürnberg s. s., Mögeldorf, Juni, auf niederem Gesträuch, Koch;
Augsburg s., Regensburg s.

2) *canescens* Loew.

Nürnberg g., Mögeldorf, Juni und Juli, auf niederem Gesträuch,
Koch.

Familie VI. ACROCERIDAE.

29. *Acrocera* Meigen.

1) *globulus* Panz.

albipes Meig. — *orbiculus* Meig. — *tumida* Erichs. — ♂ *Syrphus orbiculus* Fabr.

Nürnberg s. s., am Canal bei Gibitzenhof, auf Weidenblättern, von Hauser einmal gefangen; Regensburg s. s.; München, am 16. Juni 1868 ein Weibchen von meinem Sohne bei Pasing gefangen, Kr.

30. *Ogcodes* Latreille.

1) *gibbosus* Linn.

leucomelas Meig. — *cingulatus* Erichs.

Aschaffenburg; Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg s. s., Dutzendteich und Falznerweiher, Juni, im Grase, Koch; Augsburg s., in der Nähe der Ablasswirthschaft am 24. Juni auf Gras gekötschert; Regensburg g.; Ammerland am Starnberger See, am 10. Juni gekötschert.

2) *zonatus* Erichs.

gibbosus Latr. — *Syrphus gibbosus* Panz.

Nürnberg g., Herrnhütte, am Canal bei Gibitzenhof, sitzt an den Spitzen der Weidenblätter, August, Koch; Regensburg.

Die Larven leben in den Eiersäcken von *Clubionen* und fressen dieselben aus.

Familie VII. EMPIDAE.

A. Hybotinae.

31. *Cyrtoma* Meigen.

1) *nigra* Meig.

Nürnberg; München, den 29. Mai 1864 zwischen Hesselohr und Pullach ein Männchen gefangen, Kr.

2) *spuria* Fall.

atra Meig.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Falznerweiher, Juni bis August, Koch; Augsburg s. h.; München, allenthalben n. s.; Rosenheim, bei Hochstädt von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Schliersee, am Spitzingsee ein Männchen gefangen, Anfang Juni bis Anfang August, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

3) *simplicipes* Zett.

Reichenhall g., August, Loew.

4) *basalis* Loew.

Reichenhall g., August, Loew.

32. *Pterospilus Rondani.*

1) *muscarius Fabr.*

Stomoxys asiliformis Fabr.

Nürnberg s., Mügeldorf, auf Gras, Juni, Koch; Freising n. s. s., Weihenstephan auf Gras gekötschert am 19. Juli 1870; am Starnberger See bei Seeshaupt h., August, Koch.

33. *Hybos Meigen.*

1) *grossipes Linn.*

Empis clavipes Fabr. — funebris Fabr. — pilipes Curtis.

Nürnberg g., Falznerweiher, Juni bis August, Koch; Augsburg n. h.; um Ingolstadt, April, Schrank, p. 161 n. 2558; Freising; München allenthalben g., Starnberg im Mühlthal, Tegernsee im Lerchenwald bei Wiessee, Mitte Juni bis Mitte Oktober, Kr.

2) *culiciformis Fabr.*

vitripennis Meig.

Nürnberg s., Dutzendteich, Falznerweiher, Pommelsbrunn, Moritzberg (fränk. Jura), Juli, August, Koch; Augsburg h.; München bei Hessellohe hie und da, Mitte Juli bis Mitte Oktober, Kr.

3) *fumipennis Meig.*

Nürnberg s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Juli und August, Koch; Reichenhall g., August, Loew.

4) *femoratus Müll.*

flavipes Fabr. Meig.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, Juli, Koch; München um Hessellohe und Pullach, Starnberg im Mühlthal; Tegernsee am Albach und am Wege zum Lieberhof n. s., Ende Juni bis Mitte September, Kr.; Reichenhall g., August, Loew.

B. Ocydrominae.

34. *Microphorus Macquart.*

1) *velutinus Macq.*

pusillus Macq. — fuscipes Zetterst.

Augsburg n. h.; München, bei Hessellohe gegen Ende Juli drei Weibchen gefangen, Kr.

35. *Ocydromia Meigen.*

1) *glabricula Fall.*

Nürnberg g., Mai bis August, Koch; Augsburg h.; Oettingen; Regensburg; Freising n. s., Plantagenwald, Juni; München, an der Isar bis Pullach, bei Pasing, Lochhausen, ziemlich g.; Rosenheim, um Hochstätt von Aut. Kr. gefangen, Tegernsee im Lerchenwald, Hohenschwangau; die Männchen meist der var. *dorsalis* seltener *nigripennis*, die Weibchen weitaus am häufigsten in der typischen Form, *glabricula* Meig. seltener als die var. *rufipes* Meig., Anfang Juni bis Mitte Oktober, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

var. *scutellata* Meig.

Augsburg.

var. *rufipes* Meig.

Augsburg, Freising, Weißenstephan, Juni.

var. *dorsalis* Meig.

Augsburg.

36. *Leptopeza* Macquart.

1) *ruficollis* Meig.

München, den 27. Juli 1864 im Sommerhaus bei Hesselohr ein zur var. b. Zett. gehöriges Weibchen gefangen, Kr.

37. *Euthyneura* Macquart.

1) *myrtilli* Macq.

Augsburg, ein Stück aus Weidenmoder vom Rosenauerg gezogen am 22. April 1867.

C. Hemerodrominae.

38. *Hemerodromia* Meign.

1) *flavella* Zetterst.

melanocephala Haliday.

Augsburg s.; Freising n. s., Wiesenwald, Juni.

2) *stigmatica* Walk.

monostigma Zett.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, Koch; Rosenheim zwischen dem 13. und 23. September um Hochstätt ein Männchen von Ant. Kr. gefangen, Kr.

3) *praecatoria* Fall.

monostigma Meig.

Partenkirchen n. h., August, Loew.

4) *albicornis* Meig.

raptoria Fall.

Nürnberg s.

5) *unilineata* Zett.

oratoria Meig.

Starnberg den 12. Juli 1864 beim Stationsgebäude Mühlthal ein Männchen gefangen, Kr.

39. *Clinocera* Meign.

1) *Robertii* Macq.

Kreuth, August, n. h., Loew.

2) *lamellata* Loew. ♂

Bayern, wo ich sie im August bei Partenkirchen fing, Loew.

3) **aquilex** *Loew.* ♂ ♀

Bayern, wo ich das Männchen im August bei Partenkirchen und mehrere Weibchen bei Kreuth fing, *Loew.*

4) **appendiculata** *Zett.*

Kreuth, n. h., August, *Loew.*

40. ***Ardoptera*** *Macquart.*

1) **irrorata** *Fall.*

Nürnberg s.; Augsburg h. am Lechufer; Freising n. s.; München, den 20. Juni 1870 ob den Ueberfällen ein Männchen gekötschert, im Oktober 1865 im Sommerhaus in Hessellohe von *Ant. Kr.* ein Weibchen gefangen, *Kr.*

41. ***Sciodromia*** *Haliday.*

1) **immaculata** *Halid.*

fuscipennis Rossi. — *Microcera rostrata* Zetterst.

Augsburg, ein Stück; Partenkirchen n. h., August, *Loew.*

42. ***Phyllodromia*** *Zetterstedt.*

1) **melanocephala** *Fabr.*

Tachydromia mantispa Panz. — *obscuratoria* Walk.

Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Augsburg, von Herrn Dir. *Loew* am 30. Juli 1867 ein Stück am Lechablass gefangen; Freising, Weihenstephan an Baumstämmen laufend, Juni.

2) **albiseta** *Zetterst.*

vocatoria Meig.

Nürnberg s., Dutzendteich, Juli, *Koch*; Augsburg s.

43. ***Trichopeza*** *Rondani.*

1) **longicornis** *Meig.*

Starnberg; den 27. Juni 1869 zwischen Gaubing und Petersbrunn ein Männchen, wahrscheinlich gekötschert; Tegernsee, am 30. August 1864 im Lerchenwald ein Männchen gefangen, *Kr.*

D. Tachydrominae.

44. ***Platypalpus*** *Macquart.*

1) **maculipes** *Meig.*

Augsburg n. s.

2) **flavipes** *Fabr.*

vulgaris Meig.

Nürnberg h., Waigelshof, Herrnhütte, Mai bis Juli, *Koch*; München, je ein Weibchen bei Hessellohe und Dachau, Mitte Juni und Anfang Juli gefangen, ein Weibchen bei Hochstätt, Anfang Juni von *Ant. Kr.* gefangen, *Kr.*

3) *cothurnatus* *Macq.*

Augsburg s.

4) *major* *Zett.*

(?) *luteicornis* *Meig.*

Nürnberg h., Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, *Koch.*; München, um Hessellohe und Geiselgasteig n. s.; Starnberg, im Mühlthal, Ende Mai bis Mitte Juli, *Kr.*

5) *flavicornis* *Meig.*

Nürnberg s.; Augsburg n. h.

6) *varius* *Walk.*

München, bei Pasing vier Weibchen, bei Hessellohe ein solches gefangen, Anfang und Mitte Juli, *Kr.*

7) *infuscatus* *Meig.*

München, zwischen Hessellohe und Pullach, wahrscheinlich auf der Wiese hinter'm Beerwein gekötschert, drei Männchen, zwei Weibchen, Ende Juni *Kr.*

8) *bicolor* *Fabr.*

München, *Kr.*

9) *cursitans* *Fabr.*

Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelshof, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, *Koch.*; Augsburg n. g.; Freising; München, allenthalben im Grase ziemlich g.; Starnberg bei Ammerland; Rosenheim, um Hochstätt von Ant. *Kr.* gefangen; Tegernsee, beim Parapluie, Ende April bis Mitte Juli, *Kr.*

10) *minutus* *Meig.*

T. annulata *Meig.*

Nürnberg h., Dutzendteich, Schmausenbuck, Tullnau, Waigelshof, Mai bis Juni, *Koch.*; München, allenthalben im Grase n. s., Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. *Kr.* gefangen, Ende Mai bis Anfang August, *Kr.*

11) *calceatus* *Meig.*

Augsburg, n. g.

12) *candicans* *Fall.*

Nürnberg s., Glaishammer, Mai; Augsburg n. s.

13) *fasciatus* *Meig.*

Nürnberg h.; Augsburg h.; München, in den Isarauen bis Pullach hie und da, Ende Mai bis nach Mitte Juni, *Kr.*

14) *notatus* *Meig.*

Tachydromia fascipes *Meig.*

Nürnberg h., Waigelshof, Glaishammer, Herrnhütte, Mai bis Juli *Koch.*

15) *fulvipes* *Meig.*

Nürnberg s., Schmausenbuck, Waigelshof, Mai bis Juli, *Koch.*

16) *castanipes* Meig.

♀ *Tachydromia vivida*.

München, Prof. Dr. Walzl.

17) *luteicornis* Meig.

Augsburg s.; München, Prof. Dr. Walzl.

18) *albo-capillatus* Fall.

Augsburg s.

19) *niger* Fall.

Augsburg s. s.

20) *cellaris* Fall.

Nürnberg s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Juni, Koch; München, ein Weibchen am 19. September 1863 im Sommerhaus in Hessellohe gefangen, Kr.

21) *flavipalpis* Meig.

München, am 4. August 1863 bei Hessellohe von Ant. Kr. ein Weibchen, am 6. Juli 1870 bei Pasing von mir ein solches gefangen, Kr.

22) *albo-capillatus* Fall.

München, am 3. Juli 1864 im Sommerhaus bei Hessellohe ein zur var. *rufipes* gehörendes Weibchen gefangen, Kr.

23) *comptus* Walk.

Tachydromia stigmatella Zett.

München, am 15. Juni 1870 bei Lochhausen ein Weibchen gekötschert, Kr.

45. *Tachydromia* Meigen.

1) *connexa* Meig.

cimicoides Meig.

Nürnberg n. s.; Augsburg n. s.; Freising, Weihestephán, Juni, an Baumstämmen.

2) *annulimana* Meig.

Augsburg, Schwimmschule am 29. Juli 1867, Dir. Loew.

3) *cimicoides* Fabr.

arrogans Meig — *albitarsis* Zetterst. — *umbrarum* Halid.

Nürnberg h., Herrnhütte, Dutzendteich, an Birkenstämmen laufend, Mai, Koch; München, am ersten Oktober 1864 im Hirschgarten ein Weibchen gefangen, ein zweites erhielt ich von Herrn Dr. Walser aus Schwabhausen, Kr.

4) *nubila* Meig.

Augsburg, Schwimmschule am 29. Juli 1867, Dir. Loew, von mir aus Weidenmoder vom Rosenauberg gezogen am 5. Mai 1867.

5) *calcanca* Meig.

München, Prof. Dr. Walzl.

6) *umbripennis* Meig.

Augsburg ein Stück.

7) *nervosa* Meig.

Freising, Marglinger Wiesen, auf Baumstämmen herumlaufend am 7. Oktober 1869; München, den 24. September 1863 bei Hessellohe, Rosenheim den 18. Mai 1863 bei Hochstätt, Tegernsee, den 7. August 1868 beim Parapluie, überall ein Weibchen gefangen, Kr.

8) *truncorum* Zett.

Augsburg n. h.

Eine, in einem Exemplare bei Augsburg gefangene Art, hält Herr Direktor Löw für unbeschrieben.

46. *Elaphropeza* Macquart.

1) *ephippiata* Fall.

München, ein Weibchen dieser niedlichen Art am 21. Juli 1870 bei Hessellohe oder Pullach, wahrscheinlich unter letzterem gekötschert, Kr.

47. *Drapetis* Meigen.

1) *flavipes* Macq.

Augsburg s.; Kreuth n. h., August, Loew.

2) *assimilis* Fall.

minima Meig. — *exilis* Zetterst.

Augsburg s.; München, Prof. Dr. Wallt.

3) *exilis* Meig.

Augsburg s.

4) *flexuosa* Loew.

Partenkirchen, August, Loew.

E. Empinae.

48. *Rhamphomyia* Meigen.

1) *platyptera* Meig.

marginata Panz. Meig.

Mannheim; Nürnberg, ziemlich h., Schmausenbuck, Falznerweiher, Pommelsbrunn, Morizberg (fränk. Jura) an Waldplätzen auf Weiden fliegend, Männchen und Weibchen, April, Koch; Augsburg bei Deuringen in einem Tannenwalde am 3. Mai 1867 ein Weibchen fliegend gefangen, es flog auffallend schweifällig; München, den 3. Juni 1867 ein Weibchen bei Hessellohe; Starnberg den 22. Mai 1870 ein Weibchen zwischen Ammerland und Ambach an Gesträuch, Kr.

2) *sulcata* Fall.

Nürnberg h., Falznerweiher, Herrnhütte, Pommelsbrunn, Morizberg, Hersbruck (fränk. Jura), April und Mai, Koch; Augsburg n. s., Deuringen, April; München, an der Isar bis Pullach, um Pasing und besonders bei Schleissheim auf blühenden Weiden und Löwenzahn, Mitte April bis Ende Mai, Kr.

3) *cinerascens* Meig.

Nürnberg n. h., Falznerweiher, Hersbruck (fränk. Jura), April und Mai, Koch; Augsburg ein Stück.

4) *tibialis* Meig.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Falznerweiher, Hersbruck (fränk. Jura), auf Schlehenblüthen, April und Mai, Koch.

5) *nigripes* Fabr.

crassirostris Fall.

Nürnberg n. h., Herrnhütte, Hersbruck (fränk. Jura), an Schlehenblüthen, Mai, Koch.

6) *atra* Meig.

Nürnberg, überall g., an Blättern, Mai und Juni, Koch; München, zwei Weibchen bei Pasing, ein solches bei Schleissheim gefangen, Mitte Mai bis Anfang Juni, Kr.

7) *hybotina* Zetterst.

Augsburg n. h.

8) *lugubrina* Zetterst.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Mai, Koch.

9) *tenuirostris* Meig.

rufipes Meig.

Nürnberg, s., Schmausenbuck, September, Koch.

10) *culicina* Meig.

rufipes Meig.

Augsburg s.

11) *tipularia* Fall.

cinerea Meig.

München, den 8. Mai 1865 ein Weibchen bei Pullach, den 31. Mai 1865 ein solches in Hesselrohe im Sommerhaus gefangen, Kr.

12) *variabilis* Fall.

Augsburg ein Stück.

13) *pennata* Marq.

Nürnberg s.

14) *geniculata* Meig.

plumipes Fall. var.

Augsburg s.

15) *umbripennis* Meig.

obscuripennis Meig. — *nigripennis* Fall. Zett.

Nürnberg g., Falznerweiher, Schmausenbuck, an Weidenblüthen, April bis Juni, Koch; Augsburg h.; Freising; München, an der Würm bei Pasing auf Dolden besonders auf *Aegopodium Podagraria* zuweilen in grosser Anzahl, bei Pullach Ende Mai und Juni, Kr.

16) **plumifera** Zett.

Nürnberg s., Schmausenbuck an Schlehenblüthen, April und Mai, Koch.

17) **gibba** Fall.

Nürnberg n. h., Schmausenbuck, Mai und Juni, Koch.

18) **subciliata** Loew.

Augsburg ein Stück.

19) **genualis** Loew.

Augsburg ein Stück.

49. **Empis** Linné.

1) **meridionalis** Meig.

Nürnberg s., Glaishammer, Schmausenbuck, Mai, Koch; Augsburg n. h.; Lochhausen, im Garten des Herrn Finanzrathes Riedinger, Mai; Augsburg n. h., August, Loew.

2) **maculata** Fabr.

variegata Meig.

Nürnberg n. h.; München, bei Hessellohe, Geiseltasteig, Pasing, Schleissheim n. s. s., Kr.

3) **tessellata** Fabr.

livida Fabr.

Nürnberg g., Falznerweiher, Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), auf Leontodon Taraxacum, Mai bis Juli, Koch; Augsburg n. s.; Freising n. s.; München allenthalben g., auf Berberisblüthen, Scabiosen; Starnberg, zwischen Ammerland und Ambach; Tegernsee, beim Westenhof, Mitte Mai bis Mitte Juli, Kr.; auf dem Lande g., Schrank.

var. nigripes Loew.

Augsburg n. s.; Freising n. s.

var. rufipes Loew.

Augsburg n. s.; Freising n. s.; Ammerland, am 10. Juni 1867.

4) **ciliata** Fabr.

pennata Panz. — pennipes Meig. — boja Schrank p. 170 n. 2572.

Nürnberg n. s. h., Herrnhütte, Hersbruck (fränk. Jura), an Schlehenblüthen, April und Mai, Koch; um Ingolstadt auf Hagedorn, Mai, Schrank; München, an der Isar bis Pullach, bei Pasing, hier auf Berberisblüthen manchmal h., bei Schleissheim, Anfang Mai bis Mitte Juni Kr.

5) **livida** Linn.

lineata Fabr.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg, n. h., Pillenreuth, Mögeldorf, Juni und Juli, Koch; Augsburg g.; Oettingen; Freising g., Wald bei Wippenhausen; München; Starnberg, Rosenheim, Tegernsee, allenthalben g. und eine der verbreitetsten Arten, Anfang Juni bis gegen Ende August, Kr.; Peissenberg, Koch; Partenkirchen, Reichenhall g., August, Loew.

6) *ignota* Meig.

punctata Meig. — *dorsalis* Curt.

München, ein Männchen bei Pasing, ein Pärchen bei Schleissheim gefangen, zwischen dem 2. Mai und ersten Juni, *Kr.*

7) *rustica* Fall.

nigricans Meig.

Kreuth bei Partenkirchen n. h., August, *Loew.*

8) *borealis* Linné.

Fichtelgebirg; Nürnberg g., Falznerweiher, Herrnhütte, an Weidenblüthen, April und Mai, *Koch*; Augsburg n. h.; um Ingolstadt, Juni, *Schrank* p. 170 n. 2570.

9) *fallax* Egger.

Nürnberg s., Waigelshof, Hersbruck (fränk. Jura) an Schlehenblüthen, April und Mai, *Koch*; München, im Mai 1870 von Herrn Kaufmann Hiendlmayer beim Bahnhof in Lohhof in mehreren Exemplaren gefangen, ein Pärchen der Staatssammlung gütigst überlassen, *Kr.*

10) *opaca* Fabr.

rufipes Fabre.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg g., Falznerweiher, Tullnau, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, *Koch*; Augsburg n. h.; München, an der Isar bis Pullach, um Nymphenburg und Schleissheim hie und da; Rosenheim, ein Männchen von Ant. *Kr.* bei Hochstätt gefangen, Ende April bis nach Ende Mai, *Kr.*

11) *vitripennis* Meigen.

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Juni, *Koch.*

12) *pusio* Egger.

Nürnberg h., Schmausenbuck, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura) an Weidenblüthen, April bis Juli, *Koch.*

13) *florisomna* Loew.

Nürnberg g., Tullnau, Herrnhütte, Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura) an Weidenblüthen, Mai bis Juli, *Koch.*

14) *chioptera* Fall.

crassipes Schrank p. 172 n. 2576.

Nürnberg g., Dutzendteich, Schmausenbuck, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), an Weidenblüthen, April und Mai, *Koch*; Augsburg n. s.; um Ingolstadt, August, *Schrank*; München, an der Isar bis Baierbrunn, bei Pasing und Schleissheim, hier an einem trüben Tage von jungen Fichten abgeklopft, sonst gekötschert, ziemlich g., Anfang Mai bis Mitte Juni, *Kr.*

15) *pennipes* Linn.

pennata Schrank p. 170 n. 2571. — *ciliata* Fall. — *longirostris* Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg g., Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), an Dolden, Mai und Juni, *Koch*; Augsburg g., im Frühjahr; um Weltenburg, Juni, *Schrank*; Freising; Ammerland, am 10. Juni 1867.

16) *vernalis* Meig.

leucoptera Meig.

Nürnberg h., Tullnau, Dutzendteich, Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Augsburg n. s.

17) *decora* Meig.

Nürnberg s., Dutzendteich, Morizberg, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch.

18) *lutea* Meig.

ochracea Curt.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), an niederen Pflanzen, Juni und Juli, Koch; Augsburg h.; Freising ziemlich s.; an der oberen Isar ziemlich s., Juli, Kr.

19) *stercorea* Linn.

Aschaffenburg; Würzburg; Bamberg; Fichtelgebirg; Nürnberg h., Falznerweiher, Tullnau, Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), an Hecken, Mai und Juni, Koch; Eichstädt; Augsburg g.; Oettingen; Freising g.; München, bei Hessellohe, dort auch im Sommerhaus gefangen, Pasing, Lochhausen, Schleissheim n. s.; Rosenheim, bei Hochstädt; Tegernsee an den Abhängen neben der Albach, nach Anfang Mai bis Mitte Juni, Kr.

20) *monogramma* Meig.

München, im Schwarzhölzl ein Männchen gefangen; Starnberg im Mühlthal hier und da; Tegernsee, beim Westerhof ein Weibchen gefangen, Anfang Juni bis Mitte Juli, Kr.

21) *punctata* Fabr.

digramma Meig.

Nürnberg g., Falznerweiher, Tullnau, Pommelsbrunn (fränk. Jura) an Hecken, Mai und Juni, Koch; Augsburg h.; München, um Hessellohe, Pullach, Pasing, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn und zwischen Ammerland und Ambach; Rosenheim bei Pfaffenhofen und Hochstädt; Tegernsee beim Wester- und Lieberhof, überall ziemlich g., Mitte Mai bis Ende Juni, Kr.

22) *testacea* Fabr.

Reichenhall, August, Loew.

23) *trigramma* Meig.

Nürnberg h., Falznerweiher, Tullnau, Hersbruck (fränk. Jura), April bis Juni, Koch; Tegernsee am Albach und am Westerhof ein Männchen und zwei Weibchen gefangen, Anfang Juni, Kr.

24) *sulcipes* Meig.

? *picipes* Meig. — *fulvipes* Curtis.

Augsburg s.

25) *funesta* Meig.

München, Prof. Dr. Wahl.

26) **stigma** *Meig.*

München, Prof. Dr. *Waltl.*

27) **nuntia** *Meig.*

München, Prof. Dr. *Waltl.*

28) **rufigentris** *Meig.*

München, Prof. Dr. *Waltl* und Dr. *Kriechbaumer* zwischen Hesselohle und Pullach, Starnberg zwischen Ammerland und Ambach auf einer kleinen feuchten Wiese rechts von der Strasse auf gelben Syn-
genesisten (*Leontodon?*) g.; Rosenheim, am Wege nach Hochstätt und
dortselbst, Anfang bis Ende Mai, *Kr.*

29) **maculipes** *Zett.*

grisea Fall.

München, den 28. Mai 1870 bei Pasing ein Weibchen gefangen,
Kr.

30) **majalis** *Loew.*

Augsburg n. s.

31) **bilineata** *Loew.*

Augsburg n. s., am Isarufer bei Lochhausen, Mai.

32) **ventralis** *Loew.*

Augsburg n. s., Lochhausen, Mai.

33) **brevicornis** *Loew.*

Nürnberg; Augsburg h.

34) **aestiva** *Loew.*

Nürnberg.

35) **sciophila** *Loew.*

Augsburg n. s., Lochhausen, Mai.

36) **nigritarsis** *Meig.*

Augsburg ein Stück.

37) **turbida** *Loew.*

Augsburg ein Stück

38) **simplicipes** *Loew.*

Nürnberg s.

39) **lasionata** *Loew.*

München, wo ich sie selbst fing, Augsburg n. h., Juli, *Loew.*

40) **fumipennis** *Loew.*

Reichenhall n. h., August, *Loew.*

41) **debilis** *Loew.*

Reichenhall n. h., August, *Loew.*

Eine Art, welche ich in 20 Exemplaren bei Augsburg gefangen habe, hält Herr Direktor *Loew* für unbeschrieben.

50. *Pachymeria Stephens.*

1) *femorata Fabr.*

ruralis Meig.

Nürnberg h., Waigelshof, Herrnhütte, Mai und Juni, *Koch*; Augsburg g.; Freising g.; München, allenthalben auf Löwenzahn g., Mitte bis Ende Mai, selten nach Juni; *Kr.*

2) *nitida Meig.*

Nürnberg g., Falznerweiher, Hersbruck (fränk. Jura), April bis Juni, *Koch*; München, um Pasing und Schleissheim auf blühenden Weiden wahrscheinlich auch Löwenzahn n. s., *Kr.*

51. *Oreogeton Schiner.*

1) *basalis Loew.*

Tegernsee ein Männchen, Ant. *Kr.*, den 5. Juni 1865 am Wege zum Lieberhof, *Kr.*

52. *Hilara Meigen.*

1) *matrona Halid.*

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni; *Koch.*

2) *litorea Fall.*

♂ *univittata* Meig.

Augsburg; München den 12. Juni 1864 bei Hessellohe ein Weibchen gefangen, *Kr.*; Reichenhall n. h., August, *Loew.*

3) *gallica Fall.*

Nürnberg s., Dutzendteich, Waigelshof, Juni und Juli, *Koch.*

4) *manicata Meig.*

Nürnberg s., Falznerweiher, Morizberg (fränk. Jura) Mai bis August, *Koch.*

5) *pruinosa Meig.*

Nürnberg s., Schmausenbuck, September, *Koch*; München den 21. Juli 1870 auf einer Excursion nach Pullach ein Weibchen gefangen, *Kr.*

6) *pinetorum Zett.*

Nürnberg s., Dutzendteich, Tullnau, Pommelsbrunn (fränk. Jura) Mai, *Koch.*

7) *clypeata Meig.*

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Herrnhütte, Mai, *Koch.*

8) *chorica* Fall.

nana Macq.

Nürnberg n. s., Herrnhütte, Dutzendteich, Tullnau, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, Koch; Augsburg n. s.

9) *quadrivittata* Meig.

Augsburg n. s., München den 11. Juli 1864 im Sommerhaus in Hessellohe ein Männchen; Rosenheim den 18. Mai 1869 bei Hochstätt oder bei Langenpfungen ein Männchen gefangen, Kr.

10) *vulnerata* Schiner.

Augsburg n. h.

11) *pilosa* Zetterst.

Nürnberg s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Augsburg s.

12) *lugubris* Zetterst.

München den 26. Juni 1869 hinter dem Wasserthurm unter Hessellohe zahlreich über dem Teich schwimmend getroffen, Kr.

13) *interstincta* Zett.

modesta Meig.

München, bei Hessellohe, Lochhausen, ziemlich s., Mitte Juni bis Mitte Juli, Kr.

14) *maura* Fabr.

globulipes Meig. — *Bibio senilis* Panz.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Falznerweiher, Herrnhütte, Mai, Koch; Augsburg n. h.; München, um Hessellohe, Pullach, Pasing, einzeln; Rosenheim bei Langenpfungen neben der Brücke mehrere Exemplare gefangen, Mitte Mai bis Mitte Juni, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

53. *Brachystoma* Meigen.

1) *vesiculosa* Fabr.

Regensburg.

Familie VIII. ASILIDAE.

A. *Leptogastrinae*.

54. *Leptogaster* Meigen.

1) *nigricornis* Loew.

Nürnberg n. s., Dutzendteich, Unter-Bürg.

2) *cylindricus* Degeer.

tipuloides Fabr. Meig. — *fuscus* Meig.

Nürnberg g., Dutzendteich, Tullnau, Falznerweiher, Mai bis Juli, Koch; Augsburg n. s., Lechfeld bei Mering, Juni; Regensburg n. g.;

Freising n. s., Marglinger Wiesen, Juli; München, um Hessellohe Gaunting, Juni und Juli, *Kr.*; auf dem Lande, ziemlich g., *Schrank* p. 161 n. 2556.

3) *guttiventris* Zett.

cylindricus Meig. — *pallipes* v. Roser.

Nürnberg s. s., Tullnau, Juli, *Koch*.

B. Dasypogoninae.

55. *Dioctria* Meigen.

1) *longicornis* Meig.

Regensburg g.

2) *Reinhardi* Meig.

cothurnata Meig. — *umbellatarum* Meig. — *Meigenii* Shukard.

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Juni, *Koch*; Augsburg am Lechufer ein Stück; Regensburg n. s.; Freising; München an der Isar bei Hessellohe, Ende Juli; Rosenheim, um Hochstätt, Anfang August, *Kr.*

3) *atricapilla* Meig.

atrata Meig. — *Falleni* Meig. — *nigripes* Meig. — *geniculata* Meig. — *fuscipes* Macq. — *fuscipennis* Fall.

Nürnberg s., Dutzendteich, Juni, *Koch*; Augsburg h., Lechablass; Regensburg g.; Freising n. s., Däreneck, Juni; München am 26. Mai 1870 ein Pärchen bei Geiseltasteig gefangen, *Kr.*

4) *bicincta* Meig.

annulata Meig. — *infuscata* Meig.

Regensburg g.

5) *oelandica* Linn.

Fichtelgebirg; Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli, *Koch*; Augsburg n. s.; Regensburg; Freising; München bei Nymphenburg, Planeck; Tegernsee, am Weg zum Lieberhof, Anfang Juni, *Kr.*; auf dem Lande s. g., *Schrank* p. 159 n. 2551.

6) *rufipes* Fabr.

frontalis Fabr.

Nürnberg s., Waigelshof, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, *Koch*; Augsburg h., Lechablass; Regensburg g.; Freising h., Mai bis Juli, Weihenstephan, Däreneck, Pförer Au, München bei Hessellohe, Geiseltasteig, Schleissheim, Mitte Mai bis Mitte Juni, *Kr.*

7) *hyalipennis* Fabr.

gracilis Meig.

Regensburg g.

8) *flavipes* Meig.

frontalis Meig. — *varipes* Meig. — *rufipes* Zett.

Nürnberg g., Mögeldorf, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, *Koch*; Regensburg n. s.; München, bei Hessellohe, Juli; Regen im bayerischen Wald, Ende Juni, *Kr.*

9) *linearis* *Fabr.*

Nürnberg; Freising n. h., Wald bei der Wiesenkirche, Juli, Attachinger Au, Juni.

56. *Dasypogon* *Meigen.*

1) *teutonus* *Linn.*

tenthredoides Scop.

Aschaffenburg s.; Fichtelgebirg; Regensburg g.; Eichstädt; Freising s.; München, um Geiseltasteig, Nymphenburg, Gauting, ein paarmal als Räuberin der Honigbiene beobachtet, Juni, Kr.; auf dem Lande allenthalben n. s., *Schrank*, p. 159 n. 2549.

2) *diadema* *Fabr.*

punctatus Fabr. — *cylindricus* Fabr. — *analis* Fabr. — *nervosus* Panz. — *liburnicus* Meig. — *fasciatus* Meig. — *variabilis* Brull.

Nürnberg s.; Regensburg s.; bayrische Berge, *Panzer*. (Ob wirklich in Bayern vorkommend?)

57. *Stichopogon* *Loew.*

1) *Schineri* *Koch.*

Nürnberg h., Herrnhütte, Tullnau, Juli und August, *Koch*.

58. *Holopogon* *Loew.*

1) *nigripennis* *Meig.*

Regensburg g.

2) *venustus* *Rossi.*

minutus Fabr. Meig.

Um Ingolstadt, ich fing sie im Juni im botanischen Garten, *Schrank*, p. 161 n. 2557.

59. *Isopogon* *Loew.*

1) *brevirostris* *Meig.*

♂ *longitarsis* Fall. — ♀ *armillatus* Fall.

Augsburg, Lechfeld bei Mering am 20. Juni 1867, ein Stück; Regensburg s.

2) *hottentotus* *Fabr.*

hyalipennis Meig. — *vitripennis* Meig. — *clatus* Meig.

München, bei Lochhausen, und zwischen Gauting und Mühlthal, bei Starnberg drei Weibchen gefangen, Kr.

60. *Lasiopogon* *Loew.*

1) *cinctus* *Fabr.*

hirtellus Fall. — *cinctellus* Meig.

Nürnberg g., Falznerweiher, Dutzendteich, Mai und Juni, *Koch*; Regensburg g.; München, bei Harlaching an Eichenstöcken, um Hessellohe n. s., Ende April bis Mitte Juli Kr.; bei Tegernsee, *Schrank* p. 159 n. 2550.

61. *Cyrtopogon* Loew.

1) *lateralis* Fall.

Nürnberg, Falznerweiher h.; setzt sich an Baumstämme, Juni, Koch.

2) *ruficornis* Fabr.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli, Koch; München, am Parkzaun bei Geiselgasteig und um Pullach ziemlich s., Ende Juni und Anfang Juli, Kr.

C. *Laphriinae*.

62. *Laphria* Meigen.

1) *ephippium* Fabr.

Asilus dorsalis Degeer.

Regensburg n. s.; Eichstädt; München, zwischen Schrifflarn und Grünwald und Starnberg zwischen Gauting und Petersbrunn je ein Männchen Ende Juni und Mitte Juli gefangen; Tegernsee am Fusswege nach Kreuth am 24. August 1858 ein Weibchen gefangen, Kr.

2) *flava* Linn.

pedemontana Fabr. — ♀ *ephippium* Panz.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Pommelsbrunn (fränk. Jura), setzt sich auf Steinplatten und Baumstämme, Juli, Koch; Augsburg, Lehrer Bischoff; Eichstädt; München; Rosenheim; Tegernsee, überall ziemlich g., Ende Mai bis Anfang September, Kr.; auf dem Lande n. s., Schrank p. 156 n. 2539.

3) *gibbosa* Linn.

bombylius Degeer.

Nürnberg, ein Stück bei Pommelsbrunn (fränk. Jura) im September gefangen, Koch; Augsburg, Spickel, ein Stück an einem Brückengeländer am 20. Juni 1867; Regensburg n. s.; um Kelheim, Schrank p. 157 n. 2543; Eichstädt; München, von Herrn Hutmacher Wieselsberger um Schleissheim in Mehrzahl gefangen, Kr.

4) *gilva* Linn.

rufus Degeer.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg g., Dutzendteich in grosser Anzahl an Holzstössen und Bretterwänden, Juli, Schmausenbuck, September, Kittel, in Gärten, und an Föhrenstämmen, Koch; Augsburg n. s., Regensburg n. s.; Eichstädt; Tegernsee, im September 1858 ein Männchen gefangen, Kr.; in Waldungen, Schrank p. 157 n. 2544.

5) *ignea* Meig.

Regensburg n. s.

6) *fuliginosa* Panz.

cincta Meig. — *auribarbis* Meig. Loew.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli, Koch; München, um Hessellohe bis Schäftlarn hie und da, Ende Juni und Juli, Kr.

7) *vulpina* Meig.

Regensburg n. s.

8) *fulva* Meig.

Nürnberg.

9) *marginata* Meig.

nigra Meig. — *fulgida* Meig. — *femorata* Meig. — *podagrica* Meig.

Nürnberg s.; Regensburg s.; um Ingolstadt, *Schrank* p. 158 n. 2545; München allenthalben n. s., ein zur var. *nigra* Meig. gehöriges Weibchen von Herrn Kassier Hartmann aus Eichenästen vom Hirschgarten, ein kleineres von Herrn Präparator Will aus Birkenästen gezogen; Tegernsee, im Thale und auf den Höhen der Neureuth, Gründelalpe, des Sackfleckels, Ende Mai bis Mitte September, *Kr.*

10) *rufipes* Fall.

Tegernsee, den 30. August 1860 ein Weibchen gefangen; Hohenschwangau den 24. August 1869 am Wege auf den Tegelberg von Ant. *Kr.* ein Weibchen gefangen, *Kr.*

63. *Andrenosoma Rondani.*

1) *atra* Linné.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), September, *Koch*; Augsburg n. h., Lehrer Bischoff; Regensburg n. s.; allenthalben auf dem Lande, doch sparsam, *Schrank* p. 157 n. 2542.

D. Asilinae.

64. *Asilus* Linné.

A. *Asilus* Loew.

1) *crabroniformis* Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Peterhaide, Herrnhütte, Erlenstegen, setzt sich auf den Sand, August, *Koch*; Augsburg n. h.; Regensburg g.; Eichstädt; um Ingolstadt, *Schrank* p. 157 n. 2541; Moosburg, ein Weibchen von mir und ein solches von Herrn Notar von Sonnenburg im August 1868 gefangen, *Kr.*; Freising.

B. *Philonicus* Loew.

2) *albiceps* Meig.

canescens Meig. — *albibarbus* Zell. — *nudus* Loew.

Nürnberg h., Mögeldorf, Tullnau, setzt sich auf den Sand, Juni bis September, *Koch*; Augsburg n. s.

C. *Pomponerus* Loew.

3) *germanicus* Linn.

tibialis Fabr.

Fichtelgebirg; Nürnberg n. h., Herrnhütte, Erlenstegen, Mai und Juni, *Koch*; Augsburg s.; Regensburg g.; Freising n. h., Pförer Au, den 30. Juni 1871; München, den 10. Juni 1858 bei Geiseltasteig am Parkzaun ein Männchen gefunden, das einen *Aphodius* zwi-

schen den Beinen hatte, zwei Weibchen bei Hessellohe den 12. Juni 1864, *Kr.*; allenthalben auf dem Lande, doch etwas selten, *Schrank* p. 158 n. 2546.

D. Lophonotus Macquart.

4) punctipennis Meig.

punctatus Meig.

Nürnberg n. h., Herrnhütte, Erlenstegen, von Anfang April bis Juli, *Koch*.

5) trigonus Meig.

♂ *albipilus* Meig. — ♀ *pullus* Meig. — *hiapidus* Zell.

Nürnberg n. h., Falznerweiher, Dutzendteich, Waigelshof, Juni und Juli. *Koch*.

6) forcipula Loew.

mixtus Loew. — *forcipatus* Meig.

Aschaffenburg; Nürnberg h., Falznerweiher, Dutzendteich, Waigelshof, Juni und Juli, *Koch*; Augsburg, n. s., Spickel, Juni, Lechfeld bei Mering, Juni.

7) praemorsus Rossi.

tridens Egger.

Nürnberg s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Mai und Juni, *Koch*.

8) cristatus Meig.

Regensburg n. g.

E. Eutolmus.

9) rufibarbis Meig.

melampodius Zeller.

Nürnberg h., Erlenstegen, Herrnhütte, Mögeldorf, Juli und August, *Koch*.

F. Machimus Loew.

10) atricapillus Fall.

opacus Meig. — *calceatus* Meig. — *rufimanus* Meig. — *plebejus* Meig. — *bicornis* Zell. — *subulatus* Loew.

Nürnberg g., Herrnhütte, Mögeldorf, Juni bis August, *Koch*; Augsburg n. s., Lechablass, Juli, Dir. *Loew*; Regensburg g.; Freising, im Zimmer, Juli; München; Rosenheim; Tegernsee allenthalben weitaus die gemeinste Art, auch auf den Höhen der Neureuth und Gründelalpe, von Anfang Juni bis Anfang Oktober, *Kr.*

11) chrysitis Meig.

femoralls Zett.

Nürnberg s., Herrnhütte, August, *Koch*; Augsburg s.

12) rusticus Meig.

genualis Zell.

Nürnberg s., Herrnhütte, August, Augsburg; München, um Schleissheim, Starnberg und im Mühlthal ziemlich s., Juli, *Kr.*

G. Mochtherus Loew.

13) pallipes Meig.

omissus Meig. — *fulvipes* Meig.

Nürnberg g., Falznerweiher, Dutzendteich, Schmausenbuck, Herrnhütte, Juli und August, Koch; Regensburg n. s.

H. Itamus Loew.

14) cyanurus Loew.

aestivus Meig. — *tabidus* Meig. — *tibialis* Fall. — *niger* Deg.

Nürnberg h., Falznerweiher, Dutzendteich, Juni und Juli, Koch; Augsburg; Regensburg n. s.; Freising; München, von Hessel-lohe bis Schäftlarn, zwischen Giesing und Haaching, Tegernsee am Albach und in der Söllbachau n. s. s. Juni bis September, Kr.

15) cothurnatus Meig.

Nürnberg s., Erlenstegen, Mögeldorf, Pommelsbrunn (fränk. Jura) Juni und Juli, Koch; Augsburg s.

I. Tolmerus Schiner.

16) pyragra Zett.

Nürnberg h., Dutzendteich, Herrnhütte, Erlenstegen, Juli und August, Koch.

K. Epitriptus Schiner.

17) cingulatus Fabr.

annulatus Macq.

Nürnberg s., Herrnhütte, Waigelshof, Juli und August, Koch; Regensburg g.; Schrank p. 159 n. 2548.

Familie IX. SCENOPINIDAE.

65. Scenopinus Latreille.

1) niger Degger.

rugosus Fabr. — *fenestralis* Fabr. — *tersatus* Panz. — *nigripes* Meig. — *ater* Fall. — *fasciatus* Walker.

Augsburg s.; Regensburg s.

2) fenestralis Linn.

senilis Fabr. — *sulcicollis* Meig. — *vitripennis* Meig. — *domesticus* Meig. — *rustitarsis* Meig. — *fuscinervis* Zett. — *salitans* Scop. — *Atichia spoliata* Scop. Schrank.

Nürnberg g., Juni, Koch; Augsburg h.; Regensburg n. s.; um Ingolstadt sehr sparsam, Juni, Juli Schrank p. 102 n. 2404; Freising h., Juni; München, im Sommer an Fenstern n. s., Kr.

Die Larve soll in Rosshaarpolstern leben.

3) glabrifrons Meig.

halterata Meig. — *orbata* Meig.

Regensburg s.

Familie X. **THEREVIDAE.**

66. *Thereva* Latreille.

A. *Dialineura* Schiner.

1) *anilis* Linn.

♀ *flavipes* Fabr. — ♀ *sordida* Panz.

Nürnberg g., Erlenstegen, Tullnau, Herrnhütte, Glaishammer, Waigelshof, Pillenreuth, Mai bis Juli, *Koch*; Augsburg; Regensburg g.; München, bei Hessellohe am 25. Mai 1864 ein Männchen gefangen, *Kr.*

2) *fuscipennis* Meig.

Nürnberg, zweimal gefangen auf Blättern, Waigelshof, Herrnhütte, Juni und August, *Koch*.

3) *alpina* Egger.

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Waigelshof, Juni, *Koch*.

B. *Thereva* Schiner.

4) *nobilitata* Fabr.

hirta Deg. — *plebeja* Fall.

Nürnberg n. s., Herrnhütte, August; Regensburg n. s.; Freising aus der in Mulm lebenden Larve gezogen, Weißenstephan an Baumstämmen, Juni; München, um Schleissheim n. s. g., Ende Juni und Juli, *Kr.*; Reichenhall n. h., August, *Loew*.

5) *bipunctata* Meig.

Nürnberg s., Herrnhütte am 1. September 1870 ein Weibchen gefangen, *Kittel*, Mögeldorf, Juli, *Koch*.

6) *caesia* Meig.

München, Prof. Dr. *Waltl*.

7) *melaleuca* Loew.

Frankfurt.

8) *subfasciata* Schummel.

Nürnberg s. s., in Gärten, Waigelshof, Herrnhütte, August, *Koch*.

9) *fulva* Meig.

Nürnberg n. s., Waigelshof, Herrnhütte, Juli und August, *Koch*.

10) *annulata* Fabr.

anilis Fabr.

Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelshof, Juli und August, *Koch*.

11) *marginula* Meig.

albipennis Zett.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Waigelshof, Mai bis August, *Koch*.

12) *plebeja* Linn.

strigata Fabr. — *fasciata* Deg. — *lugens* Loew.

Regensburg g.; München, um Schleissheim, wo ich sie mit Nr. 4 und 9 meist an Linden fing, verhältnissmässig die gemeinste Art, von Mitte Mai bis Ende Juli, Kr.

13) *arcuata* Loew.

♀ *taeniata* Meig.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, August, Koch.

14) *cineta* Meig.

Regensburg s.

C. *Psilocephala* Schiner.

15) *eximia* Meig.

Nürnberg, zweimal gefangen, Herrnhütte, Mai und Juni, Koch.

16) *ardea* Fabr.

Nürnberg g., Herrnhütte, Erlenstegen, Waigelshof, Juni bis September, Koch; Augsburg; Moosburg, am Weg nach Thonställen den 16. August 1867 ein Weibchen gefangen, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

Familie XI. LEPTIDAE.

67. *Leptis* Fabricius.

1) *cingulata* Loew.

Augsburg ein Stück, Lehrer Bischoff.

2) *scolopacea* Linn.

Nürnberg g., Glaishammer, Tullnau, Falznerweiher, Pillenreuth, Mai bis August, Koch; Augsburg n. s., Lechfeld bei Mering, Juli; Eichstätt; um Ingolstadt, die Larve lebt in der Erde, Schrank p. 98 n. 2391; Freising n. s., aus der in Moder lebenden Larven gezogen, am 14. April, Wippenhausen, Mai, Isarufer, August; München, um Hessellohe, Ende Mai und Juni, Kr.

3) *strigosa* Meig.

Nürnberg, zwei Stücke; Regensburg g.; München, in den oberen Isaraueu bis Pullach, um Schleissheim; Rosenheim, in den Innauen bei Hochstätt; Tegernsee, am Lerchenwald, nirgends s., Mitte Juli bis Anfang Oktober, Kr.; Reichenhall g., August, Loew.

4) *maculata* Degeer.

♂ *annulata* Meig. — ♂ *distigma* Meig. — ♀ *nigrofasciata* Meig. — ♀ *maculata* Meig.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, Koch; München, um Hessellohe n. s., Ende Mai bis Mitte Juni, Kr.; Starnberger See, August, Koch.

5) *immaculata* Meig.

stigmatica Zett.

Nürnberg n. h., Schmausenbuck, Dutzendteich, Tullnau, Juni und Juli, Koch; Regensburg g.; Starnberg im Mühlthal; Rosenheim, um Hochstätt n. h., Mitte Juli bis Mitte August, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

6) *vitripennis* Meig.

stigma Schummel.

Nürnberg g., Dutzendteich, Mögeldorf, Falznerweiher, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Augsburg n. s.; Regensburg s.; Freising; München, bei Hessellohe und Pullach an Holzklaftern g., von Pasing nach Planeck; Tegernsee, am Albach und an den Abhängen daneben; Regen im bayrischen Wald, überall mehr oder weniger g., Ende Mai bis Ende Juni, Kr.; Reichenhall, August, Loew.

7) *notata* Meig.

Heyshami Curt.

München, bei Hessellohe und Pullach g., Ende Mai und Juni, Kr.

8) *lineola* Fabr.

Nürnberg h.; Mögeldorf, Dutzendteich, Pommelsbrunn, Juni und Juli, Koch; Augsburg, zwei Stücke; Reichenhall n. h., August, Loew.

9) *tringaria* Linn.

scelopacea var. Deg. — ♀ var. *vanellus* Fabr. — var. *simplex* Meig. — var. *punctata* Loew.

Aschaffenburg; Würzburg; Nürnberg g., Herrnhütte, Falznerweiher, August und September, Koch; Augsburg g.; Oettingen; Regensburg g.; Eichstätt; Freising g.; Giggenghausen, Juni; München, Moosburg, Rosenheim, Tegernsee allenthalben g., Mitte Juli bis Anfang Oktober, Kr.; allenthalben n. s., Schrank p. 98 n. 2390.

10) *conspicua* Meig.

Nürnberg h., Falznerweiher, Tullnau, Herrnhütte, Juni und Juli, Koch; Regensburg s.

11) *annulata* Degeer.

conjungens Ruthe.

München, zwischen Pasing und Gräfing am 31. Mai 1864 ein Weibchen, Kr.

12) *nigriventris* Loew. ♂

Am Walchensee und bei Reichenhall n. h., August, Loew.

68. *Chrysopila* Macquart.

1) *nubeculosa* Fall.

oculata Meig.

Nürnberg h., Waigelshof, Herrnhütte, Juli bis September; Regensburg g.; Tegernsee, bei Kreuth am Weg zum Königssee am 27. Juli 1863 ein Männchen gefangen, Kr., Halbleiher Wiesen, Koch.

2) **bicolor** *Fabr.*

auricollis Meig.

Regensburg s.

3) **aurea** *Meig.*

auricollis Meig.

Nürnberg h., Waigelshof, Herrnhütte, Pommelsbrunn, Juli bis September, *Koch*; Augsburg h., Lechfeld bei Mering; Regensburg n. s.; Freising g., Weißenstephan; München, bei Harlaching, Brauntal, Schleissheim, Starnberg, im Mühlthal n. s., *Kr.*; Halblech, *Koch*; Reichenhall n. h., August, *Loew*.

4) **nigrita** *Fabr.*

splendida Meig.

Nürnberg s., Erlenstegen, Juli, *Koch*; München, von Hessel-lohe bis Bayerbrunn; Starnberg, im Mühlthal; Tegernsee von St. Quirin nach Miesbach n. s., Juni und Juli, *Kr.*; Halblech h., Juli, *Koch*; Reichenhall n. h., August, *Loew*.

5) **atrata** *Fabr.*

tomentosa Fabr. — *cristata* Fabr. — *aurata* Fabr. Meig. — *Styrex holosericea* Scop.

Nürnberg n. h., Tullnau, Erlenstegen, Falznerweiher, Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, *Koch*; Augsburg n. s.; Regensburg g.; Freising; München, von Thalkirchen bis Pullach, um Pasing, Schleissheim; Starnberg im Mühlthal; Tegernsee am Albach n. s., Juni und Juli, *Kr.*; Halblech, *Koch*.

6) **flaveola** *Meig.*

Anthrax genius Panz.

Regensburg.

69. ***Atherix* Meigen.**

1) **marginata** *Fabr.*

Regensburg s.

2) **Ibis** *Fabr.*

Anthrax Titanus Fabr. — *maculatus* Meig.

Fränkische Schweiz an der Puddlach, Prof. Hoffmann; Nürnberg s., Tullnau, Mai und Juni, *Koch*; Augsburg s., Wertachufer bei Pfersee auf Gräsern sitzend, Mai, Elise *Kittel*; Regensburg s.; München, zwischen Pasing und Planeck an Erlen, bei Schleissheim, manchmal ziemlich g., Mitte bis Ende Mai, *Kr.*

70. ***Ptiolina* Zetterstedt.**

1) **crassicornis** *Panz.*

griseola Fall.

Regensburg s. s.; Regen im bayrischen Wald den 25. Juli 1864 drei Männchen gefangen, *Kr.*

2) **immaculata** *Fabr.*

Augsburg, ein Pärchen.

Familie XII. DOLICHOPIDAE.

A. Dolichopodinae.

71. *Psilopus* Meigen.

1) *contristans* Wiedem.

regalis Meig.

Nürnberg s., Erlenstegen, Tullnau, Juni, Koch; Augsburg ein Stück; Freising.

2) *albifrons* Meig.

contristans Meig.

Nürnberg g., Erlenstegen, Herrnhütte, Waigelshof, Mögeldorf, Juni und Juli, Koch.

3) *longulus* Fall.

Augsburg, Schwimmschule, Juli, Dir. Loew.

4) *flexus* Loew.

Augsburg, Schwimmschule ein Männchen, Dir. Loew.

5) *platypterus* Fabr.

♀ *crinipes* Meig. — *Leptopus tipularius* Fall.

Nürnberg h., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, Koch; Augsburg n. s.; Dinkelsbühl n. s., auf Blättern sitzend, Pfarrer Wolff; Freising n. s., Weihestephana, Juni; Rosenheim, zwischen dem 7. und 9. Juni 1870 bei Hochstätt von Ant. Kr. in grösserer Anzahl gefangen, Kr.; am Walchensee g., August; Kreuth g., August; Partenkirchen g., August, Loew.

6) *lugens* Meig.

Tegernsee, am 7. September 1864 am Weg zum Lieberhof ein Weibchen gefangen; Hohenschwangau, am 27. August 1869 in den Schwansee-Anlagen von Ant. Kr. ein Weibchen gefangen, Kr.

72. *Neurigona* Rondani.

1) *pallida* Fall.

ochraceus Meig. — *Saucropus pallidus* Loew.

München, am 30. Mai 1870 bei Pasing ein Weibchen gefangen, Kr.; Kreuth, Anfang August, Gerstäcker, Reichenhall und am Walchensee n. h., August, Loew.

2) *suturalis* Fall.

Starnberg, den 7. Juni 1868 zwischen Gauting und Mühlthal ein Weibchen gefangen, Kr.

3) *quadrifasciata* Fabr.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, Koch; München, am 21. Juli 1869 im Walde zwischen Hessellohe und Deisenhofen ein Weibchen gekötschert, Kr.

73. *Xanthochlorus* Loew.

1) *tenellus* Wiedem.

flavellus Zett.

Nürnberg s., Herrnhütte, Pommelsbrunn, (fränk. Jura), Juni und Juli, *Koch*; Augsburg n. s.; München, um Hessellohe, wo ich sie besonders in dem dortigen Sommerhaus an den Fenstern im September und bis nach Mitte Oktober zahlreich antraf, *Kr.*; Kreuth, August, *Gerstäcker* und *Loew*; Reichenhall h., August, *Loew*.

2) *ornatus* Halid.

tenellus Fall.

Nürnberg h., Waigelshof, Herrnhütte, Juni und Juli, *Koch*; Augsburg n. s., Spickel, Juli; München, Kreuth, August, *Gerstäcker*.

74. *Chrysotimus* Loew.

1) *molliculus* Fallen.

Chrysotus lactus Meig.

Reichenhall g., im August, *Loew*.

2) *concinus* Zett.

Reichenhall g., im August, *Loew*.

B. Diaphorinae.

75. *Chrysotus* Meigen.

1) *cupreus* Macq.

obscuripes Zett.

Nürnberg s., Herrnhütte, Juni und Juli, *Koch*.

2) *laesus* Wiedem.

Nürnberg s., Juni, *Koch*; Augsburg s. h.; Freising; München, allenthalben auf Wiesen, n. s.; Schliersee, am Spitzingsee gekötschert, Anfang Juni bis Ende Juli, *Kr.*; Kreuth h., August, *Loew*.

3) *neglectus* Meig.

femorale Meig. — *taeniomerus* Meig.

Augsburg s.; Freising; München, bei Nymphenburg und Pasing einige Weibchen gefangen, Rosenheim, um Höchstätt von Ant. *Kr.* ebenfalls mehrere Weibchen gefangen, Anfang Juli bis Ende September, *Kr.*

4) *gramineus* Fall.

copiosus Meig. — *minimus* Meig. — *laesus* Fall.

Nürnberg s., Waigelshof, Juni und Juli, *Koch*; Augsburg s. g., Lechfeld bei Mering gekötschert, Juli; Kreuth h., August, Partenkirchen g., August, *Loew*.

5) *suavis* Loew.

Nürnberg n. s., Schmausenbuck, Erlenstegen, Pommelsbrunn (fränk. Jura), *Koch*; Augsburg, Schwimmschule, Director *Loew*.

6) *femoratus* Fall.

München, am 12. Juni 1870 auf einer Excursion nach Bayerbrunn ein Männchen gefangen, Kr.

76. *Diaphorus* Meigen.

1) *oculatus* Fall.

♂ *flavocinctus* Meig. — ♀ *tuberculatus* Meig. — *bimaculatus* Macq

Nürnberg n. h.; Tegernsee, am 26. August 1864 am Albach oder von da zum Westerhof ein Männchen gefangen, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

2) *Winthemi* Meig.

München, am 2. August 1870 von Herrn Kaufmann Hiendlmayr beim Bahnhof in Lohhof auf blühenden Schlehen in mehreren Exemplaren gefangen, ein Pärchen der Staatssammlung gütigst überlassen, Kr.; Reichenhall h., August, Loew.

77. *Argyra* Macquart.

1) *festiva* Meig.

München, Prof. Dr. Walll.

2) *grata* Loew.

München, am 14. Juli 1864 bei Hessellohe dreimal je ein Männchen gefangen, vom 26. Mai bis 16. Juli, Kr.

3) *diaphana* Fabr.

versicolor Meig. — *hirtipes* Curt.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn, Morizberg (fränk. Jura), Mai, Koch; Starnberg, im Mühlthal; Rosenheim, bei Hochstätt n. s.; Tegernsee am Albach, Mitte Mai bis Mitte Juli, Kr.; Kreuth und Reichenhall, in der ersten Hälfte des August ♂ und ♀ vereinzelt, (fliegt bei Berlin nur im Frühling), Gerstäcker; Kreuth g., August; Partenkirchen g., August, Loew.

4) *confinis* Zett.

♀ *flaviventris* Macq.

Hohenschwangau, am 27. August 1869 in den Schwansee-Anlagen ein Männchen gefangen, Kr.

5) *setimana* Loew.

Rosenheim, am 18. Mai 1869 bei Langenpfungen neben der Brücke vier Männchen gefangen, Kr.

6) *argentina* Meig.

diaphanus Fall. — *argentella* Zett.

München, am 26. Juli 1869 zwischen Hessellohe und Pullach ein Männchen gefangen, Kr.; Reichenhall n. h., August, Kreuth h., August, Partenkirchen, g., August, Loew.

7) *leucocephala* Meig.

♀ *diaphanus* Meig. — *pellucens* Zett.

Kreuth und Reichenhall, ♂ ♀ h., August, Gerstäcker, Kreuth h., Anfang August, Loew.

8) *argentata* Macq.

Porphyrops argyria Meig.

Kreuth g., August, Loew.

9) *auricollis* Meig.

? *A. Hoffmeisteri*.

Kreuth und Reichenhall ♂ ♀ n. s. s., August, Gerstäcker, Von den drei letzten Arten waren die Weibchen ungleich häufiger als die Männchen; in den Morgenstunden eines besonders günstigen Tages fanden sich dieselben in der nächsten Umgebung des Wildbaches zu Hunderten ein, während die Männchen fast ganz fehlten, Gerstäcker; Kreuth n. h., August, Loew.

10) *incompta* Gerst.

München, bei Hessellohe dreimal je ein Männchen gefangen, vom 26. Mai bis 16. Juli, Kr.; Anfang August bei Kreuth, ♂ ♀ Gerstäcker (Stett. Zeitg. 25. Jahrg. 8. 145.)

78. *Syntormon* Loew.

1) *pallipes* Fabr.

Raphium ensicorne Meig. — *Raphium hamatum* Zett.

Partenkirchen n. h., August, Loew.

2) *denticulatum* Zett.

biseriatum Loew.

Kreuth n. h., August; Partenkirchen n. h., August, Loew.

3) *Zelleri* Loew.

Kreuth, ein ♂, Gerstäcker.

C. *Raphinae*.

79. *Raphium* Meig.

1) *caliginosum* Meig.

macrocerum Meig. — *xiphias* Meig. — *nemorialis* Meig. — *pallitarsis* Macq. — *laticornis* Fall.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn, Morizberg (fränk. Jura), Mai, Koch; Augsburg, ein Pärchen; Kreuth, Anfang August; die Männchen n. s., die Weibchen überall überall s. g., Gerstäcker; Kreuth h., August, Partenkirchen g. August, Loew.

2) *monotrichum* Loew.

macrocerum Zett. — *caliginosum* Zett.

Kreuth n. h., August, Loew.

3) *appendiculatum* Zett.

cupreum Walk.

München, zwei Männchen bei Hessellohe und Pullach gefangen, Ende Mai und Juni, Kr.; Kreuth und am Walchensee n. h., August, Loew.

4) *auctum* Loew.

Kreuth n. h., August, Loew.

5) *sagax* Gerst.

Kreuth, in mehreren Exemplaren beider Geschlechter, Anfangs August, Gerstäcker (p. 146 Nr. 2.)

80. *Porphyrops* Meigen.

1) *spinicoxa* Loew.

communis Walk.

Nürnberg h., Moritzberg (fränk. Jura), Mai, Koch; Augsburg ein Männchen, Reichenhall n. h., August, Loew.

2) *nemorum* Meig.

nigripes Macq. — *laticorne* Zett.

Augsburg n. h.

3) *micans* Meig.

München, am 14. Mai 1865 beim Damm ob den Ueberfällen ein Pärchen gefangen, Kr.

4) *crassipes* Meig.

München, in den Isarauen um Hessellohe und Pullach n. s.; Starnberg, zwischen Bauerberg und St. Heinrich, Tegernsee, am Albach oder am Weg zum Lieberhof, Anfang Mai bis Mitte Juni, Kr.; Kreuth n. h., August, Loew.

5) *rivalis* Loew.

Augsburg, Schwimmschule, am 29. Juli 1867 von Herrn Direktor Loew entdeckt.

Durch ein unliebsames Versehen wurde in der Beschreibung dieser Art in dem letzten Augsburger Vereinsberichte statt *rivalis* der Name *Hartmannifallax* gedruckt, was hiemit berichtigt wird.

6) *longicornis* Fall.

Rhaphium vitripenne Meig.

Nürnberg h., Falznerweiher, Schmausenbuck, Mai bis Juli, Koch.

81. *Systemus* Loew.

1) *leucurus* Loew.

Frankfurt.

2) *ornatus* Mik. (Verh. der zool. bot. Ges. XVI. T. I f. 1—6.)

Hypopyllus distans Loew, wahrscheinlich das Weibchen dazu.

München, den 25. Mai 1864 bei Hessellohe ein Männchen gefangen, Kr.

82. *Tachytrechus* Stannius.

1) *notatus* Stann.

litoreus Halld. — *plumipes* Macq.

Kreuth, Anfang August, die von Loew erwähnte Varietät mit fast ganz schwarzen Beinen, Gerstäcker.

2) *insignis* Stann.

München, am 26. Juli 1868 neben dem Damm ob den Ueberfällen auf dem noch etwas feuchten Fusspfade in mehreren Exemplaren gefangen, *Kr.*

3) *eucerus* Loew.

Augsburg, Schwimmschule am 29. Juli 1867 von Herrn Direktor Loew entdeckt; am Walchensee n. h., August, Loew.

83. *Gymnopternus* Loew.

1) *nobilitatus* Linné.

♀ *plumicornis* Meig. — *Rhagio nobilitatus* F.

An Wassergräben, Schrank p. 100 n. 2397.

2) *cretifer* Walk.

acutifer Walk. — *Hercostomus cretifer* Loew.

Bei Kreuth an einem Wasserfalle, Anfang August, Gerstäcker.

3) *chaerophylli* Meig.

Nürnberg s., Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli und August, Koch; Augsburg s.; München, am 28. Juli 1869 bei Schleissheim zwei Männchen, ein Weibchen gefangen, *Kr.*

4) *germanus* Wiedem.

Nürnberg h., Tullnau, Dutzendteich, Falznerweiher, Mai bis August, Koch; Augsburg n. s.; München allenthalben g., ich fand sie im Anfang Juli einmal zu Hunderten an den Fenstern des Wartzimmers in Feldmaching; Starnberg im Mühlthal, *Kr.*; Freising; Kreuth Anfang August, Gerstäcker und Loew; Partenkirchen n. h., August, Reichenhall und am Walchensee g., August, Loew.

5) *fumipennis* Stann.

fuscipennis Meig. — *laevifrons* Loew. — *pulchripes* Loew.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni; Starnberg, August, Koch.

6) *chrysozygos* Wiedem.

Nürnberg n. s., Herrnhütte, Schallershof an Hecken, Juni und Juli, Koch; München, am 3. Juli 1864 bei Thalkirchen ein Männchen gefangen, *Kr.*

7) *nigriplantis* Stann.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli, Koch.

8) *Sahlbergi* Zett.

Kreuth, Anfang August, ein steter Besucher der Wasserfälle, ausserdem auch an schattigen Stellen auf Blattpflanzen; auch bei Ramsau und am Königssee bei Berchtesgaden, Gerstäcker; Kreuth n. h., August, Loew.

9) *rusticus* Meig.

Nürnberg, ein Pärchen.

10) *nigripennis* Fall.

Nürnberg n. s.; Schmausenbuck, Juni bis August, Koch.

11) *celer* Meig.

Nürnberg s. s., G'steinach bei Feucht, Mai und Juni, Koch; München, um Hessellohe und Pullach einzeln, Ende Mai und Juni; Rosenheim, um Hochstätt von Ant. Kr. Anfang Juni ein Männchen, drei Weibchen gefangen, Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen Anfang September einzelne Weibchen gefangen, Kr.; Kreuth, Anfang August, Gerstäcker und Loew; Reichenhall g., August, am Walchensee g., August, Loew.

12) *cupreus* Fall.

Am 24. Juni 1864 bei Metten in Niederbayern ein Männchen gefangen, Kr.

13) *aerosus* Fall.

var. *Dahlbomi* Zett.

Nürnberg h., in Gärten, Dutzendteich, Schmausenbuck, Falznerweiher, Juni bis August, Koch; Augsburg s. g.; Freising; München, bei Thalkirchen, Pasing, Schleissheim, ziemlich einzeln, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn; Rosenheim, bei Hochstätt; Regen im bayrischen Wald, Mitte Mai bis Anfang Juli, Kr.; Partenkirchen n. h., August, Loew.

14) *inornatus* Loew.

Reichenhall n. h., August, Loew.

15) *atrovirens* Loew.

Tegernsee, am 5. September 1864 am Weg zum Lieberhof ein Männchen gefangen, Kr.

16) *vivax* Loew.

Kreuth, Anfang August, Gerstäcker und Loew; Reichenhall n. h., August, Loew.

17) *conformis* Loew.

Reichenhall n. h., August, Loew.

18) *dysops* ♀ Gerst.

Anfang August h. bei Kreuth an Wasserfällen; die hier allein beobachteten Weibchen setzten sich auf die von Wasser bespülten Steine, Gerstäcker.

19) *brevicornis* Staeg.

obscuripennis Zett.

Kreuth n. h., August, Loew.

84. *Dolichopus* Latreille.

1) *atripes* Meig.

Nürnberg s., in Gärten, Dutzendteich, Falznerweiher, Juli, Koch; an Wasserfällen bei Kreuth, Anfang August, Gerstäcker und Loew..

2) *atratus* Meig.

Nürnberg n. g., Falznerweiher, Schmausenbuck, Mai bis Juli, Koch.

3) *fastuosus Halid.*

pleipes Stann. — plebejus Zett.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Dutzendteich, Falznerweiher, Juni und Juli; Koch; Augsburg ein Stück; München am 26. Mai 1869 um Hessellohe oder Pullach ein Weibchen gefangen, Starnberg, am 29. Mai 1869 im Mühlthal ein Männchen gefangen, Tegernsee, am 5. Juni 1864 in der Söllbachau ein Männchen gefangen, Kr.; Kreuth, Anfang August, Gerstäcker.

4) *planitarsis Fall.*

Nürnberg h., Tullnau, Herrnhütte, Mai, Koch; Augsburg ein Stück; München, am 31. Mai 1864 bei Pasing ein Männchen gefangen; Starnberg, am 22. Mai 1870 zwischen Ammerland und Ambach ein Pärchen gefangen, Rosenheim, Mitte Mai 1869 bei Hochstätt und Langenpfungen drei Männchen gefangen, Kr.

5) *campestris Meig.*

fulgidus Walk.

Nürnberg s. s., Tullnau, Mai, Koch; München, am 15. Juni 1870 bei Lochhausen ein Weibchen gefangen, Kr.; Walchensee h., August, Kreuth n. h., August, Loew.

6) *latilimbatus Macq.*

Rosenheim, im September 1868 bei Hochstätt von Ant. Kr. ein Weibchen gefangen, Kr.

7) *excisus Loew.*

Augsburg n. s.

8) *claviger Stann.*

Reichenhall n. h., August, Kreuth n. h., August, Loew.

9) *plumitarsis Zett.*

Augsburg n. s.; Freising; München, allenthalben eine der gemeinsten Arten, Starnberg, im Mühlthal, Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee am Albach, Juni bis September, Kr.; in der Ramsau bei Berchtesgaden, Gerstäcker; Reichenhall g., August, Loew.

10) *discifer Stann.*

patellatus Meig. — confusus Zett.

Nürnberg h., Dutzendteich, Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Juni bis September, Koch; Augsburg ein Stück; München, am 26. Mai 1869 um Hessellohe oder Pullach ein Männchen gefangen, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn und zwischen Beverberg und St. Heinrich zwei Männchen, ein Weibchen gefangen, Ende Mai bis Mitte Juli Kr.; Kreuth, Anfang August, Gerstäcker.

11) *plumipes Scop.*

pennitarsis Fall. — Wahlbergi Zett.

Nürnberg g., in Gärten, Pillenreuth, Waigelshof, Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Mai bis September, Koch; Augsburg g.;

Freising; München, um Pasing, Lochhausen, Schleissheim n. s. s., Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. gefangen, Schliersee, am Spitzingsee gekötschert, Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen, Ende Mai bis Ende September, Kr.; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*; Reichenhall g., August, und am Walchensee g., August, Partenkirchen g., August, *Loew*.

12) *signatus* Meig.

pennatus Meig. — *popularis* Fall.

Nürnberg h., Schmausenbuck, Tullnau, Erlenstegen, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, *Koch*; Augsburg n. s.; Freising; München allenthalben n. s., Starnberg, von Gauting nach Andechs und zwischen Beuerberg und St. Heinrich, Rosenheim, bei Langenpfungen neben der Brücke; Tegernsee, am Albach, Schliersee, am Spitzingsee in Mehrzahl gekötschert, Mitte Mai bis Ende Juni, Kr.; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*.

13) *popularis* Wiedem.

Starnberg, am 30. Mai 1869 zwischen Beuerberg und St. Heinrich ein Weibchen gefangen, Tegernsee, am 5. Juni 1864 am Albach zwei Weibchen, und am 7. Juni 1865 am Weg nach Miesbach ein Weibchen gefangen, Kr.; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*; Partenkirchen n. h., August, *Loew*.

14) *acuticornis* Wiedem.

ruralis Meig.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Juni und Juli, *Koch*.

15) *longicornis* Stann.

acuticornis Meig.

Nürnberg n. h., Dutzendteich, Schmausenbuck, Morizberg (fränk. Jura), Juli bis September, *Koch*; München, am 25. Juli 1869 am Weg von Hessellohe nach Schäftlarn ein Männchen gefangen, Kr.

16) *nitidus* Fall.

ornatus Meig. — *nitens* Stann. — *jucundus* Halld.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, September, *Koch*; München, am 26. Juni 1869 zwischen Hessellohe und Pullach ein Weibchen gefangen; Rosenheim, im September 1868 bei Hochstätt von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Hohenschwangau am 28. August 1869 in den Schwansee-Anlagen ein Weibchen mit ganz gelben Hinterschienen gefangen, Kr.

17) *griseipennis* Stann.

nitidus Stäger.

Nürnberg n. s.; Augsburg n. s.; Reichenhall n. h., August, *Loew*.

18) *urbanus* Meig.

München, am 14. Juni 1868 mehrere Exemplare im Schwarzhölzl gefangen; Starnberg, am 30. Mai 1869 zwischen Beuerberg und St. Heinrich ein Männchen gefangen, Kr.; bei St. Bartholomä am Königsee, August, *Gerstäcker*.

19) *trivialis Halid.*

intermedius Stäger.

München, am 6. Juli 1870 bei Pasing ein Männchen, vier Weibchen gefangen, Tegernsee, Ende August und Anfang September, einzeln am Albach, am Weg zum Lieberhof und beim Paraplui, Hohenschwangau, Ende August und Anfang September 1869 in den Schwansee-Anlagen und in der Bleckenau drei Männchen gefangen, *Kr.*; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*; am Walchensee g., August, *Loew*.

20) *brevipennis Meig.*

plumitarsis Fall.

Nürnberg n. s., Falznerweiher, Herrnhütte, Juni und Juli, *Koch*.

21) *linearis Meig.*

parvulus Zett. — agilis Zett.

Partenkirchen n. h., August, *Loew*.

22) *equestris Halid.*

cinctus Staeg. — Staegeri Zett.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Falznerweiher, Dutzendteich, Juni bis August, *Koch*; München, im Schwarzhölzl und bei Lochhausen ein Männchen, drei Weibchen gefangen, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn ein Weibchen gefangen, Schliersee am Spitzingsee in mehreren Exemplaren gekötschert, *Kr.*; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker*.

23) *aeneus Fabr.*

ungulatus Fabr.

Aschaffenburg g.; Würzburg; Bamberg; Nürnberg g., Herrnhütte, Falznerweiher, Pillenreuth, Schmausenbuck, Erlenstegen, Dutzendteich, Mögeldorf, Pommelsbrunn (fränk. Jura), *Koch*; Oettingen; Eichstädt; Augsburg g.; Freising; München, allenthalben, namentlich an der Isar und Würm die gemeinste Art, Starnberg, im Mühlthal, Rosenheim, bei Hochstätt Mitte Mai bis Ende Juli, *Kr.*; Reichenhall g., August, *Loew*; an Wassergräben, Juni, *Schrank* p. 123 n. 2457; Kreuth, g., August, *Loew*.

24) *coeruleicollis Meig.*

München, Prof. Dr. *Waltl.* (Ob ein *Dolichopus*?)

84. *Hypophyllus Loew.*

1) *longiventris Loew.*

Kreuth n. h., August, *Loew*.

2) *crinipes Staeg.*

pectinifer Zell.

München, am 26. Mai 1869 zwischen der Hesselloher Brücke und Pullach zwei Männchen, ein Weibchen, wahrscheinlich gekötschert, *Kr.*

3) *discipes Ahr.*

patellatus Fall. — ventralis Zett. — patellipes Meig.

Am Wildbache bei Kreuth auf niedrigen Pflanzen, eines Morgens in grösserer Anzahl, August, *Gerstäcker*.

4) *obscorellus* Fall.

In der Ramsau, in der Nähe einer Quelle, Anfang August, *Gerstäcker*.

85. *Liancalus* Loew.

1) *virens* Scop.

regius Fabr. — *Medeterus regius* Meig.

Nürnberg, ein Weibchen am 11. November 1865, *Kittel*, h. in der Stadt, Juli bis September, *Koch*; München, s. h. im englischen Garten, wo er die am Ufer der Isar aufgehäuften Felsblöcke fast schaarenweise besetzt hält, *Gerstäcker*, am 19. September 1863 in den Isarauen ein Männchen gefangen, Rosenheim, zwischen dem 13. und 23. September 1869 um Hochstätt von Ant. Kr. ein Weibchen gefangen, *Kr.*; Kreuth, überall h. an Wasserfällen, Anfang August, *Gerstäcker*.

86. *Hydrophorus* Wahlenberg.

1) *bipunctatus* Lehm.

binotatus Fall.

Nürnberg, Dutzendteich, läuft sehr schnell über das Wasser hin, September, *Koch*.

2) *praecox* Lehm.

oceanus Macq. — *Medeterus viridis* Meig. — *Aphrozeta semiglaucæ* Perris.

Am Walchensee n. h., August, *Loew*.

3) *inaequalipes* Macq.

cinerea Perris.

Nürnberg, Dutzendteich, läuft sehr schnell über das Wasser hin, September, *Koch*.

4) *litoreus* Fall.

♀ *aquaticus* Meig.

Nürnberg, Dutzendteich, n. h., September, *Koch*.

5) *nebulosus* Fall.

Nürnberg s., Falznerweiher, September, *Koch*.

87. *Sympycnus* Loew.

1) *aeneicoxa* Meig.

brevicornis Zett.

Augsburg ein Stück; Rosenheim, zwischen dem 4. und 6. August 1869 bei Hochstätt von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, *Kr.*; Kreuth, Anfang August, nur Weibchen, *Gerstäcker*; Kreuth g., Anfang August, *Loew*.

2) *annulipes* Meig.

pulicarius. — *pygmaeus* Macq. — *Chrysotus cinereus* Zett.

Nürnberg h., Falznerweiher, September, *Koch*; Augsburg s. h.; Kreuth, Anfang August, nur Weibchen, *Gerstäcker*; Kreuth g., Au-

gust, *Loew*; Reichenhall n. h., August, und Walchensee, August, *Loew*.

3) *bifasciellus* Zett.

Nürnberg ein Stück.

4) *plantaris* Gerst.

Ich fing ein einzelnes Pärchen dieser interessanten, und durch die Erweiterung der männlichen Tarsen an *Dolichopus* erinnernden Art Anfang August bei Kreuth, *Gerstäcker*, Stett. ent. Zeitg. 1864 S. 150.

5) *spiculatus* Gerst.

Unter zahlreichen Weibchen fand sich nur ein Männchen; Anfang August bei Kreuth, *Gerstäcker*, Stett. ent. Zeitg. 1864 S. 150 Nr. 4. Reichenhall n. h., August, Kreuth g., Anfang August, *Loew*.

88. *Campsicnemus* Walker.

1) *compeditus* Loew.

München, am 21. Juli 1870 bei Hessellohe oder Pullach drei Männchen, fünf Weibchen gekötschert, *Kr*.

2) *curvipes* Fall.

Dolichopus ciliatibius v. Roser.

Nürnberg g., Tullnau, Mögeldorf, Falznerweiher, im Grase; September, *Koch*; Augsburg, an der Schwimmschule, Juli, Direktor *Loew*; Kreuth h., Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*; am Walchensee g., August, *Loew*.

3) *scambus* Fall.

Medeterus prodromus Meig. — *Dolichopus clavitibius* v. Roser.

Nürnberg g., Falznerweiher, Herrnhütte, August und September, *Koch*; Augsburg, Schwimmschule, Juli, Direktor *Loew*.

4) *lumbatus* Loew.

Nürnberg s., Herrnhütte, Falznerweiher, Juni bis September, *Koch*.

5) *umbripennis* Loew.

Mehrere Exemplare beider Geschlechter; sowohl bei Kreuth als in der Ramsau bei Berchtesgaden in der Nähe von Wasserfällen und Quellen n. s., *Gerstäcker*; Kreuth h., Anfang August, *Loew*.

89. *Teuchophorus* Loew.

1) *spinigerellus* Zett.

? *Porphyrops flavicoxa* Meig.

Partenkirchen g., Kreuth, *Loew*.

90. *Medeterus* Fischer.

1) *obscurus* Zett.

robustus Loew.

München, bei Pasing und Schäftlarn an aufgeschichtetem Holz mehrere Weibchen gefangen, Juli, *Kr*.

2) *ambiguus* Zett.

München, mit der vorigen Art, aber in grösserer Anzahl und beiden Geschlechtern gefangen, *Kr.*

3) *diadema* Linn.

rostratus Fabr. Meig. — *aeneovittatus* Macq.

Nürnberg h., an Mauern, Juli, *Koch.*

4) *plumbellus* Meig.

Nürnberg s., Augsburg n. s.

5) *jaculus* Meig.

Nürnberg n. h., Juli und August, *Koch*; Augsburg g.; München, im Walde zwischen Hessellohe und Deisenhofen an Holzhausen, auch um Herlaching Ende Juni und Juli gefunden, bei Hessellohe Ende September bis Mitte Oktober im Sommerhaus, *Kr.*; Kreuth, Anfang August, *Gerstäcker* und *Loew*; am Walchensee n. h., August, *Loew.*

6) *truncorum* Meig.

Nürnberg g., Juli und August, an Mauern, *Koch*; Augsburg s.; München, bei Schäftlarn mit den beiden ersten, zwischen Herlaching und der Bahnbrücke, Juli, *Kr.*

7) *infumatus* Loew.

Bei Berchtesgaden an einem Kieferstumpfe, August, *Gerstäcker.*

8) *apicalis* Zett.

Ein Exemplar bei Kreuth, August, *Gerstäcker.*

9) *gratiosus* Meig.

München, Professor Dr. *Walzl.*

10) *tristis* Zett.

Nürnberg n. h., Juni bis August, *Koch.*

Familie XIII. **PLATYPEZIDAE.**

91. *Callomyia* Meigen.

1) *amoena* Meig.

Nürnberg s. s., Waigelshof, Juni, ein Männchen gefangen an Blättern niederer Gesträuche, *Koch.*

2) *antennata* Zett.

♀ *cinerea* Zett. — ♀ *Hoffmannsegit* Meig.

Nürnberg s. s., Dutzendteich, Juni, ein Männchen gefangen, *Koch*; bei Kreuth, August, *Loew.*

3) *elegans* Meig.

♂ *speciosa* Meig.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, August, ein Weibchen gefangen, *Koch*; Reichenhall n. h., August, *Loew.*

4) *humeralis* Loew.

Reichenhall n. h., August, Loew.

92. *Platypeza* Meig.

1) *boletina* Fall.

Kreuth n. h., August, Loew.

2) *fasciata* Fabr.

Nürnberg, ein Weibchen gefangen, Koch.

3) *atra* Meig.

Nürnberg s.; Kreuth n. h., August, Loew.

4) *infumata* Hal.

Platypeza ornata Meig. — *vittata* Zett.

Reichenhall n. h., August, Loew.

5) *furcata* Fall.

Kreuth n. h., August, Loew.

93. *Platycnema* Zett.

1) *pulicaria* Fall.

Augsburg ein Stück.

Familie XIV. LONCHOPTERIDAE.

94. *Lonchoptera* Meig.

1) *lutea* Panz.

rivalis Meig.

Nürnberg n. s., Tullnau, Falznerweiher, auf niederen Pflanzen, Juli bis September, Koch; Augsburg g., Abends im Gebüsch, Oktober; Freising h.

2) *trilineata* Zett.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, Juli, Koch; Augsburg z. s., München, um Hessellohe einzeln, Ende Juli bis Anfang Oktober, Kr.

3) *punctum* Meig.

Nürnberg ein Stück.

4) *flavicauda* Meig.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, September, Koch.

5) *lacustris* Meig.

Nürnberg h., Tullnau, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, September, Koch; Augsburg n. s.; Starnberg, am 22. Mai 1870 ob Ammerland ein Weibchen gekötschert, Kr.

6) *tristis* Meig.

Nürnberg s. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Koch; Augsburg n. s., Freising n. s.

Familie XV. PIPUNCULIDAE.

95. *Chalarus* Walker.

1) *spurius* Meig.

♀ obacurus Zett. — *Ateleneura velutina* Macq.

Nürnberg in Gärten s. s., Juli, Koch; Reichenhall n. h., August, Loew.

96. *Pipunculus* Latreille.

1) *furcatus* Schin.

München, am 21. Mai 1865 zwischen Thalkirchen und Hessellohe ein Weibchen gefangen, Kr.

2) *modestus* Halid.

Nürnberg h., in Gärten, Dutzendteich, Schmausenbuck, Juni bis August, Koch; München, am 26. Mai 1869 bei Hessellohe oder Pullach ein Männchen gefangen, Kr.

3) *sylvaticus* Meig.

Nürnberg n. h., Herrnhütte, Mai und Juni, Koch; Augsburg ziemlich s., Ammerland, Juni.

4) *nigritulus* Zett.

Nürnberg n. h., Dutzendteich, Herrnhütte, Juni bis August, Koch; Augsburg n. s. s.; München, am 21. Juli 1870 bei Hessellohe oder Pullach ein Männchen gefangen, Kr.

5) *campestris* Latr.

spinipes Meig.

Freising n. s., am 10. Juni, im Plantagenwald; Reichenhall n. h., August, Loew.

6) *rufipes* Meig.

Nürnberg s. s., Juni, Koch; Augsburg s.

7) *ruralis* Meig.

Nürnberg g., Schmausenbuck, Erlenstegen, Dutzendteich, Pillenreuth, Pommelsbrunn (tränk. Jura), Juni und Juli, Koch; Augsburg s.; München, bei Hessellohe, Pasing vor Mitte Mai bis gegen Ende Juli; Rosenheim um Hochstätt Mitte Mai von mir, August und September von Ant. Kr. gefangen, n. s., doch ziemlich einzeln, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

8) *pratorem* Fall.

Nürnberg n. h.; Falznerweiher, Schmausenbuck, Morizberg, Pommelsbrunn (tränk. Jura), Juni bis September, Koch; Wessen (bayr. Geb.), September, Koch; Augsburg n. s., München, am 4. Oktober 1863 bei Hessellohe von Ant. Kr. ein Weibchen, am 12. Juni 1870 bei Baierbrunn von mir ein Männchen gefangen, Kr.

9) *flavipes* Zett (*Meig.*?)

Hohenschwangau, Ende August und Anfang September in den Schwansee-Anlagen vier Männchen (zur var. a. gehörig) von mir und Ant. Kr. gefangen, Kr.

10) *geniculatus* Meig.

München, am 26. Mai 1870 bei Geiselgasteig zwei Männchen, ein Weibchen gekötschert, Kr.

97. *Nephrocerus* Zetterstedt.

1) *flavicornis* Zett.

Tegernsee, am 5. Juni 1865 am Albach oder am Weg zum Lieberhof von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Kr.

2) *scutellatus* Macq.

München, ein Männchen dieser seltenen Fliege am 21. Mai 1865 ober Maria Einsiedel an einem Strauche gefunden, Kr.

Familie XVI. SYRPHIDAE.

98. *Callicera* Panzer.

1) *aenea* Fabr.

♀ *aurata* Rossi. — Panzeri Rondan. — *aurata* Rondan.
Nürnberg s. s. (?).

99. *Microdon* Meigen.

1) *mutabilis* Linn.

apiarius Fabr. — *apiformis* Deg. Loew. — *aureo-pubescent* Latr. — *scutellatus* Schummel.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, Koch; Augsburg s.; Regensburg; Eichstädt; München, am Parkzaun bei Geiselgasteig, bei Pasing n. s., Starnberg, Tegernsee, am Weg zum Lieberhof, Schliersee, am Spitzingsee, Ende Mai und Juni, Kr.

2) *devius* Linn.

Stratiomys conica Panz. — *plebeja* Schrank. — *Stratiomys pigra* Schrank p. 97. n. 2387. — *micans* Meig. — *anthinus* Meig. — *fusctarsis* Schummel. — *apiformis* Curt.

Nürnberg n. s., Dutzendteich, Mögeldorf, Juni und Juli, Koch; Falznerweiher, Kittel; Augsburg h., die Larve (*Scutelligera Ammerlandensis* Spix.) ist bei Deuringen, Ende März unter Tannenrinde in Gesellschaft von *Formica rufa* h.; die Fliege ist leicht zu ziehen; Regensburg; Eichstädt; München, bei Hessellohe an der Isar auf Erlen, zuweilen paarweise, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, und zwischen Beuerberg und St. Heinrich, Ende Mai und Juni, Kr.; Ammerland, Freising n. s., auf Blüten, Schrank.

100. *Psarus* Latreille.

1) *abdominalis* Fabr.

Nürnberg s. s., Dutzendteich, Juni, Koch; Regensburg s. s.

101. *Chrysotoxum* Meig.

1) *fasciolatum* Deg.

marginatum Meig. — *costale* Meig.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Juli, Koch; Regensburg g.; Starnberg, im Mühlthale und am Weg nach Allmannshausen s., Ende Mai bis Ende Juni, Tegernsee am Weg zum Lieberhof ein Männchen am 10. September 1864 gefunden, Kr.

2) *arcuatum* Meig.

hortense Linn. — ♂ *fasciolatum* Loew. — ♀ *hortense* Loew.

Bamberg, Prof. Hoffmann; Nürnberg; Augsburg; Regensburg; Tegernsee an den Abhängen des Wester- und Lieberhofes, zwischen Kreuth und Glashütte, von der Valepp auf die Fürstenalpe; Hohenschwangau am Weg zum weissen Haus, Schliersee, am Spitzingsee überall einzeln, Anfang Juni bis Ende August, Kr.; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüten, Schrank p. 104 n. 2407.

3) *sylvarum* Meig.

vespiformis Fabr. — *fasciolatum* Meig. — *scutellatum* Macq. — *arcuatum* Walk.

Nürnberg; Regensburg; München, am 31. Juni 1868 ein Weibchen bei Pasing, am 7. Juli 1869 ein solches bei Dachau gefunden, Kr.

4) *intermedium* Meig.

scutellatum Loew. — *monticola* Schummel. — *graecum* Walk. — *italicum* Rond.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Koch; Regensburg s.; Rosenheim, bei Hochstätt, Hohenschwangau am ersten Drittel des Tegelberges und am Weg zum weissen Haus, Tegernsee am Weg zum Lieberhof, nach Kreuth und Glashütte, in der Sölbachau, einzeln, Mitte August bis Mitte September, Kr.

5) *bleinctum* Linn.

Nürnberg g., Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Juni bis September, Koch; Augsburg g.; Regensburg g.; Ammerland, Juni; München, Starnberg, Rosenheim, Tegernsee im Thale und auf den Höhen der Neureuth und Gründelalpe, überall g., Ende Mai bis Ende August, Kr.; Kreuth n. h., August, Loew; Freising g., Weiherstephan, Juni; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüten, Juli, Schrank p. 107 n. 2413.

6) *festivum* Linn.

arcuatum Deg. — ♀ *arcuatum* Meig.

Nürnberg g., Herrnhütte, Dutzendteich, Schmausenbuck, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni bis September, Koch; München; Starnberg, Rosenheim. Hohenschwangau allenthalben n. s., nach Mitte Mai bis Ende August, Kr.; Freising, Weiherstephan, Mai, Juni.

7) *vernale* Loew.

Nürnberg überall g., Koch; München, allenthalben ziemlich g.; Rosenheim, von Mitte Mai bis Mitte Juli, Kr.

8) *octomaculatum* Curt.

intermedium Zett. — *chrysopecta* Rond.

Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelshof, Tullnau, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, Koch.

9) *elegans* Loew.

arcuatum Schrank. — *intermedium* Walk.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli bis September, Koch; München, Hessellohe, Nymphenburg, Pasing, überall ziemlich s., Ende Mai bis Anfang Juli; Kr.

102. *Paragus* Latreille.

1) *tibialis* Fall.

aeneus Meig. — *obscurus* Meig. — *femoratus* Meig. — *haemorrhous* Meig. — *trianguliferus* Zett. — *coadunatus* Rond. — *sigillatus* Curt. — *dispar* Schummel — *albipes* Gimmerth. — *nigritis* Gimmerth.

Nürnberg g., Dutzendteich, Tullnau, an Thymus, Juli u. August, Koch; Augsburg ein Stück; Regensburg n. s.

2) *albifrons* Fall.

thymiastris Panz. — *majoranae* Rond.

Fichtelgebirg; Nürnberg s. s., in Gärten, August, Koch; Regensburg g.

3) *quadrifasciatus* Meig.

Regensburg s. s.; Rosenheim im September 1868 von Ant. Kr. ein Männchen bei Hochstätt, Kr.

4) *lacerus* Loew.

Nürnberg s. s., einmal gefangen, Juli, Koch.

5) *bicolor* Fabr.

testaceus Meig. — *arcuatus* Meig. — *taeniatus* Meig. — *zonatus* Meig. — *rufoaenea* Zett. — *punctulatus* Zett.

Nürnberg s., Mögeldorf, September, Koch; Augsburg s.; Regensburg g.; am Starnberger See, August, Koch.

var. *taeniatus* Meig.

Augsburg, ein Pärchen auf der Haide vor dem Ablass, Mai.

103. *Pipizella* Rondani.

1) *virens* Fabr.

varipes Meig. — *maculipennis* Meig. — *campestris* Fall. — *geniculata* Curt. — *varians* Rondani.

Nürnberg g., Mai bis Juli, Koch; Augsburg g.; München, Starnberg, Moosburg, Rosenheim, Tegernsee, Regon im bayerischen Wald, allenthalben g., Anfang Mai bis Mitte September, Kr.; Freising g.; Reichenhall n. h., August, Loew.

2) *annulata* Macq.

morosa Loew.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Tullnau, Mai bis Juli, Koch; Augsburg; n. s.; München überall, aber ziemlich s. und einzeln, Kr.

3) *Heringii* Zetterst.

Heringia Zetterstedti Rond. — ♀ *Pipiza atra* Loew.

Nürnberg s. s., in Gärten, Juni, Koch.

104. *Pipiza* Fallen.

1) *fasciata* Meig.

München, den 21. Juli 1870 auf einer Excursion nach Hessellohe und Pullach ein Weibchen. Wenn die Bestimmung richtig ist, so möchte ich auch diese Art für eine Var. von *festiva* halten, Kr.

2) *quadrinaculata* Panz.

Fichtelgebirg; Nürnberg auf Blüthen, Panzer, Falznerweiher, Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura) s., Mai und Juni, Koch; München, in den Isarauen und bei Planeck einzeln, Mitte Mai bis Mitte Juni, Kr.

3) *festiva* Meig.

ornata Meig. — *lunata* Meig. — *artemis* Meig.

Nürnberg ein Stück, Kittel; vereinzelt, Schmausenbuck, Herrnhütte, Mai und Juni, Koch; München, an den Ufern der Isar bis Pullach, besonders neben dem Damm ob den Ueberfällen, mehrmals am häufigsten die var. *lunata* gefunden, Rosenheim, bei Langenpfungen, Mitte bis Ende Mai, und wieder Ende Juli bis Anfang August, nur Weibchen. Vgl. *austriaca*, Kr.

4) *noctiluca* Linn.

♀ *rosarum* Panz.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni und Juli, Koch; München, bei Hessellohe und Pullach, Mitte Mai, ziemlich s., Kr.; Halblech, Juli, Koch.

5) *signata* Meig.

Nürnberg s. s., Waigelshof, Mai und Juni, Koch; München, den 29. Juni 1868 bei Schleissheim von Anton Kr. ein Weibchen, den 21. Juli 1870 auf einer Excursion nach Hessellohe und Pullach ein Weibchen gefunden, Kr.

6) *notata* Meig.

München, den 28. Mai 1865 bei Pasing ein Weibchen gefunden, drittes Fühlerglied fast kreisrund, am Ende abgestutzt, Kr.

7) *flavitaris* Meig.

♀ *vitrea* Meig. — *Ratzeburgi* Zetterst.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, Mai und Juni, Koch.

8) *lugubris* Fabr.

München, den 24. Juni 1865 bei Schleissheim von Ant. Kr. ein Weibchen, den 12. Juli 1868 am Damm ob den Ueberfällen ein Weibchen, den 6. Juli 1870 bei Pasing ein Weibchen gefunden; zwischen dem

13. und 23. September 1869 bei Hochstätt von Ant. Kr. ein Weibchen gefunden, Hohenschwangau den 30. August 1870 in den Schwannsee-Anlagen ein Weibchen gefunden, Kr.; in Gobüsch, sparsam, Schrank p. 109 n. 1416.

9) *austriaca* Meig.

Nürnberg s. s., Waigelshof, Mai und Juni, Koch; als solche bestimmte ich eine Art, die ich mehrmals, einmal in 7 ganz gleichen Stücken aber nur Männchen mit festiva fing, mit letzteren 7 erhielt ich noch ein Exemplar, ebenfalls Männchen, das zwei gelbe Flecken auf dem zweiten Hinterleibsringe hat, sonst aber mit den anderen ganz übereinstimmt. Es fragt sich nun, ob nicht diese austriaca das Männchen zu festiva ist, und zwar die Normalform desselben, Kr.

10) *vitripennis* Meig.

Augsburg, ein Stück; München, bei Hessellohe und bei Pasing, Ende April je ein Männchen gefunden, Kr.

11) *chalybeata* Meig.

? *coerulescens* Macq.

Nürnberg s. s., Juni, Koch.

12) *anthracina* Meig.

♀ *ruficornis* Meig. Bohem.

Nürnberg n. s., Falznerweiher, Waigelshof, Morizberg (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch.

13) *carbonaria* Meig.

leucogona Zett. — *geniculata* Zett.

Nürnberg s., Falznerweiher, Dutzendteich, Pommelsbrunn, (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch.

14) *leucopeza* Meig.

München, Prof. Dr. Wallt.

15) *obscuripennis* Meig.

Nürnberg; München, Prof. Dr. Wallt.

16) *tristis* Meig.

München, Prof. Dr. Wallt; Rosenheim im September 1868 von Ant. Kr. ein Männchen bei Hochstätt gefunden, Kr.

17) *leucogona* Loew.

Augsburg ein Stück.

105. *Triglyphus* Loew.

1) *primus* Loew.

München, bei Pasing an der Würm auf Blüten von *Ranunculus reptans* zwei Exemplare gefunden, Mai, Kr.

106. *Psilota* Meigen.

1) *anthracina* Meig.

conjugata Rond.

München, den 28. Mai 1870 bei Pasing ein Weibchen gefunden, Kr.

107. *Chrysogaster Meigen.*

1) *metallina Fabr.*

metallica Fabr. Loew. — ♂ *discicornis* Meig. — *grandicornis* Meig. — ♀ *metallica* Meig.

Nürnberg h., Dutzendteich, Mögeldorf, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis September, Koch; München, bei Schleissheim ein abgeflogenes Männchen am 24. Juni 1865.

2) *viduata Linn.*

nuda Macq.

Nürnberg n. h., Tullnau, G'steinach, Falznerweiher, Mai und Juni, Koch; Augsburg g.; München, um Hessellohe, Pasing, Lochhausen, Schliersee, Spitzingsee ziemlich g., Rosenheim, bei Tangenpfungen, Mitte Mai bis Mitte Juni, Kr.; Freising g.

3) *Macquarti Loew.*

viduata Zett.

Nürnberg s., Tullnau, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Augsburg n. s.; München, in den oberen Isarauen bis Pullach, um Schleissheim, Mitte bis Ende Mai, ziemlich s., Kr.

4) *aerosa Loew.*

Nürnberg n. h., Tullnau, Schmausenbuck, Falznerweiher, Mai und Juni, Koch; Augsburg n. s.

5) *coemeteriorum Linn.*

solatitialis Fall.

Nürnberg n. s., auf Blüthen, Kittel, Dutzendteich, Falznerweiher, Mögeldorf, Mai bis Juli, Koch; München, bei Thalkirchen, Hessellohe, Schäftlarn, Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, Rosenheim, um Hochstätt, Tegernsee, am Albach n. s., Anfang Juni bis Ende August, Metten in Niederbayern, Ende Juni, Kr.

6) *chalybeata Meig.*

cupraria Macq.

Starnberg, ein Männchen am 7. Juni 1868 zwischen Gauting und Mülhthal gefunden, Kr.

7) *basalis Loew.*

Augsburg, Lehrer Bischoff.

108. *Orthoneura Macquart.*

1) *elegans Meig.*

Nürnberg s., Dutzendteich, Falznerweiher, April bis Juni, Koch; München, den 14. Juni 1868 im Schwarzhölzl zwei Weibchen gefunden, Kr.

2) *nobilis Fall.*

Nürnberg s., Herrnhütte, Morizberg (fränk. Jura), Mai, Koch; München, den 11. Juli 1864 bei Pullach ein Weibchen, Regen im bayrischen Wald ein Weibchen, am 25. Juni 1864 gefunden; Kr.; Halblach, Juli, Koch.

3) *brevicornis* Loew.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Koch; München, den 14. April 1869 und den 7. Mai 1870 bei Schleissheim je ein Weibchen (beide mit stahlblauer Stirne) gefunden, Kr.

4) *geniculata* Meig.

München, den 24. Juni 1869 am Dachauer Kanal bei Schleissheim zwei Weibchen gefunden, Kr.

109. *Cheilostia* Meigen.

1) *oestracea* Loew.

rupestris Panz.

Aschaffenburg, Prof. Hoffmann; Nürnberg h., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli bis September, Koch; Regensburg n. s.; Eichstädt; München, in den Isarauen bis Schäftlarn n. s., häufiger noch in den Alpen und deren Nähe, Rosenheim, Tegernsee und Hohenschwangau, von Herrn Ed. Steinheil um Reichenhall, Anfang Juli bis nach Mitte September, Kr.

2) *pigra* Loew.

Nürnberg n. h., Schmausenbuck, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, Koch; München, bei Pullach, Geiselgasteig, Pasing, auf Feldern an Löwenzahn n. s., Mitte bis Ende Mai, Schliersee, am Spitzingsee den 24. Juni 1870 zwei Männchen mit fast ganz schwarzen Beinen, und ein abgeriebenes Weibchen gefangen, Kr.

3) *barbata* Loew.

vulnerata Panz. Schln.

Nürnberg n. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; München in den Isarauen bei Pullach; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, Rosenheim, bei Hochstätt, Tegernsee, allenthalben eine der gemeinsten Arten, Mitte Mai bis gegen Ende September, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

4) *decidua* Egger.

Nürnberg.

5) *variabilis* Panz.

ater Fabr. — *nigrita* Fabr. — *nigrina* Meig.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, Koch; Regensburg n. s.; München, an den Isarufern bis Schäftlarn, bei Pasing, Nymphenburg, Starnberg im Mühlthal und am Weg nach Ambach, Rosenheim, bei Langenpfunzen, neben der Brücke, Tegernsee am Albach Mitte Mai bis Ende Juli, im Gebirge noch bis Mitte August, Kr.

6) *personata* Loew.

Hohenschwangau den 24. August 1869 am Weg auf den Tegelberg 4 Männchen, 2 Weibchen, alle mehr oder minder abgeflogen, von mir und Ant. Kr. gefangen, Kr.

7) *sparsa* Loew.

Nürnberg n. s., Schmausenbuck, Dutzendteich, Waigelshof, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch.

8) *antiqua* Meig.

nigripes Meig. — *tropica* Meig. — Schmidtii Zett. — *vienna* Zett.

Augsburg, Lehrer *Bischoff*; München, um Hesselohle und Pullach, bei Pasing, Starnberg, im Mühlthal, Tegernsee, am Albach und beim Westerhof, Mitte Mai bis Mitte Juli, *Kr.*

9) *maculata* Fall.

Den 7. Juli 1865 am Weg von St. Quirin nach Miesbach drei Männchen von mir und Ant. *Kr.* gefangen, *Kr.*

10) *soror* Zett.

München, bei Harlaching, Pasing; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, ziemlich s., Anfang Juni, bis Mitte Juli, *Kr.*

11) *scutellata* Fall.

Nürnberg h., Falznerweiher, Pillenreuth, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni bis August, *Koch*; Regensburg n. s.; München überall; Starnberg zwischen Gauting und Petersbrunn; Rosenheim, bei Hochstätt; Hohenschwangau in den Schwansee-Anlagen und am Weg zum weissen Haus, n. s., Mitte Mai bis Mitte September, *Kr.*

12) *means* Fabr.

Augsburg, Lehrer *Bischoff*; Regensburg n. s.

13) *pulchripes* Loew.

means Zett. — *paganus* Meig.

Nürnberg n. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Juli und September, *Koch*; München, bei Hesselohle, Pasing; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn; Rosenheim, am Weg nach Hochstätt; Tegernsee, am Albach und von da zu Lieberhof, n. s., April und von Anfang Juli bis Anfang September, *Kr.*

14) *impressa* Loew.

vernalis Meig. — *coemeteriorum* Fall.

Nürnberg n. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Juni und August, *Koch*; München, in den Isarauen bis Hesselohle und Pullach; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, und zwischen St. Heinrich und Ambach; Rosenheim, bei Langenpfungen, ziemlich g. Von Mitte Mai bis nach Mitte Juni, und von Mitte Juli bis gegen Ende September, *Kr.*; Wessen, (bayr. Gebirg), September, *Koch*.

15) *albitarsis* Meig.

flavimana Meig. — *vidua* Macq.

Nürnberg n. s., Schmausenbuck, Herrnhütte, Pommelsbrunn, Morizberg (fränk. Jura), Mai und Juni, *Koch*; Regensburg s.; München am 13. Juni 1864 bei Geiseltasteig ein stark abgeflogenes Männchen, den 30. April 1865 am Damm ob den Ueberfällen von Ant. *Kr.* ein Weibchen; Starnberg den 30. Mai 1869 zwischen St. Heinrich und Ambach ein Weibchen, *Kr.*

16) *morio* Zett.

♂ *luteicornis* Zett.

München, bei Hesselohle und Pasing; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, Rosenheim, bei Hochstätt, n. s., vor Mitte bis Ende April, *Kr.*

17) *mutabilis* Fall.

funeralis Meig. — ♀ *ruralis* Meig. — ♀ *pratensis* Meig. — *pygmaea* Zett.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August, Koch; Regensburg g.

18) *fasciata* Egger et Schiner.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, April, Koch.

19) *canicularis* Panz.

Nürnberg n. h., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August und September, Koch; Augsburg Lehrer Bischoff; München, in den Isarauen bei Hessellohe einzeln; Rosenheim, um Hochstätt, Ant. Kr.; Tegernsee und Hohenschwangau allenthalben g. Ein Männchen Ende April, alle übrigen Exemplare August und September.

20) *himantopus* Panz.

Regensburg s. s.

21) *flavicornis* Fabr.

♀ *flavipes* Meig.

Nürnberg s., Dutzendteich, April und Mai, Koch; Augsburg, Lehrer Bischoff; Regensburg n. g.; München, in den oberen Isarauen bis Pullach; Starnberg, zwischen Ammerland und Ambach, überall ziemlich s., Ende April bis gegen Ende Mai. Mit dieser Art glaube ich *gilvipes* Zett. als die ausgeprägte weibliche Form verbinden zu müssen, Kr.

22) *chrysocoma* Meig.

München, von Mitte bis Ende April bei Schleissheim s., Kr.; Altenau (bayr. Gebirg) s., Juli, Koch.

23) *grossa* Fall.

Regensburg s. s.; München überall, den ganzen April hindurch bis Anfang Mai, besonders auf Weidenblüthen, Kr.

24) *chloris* Meig.

chlorus Meig.

Nürnberg n. h., Falznerweiher, Dutzendteich, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; München, allenthalben; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn und zwischen Ammerland und Ambach; Rosenheim bei Hochstätt Mitte April bis Ende Mai, einzelne abgeriebene Exemplare noch bis gegen Mitte Juni, Kr.

25) *modesta* Egger.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; Augsburg, Lehrer Bischoff.

26) *vernalis* Fall.

obscura Loew.

Nürnberg n. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai, Koch; Regensburg n. s.; München, überall n. s.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn; Rosenheim, bei Hochstätt; Hohenschwangau in der Bleckenau von Ant. Kr. Von Mitte April bis Anfang Mai, und Ende Juli bis Ende September, Kr.

27) praecox Zett.

♀ glabrata Meig.

Nürnberg h., Schmausenbuck, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis Juli, Koch; Augsburg ein Stück; München, überall; Starnberg. zwischen Gauring und Petersbrunn, und zwischen Ammerland und Ambach, n. s. s., gegen Ende April bis Ende Mai, Kr.

28) auripila Meig.

München, Prof. Dr. Wallt.

29) albipila Meig.

München, Prof. Dr. Wallt.

30) fulvicornis Meig.

Regensburg s. s.

31) flavicornis F. (?)

Regensburg s.

110. Melanostoma Schiner.

1) ambigua Fall.

Augsburg ein Stück; München, Dachau, Moosburg, Rosenheim, Tegernsee, Hohenschwangau allenthalben g. Vom Ende April bis Ende September, Kr.

2) mellina Linn.

Syrphus scalaris Fabr. Panz. — Syrphus Iris Meig. — Syrphus mellarius Meig. — Syrphus melliturgus Meig.

Überall h. auf Blüthen; Larven unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, Schrank p. 106 n. 2410.

3) gracilis Meig.

Nürnberg s., Falznerweiher, Mai und Juni, Koch; Reichenhall n. h., August, Loew.

111. Platycheirus St. Fargeau et Serville.

1) manicatus Meig.

alpicola Schummel.

Tegernsee, den 10. September 1863 am Weg zum Lieberhof ein Weibchen; den 7. Juni 1865 am Weg von St. Quirin nach Miesbach von Ant. Kr. ein Männchen gefangen; Hohenschwangau am 24. August 1869 am Weg auf den Tegelberg von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Kr.

2) albimanus Fabr.

Syrphus cyaneus Walk.

Nürnberg h., Schmausenbuck, Waigelshof, Dutzendteich, Mai bis September, Koch; Augsburg ein Stück; Eichstätt; München bei Hessellohe, Pasing, einzeln; Tegernsee, zwischen der Neureuth und Gründelalpe; Hohenschwangau am Fusse des Tegelberges (auf Solidago virgaurea bei trübem Wetter) n. s., Ende Mai bis Mitte Juni, und Ende Juli bis Anfang September, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

3) *peltatus* Meig.

Nürnberg n. h., Waigelshof, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; Regensburg n. s.; München, in den Isaraunen bis Pullach, um Pasing, im Mai einzeln; Rosenheim, den 18. Mai 1869 bei Langenpfungen neben der Brücke ein Pärchen; Hohenschwangau den 28. August 1869 in den Schwansee-Anlagen ein Männchen gefangen, Kr.

4) *scutatus* Meig.

albimana Fall.

Nürnberg h., Tullnau, Dutzendteich, Erlenstegen, Waigelshof, Mai bis August, Koch; Rosenheim den 12. oder 13. September 1869 bei Hochstätt ein Weibchen gefangen; Hohenschwangau den 18. August 1869 am untersten Drittel des Tegelberges (wahrscheinlich mit *albi-manus* an *Solidago virgaurea*) zwei Männchen gefangen.

5) *podagratus* Zett.

? *Scaeva angustata* Zett.

Nürnberg h., Falznerweiher, Dutzendteich, Mügeldorf, Mai bis September, Koch.

6) *clypeatus* Meig.

Augsburg n. s.; München, in der Isaraunen von Hessellohe bis Baierbrunn, ziemlich s.; Starnberg, am Weg nach Allmannshausen, zwei Weibchen; Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen ein Männchen gefangen, Anfang Mai bis Ende August, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

112. *Pyrophaena* Schiner.

1) *ocymi* Fabr.

♂ *Syrphus lobatus* Meig. — *Syrphus granditarsus* Walk.

Nürnberg s. s., Hersbruck (fränk. Jura) einmal gefangen, Juli, Koch; München, den 24. Juni 1865 neben dem Kanal vor Schleissheim ein Männchen, 5 Tage darauf ebenda ein Weibchen gefangen, Kr.

2) *rosarum* Fabr.

noctilucus Panz.

Nürnberg s.

113. *Leucozona* Schiner.

1) *lucorum* Linn.

Conops praecinctus Scop.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni bis August, Koch; München, in den Isaraunen bis Pullach n. s. s., einzeln auch bei Pasing, Schleissheim, Ant. Kr.; Starnberg, wahrscheinlich bei Pfaffenhofen; Tegernsee, am Albach, im Lerchenwald einzeln, bei Aschau von Herrn Kassier Hartmann gefangen, Anfang Mai bis Ende Juni und wieder im August, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

114. *Eriozona* (Förster) Schiner.

1) *syrphoides* Fall.

oestriformis Meig.

München den 26. Mai 1869 und den 16. Juli 1870 bei Hessellohe je ein Männchen, ersteres in den Anlagen hinter dem Bahnhof auf

blühenden Spiraeen; Hohenschwangau den 19. und 25. August 1869 zwei Weibchen, ein Männchen in den Schwansee-Anlagen, und am Wege zum weissen Haus, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

115. *Syrphus* Fabr.

1) *pyrastri* Linn.

transfugas Fabr. — *rosae* Deg. — *unicolor* Curtis.

Aschaffenburg; Würzburg; Fichtelgebirg; Nürnberg überall h., Koch; Augsburg h.; Regensburg h.; Eichstädt; München überall, besonders in den Isaraueu n. s., schon vor Mitte April auf blühenden Weiden (wahrscheinlich als Puppe überwintert), dann von Ende Juni bis Anfang Oktober; Starnberg; Rosenheim; Tegernsee, am Albach bis an das Sackfleckl; Hohenschwangau, am Weg zum weissen Haus und auf dem Tegelberg; Reichenhall von Ed. Steinheil gefangen, Kr.; Freising h., Weihenstephan. Die var. *unicolor* Curt. einzeln mit der Normalform, mehr im Gebirge, Kr.

2) *seleniticus* Meig.

München, in den Isaraueu, ziemlich s., Mitte April, Anfang bis Mitte August; Rosenheim, am 20. April 1870 bei Hochstädt ein Weibchen; Walchensee, am 30. Juni 1866 zwei Weibchen; Hohenschwangau, am Weg zum weissen Haus am 19. August 1869 ein Weibchen, Kr.

3) *laternarius* Mill.

glaucus Meig. — *Scaeva mutata* Zett.

München, den 26. Juni 1869 zwischen Hessellohe und Pullach auf der Höhe ein Männchen, Kr.

4) *glaucius* Linn.

nobilis Meig. — *leucozonius* Ahr.

Augsburg ziemlich s.; München, an den oberen Isarufem bis Pullach; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn, bei Pfaffenhofen; Rosenheim, um Hochstädt; Tegernsee, am Albach und von da zum Lieberhof auf Dolden n. s.; Hohenschwangau, im Thale überall n. s.; nach Mitte Juni bis gegen Mitte September, Kr.

5) *venustus* Meig.

solitaria Meig. — *berberidis* Loew.

Nürnberg s., Dutzendteich, Falznerweiher, Mai und Juni, Koch; Regensburg n. s.; München, von Thalkirchen bis Pullach einzeln, Mai und Mitte Juli, Kr.

6) *macularis* (Zett. ♂) Schiner.

♀ *implicatus* Meig.

München, den 13. April 1869 bei Hessellohe einzeln; Starnberg, zwischen Ammerland und Ambach ein Weibchen, Mai, Kr.

7) *lunulatus* Meig.

Nürnberg s., Dutzendteich, Schmausenbuck, Mai bis Juli, Koch; Regensburg s. s.; München, von Thalkirchen bis Pullach einzeln, Mai und Mitte Juli, Kr.

8) *tricinctus* Fall.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August, Koch; Regensburg s.; München, ein Männchen, (var. *bicinota*) den 2. August 1870 bei Hessellohe; Hohenschwangau ein Männchen den 4. September 1869 in den Schwansee-Anlagen.

9) *albostratus* Fall.

Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. zwei Weibchen gefangen; Hohenschwangau, am Alpsee, in den Schwansee-Anlagen und in der Bleckenau n. s.; nach Mitte August bis gegen Ende September, Kr.

10) *topiarius* Meig.

Nürnberg n. h., Waigelshof, Herrnhütte, Mai bis August, Koch.

11) *annulipes* Zett.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, September, Morizberg (fränk. Jura), Mai, Koch; München, in den Isarauen bis Pullach, ziemlich s., Ende Mai, vor Mitte Juli bis Ende September; Tegernsee, am Albach einzeln, August und September, nur Weibchen gefangen, Kr.

12) *arcuatus* Fall.

lapponicus Zett.

Regensburg g.; München, ein Weibchen am 22. April 1858 zwischen Nymphenburg und Pasing auf Weidenblüthen, ein zweites abgeflogenes am 12. Juni 1864 bei Hessellohe; Starnberg, am 29. Mai 1869 im Mühlthal ein abgeflogenes Weibchen, Kr.

13) *corollae* Fall.

♀ *lacerus* Meig. — *Musca pyrorum* Schrank p. 114 n. 2430. — *Scaeva oltoria* Fall.

Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelshof, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; Augsburg n. s.; München, bei Schleissheim; Rosenheim, um Hochstätt; Tegernsee am Albach, meist nur einzeln; Hohenschwangau n. s., Ende April bis Anfang Juni, Ende Juli bis September, Kr.; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüten, Schrank.

14) *luniger* Meig.

Nürnberg s., Waigelshof, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Regensburg s. s.; München, ein Männchen am 25. April 1865 bei Hessellohe; Tegernsee ein Weibchen, den 13. August 1865 am Albach, eines am 24. August 1863 zwischen der Valepp und Fürstalpe; Hohenschwangau am Weg zum Tegelberg von Ant. Kr. in den Schwansee-Anlagen und in der Bleckenau, überall einzeln, Ende August und Anfang September, Kr.

15) *guttatus* Fall.

München, den 2. August 1870 beim Damm ob den Ueberfällen ein Weibchen; Tegernsee, am 5. September 1864 am Weg zum Lieberhof ein Weibchen, Kr.

16) *nitidulus* (Zett.?) Schin.

München, den 1. Mai 1870 bei Hessellohe ein Weibchen, Kr.

17) *lasiophthalmus* Zett.

Augsburg, die Puppe in Mehrzahl in Moos bei Deuringen gefunden, Anfang März, die Fliege schlüpfte am 27. März aus; München, den 7. Mai 1870 bei Schleissheim ein Männchen, *Kr.*

18) *umbellatarum* Fabr.

amoenus Loew.

Nürnberg ein Stück; Regensburg s. s.; München, in den Isaraueu bei Pullach; Starnberg, von Gauting nach Almannshausen und nach Feldafing; Hohenschwangau am Alpsee, in den Schwansee-Anlagen und am Weg zum weissen Haus, Anfang Juni bis Anfang September, *Kr.*; Altenau s., Juli, *Koch.*

19) *maculicornis* Zett.

München, den 13. April 1869 in den oberen Isaraueu ein Weibchen; Hohenschwangau am Tegelberg und am Weg zum weissen Haus einzeln; Mitte bis Ende August, *Kr.*

20) *decorus* Meig.

Regensburg s. s.; Hohenschwangau in den Schwansee-Anlagen zwei Pärchen, Ende August und Anfang September; bei den Männchen sind fast die ganzen Hinterbeine und die Fühler schwarz, bei den Weibchen ist auch die vierte Binde unterbrochen, *Kr.*

21) *balteatus* Deg.

Syrphus nectareus Fabr. Panz. — *Musca alternata* Schrank p. 109 n. 2417. — *Musca canabina* Scop.

Aschaffenburg; Würzburg; Nürnberg überall g., *Koch*; Augsburg; Oettingen; Regensburg; München; Rosenheim, Tegernsee; Hohenschwangau überall eine der gemeinsten Arten, gegen Ende April, dann Juli, August, September, *Kr.*; Freising g.; in Gebüsch sparsam, *Schrank.*

22) *bifasciatus* Fabr.

Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelsdorf, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, *Koch*; Regensburg s.; München in den oberen Isaraueu und bei Pasing ziemlich s., Mitte Mai; Starnberg, zwischen St. Heinrich und Ambach den 30. Mai 1869 ein Weibchen; Tegernsee, am 6. Juni 1866 beim Westerhof zwei Weibchen, *Kr.*

23) *lineola* Zett.

Aschaffenburg ein Stück; Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, *Koch*; München den 21. September 1868 zwischen Harlaching und Geiseltasteig ein etwas abgeflogenes Weibchen; Starnberg den 27. Juni 1869 zwischen Gauting und Petersbrunn ein Männchen, *Kr.*

24) *vittiger* Zett.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Herrnhütte, Falznerweiher, Pillenreuth, Juni bis August, *Koch*; München den 26. Mai 1869 zwischen Hesselöhe und Pullach ein Männchen; Starnberg den 7. Juni 1868 zwischen Gauting und Mühlthal ein Weibchen; Tegernsee, zwischen der Neureuth und Gründelalpe und am Wag nach Kreuth einzeln, August, *Kr.*

25) grossulariae Meig.

ribesii Fall.

Nürnberg s., Waigelshof, Mai, *Koch*; Regensburg s.; München zwischen den Ueberfällen und Geiseltasteig am 2. August und 21. September je ein Männchen, Tegernsee, am 4. und 5. September 1864 im Lerchenwald und am Weg zum Lieberhof zwei und ein Weibchen; zwischen Wessen und Kössen an der bayr. tir. Grenze am 9. Juli 1865 ein Männchen gefangen, *Kr.*

26) diaphanus Zett.

München, den 16. Juni 1868 bei Pasing ein Männchen von *Ant.* *Kr.*; den 11. Juli 1869 am Wege von Schäftlarn nach Grünwald ein Weibchen von mir gefangen, *Kr.*

27) ochrostoma Zett.

München, am 14. Mai 1865 beim Damm ob den Ueberfällen ein Exemplar gefangen, *Kr.*

28) nitidicollis Meig.

Nürnberg s., Herrnhütte, Mai, *Koch*; München, um Hessellohe und Pullach ziemlich s., Mitte Mai und Juni; Rosenheim, bei Langenpfunken am 18. Mai 1869 ein Männchen, *Kr.*

29) ribesii Linn.

Aschaffenburg; Würzburg, Fichtelgebirg; Nürnbergh.; Augsburg h.; Regensburg h.; Eichstädt; München, Rosenheim, Tegernsee, Hohenschwangau allenthalben, eine der gemeinsten Arten, Ende April bis gegen Mitte Oktober, *Kr.*; Reichenhall n. h., August, *Loew*; Freising h.; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, *Schrank* p. 105 n. 2408.

30) vitripennis Meig.

Nürnberg h., mit der vorigen Art, *Koch*; Augsburg n. s., Regensburg g.; München, überall mit der vorigen Art, von der sie nur eine schwächliche Form zu sein scheint, und durch standhafte Merkmale nicht unterschieden werden kann, *Kr.*; Freising h.

31) melanostoma Zett.

München, den 14. Mai 1870 bei Pullach und den 28. Mai 1870 bei Pasing je ein Weibchen, *Kr.*

32) excisus Zett.

abbreviatus Zett. — *affinis* Loew.

Nürnberg s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, *Koch*.

33) auricollis Meig.

Regensburg g.; München, an der Isar bis Pullach, bei Pasing; Starnberg, zwischen Ammerland und Ambach; Tegernsee, am Albach und in den benachbarten Anhöhen, n. s., Mitte bis Ende Mai, dann Anfang Juli bis Ende September, Hohenschwangau, am ersten Drittel des Tegelberges und in den Schwansee-Anlagen, *Kr.*

34) cinctus Fall.

München, am 27. Juli 1864 ein Weibchen in Hessellohe im Sommerhaus gefangen und am 26. Juni 1869 zwischen Hessellohe und

Pullach ein Männchen, Tegernsee, beim Paraplui und am Weg zum Lieberhof n. s. s., Anfang August bis Anfang September, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

35) *cinctellus* Zett.

Nürnberg s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Morizberg (fränk. Jura), Juni bis August, Koch.

36) *sexguttatus* Meig.

München, Prof. Dr. Walzl.

116. *Didea* Macquart.

1) *alneti* Fall.

♀ *Syrphus glaucius* Panz. — *pellucidula* Meig.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, Mai und Juni, Koch; Regensburg; Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. im September 1868 ein Weibchen gefangen; Tegernsee, auf der Neureuth ein Männchen am 5. August 1858; Hohenschwangau, am Alpsee, in den Schwansee-Anlagen und an der Strasse zum weissen Haus hier und da, August und Anfang September.

2) *fasciata* Macq.

Enica Foersteri Meig.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, Mai und Juni, Koch; Tegernsee, am Albach und beim Paraplui je ein Männchen; am Alpsee bei Hohenschwangau von Ant. Kr. ein Weibchen, August und Anfang September, Kr.

3) *intermedia* Loew.

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Falznerweiher, Juni bis September, Koch.

117. *Pelecocera* Meigen.

1) *scaevoides* Fall.

Brachyopa scaevoides Meig.

Augsburg h.; München, den 18. Mai 1865 bei Schleissheim ein Weibchen, den 22. Mai 1870 zwischen Ammerland und Ambach zwei Männchen (beide haben nur drei Paar Flecken) gefangen, Kr.; Freising h.

118. *Melithreptus* Loew.

1) *strigatus* Stueg.

Nürnberg s., Dutzendteich, Tullnau, Juli und August, Koch.

2) *scriptus* Linn.

Conops gemmatus Scop.

Aschaffenburg g.; Würzburg; Nürnberg überall g.; Augsburg g.; Regensburg g.; Eichstätt; München, Moosburg, Rosenheim, Tegernsee, Hohenschwangau, allenthalben g., vom Ende April bis Ende September, Kr.; Freising g.

3) *dispar* Loew.

Nürnberg s., Tullnau, Juni bis August, Koch; Augsburg s.; Reichenhall n. h., August, Loew.

Gewiss nur Var. des vorigen, in den er allmählig übergeht; er stellt die in der Zeichnung in beiden Geschlechtern mehr übereinstimmende Form dar, während ersterer eine mehr specifisch männliche Form bildet, Kr.

4) *pictus* Meig.

Augsburg n. s.; Halblech bei Füssen s., Juli, Koch.

Diese Art dürfte von *melissae* Meig. wohl kaum verschieden sein, Kr.

5) *menthastri* Meig.

Augsburg s.; Regensburg n. g.; Eichstädt; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, Schrank p. 106 n. 2409.

Ich kann mich der Vermuthung nicht entschlagen, dass Linné diese Art auf das Weibchen des *scriptus* gegründet hat, Kr.

6) *nitidicollis* Zett.

Nürnberg h., Falznerweiher, Dutzendteich, Tullnau, Schmausenbuck, Juni bis August, Koch; Augsburg s.

7) *taeniatus* Meig.

Ueberall auf Blüthen g.

8) *melissae* Meig.

Nürnberg s., Falznerweiher, Erlenstegen, Juni, Koch; Regensburg g.; München, bei Pasing, Pullach, zwischen Hessellohe und Deisenhofen einzeln; Rosenheim, bei Hochstädt von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee allenthalben, besonders an sonnigen, trockenen mit niederen Pflanzen bewachsenen Abhängen, Ende Mai bis Ende September, Kr.

119. *Xanthogramma* Schiner.

1) *citrofasciata* Fabr.

Syrphus festivus Fabr.

Nürnberg n. h., Erlenstegen, Falznerweiher, Herrnhütte, Wai-
gelshof, Mai und Juni, Koch; Regensburg n. g.; München, ein
Männchen am 9. Mai 1865 bei Pasing, ein zweites am 21. Mai 1865 an
der Isar bei Hessellohe gefangen; Rosenheim, Mitte Mai ein Männ-
chen bei Hochstädt von Ant. Kr. und ein Weibchen bei Langenpfungen
von mir gefangen, Kr.; auf Blüthen, Schrank p. 116 n. 2433.

2) *ornata* Meig.

Syrphus dives Rondan.

Nürnberg h., Herrnhütte, Erlenstegen, Falznerweiher, Pommels-
brunn (fränk. Jura), Juli bis September, Koch; Augsburg; Regens-
burg n. s.; München, allenthalben n. s.; Rosenheim, um Hochstädt.
nach Mitte Mai bis nach Mitte August; Tegernsee am 33. August 1865
von Ant. Kr. am Weg zum Lieberhof gefangen, Kr.; Partenkirchen
und Reichenhall n. h., August, Loew; Freising n. s., Weihenstephan.

120. *Doros Meigen.*

1) *conopscus Meig.*

♀ *Syrphus coarctatus* Panz.

Augsburg s.; Regensburg n. g.; München, ein Weibchen erhielt ich von Herrn Baron v. Pechmann, doch ohne nähere Angabe des Fundortes, *Kr.*

121. *Ascia Meigen.*

1) *lanceolata Meig.*

Nürnberg n. s., in Gärten, Juli bis September, *Koch*; Regensburg s.; Tegernsee, am Weg zum Lieberhof einzeln, Ende August und Anfang September, *Kr.*

2) *podagrica Fabr.*

Musca elongata Fabr. Schrank p. 108 n. 2414.

Nürnberg g., in Gärten, Dutzendteich, Falznerweiher, Juli bis September, *Koch*; Augsburg s.; Regensburg s.; München, bei Hessellohe, Pullach, Pasing, hie und da; Tegernsee, im Thale n. s.; Hohenschwangau in den Schwansee-Anlagen ein Weibchen gefangen; Anfang Mai bis Anfang Oktober, *Kr.*; Reichenhall n. h., August, *Loew*; Larven unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, September, *Schrank*.

3) *dipar Meig.*

Musca crassipes Schrank p. 108 n. 2415.

Nürnberg s. s., Juli, *Koch*; Augsburg s.; wie die vorige, *Schrank*.

4) *floralis Meig.*

bifasciata Zett. — *dispar* Zett.

Augsburg s.; Tegernsee, den 26. August 1864 am Albach oder von da zum Westerhof, ein Weibchen gefangen, *Kr.*; Reichenhall n. h., August, *Loew*.

5) *quadripunctata Meig.*

Nürnberg s., Juli, *Koch*; Augsburg s.; Regensburg s.; München, den 24. Juli 1864 zwischen Nymphenburg und Pasing ein Weibchen gefangen, *Kr.*

122. *Sphegina Meigen.*

1) *clunipes Meig.*

nigra Meig. — *Syrphus podagricus* Panz.

Nürnberg n. h., Falznerweiher, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juli bis September, *Koch*; Regensburg s.; München, bei Hessellohe einzeln; Freising s.; Rosenheim, bei Hochstätt von *Ant. Kr.* gefangen; Tegernsee, am Albach und den angrenzenden Abhängen, im Lerchenwald n. s.; an diesen drei Orten aber das Weibchen immer in der als *Sph. nigra* beschriebenen Form, die mir die Normalform dieses Geschlechtes zu sein scheint; Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen und am Weg zum weissen Haus ein Männchen, 6 Weibchen, wovon wieder 4 zu *Sph. nigra* 2 die rothgefleckte, der männlichen Zeichnung entsprechende Form, doch bei einem so dunkel ist,

dass sie als Uebergang zur schwarzen Form betrachtet werden kann, Kr.; Reichenhall n. h., August, am Walchensee nur die var. nigra erbeutet, ebenso bei Kreuth, Loew.

2) *elegans Schummel?*

München, neben dem Damm ob den Ueberfällen zwischen Ende April und Mitte Mai zwei Männchen und zwei Weibchen; Rosenheim, den 18. Mai 1869 bei Langenpfungen neben der Brücke ein Weibchen gefangen, Kr.

Dass die beiden Geschlechter zu ein und derselben Art gehören, und dass diese Art von der vorigen wirklich verschieden ist, kann nicht dem geringsten Zweifel unterliegen; dagegen bin ich nicht ganz sicher, ob diese Art die von Schummel beschriebene ist. Der Hauptunterschied dieser Art von *clunipes* besteht bei beiden Geschlechtern darin, dass der zweite Hinterleibsring bedeutend kürzer und dicker ist. Das Männchen hat überdiess auch auf dem ersten Ring gelbe Flecken; meine Weibchen haben einen ganz braunrothen Hinterleib, nur der äusserste Hinterrand der einzelnen Ringe zeigt manchmal einen äussert schmalen schwarzen Saum. Der vorigen Art analog ist es mir nun sehr wahrscheinlich, dass meine Weibchen die diesem Geschlecht zukommende Färbung in ausgeprägtester Weise besitzen, dass aber auch Formen vorkommen, deren Zeichnung sich mehr der des Männchen nähert, und auf diese Formen würde sich Schummels Beschreibung sehr gut anwenden lassen. Das ist auch der Grund, dass ich vorläufig unterlassen habe, vorliegende Art für neu anzugeben, Kr.

123. *Bacha Fabricius.*

1) *elongata Meig. Curt.*

tabida Meig. — *abbreviata* Meig. — ♂ *scutellata* Meig. — ♂ *vitripennis* Meig.
 ♂ *sphagina* Meig. — *nigricornis* Schummel.

Nürnberg h., in Gärten, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni bis September, Koch; Regensburg s.; München, in den Isarauen bis Schäfilarn, im Wald zu Hessellohe und Deisenhofen, einzeln; Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee am Albach und den benachbarten Abhängen, im Lerchenwald, n. s.; Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen einzeln. Mitte Mai bis Ende September, Kr. Reichenhall g., August, Loew.

2) *nigripennis Meig.*

Tegernsee, den 15. September 1864 bei Wiessee ein Männchen gefangen, Kr.

3) *obscuripennis Meig.*

Nürnberg in Gärten, August, einmal gefangen, Koch.

124. *Myolepta Newmann.*

1) *luteola Gmel.*

Thereva dubia Fabr. — *lateralis* Fall. Meig.

München, den 11. Juli 1864 bei Pullach ein Pärchen gefangen; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn im Juni n. s. s., Kr.

2) *vara* *Panz.*

Milesia vara Fabr.

Regensburg s. s.; München, den 20. Juni 1864 bei Pullach ein Weibchen, *Kr.*

125. *Rhingia* *Scopoli.*

1) *rostrata* *Panz.*

Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Fichtelgebirg; Nürnberg h., Herrnhütte, Schmausenbuck, Waigelshof, Falznerweiher, Pommelsbrunn im Sommer, *Koch*; Augsburg n. h.; Dinkelsbühl h., Pfarrer *Wolff*; Regensburg g.; Eichstädt; München, in den Isarauen von Hessel-lohe bis Schäftlarn ziemlich g., um Pasing; Rosenheim, um Hochstätt von Ant. *Kr.* gefangen; Tegernsee, am Albach und den angrenzenden Abhängen n. s.; Hohenschwangau, am ersten Drittel des Tegelerberges und am Weg zum weissen Haus einzeln, Anfang Mai bis gegen Ende September, *Kr.* Partenkirchen, August; Reichenhall n. h., August, *Loew.* Allenthalben aber sparsam, auf dem Lande, *Schrank* p. 156 n. 2538.

2) *campestris* *Meig.*

rostrata Deg.

Augsburg ein Stück; Regensburg s.; Tegernsee, am Albach, im Lerchenwald, in der Söllbachau einzeln, Anfang Juni bis Mitte September; Schliersee, den 24. Juni 1870 am Spitzingsee an Pflanzen neben frischem Kuhmist, in grösserer Anzahl gefangen, *Kr.*; Weissen (bayr. Geb.), September, *Koch*; Reichenhall n. h., August, *Loew*; Kreuth n. h., August, *Loew.*

126. *Brachyopa* *Meigen.*

1) *ferruginea* *Fall.*

Ein Männchen am 21. Juni 1868 zwischen Gauting und Petersbrunn von Ant. *Kr.*; am 29. Mai 1869 ein Weibchen ebenda von mir gefangen, *Kr.*

2) *conica* *Panz.*

Regensburg n. g.

3) *arcuata* *Panz.*

Regensburg s.

4) *bicolor* *Fall.*

Regensburg s.; München, den ersten Mai 1865 ober Pullach; mehrere aus Puppen gezogene Exemplare (ein Männchen, vier Weibchen) erhielt ich von Herrn Ingenieur Buchner, *Kr.*

127. *Volucella* *Geoffroy.*

1) *bombylaus* *Linn.*

var a) *bombylaus* Meig. — *pocopyges* Poda. — *alpicola* Rond.

Ueberall n. s. auf Blüthen; um Burghausen in Waldungen, *Schrank* p. 127 n. 2473.

var. b) *plumata* Meig. — *tricolor* Poda. — *mystacea* Linn. — *apiaria* Schrank p. 126 n. 2475. — *proxima* Rond.

Ueberall n. s. auf Blüten; Larve in den Ballen der Zwiebelgewächse (nach Reaumur), im Kuhmiste (nach Degeer) bei Tegernsee, Schrank p. 128 n. 2474 bei Gera.

var. c) *haemorrhoidalis* Zett.

Ueberall ziemlich s.

München, an der Isar und Würm ziemlich g., um Schleissheim; Starnberg, zwischen St. Heinrich und Ambach; Rosenheim, bei Langenpfunzen; Tegernsee, einzeln hie und da, nach Mitte Mai bis Anfang September, Kr.

2) *pellucens* Linn.

dryophila Scop.

Aschaffenburg: Fichtelgebirg; Nürnberg, Dutzendteich, Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai bis August, Koch; Augsburg; Regensburg: Eichstädt; München, an der Isar und Würm ziemlich g., um Schleissheim; Tegernsee, am Albach g., in der Söllbachau, zwischen der Neureuth und Gründelalpe; Hohenschwangau, am Weg zum weissen Haus; gegen Ende Mai bis Mitte September, Kr.; im Köschinger Forste, wo sie Herr P. Dallinger gefunden hat, Schrank p. 129 n. 2476, um Hohenschwangau und Gera, Schrank p. 131 n. 2481; Reichenhall n. h., August, Loew.

3) *inflata* Fabr.

dryophila Schrank. — *Hochhuthli* Grimmerth.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, Juni, Koch; Regensburg s. s.; München, am 2. Juni 1859 bei Planegg ein Weibchen gefangen, Kr.

4) *zonaria* Poda.

inanis Fabr. — *bifasciata* Scop. Panz.

Aschaffenburg ziemlich s.; Nürnberg ziemlich s.; Augsburg, Lehrer Bischoff; Regensburg s.

5) *inanis* Linn.

micans Fabr. — *trifasciata* Schrank.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Erlenstegen, Schmausenbuck, Dutzendteich, Falznerweiher, Pommelsbrunn (fränk. Jura), im Sommer, Koch; Regensburg g.; Eichstädt; München, in den Isaraueu einzeln; bei Reichenhall von Herrn Ed. v. Steinheil gefangen; Tegernsee, im Thale allenthalben ziemlich g., auch auf den Höhen der Neureuth und Gründelalpe; Mitte Juli bis Mitte September, Kr.

128. *Sericomyia* Meigen.

1) *lappona* Linn.

lapponum Fabr.

Nürnberg s. s., Falznerweiher, Mai, Koch; Regensburg s. s.; München, bei Pasing, Schleissheim, hier n. s. s.; Tegernsee, am Albach, auf der Neureuth ziemlich s., Anfang bis Mitte August.

2) *borealis* Fall.

lapponum Latr.

Nürnberg n. s., Falznerweiher, Schmausenbuck, Juni bis September, Koch; Augsburg n. s.; Regensburg n. s.; München, um

Schleissheim n. s., Schäftlarn, zwischen Gauting und Starnberg, Ende Mai bis Ende Juli; Tegernsee, am Ringsee, von der Valepp zur Fürstalpe je ein Exemplar, Ende August. *Kr.*; Freising n. s., August; bei Weißenstephan auf Blüthen.

129. *Arctophila* Schiner.

1) *bombiformis* Fall.

Regensburg s. s.; Tegernsee, allenthalben ziemlich g., im Thale, besonders an den Bachufern und angrenzenden Abhängen; am Weg von Wessen nach Koessen; Hohenschwangau, Rosenheim, am Hochstätt von meinem Sohne gefangen, *Kr.*; Kreuth n. h., August, *Loew*.

2) *mussitans* Fabr.

Musca superbians Müll.

Nürnberg n. s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), August und September, *Koch*; Tegernsee so g. und verbreitet wie die vorige, besonders am Albach und den Abhängen gegen den Lieberhof, auch auf den Höhen der Neureuth und Gründelalpe, August und September, *Kr.*

130. *Eristalis* Latreille.

1) *sepulcralis* Linn.

Musca punctata Müll. Schrank p. 115 n. 2432. — *Eristalinus tristis* Rond. — *tristis* Panz. Meig.

Nürnberg h., Ende August bei der Herrnhütte, *Kittel*, den Sommer über g., *Koch*; Regensburg g.; München, in den Isaraunen bei Pasing, Schleissheim; Starnberg, von Gauting nach Andechs; Rosenheim, bei Hochstätt; Niederbayern, bei Regen im bayr. Wald nirgends s. Vor Mitte April bis September, *Kr.*; Freising n. s.; Marzlinger Wiesen, Juli; auf Blüthen bei Gera, *Schrank*.

2) *aeneus* Scop.

flavicornis Rossi. — *stygius* Newm. — *Eristalomyia aenea* Rond.

Fichtelgebirg; Nürnberg, im Sommer g., *Koch*; Regensburg n. g.; München, ein einziges Weibchen den 10. April 1869 in den Isaraunen gefangen, *Kr.*

3) *cryptarum* Fabr.

nubilipennis Curt.

Fichtelgebirg.

4) *tenax* Linn.

campestris Linn. — *arbutorum* Schrank. — *sylvaticus* Meig. — *Musca porcina* Deg. — *Conops vulgaris* Deg. — *Conops fuscus* Deg.

Ueberall h.

var. *hortorum* Meig.

Ueberall h.

München, Starnberg, Rosenheim, Tegernsee, Hohenschwangau überall g. und die ganze frostfreie Jahreszeit hindurch, *Kr.*; auf Düngerhaufen, in heimlichen Gemächern, auch auf Blüthen, *Schrank* p. 113 n. 2427.

5) *intricarius* Linn.

♂ *aureus* Panz. — ♂ *bombylifomis* Panz. — *Conops leucorhoeus* Scop.

Nürnberg h., Herrnhütte, Mögeldorf, Falznerweiher, August und September, Koch; Regensburg s.; Eichstädt; München, um Schleissheim, hie und da, einzelne Exemplare auch bei Dachau und von Ant. Kr. in den oberen Isaraueu gefangen; im Ganzen ziemlich s.; Tegernsee, am Albach ein paarmal gefangen. Gegen Ende April bis Ende August, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew; bei Pöltmes, Schrank p. 130 n. 2479.

6) *arbustorum* Linn.

Aschaffenburg; Würzburg; Nürnberg g.; im Sommer auf Blüthen; Augsburg g.; Regensburg g.; München, Rosenheim, Tegernsee, Hohenschwangau, Regen im bayerischen Wald, überall g., Anfang April bis Ende September, Kr.; Freising g., auf Blüthen, Schrank p. 113 n. 2428.

7) *jugorum* Egger.

Bisher nur in den Alpen gefunden; Tegernsee überall, am Spitzingsee, bei Hohenschwangau, Juni bis gegen Ende September, Kr.

8) *rupium* Fabr.

♂ *flavocinctus* Fall. — ♀ *plceus* Fall. — *rupium* Meig. — ♀ *fossarum* Meig.

Nürnberg ein Stück; München, einzelne Stücke zwischen Schäftlarn und Grünwald, bei Pasing und von Ant. Kr. bei Schleissheim gefangen; Starnberg, ein Männchen im Mühlthal; Rosenheim ein Weibchen von Ant. Kr. bei Hochstätt; Tegernsee am Albach und den anliegenden Abhängen n. s. s.; Hohenschwangau, am Weg zum weissen Haus und zum Tegelberg einzeln. Anfang Juni bis Anfang September, Kr.

9) *pratorum* Meig.

nigroantennatus Schummel. — *pascuorum* Rond.

Nürnberg s., Erlenstegen, G'steinach bei Feucht, April und Mai, Koch; Regensburg g.; München, den 27. April 1858 bei Harlaching auf Weidenblüthen ein Weibchen, und ein solches am 30. April 1865 am Damm ob den Ueberfällen, Kr.

10) *pertinax* Scop.

similis Meig.

Aschaffenburg; Würzburg; Nürnberg h.; Augsburg h.; Regensburg g.; München, allenthalben, besonders in den Isaraueu bis Schäftlarn; Starnberg, im Mühlthal; Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr.; Tegernsee am Albach, im Lerchenwald n. s.; gegen Ende April bis Ende Mai, und von Anfang Juli bis Anfang September, Kr.; Freising g.

11) *sylvarum* Meig.

München, Prof. Dr. Wallt.

12) *nemorum* Linn.

Aschaffenburg; Fichtelgebirg; Nürnberg h.; Augsburg h.; Regensburg g.; München, allenthalben n. s.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn; Tegernsee, am Albach hie und da,

gegen Ende April bis Ende September, *Kr.*; Freising n. s.; Larve in faulen stinkenden Wässern, Fliege auf Blüthen, *Schrank* p. 130 n. 2478.

13) *alpinus* *Panz.*

München, in den Isaraunen, um Pasing, Lochhausen und besonders bei Schleissheim ziemlich g.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn und am Weg nach Allmannshausen einzeln; Rosenheim bei Langenpfungen und von Ant. Kr. bei Hochstätt gefangen, Anfang Mai bis Anfang August, *Kr.*

Unter meinen im Gebirg gesammelten Exemplaren fand ich gerade diese Art nicht, *Kr.*

14) *lucorum* *Meig.*

München, Prof. Dr. Walzl.

15) *horticola* *Deg.*

flavicinctus Fabr. — *flavocinctus* Fall.

Nürnberg, überall im Sommer g., *Koch*; Regensburg s.; München überall ziemlich g.; Tegernsee ein Weibchen am Weg nach Kreuth gefangen, Anfang Mai bis Mitte August, *Kr.*

16) *quinquelineatus* *Fabr.*

fasciatus Meig.

München, Dr. Walzl (♀)

131. *Helophilus* *Meigen.*

1) *floreus* *Linn.*

Musca atropos Schrank. — *Myathropa flora* Rond.

Aschaffenburg; Fichtelgebirg; Nürnberg n. s., am Zeltner's Weiher, August, *Kittel*; im Sommer g., *Koch*; Augsburg; Regensburg g.; Eichstätt; München überall n. s.; Rosenheim in den Innauen bei Hochstätt; Tegernsee am Albach und den benachbarten Anhöhen, am Ringsee, Metten in Niederbayern; Mitte Mai bis gegen Mitte Oktober, *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, auf Blüthen, *Schrank* p. 113 n. 2426.

2) *hybridus* *Loew.*

trivittatus Meig.

Nürnberg h., Falznerweiher, Herrnhütte, Mai bis August, *Koch*.

3) *pendulus* *Linn.*

praecox Ross.

Aschaffenburg; Bamberg, Prof. Hoffmann; Fichtelgebirg; Nürnberg h., Falznerweiher, Herrnhütte, Mai bis September, *Koch*; Augsburg; Regensburg g.; Eichstätt; München in den Isaraunen bei Harlaching, Hessellohe, um Schleissheim, ziemlich s.; Rosenheim abwärts bis Hochstätt n. s.; Ende April bis Ende September, *Kr.*; Larve in stinkenden Gräben, in den Buten der Gärten, in welchen man das gesammelte Regenwasser lange stehen lässt, in der Mistjauche der Düngerhaufen bei Bauernhöfen, *Schrank* p. 112 n. 2425.

4) *trivittatus* *Fabr.*

Nürnberg h., Falznerweiher, Dutzendteich, Herrnhütte, Mai bis September, *Koch*; Regensburg g.; München in den oberen Isaraunen,

bei Pasing, Schleissheim, Rosenheim, um Hochstätt n. s. s., Ende April bis Anfang August, *Kr.*

5) *lunulatus Meig.*

Nürnberg ein Stück; München, den 29. Juni 1865 bei Schleissheim ein Männchen gefangen, *Kr.*

6) *frutetorum Fabr.*

femoralis Fall.

Regensburg s. s.

7) *versicolor Fabr.*

Nürnberg ein Stück.

8) *lineatus Fabr.*

Rhingia muscaria Fabr. -- ♀ *Musca femorata Panz.*

Nürnberg ein Stück, *Kittel*, s. s., Dutzendteich, Mai und Juni, *Koch.*

9) *transfugus Linn.*

Nürnberg s., in Gärten, Dutzendteich, Mai und Juni, *Koch.*

132. *Merodon Meigen.*

1) *equestris Fabr.*

Narcissi Fabr. -- *flavicans Fabr.* -- *ferrugineus Fabr.* -- *transversalis Meig.* -- *constans Meig.* -- *nobilis Meig.* -- *tuberculatus Rond.* -- *bulborum Rond.*

Nürnberg s. s., in Gärten, Waigelshof, Mai und Juni, *Koch*; Regensburg s. s.; München, Prof. Dr. *Walll.*

2) *spinipes Fabr.*

♀ *viaticus Fabr.*

Nürnberg s. s., Mögeldorf, Tullnau, Juni, *Koch*; Regensburg g.

3) *analis Meig.*

Halblech bei Füssen n. s., Juli, *Koch.*

4) *moenium Meig.*

Regensburg s. s.

133. *Tropidia Meigen.*

1) *fasciata Meig.*

In Niederbayern bei Metten ein abgeflogenes Männchen am 24. Juni 1864 gefangen, *Kr.*

2) *milesiformis Fall.*

rofomaculata Curt.

Starnberg, am 22. Juni 1865 am Weg nach Allmannshausen ein abgeflogenes Männchen gefangen, *Kr.*

134. *Criorhina* *Macquart*.

1) *pachymera* *Egger*.

München, am 2. Juni 1869 bei Pasing ein Männchen; Starnberg, am 7. Juni 1858 ein Männchen gefangen, *Kr*.

2) *ruficauda* *Deg*.

Syrphus ranunculi Panz. — *Xylota haemorrhoidalis* Meig.

Regensburg s. s.

3) *fallax* *Linn*.

Eristalis semirufus Fabr.

München, am 6. Mai 1869 bei Nymphenburg ein Weibchen gefangen, *Kr*.

4) *berberina* *Fabr*.

München, bei Hessellohe und Pullach; Starnberg, im Mühlthal; Tegernsee, am Albach oder von da zum Lieberhof; Schliersee, auf der Halbinsel, überall ziemlich s., Mitte Mai bis Mitte Juli, *Kr*.

5) *asilica* *Fall*.

rußpila Meig.

Nürnberg, Pommelsbrunn, Juni, einmal auf Evonymus gefangen, *Koch*; München, den 28. Mai 1870 bei Pasing ein Pärchen; Rosenheim am 18. Mai 1869 bei Langenpfungen neben der Brücke auf einer Dolde ein Weibchen gefangen, *Kr*.

6) *oxyacanthae* *Meig*.

Nürnberg; München, den 11. Juli 1869 von Schäftlarn nach Grünwald zwei Weibchen; Starnberg, im Mühlthal, Tegernsee, am Albach und den Abhängen gegen den Lieberhof n. s. s., *Kr*.

7) *floccosa* *Meig*.

Syrphus regulus Fall.

Starnberg, am 20. Juni 1868 zwischen Gauting und Andechs wahrscheinlich im Kienthal ein Weibchen gefangen; Tegernsee am 7. Juni 1865 von Ant. *Kr*. ein Weibchen am Weg zum Lieberhof gefangen, *Kr*.

135. *Plocota* *St. Fargeau et Serville*.

1) *apiformis* *Schrank*.

apicata Meig. — *Dasyia apiformis* Egger.

Kaufbeuern, Rector Buchner; Tegernsee, *Schrank* (T. 6 Nr. 2436); mir ist diese Art noch nicht vorgekommen, *Kr*.

136. *Brachypalpus* *Macquart*.

1) *angustus* *Egg*.

München, am 20. Juni 1864 bei Pullach 8 abgeflogene Männchen und ein kleines Weibchen; an der Würm von Pasing bis Petersbrunn vom 2. bis 21. Juni vier abgeflogene Männchen gefangen; Tegernsee, den 5. Juni 1864 in der Söllbachau ein Weibchen gefangen, *Kr*.

2) *valgus* Panz.

femoratus Fabr. — *olivaceus* Meig. — *laphriiformis* Fall. — *tuberculatus* Macq.

Regensburg n. g.

137. *Xylota* Meigen.

1) *segnis* Linn.

Fichtelgebirg; Nürnberg g., in Gärten, Schmausenbuck, Falznerweiher, Mai bis September, Koch; Augsburg n. s.; Regensburg n. s.; Eichstädt; München, allenthalben n. s.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn; Rosenheim, bei Hochstätt von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee überall bis auf die Höhen der Neureuth und Gründelalpe ziemlich g.; Hohenschwangau, in den Schwansee-Anlagen n. s.; gegen Ende Mai bis gegen Ende September, Kr.; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, Schrank p. 107 n. 2412.

2) *pigra* Fabr.

crassipes Wahlbg.

Regensburg s. s.

3) *lenta* Meig.

♀ *pigra* Panz.

Nürnberg; Regensburg s. s.; München, in den Isarauen bis Geiselgasteig ziemlich s.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee, am Weg zum Lieberhof einzeln; Anfang Juni bis Anfang September, Kr.; bei Gern und Ingolstadt, Herbst, Schrank p. 114 n. 2429.

4) *ignava* Panz.

Nürnberg s., in Gärten, zweimal gefangen, Juli, Koch; Regensburg n. s.; München, in den Isarauen bis Schäftlarn, bei Pasing n. s.; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee, im Thale und auf der Höhe der Neureuth und Gründelalpe, doch s., Mitte Mai bis Anfang September, Kr.

5) *femorata* Linn.

volvulus Fabr.

Nürnberg s., Schmausenbuck, Dutzendteich, Herrnhütte, auch in Gärten, Pommelsbrunn (fränk. Jura), Mai und Juni, Koch; Regensburg n. s.; München, ein Weibchen bei der Mengerschweige, ein Männchen bei Hessellohe gefangen; Starnberg, zwischen Gauting und Petersbrunn ein Weibchen von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee, zwischen dem Westerhof und der Neureuth ein Männchen gefangen; Ende Mai und Juni, Kr.

6) *sylvarum* Linn.

♀ *impiger* Panz.

Nürnberg, s., Pommelsbrunn (fränk. Jura), Juni, Koch; Augsburg; Regensburg g.; München, von Pullach nach Schäftlarn ein Männchen gefangen; Starnberg, zwischen Gauting und Mühlthal, und am Weg nach Allmannshausen je ein Exemplar; Rosenheim, bei Hochstätt zwei Weibchen; Tegernsee, überall n. s.; Anfang Juni bis gegen Ende September, Kr.; Reichenhall n. h., August, Kreuth n. h., August, Loew.

7) *nemorum Fabr.*

bifasciata Meig. Zett. — *ignava* Fall. — *nigripes* Zett.

Regensburg s. s.; Starnberg, den 11. Juni 1867 zwischen Gauting und Petersbrunn ein Weibchen; Tegernsee den 5. September 1865 bei St. Quirin von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Kr.; Reichenhall n. h., August, Loew.

8) *florum Fabr.*

nemorum Meig.

Regensburg s. s.; Tegernsee, am Weg zum Lieberhof, auf dem Sackfleckl, zwischen Kreuth und der Glashütte; Hohenschwangau, am Weg zum neuen Schloss und in den Schwansee-Anlagen; am Weg von Wessen nach Kössen, nirgends s., Kr.

9) *triangularis Zett.*

Gastein.

138. *Syritta St. Fargeau et. Serville.*

1) *pipiens Linn.*

Aschaffenburg h.; Würzburg; Fichtelgebirg; Nürnberg im Sommer überall h., Koch; Augsburg h.; Oettingen; Regensburg h.; Eichstädt; München, Rosenheim, Tegernsee, Regen im bayr. Wald, überall g.; vor Mitte April bis nach Mitte September, Kr.; Freising h.; Larve unter Blattläusen, Fliege auf Blüthen, Schrank p. 106 n. 2411.

139. *Eumerus Meigen.*

1) *annulatus Panz.*

varius Meig. — *grandis* Meig. — *Pipiza lateralis* Zett.

Regensburg s.

2) *tarsalis Loew.*

Starnberg, den 20. Juni 1865 zwischen Gauting und Petersbrunn ein Weibchen, Kr.; Rückenschild dunkel broncegrün, vierter Ring schwarz, und auch auf diesem die Mondflecken deutlich.

3) *tricolor Fabr.*

mixtus Panz.

Regensburg n. g.; München, den 16. Juni 1868 bei Pasing ein abgeflogenes Weibchen; Starnberg, den 7. Juni 1868 zwischen Gauting und Mühlthal, wahrscheinlich gerade unter Königswiesen ein Paar gefangen (ob vielleicht in dem dort wachsenden *Muscari bothryoides* lebend?) Kr.

4) *sabulorum Fall.*

strigatus Meig. — *Selene* Meig. — *rubriventris* Meig. Macq.

Nürnberg s., Dutzendteich, Tullnau, an Thymus, Juli und August, Koch.

5) *elegans Schin. et Egger.*

Nürnberg s. s., Schmausenbuck, Juli und August, Koch.

6) *ruficornis* Meig.

München, den 16. Juli 1870 bei Hessellohe ein Weibchen, Kr.

7) *lunulatus* Meig.

♀ *planifrons* Meig. — ♀ *funeralis* Meig. — ♀ *grandicornis* Meig. — *aeneus* Macq. — *strigatus* Fall. — *Selene* Loew.

Nürnberg h., in Gärten, August und September, Koch; Regensburg s.; München, den 6. Juli 1865 bei Schleissheim ein Weibchen; Rosenheim, im September 1868 bei Hochstätt von Ant. Kr. ein Männchen gefangen, Kr.

140. *Chrysochlamys* Rondani.

1) *cuprea* Scop.

Syrphus ruficornis Panz. Meig.

Nürnberg; Regensburg s., München, am 12. Mai 1869 am Anfang des Damms ob den Ueberfällen ein Weibchen gefangen; Starnberg, am 30. Mai 1869 bei St. Heinrich ein Weibchen gefangen. Die Var. *nigrifrons* Egg. (Männchen) fing ich am 14. August 1869 zwischen Murnau und Eschenlohe, Kr.

2) *nigrifrons* Egger.

Nürnberg s. s., Herrnhütte, Juni und Juli, Koch.

141. *Spilomyia* Meigen.

1) *saltuum* Fabr.

diopthalma Panz. Meig.

Nürnberg s., in Wäldern; Regensburg s. s.

2) *diopthalma* Linn.

saltuum Meig.

Fichtelgebirg; Nürnberg, Dutzendteich¹, einmal gefangen, Juli, Koch; Augsburg s.; Regensburg s. s.; München, ein Weibchen am 27. Juli 1864 in Hessellohe im Sommerhaus gefangen, Kr.

3) *bombylans* Fabr.

Temnostoma bombylans St. Fargeau. — *Zetterstedtii* Fall.

Eichstädt, München, in den Isarauen von Thalkirchen bis Pullach und an der Würm zwischen Gauting und Petersbrunn s.; Anfang Juni bis Mitte Juli.

4) *vespiformis* Linn.

♀ *apiformis* Panz. — *Wagae* Gorski. — *Temnostoma vespiformis* St. Fargeau.

Fichtelgebirg; Nürnberg s. s., in Gärten, Juni, Koch; Augsburg s.; Regensburg s. s.; München in den Isarauen von Thalkirchen bis Pullach, an der Würm zwischen Gauting und Petersbrunn n. s. s.; von Ant. Kr. bei Schleissheim gefangen, Ende Mai bis Ende Juli; Starnberg bei Leoni auf blühendem Weissdorn am 22. Juni 1865; Tegernsee, am Albach und am Fusswege nach Kreuth Ende August und Anfang September ziemlich s. und abgeflogen; Walchensee am Weg vom Kesselberg herab auf blühendem Hollunder am 30. Juni 1866 acht, zum Theil etwas abgeflogene Männchen gefangen, Kr.

5) *apiformis* Fabr.

Milesia apicata Meig.

Gastein; Larve in modernem Holze um Tegernsee, Schrank p. 117 n. 2436.

142. *Ceria* Fabricius.

1) *conopsoides* Linn.

clavicornis Fabr. — *Conops vaginicornis* Schrank p. 163 n. 2561. — *Syrphus conopseus* Panz.

Fichtelgebirg; Nürnberg h., Herrnhütte, Waigelshof, auf Evonymus, Mai und Juni, Koch; Regensburg s.; Eichstädt; München, an der Isar bis Baierbrunn und an der Würm von Pasing bis Petersbrunn einzeln; gegen Ende Mai bis Anfang August, Kr.; bei Passau und Ingolstadt, Schrank.

2) *subsessilis* Latr.

Sphiximorpha subaessilis Rond.

Regensburg s.

Familie XVII. CONOPIDAE.

143. *Conops* Linné.

1) *capitatus* Loew.

München, zwischen Gauting und Petersbrunn ein Weibchen den 20. Juni 1865 gefangen, Kr.

2) *scutatus* Meig.

aculeatus Meig.

Regensburg g.; Tegernsee, auf dem Angermannsbüchel bei St. Quirin ein Weibchen den 26. August 1865 gefangen, Kr.

3) *vesicularis* Linn.

macrocephala Linn. — *cylindrica* Meig.

Nürnberg n. s., Herrnhütte, Falznerweiher, Dutzendteich an Evonymus und Weidenblüthen, Mai und Juni, Koch; Augsburg; Dinkelsbühl, Pfarrer Wolff; Regensburg s.; München, in den Isaraunen bis Pullach n. s.; auch an der Würm zwischen Pasing und Gräfing, Mai; ein abgeflogenes Männchen am 11. Juli gefangen, Kr.

4) *quadrifasciatus* Deg.

Nürnberg g., Dutzendteich, Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Juni bis August, Koch; Augsburg; Regensburg g.; München, von Harlaching bis Schäftlarn, um Schleissheim, ziemlich einzeln, Juli; Tegernsee, an den Ufern des Sees und der Bäche, besonders am Albach n. s., Anfang August bis Mitte September, Kr.; bei Gern und Ingolstadt in Gebüsch, Juli, August, Schrank p. 164 n. 2562.

5) *strigatus* Meig.

trifasciatus Meig. — *auricinctus* Loew.

München, Prof. Dr. Wallt; Tegernsee, am Albach n. s. s., Mitte August bis Anfang September, Kr.

6) *flavipes* Panz.

melanocephala Meig. — ♀ *bleinctus* Meig. — *trifasciatus* Deg.

Fichtelgebirg; Nürnberg g., Dutzendteich, Falznerweiher, Schmausenbuck, Herrnhütte, Juni bis August, Koch; Regensburg.

144. *Physocephala* Schiner.

1) *rufipes* Fabr.

Nürnberg, Mögeldorf einmal gefangen, September, Koch; Regensburg n. s.; München, um Nymphenburg, Schleissheim, hie und da, Juli; Tegernsee bei Wiessee ein Männchen am 15. September 1864 gefangen.

2) *lacera* Meig.

♀ *annulipes* Meig.

Regensburg.

3) *chrysorhoea* Meig.

♀ *Pallasi* Meig.

Nürnberg h., Mögeldorf, Dutzendteich, August und September, Koch.

4) *variegata* Meig.

Nürnberg s., Mögeldorf, Juni und Juli, Koch.

5) *vittata* Fabr.

chrysorhoea var. d. Zell. — *semiatra* Costa. — *soleaeformis* Grimmerth.

Nürnberg s., Dutzendteich, Juli, einmal gefangen, Koch; Augsburg s., Haide vordem Ablass, September; Regensburg n. s.; Eichstädt; München, den 20. Juni 1864 bei Pullach ein Männchen; den 9. Juli 1865 bei Schleissheim von meinem Sohne ein Weibchen gefangen; am 5. Juni 1859 fand ich ein lebendes Weibchen in einem Kästchen, worin kurz vorher gefangene Wespen und Bienen, besonders Hummeln steckten, in deren einer sich die Fliege entwickelt haben musste, Kr.

145. *Zodion* Latreille.

1) *cinereum* Fabr.

tibialis Fabr. — *conopsoides* Latr. — *fuliginosum* Desv. — *fulvipes* Desv. — *fulvicorne* Desv. — *Myodaires* Desv. — *Carveli* Desv. — *pedicillatum* Desv.

Nürnberg h., Mögeldorf, Falznerweiher, Juni und Juli, Koch; Augsburg n. s., Spickel; Regensburg; München, um Hessellohe und Pullach, zwischen Gauting und Petersbrunn hie und da, Mitte Juni. Die beiden Arten sind wohl kaum spezifisch verschieden, Kr.

2) *notatum* Meig.

irrorata Fabr. — *tessellata* Fabr.

Nürnberg n. h., Mögeldorf, Dutzendteich, Pillenreuth, Juni und Juli, Koch; Augsburg s.; Regensburg.

146. *Occemyta* Robineau-Desvoidy.

1) *atra* Fabr. Panz.

annulata Fabr. — *femorata* Fabr. — *cinerascens* Meig. — *maculata* Meig. — *micans* Meig. — *femoralis* Desv. — *nitidula* Desv. — *fulvifrons* Desv. — *Meigeni* Desv. — *pallipes* Desv. — *Dufouri* Desv. — *grisea* Desv. — *atra* Desv.

— Lamarekii Desv. — Bigotti Desv. — Guerini Desv. — brunnipes Desv. —
Lucasi Desv. — pusilla Desv. — nana Desv.

Fichtelgebirg; Nürnberg s., in Waldungen auf verschiedenen
Gesträuchen, *Kittel*; n. h., Mögeldorf, Dutzendteich, Juni und Juli, *Koch*;
Augsburg h. auf Gebüsch bei Siebenbrunn; Regensburg g.; Mün-
chen, bei Harlaching, Pullach, auf den Wiesen bei Sendling Mitte Mai
und im Juli; Tegernsee, im Thale und auf den Höhen der Neureuth
und Gründelalpe August und September ziemlich einzeln, *Kr.*

2) *Sundewalli Zett.*

Augsburg ein Stück.

3) *pusilla Meig.*

Regensburg n. s.

147. *Sicus Scopoli.*

1) *ferrugineus Linn.*

Fichtelgebirg; Nürnberg g., Mögeldorf, Dutzendteich, Herrn-
hütte, Juni und Juli, *Koch*; Augsburg n. s., Kobel; Regensburg g.;
Eichstädt; München, an der Isar bis Schäftlarn, um Schleissheim,
die gewöhnlichste Myopide, Mitte Juni bis Ende Juli; Tegernsee, am
Albach um Wiessee Ende Juli bis Mitte September, *Kr.*; Freising h.,
Wald bei Wippenhausen, Juli, August.

148. *Myopa Fabricius.*

1) *variegata Meig.*

nitidula Fabr.

Nürnberg s., Mögeldorf, Juli, *Koch*; Regensburg s.; Mün-
chen, um Schleissheim zwei Weibchen am 6. Juli 1865 gefangen, *Kr.*

2) *picta Panz.*

Regensburg s. s.

3) *buccata Linn.*

florea Desv. — marginalis Desv. — punctigera Desv. — Myopella puncticeps
Desv. — Pictinia fulvipalpis Desv.

Fichtelgebirg; Nürnberg überall verbreitet, doch vereinzelt,
Mögeldorf, Schmausenbuck, Waigelshof, Dutzendteich, Falznerweiher,
Herrnhütte, April bis Juni, *Koch*; Augsburg n. s.; Regensburg g.;
München, in den oberen Isaraueu zwischen Pasing und Gräfling einzeln,
Mitte Mai und Juni, *Kr.*; Freising n. s.; um Neuburg an der Donau;
im Köschinger Forste hat sie Herr P. Dollinger gefunden, *Schrank*
p. 165 n. 2564.

4) *testacea Fabr.*

ferruginea Panz. — buccata Scop.

Fichtelgebirg; Nürnberg n. s., Mögeldorf, Dutzendteich;
Herrnhütte, Mai und Juni, *Koch*; Augsburg n. s.; Regensburg g.;
Eichstädt; München, um Pasing und Schleissheim einzeln, Ende April
und Mai, und wieder Ende Juli, *Kr.*; Freising n. s.

5) *polystigma Rond.*

Ein Männchen dieser zweifelhaften, vielleicht als Var. zu *testacea*
gehörigen Art am 25. April 1865 bei Hessellohe gefangen, *Kr.*

6) *occulta* Meig.

Gonirhyncus dispar Rond.

Regensburg s.

7) *fasciata* Meig.

ephippium Fabr.

Nürnberg n. h., Mögeldorf, Dutzendteich, Herrnhütte, Mai und Juni, Koch; Regensburg n. s.

8) *dorsalis* Fabr.

testacea Fabr. — *grandis* Meig. — *Lonchopalpus dorsalis* Rob.

Nürnberg, bei Mögeldorf einmal gefangen, Juni, Koch.

149. *Dalmannia Robineau-Desvoidy.*

1) *punctata* Fabr.

virens Meig.

Regensburg n. s.; Starnberg, ein Weibchen den 7. Juni 1868 gefangen, Kr.

2) *flavescens* Meig.

Regensburg s.

Familie XVIII. OESTRIDAE.

150. *Gastrophilus* Leach.

1) *equi* Fabr.

bovis Linn. — *intestinalis* Deg. — *Oestrus haemorrhoidalis* Modur. (Schränk p. 58 n. 2286).

Die Larve überall n. s. s., die Fliege jedoch s.; Rosenheim, um Hochstätt ein Weibchen Mitte September 1869 von Ant. Kr. gefangen; Tegernsee, auf der Höhe der von der Glashütte nach Achenthal führenden Strasse am Strassengeländer ein Weibchen den 29. August 1863 gefangen; Hohenschwangau auf der Spitze des Säuling den 9. September 1869 von Ant. Kr. gefangen, Kr.; in den Gedärmen und oft im Magen der Pferde, Schränk.

2) *nasalis* Linn.

veterinus Fabr. — *salutiferus* Clarck. — *jumentorum* Clarck. — *salutaria* Meig. — *nigritus* Zett.

Regensburg. Im Schlunde der Pferde. Herr Fischer glaubt, dass auch die Engerlinge im Magen der Pferde von dieser nicht von der vorigen Art seien, Schränk p. 59 n. 2287.

151. *Oestrus* Linné.

1) *ovis* Linn.

Die Larven n. s. s., die Fliege s.; in den Stirnhöhlen der Schafe, Schränk p. 60 n. 2289.

152. *Cephenomyia Latreille.*

1) *stimulator* *Clarck.*

microcephalus *Clarck.* — *Oestrus capreoli* *Henning.*

Tegernsee, am Hirschberg zwei Männchen den 4. September 1865 von Ant. Kr. gefangen; Hohenschwangau, auf der Spitze des Tegelberges drei Männchen am 24. August und auf der Spitze des Säulings zwei Männchen am 9. September 1869 von mir und Ant. Kr. gefangen, *Kr.*

Oestrus Elaphi *Schrank* p. 61 n. 2291, in der Haut der Hirsche (*Oestrus lineatus* *De Vill. Meig.* 4. p. 173 Nr. 9).

Im Hirschpark bei Oettingen soll *C. rufibarbis* *Meig.* vorkommen. Im oberen Gaumen am Schlunde in Hirschköpfen *Oestrus Cervi*, *Schrank* p. 61 n. 2290.

153. *Hypoderma* *Clarck.*

1) *bovis* *Linn.*

Die Larven n. s. s., die Fliegen s. In der Haut des jüngeren Rindviehes, meistens in den oberen Theilen, vorzüglich an Stücken, wo diese Larve Beulen verursacht, *Schrank* p. 59 n. 2288.

U e b e r
Kometen und Sternschnuppen.

Vortrag von Dr. Joh. Neger,

gehalten

in der Naturhistorischen Gesellschaft

zu

NÜRNBERG.

Mit dem Namen Kometen bezeichnet man bekanntlich eine Klasse von Himmelskörpern, die oft unvermuthet am Firmament erschienen sind, und wenn sie grösser waren, durch ihre oft abentheuerliche, durch einen langen Schweif ausgezeichnete Gestalt seit den ältesten Zeiten die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen haben. Dass der Aberglaube der früheren Zeit sie als Zuchtruthen Gottes, als Vorboten von Krieg und Pestilenz bezeichnete, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden und dass man ihre wahre planetenartige Natur erst dann erkannte, als man begann, auch diese Bewohner des Himmels, von denen die gegenwärtig lebende Generation in dem im Jahre 5 1848 erschienenen Donatischen Kometen einen besonders schönen Repräsentanten kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hat, mit Telescopen und mathematischen Berechnungen zu verfolgen. Als deren Resultat hat sich denn nun ergeben, dass die Kometen in der That Weltkörper sind, die den Gesetzen der Schwere folgen und desshalb gleich den Planeten von der Attractionskraft des Centralkörpers unseres Sonnensystems, der Sonne, in der Art an sich gezogen werden, dass sie sich in gewissen Bahnen um diese bewegen. Während aber die Bahnen der Planeten eine fast kreisförmig elliptische Gestalt besitzen und nahezu in einer Ebene, in der der sogenannten Ekliptik liegen, durchschneiden die Bahnen der Kometen nicht nur diese nach allen Richtungen, sondern sind meist auch so langgestreckt, dass von nur sehr wenigen Kometen deren Amlaufszeit bekannt ist. Auch in anderer Hinsicht sind die Kometen, deren man übrigens, seit man die Räume des Himmels mit Telescopen zu durchmustern begonnen hat, schon eine ausserordentlich grosse Anzahl kennen

gelernt hat, sehr merkwürdige Körper, welche in mannigfachster Hinsicht eine Reihe der unauflöslichsten Räthsel darbieten. So ist die Masse aller Kometen eine so fein zertheilte, dass man selbst an ihrer dichtesten Stelle, dem sog. Kopf oder Kern, noch hellleuchtende Sterne durchschimmern sieht, ihre Dichtigkeit daher nicht grösser sein kann, als etwa die einer lichten Wolke. Da aber die von einem solchen Kometen überdeckten Sterne keine Ortsveränderung zeigen, deren Licht also nicht gebrochen wird, so kann diese Masse doch auch wieder nicht gasförmig sein, und man hat daher den Schluss gezogen, dass sie vielmehr staub- oder wolkenartig sein müssen, ohne freilich sagen zu können, wie es möglich ist, dass sich solche staub- oder wolkenartige Massen im Weltraum bilden können.

Jedenfalls sprechen aber auch noch andere Thatsachen dafür, dass die Kometen zum mindesten Körper von ungemeiner Lockerheit und sehr geringfügiger Masse sind. Es ist zuweilen vorgekommen, dass sie in die Nähe eines Planeten gekommen und dann der Schwerkraft folgend aus ihrer ursprünglichen Richtung gelenkt und von diesem angezogen worden sind, ohne dass sie jedoch im Stande gewesen wären, auf die Masse und Bewegung des Planeten selbst auch nur im Geringsten irgend welchen Einfluss zu äussern, wie dies in der That eines der merkwürdigsten Beispiele gezeigt hat.

Im Jahre 1770 wurde ein Komet entdeckt, dessen Umlaufszeit man auf $5\frac{1}{2}$ Jahre berechnete; da man ihn aber sonderbarer Weise noch nie vorher beobachtet hatte, so rechnete man nach und fand, dass er seine Umlaufszeit erst dadurch erhalten hatte, dass er kurz vorher in die Nähe des Planeten Jupiter gekommen und dadurch aus seiner ursprünglichen Richtung gelenkt worden war. Wirklich kehrte er im Jahre 1776 wieder, als er aber im Jahre 1781 abermals erscheinen sollte, blieb er aus, und angestellte Untersuchungen ergaben, dass er zufällig abermals mit Jupiter in Collision gekommen und von diesem wieder in eine andere Bahn gelenkt worden ist, auf welcher er in die spurlose Ferne, aus der er gekommen war, wieder zurück-

gekehrt ist. Bei dieser zweifachen Bewegung hat aber die Bahn des Jupiter nicht die geringste Aenderung oder Störung erlitten.

Die Kometen sind theils solche, die periodisch wiederkehren, theils solche, bei denen dies bisher noch nicht beobachtet worden ist. Zwischen beiden lässt sich selbstverständlich keine feste Grenze ziehen, da manche der ersteren eine so lange Umlaufszeit besitzen, dass ein etwaiges früheres Erscheinen derselben in vorhistorische Zeiten fällt oder wenigstens soweit zurückdatirt, dass es sich der wissenschaftlichen Beobachtung entzieht. Diejenigen aber, von denen in der That die Umlaufszeit bekannt ist, sind meist kleine unscheinbare, nur mit dem Telescop wahrnehmbare Gestirne, deren man gegenwärtig 20 - 25 kennt, deren einige übrigens doch in anderer Hinsicht mannigfaltiges Interesse darbieten. Der bedeutendste von ihnen, und fast der einzige, der auch mit unbewaffnetem Auge wahrgenommen werden kann, ist der Halley'sche. Dieser Komet ist bis jetzt wenigstens 6mal beobachtet worden, zuerst mit Sicherheit im Jahre 1456. Damals zeigte er sich in hellem Glanze; sein Kern glich einem Sterne I. Grösse und sein Schweif hatte eine Länge von 60°. Seitdem hat man ihn in den Jahren 1531, 1607, 1682, 1759 und 1835 jedesmal wieder beobachtet, wobei er sich jedoch bezüglich seines Glanzes, der Länge und Gestalt seines Schweifes u. s. w. sehr verschieden zeigte. Stark glänzend zeigte er sich im Jahre 1682, wo ihn auch Halley durch Berechnung seiner Bahn für identisch mit dem im Jahre 1531 und 1607 erschienenen erkannte und desshalb seine nächste Wiederkehr für das Jahr 1759 vorauszubestimmen wagte, welche Prophezeiung, die erste in ihrer Art, denn auch richtig eingetroffen ist.

Im Jahre 1835 zeigte sich der Komet nicht sehr glänzend und auch nur mit kurzem undeutlichem Schweife. Merkwürdig aber war an ihm eine eigenthümliche von seinem Kerne ausgehende und nach der Sonne hin gerichtete Ausstrahlung von Lichtmasse, die sich nach dem Schweife hin wieder zurückbog und dem Ganzen dadurch das Ansehen etwa eines entfalteten Fächers gab. Dieser Lichtkegel blieb nicht immer nach der

Sonne hin gerichtet, sondern machte in einem Zeitraum von etwa je $4\frac{1}{2}$ Tagen pendelartige Schwingungen von etwa 60° , welche eine Wirkung der Sonne auf den Kometen zu sein schienen, indem die Ausströmung dann am stärksten war, wenn der Lichtkegel der Sonne gerade entgegengewendet war, und in dem Masse schwächer wurde, als er sich von ihr abwendete.

Diese ebenso räthselhafte als merkwürdige Erscheinung ist übrigens auch bei mehreren anderen Kometen wahrgenommen worden.

Von den übrigen wiederkehrenden Kometen, welche indess alle nur durch das Telescop erkannt werden können, sind der Biela'sche und der Encke'sche Komet, diejenigen, welche am meisten von sich reden gemacht haben. Von letzterem hat man nemlich nachgewiesen, dass er bei seiner etwa 3 Jahre betragenden Umlaufszeit sich der Sonne immer mehr nähert, seine Bahn daher eine spiralige Gestalt hat, dass er sonach wohl endlich einmal in die Sonne stürzen wird, und darin mit einen Beweis für die Existenz eines den Weltraum erfüllenden Mediums, welches der lockeren Kometenmasse Widerstand leistet, gefunden. Im Uebrigen ist seine Wiederkehr bereits 16mal nachgewiesen worden. Eine noch merkwürdigere Erscheinung bot der Biela'sche Komet dar, eine Erscheinung, wie sie ausserdem noch gar nie wahrgenommen wurde. Dieser Komet, seit dem Jahre 1772 bekannt, hat sich nemlich im Jahre 1846 unter den Augen seiner Beobachter in 2 selbstständige Kometen von ähnlicher Gestalt wenn auch etwas ungleichen Dimensionen gespalten. Man war daher im höchsten Grade darauf begierig, ihn bei seiner Wiederkehr in den Jahren 1852, 1859 und 1866 zu beobachten, Erwartungen, welche jedoch fast völlig getäuscht wurden. Im Jahre 1852 gelang es zwar noch, unter allerdings ungünstigen Verhältnissen eine weitere Theilung desselben zu beobachten, im Jahre 1859 und 1866 ist er dagegen gar nicht mehr zum Vorschein gekommen und in der Zwischenzeit wahrscheinlich einem vollständigen Auflösungsprocess entgegen gegangen.

Weit glänzendere Erscheinungen bieten, wenigstens zum Theil, jene Kometen, die bei einer Jahrhunderte und selbst Jahrtausende umfassenden Umlaufszeit sich der wissenschaftlichen Berechnung fast vollständig entzogen haben, und zu denen die berühmten grossen Kometen vom Jahre 1811, 1843, sowie der Donatische vom Jahre 1858 und zahlreiche andere gehören. Oft geschmückt mit einem Schweife, der sich über das halbe Firmament hinzieht und den Rechnungen nach, z. B. bei dem vom Jahre 1843 eine Länge von 36—40 Millionen Meilen voraussetzt, erscheinen sie unvermuthet, um eine Zeit lang dem menschlichen Auge eine Reihe der unauflöslichsten Räthel darzubieten und dann auf Nimmerwiedersehen wieder zu verschwinden. So zeigt dieser Schweif bei den meisten Kometen eine von der Sonne abgewendete Richtung und wird um so grösser, je mehr sich der Komet der Sonne nähert, und nimmt in demselben Masse wieder ab, wenn sich der Komet von der Sonne entfernt; so hat man keine merkwürdige fächerförmige Ausstrahlung, welche schon beim Halley'schen erwähnt wurde, auch bei mehreren anderen Kometen wahrgenommen und scheint endlich die Schweifbildung selbst mit dieser Ausstrahlung in einem gewissen Zusammenhang zu stehen. Welche Kraft aber soll im Stande sein, die Kometenmasse in so kurzer Zeit von ihrem Kerne zu entfernen, wenn, wie bei dem Kometen von 1843, nur wenige Tage hinreichend waren, einen Schweif von 36—40 Millionen Meilen Länge hinter ihm zu entwickeln? Mit welcher Geschwindigkeit müssen hiebei die den Schweif bildenden Theile von dem Kometen abgeschleudert worden sein? Und noch räthselhafter muss es erscheinen, dass dieser Schweif beim Vorübergang des Kometen an der Sonne in wenigen Stunden eine Schwenkung von fast 180° machen konnte, um von der Sonne abgewendet zu bleiben. Dies möchte fast auf die Vermuthung führen, dass man es hier nur mit einer optischen Erscheinung zu thun habe, ähnlich dem Lichtkegel, den ein Sonnenstrahl in einem dunklen, dunsterfüllten Raume verbreitet.

Dies mag genügen, um zu zeigen, dass die Kometen Himmelskörper sind, welche noch ausserordentlich viel Räthselhaftes darbieten, so dass es kaum möglich ist, die Frage „Was sind die Kometen eigentlich, und woraus besteht ihre Masse“ mit Bestimmtheit zu beantworten. Selbst die in anderen Zweigen des Wissens so vielfach Aufschluss gebende Spectralanalyse hat auf diesem Gebiete bisher nur noch zu wenigen Resultaten geführt, indem seit unserer Kenntniss der Spectralanalyse nur wenige kleine telescopische Kometen erschienen sind. Dennoch liegen wenigstens einige Beobachtungen vor. Das Spectrum eines im Jahre 1864 erschienenen Kometen bestand nach Donati aus hellen Linien, was einen gasförmigen Zustand andeuten würde; bei einem anderen vom Jahre 1866 ergab sich, dass das Spectrum des Schweifes von dem des Kernes verschieden war, indem dieser wesentlich auch wieder einige helle Linien zeigte, während der Schweif ein, wahrscheinlich von reflektirtem Sonnenlichte herrührendes, continuirliches Spectrum zeigte. Ueberhaupt haben verschiedene Kometen auch ein verschiedenes Spectrum ergeben, bestehen daher auch wohl aus verschiedenen Stoffen. Welcher Art aber die Beschaffenheit der Kometenmasse ist, hat sich auch auf diesem Weg noch nicht endgiltig entscheiden lassen.

Dagegen hat nun aber Schiaparelli in Mailand in neuerer Zeit eine Beobachtung gemacht, welche vielleicht geeignet ist, über die Natur dieser Himmelskörper einigen Aufschluss zu geben, und welche nachweist, dass sie in einem interessanten Zusammenhange mit einer anderen, bisher verhältnissmässig wenig berücksichtigten Himmelserscheinung, den Sternschnuppen stehen. Man versteht darunter jene plötzlichen Erscheinungen eines über den Himmel sich hinziehenden Lichtstreifens, der, wie sich fast mit Gewissheit annehmen lässt, dadurch erzeugt wird, dass kleine den Weltraum erfüllende Massen von nur wenigen Pfunden oder selbst Lothen Gewicht von der Erde angezogen werden, und wenn sie in die Atmosphäre der Erde ein-

treten, durch Reibung glühend werden und so die bekannte Erscheinung zeigen.

Sternschnuppen lassen sich zu allen Zeiten wahrnehmen, und ist, zumal, wenn man Telescope zu Hülfe nimmt, die Anzahl derer, welche sich täglich beobachten lassen, eine ungeheuer grosse. Newton, Professor am Yale-College in New-Haven in Connecticut, schätzt die Zahl der täglich mit freiem Auge sichtbaren, von denen freilich viele durch Wolken u. s. w. verdeckt werden, auf etwa $7\frac{1}{2}$ Millionen, und bezieht dies nur auf die vereinzelt erscheinenden, nicht etwa auf die hin und wieder in Schwärmen auftretenden.

Diese periodisch hin und wieder auftretenden Sternschnuppenschwärme, daran kenntlich, dass sie alle von einem gleichen Punkte auszugehen scheinen, während die vereinzelt auftretenden Sternschnuppen an jedem beliebigen Punkte des Himmels erscheinen, sind aber eine besonders merkwürdige Erscheinung und man hat deren bereits mehrere kennen gelernt, von denen die im August und im November sich zeigenden die bekanntesten sind. Namentlich der Augustschwarm ist schon seit langen Jahren unter dem Namen „die feurigen Thränen des Laurentius“ bekannt und man nimmt an, dass er eine ringförmige Gestalt bildet, deren einzelne Bestandtheile ziemlich gleichmässig vertheilt sind, weshalb auch fast das ganze Jahr hindurch Sternschnuppen erscheinen, welche zu diesem Strome gehören. Das Maximum der Erscheinung fällt jedoch auf den 10. August. Was diesem Schwarme aber ein besonderes Interesse verleiht, ist, dass, als man seine Bahnelemente berechnete, man fand, dass diese eine merkwürdige Uebereinstimmung mit den Bahnelementen eines im Jahre 1862 erschienenen, telescopischen Kometen ergeben. Die zu diesem Schwarme gehörigen Sternschnuppen werden, da ihr Strahlungspunkt im Sternbilde des Perseus liegt, auch wohl als Perseiden bezeichnet.

Auch bei dem weit glänzenderen Sternschnuppenschwarme, der vom Sternbilde des Löwen ausgehend, sein Maximum vom 13.—14. November erreicht, und namentlich in den Jahren 1799

und 1833 mit so besonderem Glanze auftrat, dass die Sternschnuppen wie Schneeflocken zu fallen schienen, hat man eine ähnliche Beobachtung gemacht. Auch hier gelang es, einen Kometen zu finden, dessen Umlaufszeit von 33 Jahren und sonstige Bahnelemente mit denen dieses Sternschnuppenschwarmes so übereinstimmten, dass an einem Zusammenhange zwischen beiden kaum gezweifelt werden kann. Ein Gleiches gilt endlich auch noch von ein paar anderen im April und im Dezember stattfindenden Sternschnuppenschwärmen, die ebenfalls einen gewissen Zusammenhang mit beobachteten Kometen nicht verkennen lassen.

Wenn nun aber wirklich ein solcher Zusammenhang zwischen Kometen und Sternschnuppen existirte, wie muss man sich einen solchen denken? Die Stoffe, aus denen die Weltkörper gebildet sind, haben sich nicht nur zu solchen compacten Massen, wie die Erde, die Sonne und die Planeten sind, vereinigt, sondern — und es scheint dies sogar der häufigere Fall zu sein — die daraus entstandene Substanz besteht wieder aus einer Unzahl zusammengehöriger kleiner Körperchen, welche sich als kosmische Wolken bezeichnen lassen, und zu der Sonne und den Planeten etwa in einem ähnlichen Verhältnisse stehen, wie eine irdische Staubwolke zu einer compacten Steinmasse. Die lockere Anordnung dieser Theile und die Geringfügigkeit ihrer Masse wird innerhalb einer solchen kosmischen Wolke nur geringe Bewegung veranlassen. Schreitet aber unsere Sonne im Weltraum fort, und mit ihr die Erde und alle Planeten, so werden leicht solche kosmische Wolken in die Anziehungssphäre der Sonne gerathen und dann beginnen deren einzelne Theile wegen ihrer ungleichen Entfernung schneller oder langsamer und dadurch bald eine langgestreckte Gestalt annehmend, sich ihr zu nähern. Rechnet man nun noch hinzu, dass solche kosmische Wolken schon an sich sehr verschiedene Dichtigkeit besitzen können, dass ferner der Einfluss, den die Anziehungskraft der Sonne auf sie ausübt, bald grösser, bald geringer sein kann, als der durch die Anziehungskraft ihrer einzelnen Theilchen auf einander bedingte,

dass endlich die Wärme der Sonne auf die Temperatur der Wolke verändernd einwirken kann, so liegt der Gedanke nahe, dass, je nachdem die eine oder andere dieser Kräfte vorherrschend wird, dadurch eine sehr verschiedenartige Wirkung erzielt werden kann. Bildet eine solche kosmische Wolke noch ein in sich abgeschlossenes vogelschwarmartiges Ganzes und geräth sie in die Nähe unserer Erde, so wird sie schon von Weitem als Komet sichtbar werden, verliert sie aber allen Zusammenhang, so werden ihre einzelnen Theile wohl noch ihre frühere Richtung beibehalten, und jedoch nur als solche, als Sternschnuppen sichtbar werden. Sternschnuppenschwärme wären demnach Mittelglieder zwischen Kometen und Einzelschnuppen, abgerissene Theile eines Kometenschweifes, nicht mehr dicht genug gehäuft, um für uns anders, als beim unmittelbaren Durchkreuzen der Erdbahn zum Vorschein zu kommen.

Es ist nicht zu läugnen, dass durch diese Theorie Schiaparelli's, wenn sie auch noch nicht alle Räthsel zu lösen vermag, hinter denen die Natur der Komet verschleiert ist, doch ein grosser Schritt zu deren Verständniss vorwärts gethan ist. Es sind zwar, namentlich von Tyndall, in neuester Zeit noch andere Theorien aufgestellt worden, da aber auch diese nur auf einzelne Erscheinungen Rücksicht nehmen und Vieles unerklärt lassen, so haben sie mehrfachen Widerspruch erfahren und es mag genügen, sie nebenher zu erwähnen. Es lässt sich aber erwarten, dass fernere fleissige Beobachtung und die weitem Hilfsmittel der Wissenschaft bald weitere Aufschlüsse geben werden.

Ueber das Verhältniss
der
humanistischen Gymnasien
zu den Naturwissenschaften.

Vortrag von Dr. J. Neger,
gehalten
in der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg
am 4. November 1871.

Es ist ein immer und immer wiederkehrender Vorwurf, der den humanistischen Gymnasien gemacht wird, dass die Bildung, welche die Schüler dieser Anstalten erhalten, eine durchaus einseitige, dass es unvereinbar mit den Anforderungen der Gegenwart sei, Gegenstände von solcher Wichtigkeit, wie neuere Sprachen und Naturwissenschaften, fast oder völlig auf die Seite zu setzen. Um die Berechtigung dieses Vorwurfs zu prüfen, muss man sich zunächst darüber klar werden, was auf den humanistischen Gymnasien eigentlich geboten wird. Der Unterricht auf diesen Anstalten umfasst zunächst ein gründliches Studium der griechischen und lateinischen Sprache, sodann Religionslehre, Geschichte, deutsche Sprache, Mathematik, Geographie, sowie endlich auch noch in untergeordneter Weise französische, englische und hebräische Sprache, Gesang, Zeichnen und andere ähnliche Fächer von geringerer Bedeutung.

Es ist nun keine Frage, dass das Studium der Schriften der hervorragendsten Geister des griechischen und römischen Alterthums, welches sich in der That in mancher Hinsicht auf eine so bewundernswürdig hohe Stufe der Cultur geschwungen hat, nur von dem veredelndsten Einfluss auf die heranwachsende Jugend sein kann, es ist keine Frage, dass die Werke eines Homer, Virgil, Sophocles, Tacitus u. a. zu den trefflichsten Producten der Literatur aller Zeiten gehören, und desshalb auch für weitere Kreise von bleibendem und unveränderlichem Werthe sind und für alle Zeiten bleiben werden, es ist daher auch unbestreitbar, dass diejenigen, denen eine solche klassische Bildung nicht zu Theil geworden ist, dies mit Recht als eine Lücke in ihrer Erziehung beklagen, und Andere, denen sie zu Theil ge-

worden ist, oft vortheilhaft sich von Jenen unterscheiden. Trotz alledem muss aber doch die Frage aufgeworfen werden, ob diese Kenntnisse von einer ganz ausschliesslichen Wichtigkeit für das Kulturleben der Gegenwart sind, ob dieses, wenn es auch ursprünglich auf dem des klassischen Alterthums basirt, doch nicht noch andere und vielleicht wichtigere Dinge in sich einschliesst, als diese einer früheren Zeit angehörigen Sprachen und Anschauungen. Es ist nicht zu läugnen, dass unser Culturleben allein im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts einen ungeheueren Aufschwung genommen hat, dass es diesen Aufschwung wesentlich der Pflege der Naturwissenschaften, gerade desjenigen Theiles der Wissenschaft verdankt, der im classischen Alterthume am meisten vernachlässigt wurde, welche uns aber Hilfsmittel geschaffen haben, durch welche alle Culturvölker aufs Engste mit einander verbunden sind, und uns für die Zukunft zu den kühnsten Hoffnungen berechtigen, welche uns hoffen lassen, dass der Erbhasse, der die Nationen früherer Jahrhunderte von einander trennt, wenn er auch erst in diesen Tagen noch einmal wieder zu einer mächtigen Flamme emporgelodert ist, doch mit der Zeit vollständig erlöschen und über dem Begriff der Nationalität der der Cultur, der der Humanität stehen wird. Schien nicht erst noch vor wenigen Jahren dieses Ziel bereits erreicht zu sein? Ist nicht der Wechselverkehr aller Culturvölker ein von Jahr zu Jahr steigender und nicht jetzt schon ein so lebendiger geworden, dass keines mehr auf die Dauer ohne das Andere bestehen kann; dass die Kenntniss ihrer Sprachen eine von Jahr zu Jahr dringendere Nothwendigkeit wird? Und wer vermag sich überhaupt die Gegenwart zu denken ohne Eisenbahnen, Telegraphen, Zündhölzer, Photographieen, Microscope, Fernrohre, zweckmässig construirte Lampen und Oefen, Uhren, Bücher, Arzneiwaaren wie Chinin, Morphinum und Chloroform und zahllose andere Materialien und Bequemlichkeiten des Lebens, welche uns mit dem internationalen Verkehre durch die Pflege der Naturwissenschaften in einer Weise zugänglich geworden sind, dass uns selbst unsere am Anfang dieses Jahr-

hundreds lebenden Vorältern darum beneiden würden, welche auf die weitere Entwicklung unseres Culturlebens vom allergrössten Einflusse sind und von welchen weder Moses noch Salomo, weder die 7 Weisen Griechenlands noch Plato, weder Socrates noch Christus, ja nicht ein Linné, Lavoisier, Cuvier, Schiller oder Göthe die entfernteste Ahnung gehabt haben?!

Wenn nun aber wirklich auf unseren humanistischen Gymnasien alle diese Dinge mit vornehmem Stillschweigen übergangen, wenn die Schüler dieser Anstalten namentlich mit der Sprache der Natur so wenig vertraut gemacht werden, als wenn dieselbe caraibisch oder malabarisch wäre, so ist das für diese Anstalten ein Vorwurf, der nicht leicht auf ihnen lastet, und ein Mangel, der fast unerklärlich scheinen muss. Auf den wirklichen Grund dieser Erscheinung können wir erst später zurückkommen, in der Regel sucht man sie durch nachstehende Darlegung zu rechtfertigen:

„Das Studium der neueren Sprachen und der Naturwissenschaften ist gewiss etwas recht Schönes und Wichtiges, allein, es ist eben nicht möglich, Alles, was schön und wichtig ist, auf diesen Anstalten zu treiben. Es würde sowohl die Zeit, als die geistige Thätigkeit der heranwachsenden Jugend viel zu sehr zersplittert werden, wenn man sie neben den bisher betriebenen Fächern auch noch mit diesen bekannt machen wollte. Endlich ist ja auch die humanistische Bildung ohnedem schon eine so umfassende, dass Jeder, dem sie zu Theil wird, dadurch in den Stand gesetzt ist, sich in die dort nicht gelehrten Gegenstände zu finden, wenn ihn die Verhältnisse dazu führen sollten, sich damit zu beschäftigen.“ Dieser vielfach gemachte Ausspruch bestätigt aber nur eine sehr allgemein vorkommende menschliche Eigenschaft, welche darin besteht, dass diejenigen, welche aus irgend einer Ursache eine Beschäftigung fast ausschliesslich treiben, zuletzt zu der Ansicht kommen, dass diese Beschäftigung nicht allein für sie, sondern auch für die ganze übrige Welt die Hauptsache sein müsse. Es gibt Turnfanatiker, welche meinen, der Mensch sei nur deswegen auf der Welt, um Turner zu

sein, es gibt Kaltwasserfanatiker, welche in dem Gebrauche der Kaltwasserkuren das einzige Heil der Welt erblicken, es gibt vielleicht auch Naturforscher, welche den Zweck des menschlichen Daseins nur im Sammeln von Insecten und Conchylien erblicken, und als etwas Aehnliches muss es jedenfalls auch erscheinen, wenn man behauptet, dass die sog. humanistische Bildung eine Grundlage für das Studium aller übrigen Wissenschaften abgeben könne. Für das Studium der neueren Sprachen mag dies vielleicht noch desshalb einigermaßen seine Richtigkeit haben, weil manche derselben viele Worte aus dem Lateinischen in sich aufgenommen haben, inwiefern dies aber auch für das Studium der Naturwissenschaften und der Medicin gelten soll, lässt sich durchaus nicht einsehen, ja man möchte sich sogar veranlasst sehen, den humanistischen Gymnasien hierin eher einen schädlichen Einfluss zuzuschreiben. Denn bei der fast ausschliesslichen Pflege, deren sich das klassische Alterthum auf diesen Anstalten zu erfreuen hat, kommen deren Schüler unwillkürlich zu der Anschauung, als wenn die Stärke eines Herakles oder Achilleus, die Weisheit eines Socrates oder Plato etwas seit jener Zeit gar nie mehr wieder Dagewesenes sei, als ob überhaupt in jener Zeit das Culturleben der Menschen seinen Culminationspunkt erreicht habe, während es sich in Wirklichkeit doch so ganz anders, so ganz entgegengesetzt verhält. Mit Stolz kann das gegenwärtig lebende Geschlecht der Menschen sagen, dass kein Jahrhundert, ja kein Jahrzehend jemals gewesen ist, das eine höhere Entwicklung der Menschheit aufzuweisen gehabt hätte, als die Gegenwart und die Weisesten Griechenlands, wenn sie mit ihrem Wissen unter uns leben müssten, würden eine ausserordentlich klägliche Rolle spielen. Gerade das wird aber auf den humanistischen Gymnasien kaum überhaupt erkannt, geschweige denn hinreichend gewürdigt und darauf hingewiesen.

Es ist allerdings nicht zu läugnen, dass namentlich im Gebiete der Kunst das klassische Alterthum ausserordentlich Bewunderungswürdiges geleistet hat, dass die Dramen eines Sophocles und Euripides, die Statuen eines Phidias und Praxiteles eine

in ihrer Art fast unerreichbare Vollendung zeigen, wir dürfen aber doch darüber nicht vergessen, dass wir neben dieser hohen Entwicklung der Kunst in fast allen übrigen Beziehungen Zustände vorfinden, welche nur dem allerhöchsten Grade von Unvollkommenheit entsprechen. Wir finden das Unwesen der Sklaverei in voller Blüthe, wir finden die ungereimtesten und unrichtigsten Vorstellungen über den Bau der Erde und des Weltalls, über die Natur der Krankheiten und deren Heilung, über die Producte fremder Völker, kurz über alles das, was in der Gegenwart richtig erkannt, dem allgemeinen Wohle der Menschheit schon die reichsten Früchte getragen hat. Ist es aber nicht ganz erklärlich, wenn die Gymnasialschüler durch diese einseitige Pflege viele solche unrichtige Begriffe unwillkürlich in sich aufnehmen und, wenn sie später mit anderen Dingen sich beschäftigen, Mühe haben, dieselben wieder los zu werden? Gibt nicht die ganze Geschichte der Naturwissenschaften selbst, die sich lange Zeit nach dem Vorbilde der griechischen Philosophen in leeren Speculationen bewegte, hiefür den deutlichsten Beleg? Und gewiss, bis zum heutigen Tage, würden Viele in vielen Dingen nüchterner denken, würden Begriffe wie Homöopathie und Sympathie, Tischrücken und Geisterklopfen, Glaubenshass und Nationalhass selbst in den gebildetsten Kreisen nicht mehr so viele Anhänger finden können, wenn ihr Geist daran gewöhnt worden wäre, sich neben den Grübeleien eines Plato auch mit den nüchternen Forschungen der Naturwissenschaft zu beschäftigen.

Ebenso stichhaltig sind auch die übrigen Gründe, welche man anführt, um den gerügten Mangel dieser Lehranstalten zu entschuldigen. Wenn man den Unterricht in der griechischen und lateinischen Sprache allerdings in der Weise fortbestehen lassen will, wie dies bisher der Fall ist, dann dürfte sich freilich kaum Zeit finden, um auch noch anderen Sprachen und Naturwissenschaften eine ausgedehntere Pflege angedeihen zu lassen. Die Sache liegt aber doch wohl so: Wenn irgend eine Lehranstalt, so sollen doch wohl die humanistischen Gymnasien vor

allen die Aufgabe haben, ihre Schüler mit dem Wichtigsten und Wissenswerthesten aus allen Zweigen des Wissens bekannt und sie zu Menschen zu machen, welche befähigt sind, der übrigen Menschheit das Banner der Cultur voranzutragen. Was ist nun aber dieses Wichtigste? Ist es das Studium der modernen Sprachen und der Naturwissenschaften, oder das der griechischen und lateinischen Sprache? Nehmen wir an, und diese Annahme ist doch gewiss keine unbescheidene, dass Beides gleich wichtig ist, geben wir gerne zu, dass nichts geeigneter ist, das menschliche Gemüth zu veredeln, es über die Sphäre der Alltäglichkeit zu erheben und die Welt gleichsam in einem verklärten Lichte erscheinen zu lassen, als diese Beschäftigung mit den grössten Geistern einer Vergangenheit, welche uns im Gebiete der Kunst als ein fast unerreichbares Vorbild erscheint, — wie lässt es sich demnach rechtfertigen, dass das eine so ganz ausschliesslich gepflegt, das andere so vollständig vernachlässigt wird? Was nun die Pflege dieses einen Theiles betrifft, so besteht sie theilweise in dem Kennenlernen der griechischen und römischen Schriftsteller, theilweise darin, dass bis in die obersten Gymnasialklassen hinauf mehrere Stunden in der Woche dazu verwendet werden, deutsche Aufsätze in grammatikalisch und syntactisch correctes Latein und Griechisch zu übersetzen. Und hierin liegt eben der einseitige Charakter der humanistischen Gymnasien. Es ist zwar natürlich, dass man, um eine fremde Sprache kennen zu lernen, sich auch mit deren Grammatik beschäftigen muss, die griechische und lateinische Sprache sind aber nicht um ihrer grammatikalischen Regeln, um ihrer syntactischen Satzbildung, sondern um der Schriftsteller willen, welche in diesen Sprachen geschrieben haben, für die allgemeine Bildung von Wichtigkeit. Um diese aber zu verstehen, ist das, was in den untern Klassen hiefür geschieht, gewiss hinreichend, was darüber hinausgeht, ist vom Uebel, ist das, was nur speciell philosophisches Interesse hat, was nicht mehr als allgemeines Bildungsmittel wirkt, was von den meisten Schülern mit Widerstreben aufgenommen, und, sobald sie das Gymnasium verlassen

haben, am ersten wieder vergessen wird! Selbst jener Grund, der in der Regel dafür angegeben wird, dass dadurch der Scharfsinn der Schüler angeregt werde, ist nicht stichhaltig, denn früher oder später kommt bei Allen, welche sich nicht speciell dem philologischen Berufe widmen, das mehr oder minder deutliche Bewusstsein, dass für die Entwicklung des Scharfsinns die Lösung von Problemen aus dem Gebiete der modernen Sprachen und der Naturwissenschaften eine wenigstens ebenso förderliche und dabei für die allgemeine Bildung weit nutzbringendere Aufgabe wäre, indem man dann doch auch auf diesem Gebiete kein völliger Ignorant bliebe. Es gehört in der That kein geringerer Scharfsinn dazu, dem Geiste eines Linné, Humboldt, Leverrier oder unserer heutigen Spectralanalytiker auf ihren Forschungen zu folgen, eine chemische Analyse sorgfältig auszuführen, eine astronomische, geognostische oder botanische Bestimmung zu treffen, als einen deutschen Aufsatz in ein correctes Lateinisch und Griechisch zu übersetzen. Was aber richtiger ist, was dem Begriffe der allgemeinen Bildung mehr entspricht, ob nur das Eine können, oder auch vom Anderen wenigstens einige Kenntnisse zu besitzen, das ist eine Frage, deren Beantwortung gewiss keinem Zweifel unterliegen kann.

Uebrigens stellt sich auch selbst in der Art, wie die Schüler der humanistischen Gymnasien mit den klassischen Schriftstellern bekannt gemacht werden, Manches eigenthümlich dar und bleibt der Zweifel offen, ob sich nicht vielleicht mehr erreichen liesse, wenn auch dieses in anderer Weise gehandhabt würde. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, dass der Lehrgang dort ein ganz anderer ist, als bei anderen Fächern des menschlichen Wissens. Während man bei diesen, z. B. bei den Naturwissenschaften sein Ziel mit allen möglichen Hülfsmitteln zu erreichen strebt, dabei von der Ansicht ausgeht, dass jedes Hülfsmittel ein Stein ist, auf welchem weiter fortgebaut werden kann, und jedes neu erdachte Hülfsmittel mit Freuden begrüsst, sucht man sie dort als Eselsbrücken zu verdächtigen und auf ein möglichst geringes Mass zurückzuführen. Ein Beleg hiefür sind die auf

den Gymnasien eingeführten und vorherrschend beliebten Ausgaben, welche, wie die bekannten Münchener, nichts als den glatten Text enthalten. Wenn nun auch jeder Schüler im Stande ist, dieselben im Allgemeinen zu verstehen, so finden sich doch oft genug Stellen, die ihm unklar sind, und bei welchen ihn Grammatik und Lexikon im Stiche lassen. Es würde nun dem Schüler das geistige Verständniss dieser Schriftstellen gewiss weit mehr eröffnen, wenn ihm gestattet würde, solche Ausgaben, welche ihn durch ihre Anmerkungen unterstützen, zu benützen und er somit nicht allein auf die Erklärung angewiesen wäre, welche ihm sein Lehrer zu geben vermag. Denn auch das lässt sich wohl nicht in Abrede stellen, dass es nicht wenige Lehrer gibt, denen nicht die Gabe des Wissens, wohl aber die des Lehrens, die des Eingehens auf die Bedürfnisse der Schüler versagt ist. Ja es liesse sich sogar die Frage aufwerfen, ob es nicht zweckmässig wäre, wenn, wie bei naturwissenschaftlichen Werken, auch die Schulausgaben eines Cäsar, Homer, Livius u. s. w. mit Plänen, künstlerisch ausgeführten Illustrationen u. dergl. versehen würden, die den Schülern die Lectüre dieser Schriftsteller gewiss anziehender und verständlicher machen und in manchen derselben vielleicht einen ästhetischen Sinn anregen, den man bei den academischen Bürgern oft in geringerem Grade, als gerade nothwendig findet. Dass aber das Alles auf den humanistischen Gymnasien noch so wenig erkannt und so wenig Sorge dafür getragen worden ist, ist ohne Zweifel ein Beleg dafür, dass diese Anstalten auch heute noch von jenem alten scholastischen Geist, dem eben die Grammatik Alles war, sich noch nicht völlig frei zu machen gewusst haben, und dass dieser es eben auch ist, der sie veranlasst, der Aufnahme neuer revolutionärer Elemente, wie Naturwissenschaften und neuere Sprachen, einen solchen Widerstand entgegenzusetzen.

Hiemit verbindet sich aber endlich noch eine andere Ursache, welche, ebenfalls dem beschränkten Sinne früherer Jahrhunderte ihren Einfluss verdankend, auch auf das gegenwärtige noch einen allzugrossen ausübt. Diese allgemein bekannte

Ursache, von der namentlich auch das oben gesprochene Wort gilt, dass sie stets die ganze Welt als nur um ihretwillen existierend betrachte, ist die Kirche. Es ist nicht abzustreiten, dass dieser Einfluss, mag er nun berechtigt sein, oder nicht, vorhanden ist, es ist nicht abzustreiten, dass in allen unseren Staaten kirchliche Rechtgläubigkeit in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes zur Empfehlung gereicht und dass Andere, die sie nicht theilen, sich deshalb die mannigfachsten Zurücksetzungen gefallen lassen müssen, es ist nicht abzustreiten, dass alle Schulen, von der höchsten bis zur niedrigsten, mehr oder weniger von der Kirche abhängig sind! Besteht doch sogar auf den humanistischen Gymnasien Bayerns bis in die neueste Zeit hinein die Bestimmung, dass einem Schüler das Gymnasialabsolutorium nicht ertheilt werden könne, wenn ihm in der Religionslehre eine geringe Note zu Theil geworden sei!

Nun ist aber allgemein bekannt, dass sich auch gegen die Berechtigung dieses Einflusses von Tag zu Tag lautere Stimmen erheben, dass man immer deutlicher den Widerspruch erkennt, in welchem dieser Einfluss zu Allem steht, was Vernunft, Wissenschaft und Erfahrung sonst lehren. So sei nur der einen Schlussfolgerung gedacht, welche sich an die, die Entstehung der Erde und des Menschengeschlechtes betreffenden naturwissenschaftlichen Forschungen knüpft. Denn wenn der Schleier, der uns die Antwort auf diese Frage verhüllt, auch noch durchaus nicht völlig gelüftet ist, so steht naturwissenschaftlich doch wenigstens so viel fest, dass auch das, was die Bibel darüber sagt, keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat, es steht namentlich fest, dass

- 1) weder alle Menschen von einem Paare abstammen, und
- 2) dass die ersten Menschen nicht von jener vollkommen gottähnlichen Beschaffenheit waren, welche ihnen die Bibel zuschreibt und welche sie erst durch den Sündenfall verloren haben sollen.

Ist dies aber einmal entschieden, dann fällt damit auch der ganze Bau der christlichen Glaubenslehre in sich zusammen. Denn das ist ja die Grundlehre dieser Kirche, dass Christus in

die Welt gekommen ist, um den Fluch, der in Folge des Sündenfalles über das Menschengeschlecht hereingebrochen, wieder von ihm zu nehmen. Hat nun aber dieser Sündenfall nie stattgefunden, so kann es auch keinen Fluch und keine Erbsünde geben, es bedarf dann aber auch keiner Erlösung, mithin weder eines Erlösers, noch eines Statthalters Christi auf Erden, gleichgültig, ob sich derselbe für unfehlbar ansehen lässt, oder nicht.

Es liegt in der Natur der Sache, dass derartige Schlussfolgerungen von Jedem gemacht werden, der sich mit naturwissenschaftlichen Dingen beschäftigt, dass er über die Wunder, welche zur Bestätigung jener Lehren dienen sollen, andere Begriffe bekommt, dass er die ganze Sache überhaupt in einem ganz anderen Lichte sieht; es lässt sich auch nicht in Abrede stellen, dass in der Gegenwart der überaus grösste Theil der Gebildeten auf diesem Standpunkte bereits angekommen ist. Wenn nun dennoch auf unseren Gymnasien bis in die obersten Klassen hinauf ein Religionsunterricht ertheilt wird, in welchem die Lehre vom Sündenfalle und dem Heilsplane Gottes zur Wiedererlösung der Menschheit mit allen möglichen philosophischen Beweisgründen entwickelt wird, so müssen einem solchen diese Beweise, und wären sie noch so geistreich dargelegt, nur als Trugschlüsse, das Ganze als das Dreschen von leerem Stroh, und ihm wahrhaft unverantwortlich erscheinen, wenn solche Dinge nicht allein gelehrt, sondern von ihnen sogar die Befähigung zu weiteren, z. B. medicinischen Studien abhängig gemacht wird. Die Kirche weiss aber auch recht wohl, welche Gegnerinnen sie an den Naturwissenschaften besitzt, sie weiss recht wohl, dass wenn man an den Gymnasien einen naturwissenschaftlichen Unterricht einführen würde, dadurch dem Religionsunterrichte ein sehr bedenkliches Gegengewicht geboten und in jenem bald wieder eingerissen würde, was in diesem aufgebaut worden wäre, auch wenn die Punkte, in welchen diese beiden Gebiete einander feindlich gegenüberstehen, nicht unmittelbar zur Sprache kämen. Das Resultat würde sich bald von selbst ergeben und keinen Zweifel mehr übrig lassen, auf welcher Seite der Sieg

bleibt; die geringe Anzahl derer, welche sich zur Zeit noch freiwillig dem geistig so mageren Berufe der theologischen Wissenschaft widmen, würde sich bald auf ein unendlich kleines Minimum reduciren. Desshalb ist es wohl erklärlich und diesem Einfluss am meisten zuzuschreiben, wenn gerade an den höchsten Bildungsanstalten der Pflege der Naturwissenschaften so hemmend als möglich entgegengetreten wird. Was aber ist die Folge? Die Entwicklung der Menschheit lässt sich doch einmal nicht aufhalten. Man wird die humanistischen Gymnasien immer mehr als einseitige und unzeitgemässe Anstalten betrachten und diese werden einen solchen Vorwurf auch nicht eher von der Hand weisen können, ehe nicht wenigstens die Stunden, in denen ihre Schüler mit griechischer Syntax und dogmatischen Grübeleien gelangweilt werden, in besserer und nützlicherer Weise zur Verwendung kommen.

U e b e r P h o s p h o r e .

Von

Dr. G. Seelhorst.

Die Veranlassung zu den im Folgenden beschriebenen Versuchen zur Bereitung künstlicher Phosphore lag in der Unmöglichkeit, während des verflossenen Jahres mit Paris zu verkehren. Ein hiesiger Mechanikus hatte früher von dort kleine mit einem Handgriff versehene Holzrähmchen erhalten, in welchen sich je sechs flache, etwa 8 Millim. breite Glasröhrchen mit Phosphoren gefüllt, befanden. Dieselben zeigten nach nur sekundenlanger Belichtung im diffusen Tageslicht die Farben des Spectrum's, roth, orange, gelb, grün, blau, violett. Da auf Paris als Bezugsquelle nicht mehr zu rechnen war, so versuchte ich die Herstellung der Präparate nach den von Becquerel gegebenen Vorschriften aber mit sehr wenig Erfolg. Nicht nur konnte ich die Resultate, wie sie in Müller, Lehrbuch der Physik und Meteorologie 6. Aufl. Bd. I. p 647 ff. beschrieben, theils gar nicht, theils nicht mit Sicherheit erreichen, so waren die Methoden andererseits sehr zeitraubend und umständlich. Durch Erhitzen von Strontianhydrat oder kaustischem Strontian mit Schwefel erhielt ich niemals einen violett leuchtenden Phosphor.

Weit günstiger gestaltete sich die Sache, als ich die Arbeiten von A. Forster*) kennen lernte. Mit genauer Befolgung der a. a. O. gegebenen Vorschriften gelang die Herstellung der gelben, grünen und blauen Phosphore recht gut, mit einem Präparat kam auch ein orangerother, ein so schön rother und violetter aber als die Pariser Röhren enthielten, blieb mir versagt. Die Analyse des rothleuchtenden ergab Schwefelbarium,

*) Pogg. Ann. Bd. 133 p. 94 u. 228.

des violetteleuchtenden aber ein Gemenge aus Kalk und Strontian. Die Gewinnung der erstgenannten kann nur durch Anwendung sehr verschiedener Präparate von schwefelsaurem Baryt ermöglicht werden, man muss eben so lange probiren, bis man einen gefunden hat, der mit Kohle oder Wasserstoff reducirt einen rothleuchtenden Phosphor giebt. Ich habe zehn verschiedene Barytsulphate probirt, ohne einen brauchbar zu finden. Seitdem konnte ich mir keine neuen Sorten mehr verschaffen, um die Versuche fortzusetzen. Ebenso blieben allerlei Combinationen von Gyps und schwefelsaurem Strontian, sowie von einem Strontianpräparat, welches einen blauen, mit einem Barytpräparat, welches einen gelbrothen Phosphor gab, um einen violetten zu erzeugen, erfolglos. Diese beiden müssen also der Gegenstand noch weiterer Arbeiten sein, die Herstellung gelber, grüner und blauer Phosphore bietet keine Schwierigkeiten.

Ich habe meine Phosphore, wie Forster vorschreibt, gleich nach der Herstellung noch heiss in getrocknete Glasröhren eingeschmolzen. Sollen sie dagegen in die flachen, engen Glasröhren eingefüllt werden, so müssen sie gepulvert werden, wobei freilich ihre Schönheit leidet. Man braucht sich dabei nicht zu übereilen; um die Präparate vor dem Wassergehalt der Luft zu schützen, genügen die bei jeder organischen Elementaranalyse üblichen Cautelen. Sehr bequem und der weitesten Anwendung fähig fand ich das Einschmelzen in Paraffin. Ich rühre den fein gepulverten Phosphor mit geschmolzenem Paraffin zu einem dicken Brei an und trage diesen mit dem Pinsel in verschiedenen Figuren auf ebene Glasscheiben auf. Die Contouren werden mit dem Messer ausgeschnitten, dann andere Farben daneben gesetzt und so Blumen, Sterne, Schmetterlinge etc. hergestellt, welche nach der Beleuchtung mit Magnesiumlicht sich recht hübsch machen. Die obere Seite des Präparates wird dann noch einigemal mit geschmolzenem Paraffin überstrichen und die Glas- tafel entsprechend, mit der Glasseite nach oben, in ein Kästchen mit schwarzem Hintergrund und Schiebdeckel, gefasst. Die leuchtenden Flächen sind dadurch grösser und ihre Farben treten

besser hervor. Solche Präparate haben sich über ein Jahr ganz gut erhalten.

Eines Umstandes muss ich noch erwähnen, nämlich, dass der, eben in der zugeschmolzenen Röhre kalt gewordene Phosphor oft nicht phosphoresciren wollte und als schlecht bei Seite gelegt wurde. Anderen Tages leuchteten solche Präparate zu meiner Ueberraschung oft recht schön. Auch erschien mir zuweilen eine Farbe anders, als anderen Beobachtern, die erst blau und dann gelb leuchtenden Phosphore konnte ich fast nie blau sehen, obgleich ich durchaus nicht farbenblind bin. Ich bin geneigt, den Grund in einer Schwächung der Augen bei der unmittelbar vorhergehenden Bereitung zu suchen. Das Beobachten des fast stundenlangen Glühens der Masse im Tiegel dürfte wohl die Ursache sein. Gelb und grün sah ich immer, nur blau nicht.

Es mögen nun die kurzen Beschreibungen einer Anzahl von Versuchen folgen.

Grüner Phosphor.

1) Unterschwefeligsaurer Strontian nach Forster bereitet, 15 Min. über der Bunsen'schen Lampe, 5 Min. über dem Gebläse geglüht. Geschmolzene Masse sehr hart, leuchtet schön gelbgrün. Einer der schönsten Phosphore.

2) Gleiche Theile kohlenaurer Strontian und gefällter Schwefel langsam 5 Min. gelind, dann 25 Min. stark über dem Bunsenbrenner, endlich 5 Min. über dem Gebläse erhitzt. Nicht geschmolzen, körnig. Sehr schön grün, dunkler als 1.

Blauer Phosphor.

3) Schwefelsaurer Strontian, mit einer Schwefelsäure unbekannten Ursprungs, die wir mit a bezeichnen wollen, aus Chlorstrontium gefällt, mit Wasserstoff nach Forster reducirt, 10 Min. über der Lampe, 10 Min. über dem Gebläse geglüht, leuchtete schwach blau.

Fünf andre Versuche mit verschiedener Zeit des Glühens ergaben kein besseres Resultat.

4) Ein anderer schwefelsaurer Strontian mit einer andern Schwefelsäure b bereitet, gab mit Wasserstoff unter ganz gleichen Umständen wie der mit der a Säure bereitete bei 15 Min. Glühen über der Lampe, 5 Min. Gebläse einen gelben, 10 Min. Lampe, 10 Min. Gebläse einen schöner gelben Phosphor. Bei 10 Min. Lampe und 15 Min. Gebläse wurde er bleibend blau. Noch länger 20 Min. Gebläsehitze liess das Blau noch schöner werden. Ich kann mich betreffs des verschiedenen Verhaltens der Strontiansulfate den Worten Forster's nur anschliessen. Violett und Rosa erhielt ich bei keiner Sorte. Genaue Analyse der beiden Schwefelsäuren ergab bei a: 0,7% schwefelsaures Bleioxyd, sonst keine Verschiedenheit.

Gelber Phosphor.

Für hellgelb leuchtende ist die im 4ten Versuche beschriebene Methode, 10 Min. Lampe 10 Min. Gebläse die beste.

Für dunkelgelbe oder orange Phosphore habe ich nur einen schwefelsauren Baryt tauglich gefunden. Derselbe mit Kohle, 6 zu 1, 30 Min. über der Lampe, 10 Min. im Gebläse geglüht, leuchtete anfangs nicht, am anderen Tage aber gut orange-roth.

Bei zwei Versuchen, denselben Baryt mit Wasserstoff zu reduciren, schmolz der Platintiegel durch und das Product leuchtete gar nicht.

Ebensowenig erhielt ich mit anderen Sorten von schwefelsaurem Baryt, weder mit Kohle noch mit Wasserstoff, irgend brauchbare Resultate.

Unterschwefeligsaurer Strontian gab 15 Min. Lampe, 5 Min. Gebläse geglüht eine sehr fest an den Tiegel angeschmolzene Masse, welche sich nur mit Gefahr loslösen liess und gut blaugrün leuchtete. Wegen des Anschmelzens ist diese Methode aber nicht zu empfehlen.

Ich habe nur diese wenigen Versuche aus einer Reihe von etwa sechzig mit verschiedenen Substanzen ausgewählt, weil sie die zuverlässigsten und brauchbarsten sind, wenn man die Phos-

phore für den Handel darstellen will. Es hätte keinen Zweck, die übrigen Versuche, sowie die Vorarbeiten dazu, zu beschreiben. Ich bin im Wesentlichen Forster's Vorschriften gefolgt, habe dieselben negativen Resultate erhalten wie er und es ist mir ebensowenig wie ihm gelungen, den Grund für das verschiedene Verhalten derselben Substanz zu finden. Ebenso kann ich bestätigen, dass die chemische Reinheit der Präparate nicht förderlich, zuweilen hinderlich ist, ohne aber den Grund angeben zu können. Betreffs der Darstellung grösserer Quantitäten fand ich es vortheilhafter, mehrere kleine Portionen zu bereiten, die man besser durchglühen kann, als grosse Mengen auf einmal vorzunehmen. Mit 50 Gramm wollte trotz eines grossen zehnstrahligen Gasgebläses nicht gelingen, was mit 10 Gramm über dem Bunsen'schen Gebläse leicht war. Auch war das lange Blasen sehr anstrengend.

Bei den Reductionen mit Wasserstoff wendete ich den von mir in Fresenius, Zeitschr. anal. Ch. Bd. 8 p. 139 beschriebenen Apparat zur Wasserstoffentwicklung an, wobei sich derselbe trotz der bedeutenden Ansprüche in quantitativer Hinsicht trefflich bewährte.

Möchten wir bald erfahren, worauf diese höchst eigenthümliche Erscheinung, die Phosphorescenz, überhaupt beruht!

Nürnberg, 1871.

Apterologisches
a u s d e m f r ä n k i s c h e n J u r a

von

Dr. L. Koch in Nürnberg.

Verlag von

In einigen kleinen Aufsätzen sollen die wichtigsten apterologischen Vorkommnisse unseres fränkischen Jura dargestellt werden. Seit einer Reihe von Jahren habe ich oft in den Thälern und auf den Bergen dieses anmuthigen Höhenzuges gesammelt und manche von mir dort entdeckte Art bereits bekannt gegeben; in der jüngsten Zeit jedoch meine Aufmerksamkeit besonders den Höhlen jener Gegenden zugewandt und von dort einige sehr interessante Thiere erhalten.

1. *Linyphia cavernarum* n. spec.

T. I. Fig. 1. Epigyne.

Der Cephalothorax und alle mit ihm verbundenen Theile hellbräunlichgelb; die Epigyne röthlichbraun; das Abdomen hellgraugelb oder grauweiss, ebenso die Spinnwarzen.

Der Cephalothorax dem Umrisse nach breit-oval, glatt, glänzend, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert, ziemlich hoch, vom Hinterrande schräg ansteigend, am Kopfteile oben und seitlich gewölbt und hier mit kurzen Härchen spärlich bewachsen. Der Clypeus ungefähr so hoch als die vordere Augenreihe breit ist, schräg nach vorn abgedacht, unterhalb der Augen der Quere nach eingeschnürt.

Die vordere Augenreihe gerade, die MA *) sehr klein, in ihrem Durchmesser von einander und von den SA nur wenig weiter entfernt; die SA gross, grösser als alle übrigen, die vorderen und hinteren von gleicher Grösse, aneinanderstossend. Die hintere Reihe breiter, etwas nach hinten gebogen (*procurva*), die MA oval, schräg nach hinten divergirend gegen einander

*) MA == Mittelaugen, SA == Seitenaugen.

gestellt, kleiner als die SA und grösser als die vorderen MA, von einander noch einmal soweit als von den SA entfernt.

Die Mandibeln kräftig, etwas nach hinten gedrückt, so lang als das Patellar- und Tibialglied der Palpen zusammen, so dick als die Vorderschenkel, vorn herab leicht gewölbt, am Ende etwas auseinanderweichend, mit feinen Borstchen spärlich besetzt.

Die Maxillen über die Lippe gebogen, aussen gerundet, stark gewölbt, mit einzelnen Borstchen besetzt. Die Lippe breiter als lang, in der Mitte der Quere nach eingeschnürt, vorn fast gerade abgestutzt.

Das Sternum breit-herzförmig, stark gewölbt, glatt, spärlich mit kurzen Borsten besetzt.

Das Abdomen hochgewölbt, nur wenig länger als breit, daher fast kugelig, fettähnlich glänzend, mit kurzen, abstehenden, gelblichweissen Härchen dünn bedeckt.

Die Schenkel, Patellen und Tibien ziemlich dick; die Schenkel der beiden Vorderpaare oben etwas gewölbt; an jenen des ersten Paares vorn im obersten Drittheile ein sehr kurzer Stachel, sonst sind die Beine mit Ausnahme einer langen Borste am Ende der Patellen und zunächst der Basis der Tibien des dritten und vierten Beinpaares wehrlos. Die Unterseite der Schenkel und Tibien ist mit langen steifen Haaren besetzt.

Länge des Cephalothorax: 0^m00075; des Abdomen: 0^m00125.

Ich besitze mehrere weibliche Exemplare dieser Art aus der Rosenmüllershöhle bei Muggendorf.

2. *Linyphia Rosenhaueri* n. spec.

T. 1. Fig. 2. Männliche Palpe. Fig. 3. Decke der Copulationsorgane.
Fig. 4. Epigyne. Fig. 5. Augenstellung.

Dieses interessante Thierchen ist eine Entdeckung des Herrn Prof. Dr. Rosenhauer in Erlangen, von welchem ich schon vor vielen Jahren das erste Exemplar gütigst mitgetheilt erhielt.

Der Cephalothorax und alle mit demselben verbundenen Theile bräunlichgelb; die Copulationsorgane des Männchens braun; Abdomen grauweiss, Epigyne braun; die Spinnwarzen grauweiss; bei einzelnen Exemplaren erscheint das Abdomen oben blassgrau gefleckt.

Femina.

Der Cephalothorax dem Umrisse nach breit-oval, glänzend, fein erhaben netzartig, mit einzelnen Körnchen, welche ein kurzes Härchen tragen, bestreut; in der Mittellinie des Kopftheiles sind diese Körnchen in eine Längsreihe geordnet. Der Brusttheil in den Seiten gerundet, an der hinteren Abdachung etwas eingedrückt. Der Kopf oben und seitlich sehr stark, fast kugelig gewölbt. Der Clypeus so hoch, als die Breite einer Mandibel an ihrer Basis beträgt, schräg nach vorn abgedacht, unterhalb der Augen nicht eingeschnürt; ziemlich reichlich mit Körnchen, welche ein kurzes Härchen tragen, besetzt.

Die vier MA an den Ecken eines vorn sehr verschmälerten Trapezes stehend; die vorderen sehr klein und flach, an manchen Exemplaren kaum bemerkbar, von einander dreimal so weit als ihr Durchmesser beträgt, vom Rande des Clypeus aber mehr als noch einmal so weit, als von den hinteren MA entfernt; letztere sind grösser und stehen von einander und den vorderen in gleicher Entfernung. Die SA oval, grösser als die übrigen, an einer leichten Erhöhung etwas schräg gegen einander gestellt, dicht beisammen. Die hintere Augenreihe, von oben betrachtet durch Zurückstehen der MA gebogen (*procurva*).

Die Mandibeln lang, nach hinten gedrückt, von der Mitte ihrer Länge an divergirend, beträchtlich dicker als die Vorder-schenkel, glänzend, fein netzartig, mit einzelnen feinen Borsten besetzt. Die Krallen lang, stark gebogen, am vorderen Falzrande drei Zähne, von welchen der unterste etwas gekrümmt ist; am hinteren Rande des Klauenfalzes nur zwei sehr kleine Zähne.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, gerade vorwärts gerichtet, am vorderen Ende innen mit einem dichten schwarzen Haarbüschel. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, beträchtlich breiter als lang; der Vorderrand hoch und breit gewulstet.

Das Sternum herzförmig, gewölbt, sehr glänzend, weitmaschig netzartig, mit einzelnen groben Körnern, auf welchem eine lange feine, schwarze Borste sitzt, bestreut.

Die Palpen dünngliederig, lang, das Femoralglied mit sehr starker Kopfkrümmung, das Tibial- und Tarsalglied mit langen, kräftigen Borsten reichlich besetzt. — Keine Kralle am Ende des Tarsalgliedes.

Die Beine dünngliederig; das erste und zweite Paar von gleicher Länge, das vierte etwas länger; das dritte Paar ist das kürzeste. Die Schenkel sind oben, jedoch nur ganz unbedeutend gewölbt; an jenen des ersten Paares oben, etwas oberhalb der Mitte und an der Vorderseite noch weiter gegen die Spitze zu je ein Stachel, an jenen des zweiten oben über der Mitte ein Stachel; die Schenkel des dritten und vierten Paares haben keine Stacheln; an der Spitze der Patellen ein sehr langer feiner Stachel, ebenso sind auch die Tibien mit langen dünnen Stacheln besetzt, — die sämtlichen Metatarsen wehrlos. — Die Krallen an den Tarsen lang, wenig gekrümmt, mit einer dichten Reihe kurzer Zähnen, welche jedoch nicht weit über die Mitte der Länge hinausreicht, besetzt. Die Afterkralle lang, stark gebogen, am Ende sehr spitz, mit einem sehr kleinen Zähnen.

Das Abdomen eiförmig, etwas fettig glänzend, mit einzelnen Körnchen, welche ein kurzes, weisses Härchen tragen, bestreut. Die Spinnwarzen sehr kurz. —

Körperlänge: 0^m 002, Länge des Cephalothorax: 0^m 001.

Mas.

Der Cephalothorax wie bei dem Weibchen; der Kopftheil etwas reichlicher behaart; das Abdomen schmaler, im Umrisse elliptisch; die Beine etwas länger, jedoch in demselben Verhältnisse, wie bei den Weibchen. Das Femoralglied der Palpen mit

schwacher Kopfkrümmung, von der Basis an allmählich verdickt, das Patellarglied so lang als dick, das Tibialglied glockig, die Decke der Copulationsorgane nach Innen gedrückt, lang behaart, der äussere (vordere Rand) an der vorderen Hälfte leicht ausgeschnitten. Länge des Männchens: 0^m 002.

Im September findet man beide Geschlechter entwickelt; Weibchen übrigens auch schon bei den Eiersäcken, diese sind weiss, rund, durch ein dichtes Gewebe gebildet.

Erst ziemlich tief in den Höhlen wird man diese Art gewahr; sie macht dort, ähnlich den übrigen kleinen Arten dieses Genus ein kleines Gespinnst in den Aushöhlungen der Tropfsteine, wie auch am Boden.

Sie scheint in vielen Höhlen der Muggendorfer Thäler vorzukommen; ich erhielt Exemplare aus der Schönstein-, der Rosenmüllers- und Gaillenreuter Höhle, am häufigsten findet sie sich in der Rosenmüllers Höhle; in den Höhlen der Hersbrucker Gegend konnte sie, trotz aufmerksamen Nachforschens noch nicht bemerkt werden. — In der schwäbischen Alb wurde sie von Herrn Professor Leydig in der Falkensteiner Höhle bei Urach gesammelt. — Auch Herr Dr. Thomas in Ohrdruff beobachtete diese Species in den Muggendorfer Höhlen. Dieses interessante Thierchen bildet höchst wahrscheinlich für sich eine eigne Gattung, seine Augenstellung, der eigenthümlich hoch gewölbte Cephalothorax, der Mangel einer Krallen an dem Tarsalgliede der weiblichen Palpen, alles dies sind Merkmale, welche sich bei dem Genus *Linyphia* nicht vorfinden.

3. *Linyphia troglodytes*. n. sp.

T. 1. F. 6. Männliche Palpe. F. 7. Die Copulationsorgane. F. 8. Epigyne.

Femina.

Der Cephalothorax, die Palpen und Beine, Mandibeln, Maxillen und Lippe bräunlichgelb oder blassgelb, das Sternum bräunlichgelb, schwärzlich angelaufen, das Abdomen oben grau-

gelb oder grauweiss, mit einer Reihe von schwärzlichen Querstreifen, von welchen die vordersten in der Mitte durchbrochen sind, die nächsten bilden einen Winkel, dessen Spitze nach vorn gerichtet ist, die hintersten sind gerade. Diese Querstreifen nehmen nach hinten an Breite nur wenig ab, verschwinden jedoch häufig ganz. Die Unterseite und ein Ring in dem Spinnwarzen dunkelgrau; letztere bräunlichgelb oder blassgelb. Die Epigyne braungelb.

Mas.

Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt und gezeichnet; die Palpen sind bräunlichgelb oder blassgelb, die Copulationsorgane braungelb, einzelne Theile derselben schwarzbraun.

Femina.

Der Cephalothorax dem Umrisse nach oval, ziemlich hoch, glänzend, fein netzartig, vom Hinterrande schräg ansteigend, an der seitlichen Abdachung des Brusttheiles etwas gewölbt. Der Kopftheil durch schwache Impressionen seitlich vom Thorax abgesetzt, oben und in den Seiten leicht gewölbt, höher als der Brusttheil. An der hinteren Abdachung des Cephalothorax ein kurzer Längseindruck. Der Clypeus c. $1\frac{1}{2}$ mal so hoch als das Patellarglied der Palpen lang ist.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der MA etwas gebogen (recurva); die MA rund, kleiner als die SA, kaum weiter als in ihrem Halbmesser von einander, von den SA noch einmal so weit entfernt. Letzere oval, wenigstens noch einmal so gross als die MA, mit den hinteren SA an einem gemeinschaftlichen Hügelchen; letztere so gross als die vorderen, an diese anstossend, von den hinteren MA so weit als die vorderen SA von den vorderen MA entfernt. Die hintere Reihe, von Oben betrachtet, fast gerade, breiter: die MA rund, so gross als die SA, von einander weiter als von den SA und etwas weiter als in ihrem Durchmesser entfernt; von der vorderen MA merklich weiter als von einander abstehend.

Die Mandibeln nach hinten gedrückt, an der Basis etwas gewölbt, so lang als das Patellar- und Tibialglied der Palpen zusammen, wenig divergirend, spärlich behaart. Die Krallen mässig lang, stark gekrümmt.

Die Maxillen gewölbt, schräg an die Lippe angelehnt, aussen leicht gerundet, mit langen Borsten spärlich besetzt. Die Lippe nicht so lang als breit, sehr kurz, halbkreisförmig.

Das Sternum breit herzförmig, etwas gewölbt, fein erhaben netzartig.

Das Abdomen dem Umrisse nach eiförmig, hochgewölbt, etwas fettig glänzend, mit angedrückten Härchen, welche in den Seiten dichter stehen und hier auch länger sind, leicht bewachsen.

Die Beine lang, sehr gracil, das erste, zweite und vierte Paar fast gleichlang, das dritte kürzer; am Femur des ersten Paares vorn, etwas über der Mitte, ein langer Stachel, die übrigen Schenkel unbewehrt; alle Patellen mit einer sehr langen Stachelborste am Ende; an den Metatarsen des zweiten und dritten Beinpaares etwas unterhalb der Mitte ein Stachel.

Körperlänge 0^m002, Länge des Cephalothorax: 0^m00075.

Mas.

Cephalothorax und Augenstellung wie bei dem Weibchen; die Mandibeln länger, an der Spitze etwas auswärts gebogen; das Abdomen kleiner und schmaler; die Längenverhältnisse der Beine und die Bestachelung derselben, wie bei dem anderen Geschlechte: das Femoralglied der Palpen von der Basis bis zum Ende ziemlich gleichdick, das Patellarglied etwas länger als breit, am Ende oben mit einer langen Borste, der Tibialtheil höchstens so lang als dick, oben in der Mitte mit einer Borste, welche noch länger als jene des Patellargliedes ist. —

Aus der Rosenmüllershöhle, — entwickelte Männchen und Weibchen Anfangs September.

4 *Linyphia collina* n. sp.

T. I. F. 9. Männliche Palpe. F. 10. Epigyne. F. 11. Mandibeln des Männchens. F. 12. Mandibeln des Weibchens.

Femina.

Cephalothorax braungelb, am Seitenrande breit schwarz gesäumt, mit einem schwarzen Mittellängsstreifen, welcher vom Hinterrande abgeht und bis zu den hinteren MA reicht, auf dem Kopftheile aber eine Gabel bildet und weniger intensiv gefärbt ist. Mandibeln braungelb, gegen das Ende etwas lichter gelb. Maxillen und Lippe braungelb, am Vorderrande gelblichweiss. Das Sternum hellbräunlichgelb, bei einzelnen Exemplaren mehr oder weniger schwarz angelaufen. Das Abdomen oben schmutzig gelbbraun, zunächst der Basis ein schwarzer Bogenfleck, von welchem ein schwarzer Längsstrich abgeht, welcher jedoch kaum bis zur Mitte reicht und von welchem zwei Bogen abgehen, welche an ihren beiden Enden zu schwarzen Fleckchen erweitert sind; hinter diesen zwei schwarzen Laubfleckchen, welche in der Mittellinie zusammenstossen und an ihren seitlichen Enden in schräge Linien, nach den Seiten herabziehend, sich verlängern; hinter diesen Laubfleckchen eine Reihe von Winkelflecken, welche nach hinten an Breite abnehmen. Die Zwischenräume zwischen diesen Zeichnungen weiss gesprenkelt. In den Seiten schräge schwarze Striche. Die Unterseite mit einem schwarzen, beiderseits bräunlich gesäumten Längsstreifen, welcher vorn, die Epigyne seitlich umfassend, breiter beginnt und nach hinten verschmälert zuläuft; derselbe ist durch eine weisse Längslinie getheilt; vor den Spinnwarzen ein schwarzer Querstreifen, in diesem zwei weisse Punktflecken. Die Epigyne und die Spinnwarzen gelbbraun. Das Femoralglied der Palpen bräunlichgelb, mit einem schwarzen Ringe in der Mitte; das Patellar- und Tibialglied bräunlichgelb; am Ende schwärzlich angelaufen; der Tarsaltheil gelbbraun mit einem bräunlichgelben Ringe an der Basis. Die Beine braungelb; die Schenkel mit zwei schwarzen, breiten Ringen; die Patellen am Ende schwarz angelaufen; die Tibien

und Metatarsen mit zwei schwarzen, breiten Ringen, einem in der Mitte und einem am Ende.

Mas.

Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt und gezeichnet, nur sind die Ringe an den Beinen weniger deutlich, jene an den Schenkeln der beiden Vorderpaare fehlen zuweilen ganz.

Femina.

Der Cephalothorax länglich, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert, zwischen den Beinen des zweiten Paares am breitesten, glänzend, fein netzartig. Der Brusttheil gewölbt, mit länglicher, tiefer Grube hinter dem Kopfe, mit einzelnen groben, ein langes Haar tragenden Körnern bestreut. Der Kopftheil oben und seitlich leicht gewölbt, nicht höher als der Thorax, von diesem in beiden Seiten durch eine Furche deutlich abgesetzt, reichlicher mit langen, vorwärts gerichteten, auf Körnchen sitzenden Haaren, welche in Längsreihen geordnet sind, besetzt. —

Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe tief eingeschnürt, schräg nach vorn abgedacht. —

Die Augen stark gewölbt; die vordere Reihe, von vorn gesehen, gerade; die MA rund, etwas kleiner als die SA, höchstens in ihrem Halbmesser von einander, von den SA in ihrem Durchmesser entfernt. Letztere mit den hinteren SA an einem stark hervortretenden Hügelchen, oval, an die hinteren fast anstossend. Die hintere Augenreihe, von oben gesehen durch das Zurückstehen der SA gebogen (*recurva*), die Augen gleich weit von einander entfernt; die MA rund, grösser als alle übrigen, von den vorderen MA merklich weiter, als von einander abstehend. Die hinteren SA oval, so gross als die vorderen.

Die Mandibeln etwas nach hinten gedrückt, vorn herab leicht gewölbt, länger als das Tibialglied der Palpen, so dick als die Vorderschenkel an ihrer Basis, glänzend, fein netzartig, mit auf Körnchen sitzenden Borstchen spärlich besetzt, etwas divergirend. Die Krallen mässig lang, stark gekrümmt; am vor-

deren Falzrande drei kräftige Zähne, am hinteren vier sehr kurze, gleichlange, schwache Zähnchen. Die Maxillen stark gewölbt, gerade vorwärts gerichtet, aussen gerundet. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, mit gerundetem, stark gewulstetem, sehr glattem und glänzendem Vorderrande.

Das Sternum herzförmig, flach, mattglänzend, sehr fein netzartig, mit grossen, eine lange Borste tragenden Körnern weitschichtig bestreut.

Das Abdomen hochgewölbt, dem Umrisse nach spitz-eiförmig, vorn und in den Seiten gerundet, hinten spitz zulau fend, fast glanzlos, mit kürzeren Haaren und langen Borsten reichlich bewachsen.

Die Spinnwarzen kurz. — Die Epigyne sehr glänzend, stark prominirend. Die Palpen dünngliederig, das Femoralglied mit schwacher Kopfkrümmung an der Basalhälfte, am Ende des Patellargliedes eine lange Borste; das Tibialglied vorn mit drei solchen Borsten; das Tarsalglied am Ende spitz, reichlich mit langen Borsten besetzt.

Die Beine glänzend, spärlich behaart; die Stacheln sehr fein, borstenartig. Die Schenkel gegen das Ende an Dicke abnehmend, unten mit langen Haaren besetzt, jene des vierten Paares mit starker Abdominalkrümmung; an den Schenkeln des ersten Paares vorn zwei Stacheln, die übrigen sind unbewehrt. — An den Metatarsen des ersten Paares oben 4 Stacheln in einer Längsreihe, welche sich fast bis zum Ende des Gliedes erstreckt; im ersten Drittheile beiderseits ein Stachel und etwas vor diesen an der Unterseite ein Stachel; an den Metatarsen des zweiten, dritten und vierten Paares oben je zwei Stacheln, einer zunächst der Basis und einer jenseits der Mitte, zwischen beiden zwei seitliche Stacheln.

Länge des Cephalothorax: $0^m 002$, das Abdomen $0^m 0025$, eines Beines des ersten Paares: $0^m 012$, des zweiten oder vierten: $0^m 011$, des dritten: $0^m 008$.

Mas.

Der Cephalothorax wie bei dem Weibchen, doch ist der Kopftheil mehr erhöht; der Clypeus höher und wenig schräg abgedacht; die Augen der vorderen Reihe etwas weiter auseinander gestellt; die MA weiter als in ihrem Halbmesser von einander und von den SA weiter als in ihrem Durchmesser entfernt; die Distanzverhältnisse der hinteren Reihe und die Grösse der Augen wie bei dem Weibchen. Die Mandibeln mit ihren Spitzen etwas mehr auseinander weichend. Das Abdomen dem Umriss nach spitzeiförmig, so breit als der Cephalothorax. Das Femoralglied der Palpen mit starker Kopfkrümmung an der Basis; das Patellarglied so lang als dick, mit zwei starken, langen, gekrümmten, in eine sehr feine Spitze auslaufenden Borsten oben an ihrem vorderen Ende. Das Tibialglied trägt an seiner Oberseite einen geraden, aufwärts stehenden, am Ende abgerundeten Fortsatz, welcher vorn an seiner Basis ein kleines Höckerchen hat und länger als das Glied selbst ist. Die Beine länger als beim Weibchen, am Femur des ersten Paares vorn ein Stachel in der Mitte, an allen Metatarsen oben 1.1 Stacheln, zwischen diesen seitlich je ein Stachel.

Länge des Cephalothorax: 0^m002, des Abdomen: 0^m0025, eines Beines des ersten Paares: 0^m0135, des zweiten oder vierten: 0^m0125, des dritten: 0^m009.

Linyphia collina hat mit *Lin. thoracica* Wid. grosse Aehnlichkeit; bei letzter Art ist jedoch der schwarze Randsaum des Cephalothorax schmaler und der dunkle Mittellängsstreifen desselben reicht nicht bis zu den Augen und ist auf dem Kopftheile nicht gabelig getheilt, sondern einfach erweitert; die vorderen MA sind so gross als die SA; die Zeichnung des Abdomen ist bei beiden Arten wesentlich verschieden, der weisse Flecken vor den Spinnwarzen ist bei *Lin. thoracica* grösser und dreitheilig; die Schenkel des Weibchens dieser Art sind stämmiger; das Sternum zeigt keine Körner und dessen Oberfläche ist nicht netzartig; ausserdem sind die Sexualorgane beider Arten wesentlich verschieden gestaltet.

Vorkommen: unter Steinen bei Happurg und Hartmannshof; beide Geschlechter entwickelt von Mitte bis Ende August.

5. *Erigone globipes* n. spec.

T. I. F. 13. Männliche Palpe. F. 14 ein Bein des ersten Paares
F. 15. Augenstellung von vorn gesehen. F. 16. Seitenansicht des
Cephalothorax.

Cephalothorax und Abdomen schwarz, letzteres greis behaart, die Beine gelbbraun, das Metatarsalglied des ersten Paares schwarz. — Das Femoral- und Patellarglied der Palpen gelbbraun; der Tibialtheil, die Decke der Copulationsorgane und letztere selbst schwarzbraun.

Der Cephalothorax glatt, sehr glänzend, dem Umrisse nach oval; der Brusttheil seitlich steil abgedacht, vom Hinterande bis zur Höhe des Kopftheiles schräg ansteigend. Der Kopf sehr hoch, oben kugelig gewölbt, unterhalb der Wölbung, welche die beiden hinteren MA trägt, vorn der Quere nach tief eingeschnürt und unter der vorderen Augenreihe der Quere nach ebenfalls, jedoch kaum bemerkbar eingedrückt. Der Clypeus höher als die Länge der Mandibeln beträgt, etwas schräg nach vorn abgedacht, dabei bauchig gewölbt, glatt, glänzend, kahl.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA gebogen; die Augen in gleicher Entfernung von einander, die MA sehr klein, kleiner als alle übrigen, rund; die SA oval, gross, in ihrem Durchmesser von den MA entfernt, an die hinteren SA anstossend, schräg gegen diese gestellt; die hinteren SA ebenfalls oval, so gross als die vorderen. An der vorderen Wölbung der Kopfhöhe stehen die beiden hinteren MA, sie sind rund, etwas kleiner als die SA und stehen weiter als in ihrem Durchmesser von einander entfernt.

Die Mandibeln nach hinten gedrückt, so dick als die Vorderchenkel, kürzer als die vordersten Patellen, glänzend, etwas quer gerunzelt, mit sehr kurzen, feinen Härchen spärlich besetzt.

Das Sternum breit-herzförmig, hochgewölbt, glänzend, glatt, mit langen Haaren sehr weitschichtig besetzt.

Das Abdomen dem Umrisse nach eiförmig, etwas fettartig glänzend, mit langen abstehenden Haaren reichlich bewachsen. —

Das Femoralglied der Palpen so lang als die vordersten Patellen; der Patellar- und Tibialtheil gleich lang, letzterer an seinem Ende breiter, und vorn mit einem kegelförmigen, vorwärts gerichteten, am Ende abgestutzten Fortsatz, an dessen Basis innen ein kürzerer Zahn. Die Decke gewölbt, in den Seiten wenig gerundet, vorn abgestutzt, mit langen Haaren reichlich bewachsen.

Die Beine kurz behaart; die Schenkel an der Unterseite mit einer Doppelreihe von Stachelborsten, jene am Femur des ersten Paares länger und dicker. Das Metatarsalglied des ersten Paares von länglich eiförmiger Gestalt, fein runzelig uneben, an der Unterseite mit längeren Haaren besetzt, sonst kurz behaart.

Länge des Cephalothorax: 0^m0005, das Abdomen: 0^m001.

Diese durch die Bildung der Metatarsen des ersten Beinpaars ausgezeichnete Species, eine der interessantesten unter den merkwürdigen Arten des Genus *Erigone* kömmt im Pegnitzthale bei Neuhaus vor, — sie lebt an Graswurzeln in nassen Wiesen und ist Anfangs Mai geschlechtsreif.

***Prothesima* n. g.**

Melanophora (C. Koch, Westr. Simon. Thor. L. Koch), *Drassus* Walck. (ad partem) *Filistata* Reuss (ad partem) *Drassus* Blackw. (ad partem).

Meigen gibt im VII. Bande seiner „system. Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insekten“ einem Dipterengenus den Namen *Melanophora*, was mir, als ich das gleichnamige Genus in meinen „Drassiden“ bearbeitete, wohl bekannt war. Da der erwähnte Band des Meigen'schen Werkes 1838 erschienen war und Meigen im 4. Bande desselben (1824 herausgegeben) die betreffenden Arten noch zu *Tachina* zählt, konnte ich keinen Anstand nehmen, das von C. Koch 1833 creirte Genus *Melanophora* für die Arachniden beizubehalten. Erst durch Schiner (*Fauna austriaca*, die Fliegen Bd. I p. 552) wurde

ich aufmerksam gemacht, dass Meigen in „Illigers Magaz.“ schon im Jahre 1803 die Gattung *Melanophora* aufgestellt habe. Letzteres Werk stand mir nicht zur Verfügung, wesshalb ich mich an Herrn Dr. Kriechbaumer in München wandte und durch dessen Güte folgende Aufklärung erhielt: „Meigen hat im 2. Bande von Illigers Magazin unter dem Titel „Versuch einer neuen Gattungseintheilung der europ. zweiflügeligen Insekten“ als Vorläufer seines späteren Werkes 114 Gattungen von Zweiflüglern charakterisirt und dazu 1 oder mehrere Arten als Beispiele angegeben. Unter diesen Gattungen findet sich auch (p. 279) die Gattung *Melanophora* und als dazu gehörige Art die *Musca grossificationis* F., eine Art, die auch heutzutage zur genannten Gattung gerechnet wird. Wenn nun auch Meigen seine eigene Schöpfung eine Zeit lang ignorirte, so war sie doch einmal da und wurde später ohne Aenderung angenommen; die Dipterologen werden sich daher diesen Namen nicht mehr entreissen lassen.“ — Nachdem nun constatirt ist, dass Meigen die Priorität zusteht, ist es unabweislich, dem bisherigen Arachnidengenus *Melanophora* einen neuen Namen zu geben; — wir wählten die Bezeichnung *Prothesima*, weil sie sich auf ein wesentliches, bisher noch nicht erwähntes Merkmal dieser Gattung stützt. Während nämlich bei *Drassus* die Palpen an der Mitte der Maxillen, manchmal auch schon vor derselben, resp. näher der Basis inserirt sind, erscheinen dieselben bei *Prothesima* jenseits der Mitte eingefügt; die Impression der Oberfläche der Maxillen findet sich bei diesem Genus sehr weit vorn, wodurch diese Theile auffallend anders als bei *Drassus* geformt erscheinen. Die hintere Augenreihe ist bei manchen Arten breiter als die vordere und daher dieses Merkmal nicht charakteristisch für die Gattung.

6. *Prothesima vernalis* n. spec.

T. 1. F. 17. Aussenseite einer männlichen Palpe. F. 18. Die Copulationsorgane. F. 19. Epigyne.

Femina.

Der Cephalothorax dunkelbraungelb, schwarz marmorirt, sehr glänzend, glatt, so lang als Pat. c. Tibia eines Beines des

vierten Paares, in der Mitte breiter als Tibia IV lang, dem Umriss nach oval, oben fast gerade, in die Seiten mit leichter Wölbung schräg abgedacht, licht mit feinen Härchen besetzt. Die Mittelritze kurz, Kopf und Brusttheil nicht von einander abgesetzt.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA stark gebogen (*procurva*); die MA an einer Hervorwölbung, in ihrem Durchmesser von einander entfernt, an die SA fast anstossend; letztere oval, bedeutend grösser. Die hintere Reihe von oben betrachtet gerade, etwas breiter als die vordere; die MA flach, grösser als alle übrigen, an einander stossend, von den seitlichen nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennt. Die SA so gross als die vorderen SA, von diesen etwas weiter als in ihrem Halbmesser entfernt.

Die Mandibeln an der Basis stark gewölbt, etwas nach hinten gedrückt, braungelb, vorn mit zwei schwarzen Längsstrichen, glänzend, der Quere nach sehr fein gerunzelt, reichlich mit kürzeren und längeren abstehenden Haaren besetzt, nur wenig divergirend.

Das Sternum ei-herzförmig, sehr glänzend, glatt, licht behaart, ohne seitliche Impressionen, schwarz.

Das Abdomen schwarz, etwas blau-roth schillernd, licht mit graugelben, angedrückten Haaren bedeckt, vorn und hinten abgerundet, in der Mitte am breitesten, $2\frac{1}{2}$ mal so lang als breit.

Die Palpen bräunlichgelb, das Femoralglied mit schwacher Kopfkrümmung; der Patellar- und Tibialtheil fast gleichlang.

Die Spinnwarzen braungelb, schwarz angelaufen.

Die Beine bräunlichgelb mit röthlichen Metatarsen und Tarsen; die Schenkel des ersten Paares oben und an der Spitze, die Patellen und Tibien der beiden Vorderpaare ganz schwarz angelaufen; die Schenkel, Patellen und Tibien der Hinterpaare an den Gelenkenden schwarz. An den Tarsen des ersten und zweiten Paares unten eine sehr lichte Scopula. Das vierte Paar um seinen Metatarsus länger als das erste.

Länge des Cephalothorax: 0^m002, des Abdomen: 0^m0025, eines Beines des ersten Paares: 0^m005, des zweiten: 0^m0045, des dritten: 0^m004, des vierten: 0^m006.

Mas.

Der Cephalothorax dunkler gefärbt und gleichmässig schwarz angelaufen; die Schenkel der beiden Vorderbeinpaare oben ganz, jene der Hinterpaare an der Spitze schwarz angelaufen; auch die Patellen und Tibien des zweiten und dritten Paares erscheinen schwärzlich.

Cephalothorax und Augenstellung wie bei dem Weibchen; die Mandibeln graciler, etwas stärker divergirend, an der Basis weniger gewölbt; das Sternum wie bei dem Weibchen. Das Abdomen mit einem glänzenden, dreieckigen Chitinschildchen an der Basis. — Patellar- und Tibialglied der Palpen gleichlang, letzteres vorn an seiner Aussenseite mit einem stark aufwärts gebogenen, kurzen, am Ende spitzen Fortsatze; die Decke der Copulationsorgane spitz-eiförmig, ziemlich dicht behaart. Scopula wie beim Weibchen. Das vierte Beinpaar um seinen Tarsus länger als das erste.

Länge des Cephalothorax: 0^m002, des Abdomen: 0^m002, eines Beines des ersten Paares: 0^m005, des zweiten: 0^m0045, des dritten: 0^m004, des vierten: 0^m0055.

Bei Happurg an sonnigen Abhängen unter Steinen; beide Geschlechter entwickelt Anfangs Mai.

Von *Prothesima lutetiana* und *violacea* leicht durch die anders gefärbten Beine, den braungelben Cephalothorax und die braungelben Mandibeln zu unterscheiden; auch ist das vierte Beinpaar merklich länger als bei den eben genannten Arten.

7. *Agroeca proxima* Cambr.

T. II. F. 20. Seitenansicht einer männlichen Palpe. F. 21. Die Copulationsorgane. F. 22. Die Epigyne,

Agelena proxima Cambr. Descript. of some British spiders new to science in Transactions of the Linnean Society of London vol. XXVII. p. 415. Pl. 54. n. 13.

Beide Geschlechter sind gleich gefärbt und gezeichnet.

Der Cephalothorax röthlichgelb, gelblichweiss behaart; am Seitenrande schmal schwarz gesäumt; am Kopftheile zwei vom Hinterwinkel desselben bis zu den hinteren SA sich erstreckende schwarze Bogenlinien; an der Seitenabdachung des Brusttheiles drei schwarze Striche, welche an ihrem unteren Ende umgebogen sind. Die Mandibeln röthlichgelb; die Maxillen und die Lippe hellbräunlichgelb; das Sternum röthlichgelb, weiss behaart; das Abdomen oben röthlichbraun, goldgelb behaart, mit zwei Paar schwarzen Fleckchen an der vorderen Hälfte, an der hinteren eine Längsreihe schwarzer Winkelstriche; die Unterseite ist bräunlichgelb, gelblichweiss behaart. — Die Spinnwarzen röthlichgelb. Die Palpen des Weibchens bräunlichgelb mit stärker gebräuntem Tarsalgliede. Die Beine röthlichgelb, goldgelb behaart.

Femina.

Der Cephalothorax kürzer als Patella und Tibia eines Beines des letzten Paares zusammen, nicht so breit als Tibia IV lang, dem Umrisse nach oval, oben fast gerade, nur am Kopftheile hinter den Augen leicht gewölbt, nach den Seiten ziemlich steil abgedacht, fast glanzlos, licht mit kurzen, anliegenden, einfachen Haaren bedeckt; die Mittelritze lang. Kopf- und Brusttheil gehen unmerklich in einander über.

Die Augen rund; die vordere Reihe derselben durch Tieferstehen der SA gebogen (*procurva*), die Augen dieser Reihe einander sehr genähert, gleichgross und gleichweit von einander

abstehenden Borsten licht besetzt.

Die Maxillen stark gewölbt, ohne Quereindruck, vorn an der Aussenseite gerundet. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, gewölbt, vorn etwas verschmälert und gerade abgestutzt.

Das Sternum breit-herzförmig, fast kreisrund, wenig gewölbt, licht mit einfachen Haaren bedeckt; am Seitenrande längere abstehende Borsten. —

Das Abdomen dicht mit anliegenden, glänzenden Federhärchen bedeckt, vorn und in den Seiten gerundet, hinten etwas spitz zulaufend. Die Unterseite mit einfachen Haaren bedeckt. — Das Femoralglied der Palpen gebogen, seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt, oben in der Mitte ein Stachel am Ende zwei; das Patellar- und Tibialglied sind gleichlang.

Die Beine mit gefiederten, anliegenden Haaren ausser der gewöhnlichen Behaarung bedeckt; die Schenkel oben gewölbt; keine Scopula.

Länge des Cephalothorax: 0^m0025, das Abdomen 0^m004.
eines Beines des ersten, zweiten oder dritten Paares: 0^m0065.
des vierten: 0^m0085.

Mus.

Diese Art
Steinen im frä
September, spä
im Süden Tirols
sor Canestrini
zolo im Sarkath
sie durch Rev^d.

Agroeca
C. Kch. und kan
ist jedoch beträ
dass die hintere
entfernt sind, a
des grössern Ab
tere Augenreihe
organe beider A

Agroeca
European Spider
nach der sehr
Geschlechter kan
einerlei sei. —

Ich erhi

Patellar- und Tibialglied sind gleichlang; letzteres aber ist merklich dünner, vorn an der Aussenseite desselben ein kurzer, absteigender, etwas gebogener, am Ende spitzer Fortsatz. Die Decke der Copulationsorgane gewölbt, spitz-eiförmig.

Länge des Cephalothorax: 0^m0025, des Abdomen: 0^m0037, eines Beines des ersten Paares: 0^m 007, des zweiten: 0^m 0065, des dritten: 0^m 006, des vierten: 0^m 009.

Diese Art ist weit verbreitet; ich fand sie zuerst unter Steinen im fränkischen Jura bei Hartmannshof entwickelt im September, später bei Nürnberg auf der Grütz (Ende August); im Süden Tirols scheint sie nicht selten zu sein; H. Professor Canestrini sammelte sie bei Trient; ich selbst bei Pinzolo im Sarkathal (Anfangs September); aus England erhielt ich sie durch Rev^d. O. P. Cambridge.

Agroeca proxima hat grosse Aehnlichkeit mit *Agr. linotina* C. Kch. und kann sehr leicht mit dieser verwechselt werden; sie ist jedoch beträchtlich kleiner und leicht daran zu erkennen, dass die hinteren und vorderen MA weniger weit von einander entfernt sind, als bei *Agr. linotina*; bei dieser erscheint wegen des grössern Abstandes der vorderen und hinteren MA die hintere Augenreihe weit stärker gebogen; übrigens sind die Sexualorgane beider Arten wesentlich verschieden gestaltet.

Agroeca Haglundii Thorell (Remarks on Synonyms of European Spiders Nr. 2 p. 162) ist eine mir unbekannte Art; nach der sehr genauen Beschreibung der Sexualorgane beider Geschlechter kann ich nicht annehmen, dass sie mit *Agr. proxima* einerlei sei. —

Ich erhielt die oben citirte Abhandlung, in welcher *Agr. proxima* zuerst veröffentlicht wurde, erst nachdem die Tafeln zum gegenwärtigen Schriftchen bereits gestochen waren; ich hätte es sonst für überflüssig gehalten, diese Art hier noch einmal vorzuführen.

Trachelas. L. Koch.

T. II. F. 23. Maxillen und Lippe. F. 24. Augenstellung. F. 25 und 26. Tarsenklaunen. F. 27. Klaunen der weiblichen Palpen.

In meinem Werke „die Arachniden-Familie der Drassiden“ (leider noch nicht vollendet, weil der Verleger sich nicht entschliessen wollte, die Herausgabe eines zweiten Bandes zu übernehmen), ist p. 2 ein neues Genus unter dem Namen „Trachelas“ aufgeführt, jedoch desselben nur mit wenigen Worten in der vorausgeschickten analytischen Tabelle erwähnt. Ich kannte damals nur zwei Arten, eine aus Nordamerika (*Trachelas scabriceps*), die andere aus Neugranada stammend (*Tr. nigricans*); später erhielt ich eine dritte Species (*Tr. minor*), zuerst von Rev^d. O. P. Cambridge aus Palästina und Spanien, dann dieselbe auch von Prof. Canestrini aus der Umgegend von Venedig. Sehr überrascht war ich, vor einigen Jahren bei Happurg im fränkischen Jura ein junges Thierchen dieser Gattung zu entdecken; bald darauf erhielt ich ein entwickeltes weibliches Exemplar durch Herrn Professor Rosenbauer ebenfalls aus unserem Juragebiete und erst diesen Herbst war ich so glücklich, dieselbe Art im südlichen Tirol zu finden.

Dass dieses Genus zu den Drassiden zu rechnen sei, ist unzweifelhaft, die nachfolgende Charakteristik desselben wird den Beweis dafür bringen. Warum Canestrini und Pavesi (*Catalogo sistematico degli Araneidi Italiani* p. 13) veranlasst waren, dasselbe in die Therididen einzureihen, ist mir unbekannt. —

Trachelas.

Cephalothorax oben gewölbt, die rauhe Oberfläche mit einfachen Haaren besetzt; eine Mittelritze vorhanden.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA gebogen (*procurva*), die hintere Reihe breiter, durch Zurückstehen der SA gebogen (*recurva*).

Die Mandibeln mit groben Körnern bestreut.

Die Maxillen gewölbt, ohne Impression.

Die Lippe um $\frac{1}{3}$ kürzer als die Maxillen, frei beweglich mit dem Sternum verbunden.

Das Sternum grobgekörnt, mit Eindrücken am Seitenrande, mit einfachen Haaren besetzt.

Das Abdomen mit einfachen Härchen bewachsen.

Das oberste und unterste Paar der Spinnwarzen gleichlang.

Beine bei den Weibchen 4, 1, 2, 3, bei den Männchen 1, 4, 2, 3, ohne Stacheln; eine Scopula ist vorhanden. Die Tarsen mit zwei Krallen.

Die Kralle der weiblichen Palpen ist schwach gekrümmt und mit vier kurzen, vorwärts gerichteten Zähnen versehen.

8. *Trachelas nitescens*. n. spec.

T. II. F. 28. Epigyne.

Cephalothorax schwarzbraun; Mandibeln und Maxillen gelbbraun; die Lippe schwarzbraun, am Vorderrande braungelb; das Sternum gelbbraun; das Abdomen oben und in den Seiten schwarz, mit einem grossen bräunlichgelben Flecken, welcher sich von der Basis bis über die Mitte hinaus erstreckt und einen schwarzen, durch eine gelbliche Längslinie getheilten, hinten spitz zulaufenden Mittellängsstreifen zeigt; die Unterseite schmutzigbräunlichgelb; die Spinnwarzen röthlichbraun. Palpen und Beine röthlichbraun, die Schenkel des ersten und zweiten Beinpaares und die Basis der Tibien und Metatarsen des vierten Paares stärker gebräunt.

Der Cephalothorax mehr als $\frac{1}{2}$ mm länger, als an seiner breitesten Circumferenz breit, vorn mehr als halb so breit als in der Mitte, in den Seiten gerundet, ziemlich hoch, nach hinten und in die Seiten gleichmässig abgedacht, etwas glänzend, runzelig uneben und weitschichtig grob gekörnt; die Körnchen kurz, feine Härchen tragend. Die Absetzung von Kopf und Brusttheil nur schwach angedeutet. Die Mittelritze kurz, aber scharf eingeschnitten.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA schwach gebogen; die MA rund, grösser, in ihrem Halbmesser von einander, von den SA aber nicht so weit, vom Kopfrande weiter, als von den hinteren SA entfernt. Die SA oval, mit dem hinteren SA an einer gemeinschaftlichen Erhöhung, von diesen in ihrem kürzeren Durchmesser entfernt. Die hintere Reihe breiter, durch Tieferstehen der MA, jedoch sehr schwach gebogen (*recurva*), die Augen gleichweit von einander entfernt; die MA flach, fast so gross als die vorderen SA, nicht ganz kreisrund, die SA oval.

Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe etwas zurückweichend, mit einzelnen, langen Borsten besetzt.

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, vorn herab etwas gewölbt, nicht divergirend, glänzend, so lang als die vordersten Patellen und so dick als die Vordersehenkel an der Basalhälfte, gerunzelt und mit groben Körnern, welche eine lange Borste tragen, bestreut. Die Krallen kurz, stark gekrümmt, kräftig.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, in der Mitte des Aussenrandes etwas eingebuchtet, parallel, vorn gerundet, mit langen Borsten besetzt. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, aus breiter Basis verschmälert zulaufend, vorn leicht ausgerandet, frei beweglich mit dem Sternum verbunden.

Das Sternum flach, herzförmig, glänzend, mit schwachen Impressionen am Seitenrande; die Fläche runzelig uneben und mit Körnern, welche ein langes abstehendes Haar tragen, weitschichtig besetzt.

Das Abdomen oben stark seidenartig glänzend, vorn abgestutzt, in den Seiten gerundet, hinten etwas spitz zulaufend, weitschichtig fein vertieft punktirt, in jedem Pünktchen ein kurzes angedrücktes feines Härchen; die Unterseite fast glanzlos.

Die Spinnwarzen kurz, konisch, das oberste und unterste Paar gleichlang.

Das Femoralglied der Palpen mit starker Kopfkrümmung, seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt. Das Pa-

tellarglied länger als breit; der Tarsaltheil länger als das Tibialglied, vorn keulig verdickt, mit kurzen Haaren und Borstchen ziemlich dicht bewachsen.

Das erste Hüftenglied der Beine ziemlich lang. Die Beine selbst etwas weitschichtig granulirt, die Körnchen mit mässig langen, abstehenden Haaren besetzt; an den Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare eine kurze, sehr lichte Scopula; die Spitzen dieser Glieder an den vier hinteren Beinen dichter behaart. -- Keine Stacheln an den Beinen. Die Schenkel der beiden Vorderpaare an der Basis dicker und gewölbt.

Länge des Cephalothorax: 0^m 003, des Abdomen: 0^m 0045, eines Beines des ersten Paares: 0^m 008, des zweiten: 0^m 0075, des dritten: 0^m 006, des vierten: 0^m 008.

Diese interessante Art scheint an verschiedenen Orten des fränkischen Jura vorzukommen, ist jedoch sehr selten; ich selbst klopfte ein unentwickeltes Weibchen von einer Eiche bei Happurg; Herrn Prof. Dr. Rosenhauer verdanke ich ein bei Gräfenberg gesammeltes Weibchen; im August 1871 fing ich ein vollständig reifes Exemplar an einer Mauer bei Kastelruth (Südtirol). Das Männchen ist noch nicht bekannt.

Eschatocephalus Frauenfeld.

Beide nachfolgend beschriebenen Zeckenarten glaube ich mit allem Rechte in die Gattung *Eschatocephalus* Frauenfeld einreihen zu dürfen, wenn auch das anscheinend wichtigste Merkmal an denselben nicht zu bemerken ist.

Die ganze Reihe von Kennzeichen, welche das Genus *Eschatocephalus* von den übrigen Ixodiden absondern und von Frauenfeld (Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien Bd. III Jahrg. 1853 p. 57) in ausführlichster Weise dargestellt wurden, zeigen auch unsere beiden Arten mit der einzigen Ausnahme, dass, während bei *Eschatocephalus gracilipes* Fr. der für die Mundtheile bestimmte Ausschnitt am Vorderrande des Rückenschildes fehlt und diese

Theile senkrecht abwärts gerichtet sind, für dieselben bei unseren Thieren ein leichter Ausschnitt an der erwähnten Stelle besteht und die Mundtheile nicht senkrecht abwärts hängen, sondern etwas schräg nach vorn, dabei aber doch auch abwärts gerichtet sind. Das könnte nun wohl zur Aufstellung eines eigenen Genus verleiten, obwohl ich die Berechtigung dazu sehr bezweifle, denn nach allen sonstigen Gattungscharakteren, — dem Fehlen der Augen, der eigenthümlichen Form der Palpen, den langen, gracilen Beinen, dem hochaufgestülpten Rande des Rückenschildes, wie auch als spezifische Höhlenthierc gehören sie zu *Eschatocephalus*.

Die Beifügung der Beschreibung einer nicht aus den Höhlen des fränkischen Jura stammenden Species glaube ich wird nicht beanstandet werden.

9. *Eschatocephalus Frauenfeldi*. n. spec.

T. 11. F. 29. Die Zecke, stark vergrößert. F. 30. Die Unterseite des Rückenschildes. F. 31. Palpen und Rüssel. F. 22. Tarseaglied eines Beines mit den Klauen.

Der Körper gelbbraun, die Mundtheile, Palpen und Beine braungelb. —

Der Körper dem Umrisse nach elliptisch, hinten gerundet, mit erhöhtem Seiten- und Hinterrande, vorn dem Mundsegmente entsprechend ausgeschnitten, sehr glänzend, glatt, nur Längs des erhöhten Randes (durch Schrumpfung?) gerunzelt, weitschichtig gröber und feiner vertieft punktirt, in jedem Pünktchen ein kurzes, feines Härchen; die Pünktchen vorn längs des Seitenrandes grösser und zahlreicher. —

Das Mundsegment, am todten Thiere abwärts gerichtet, jedoch nicht senkrecht nach unten gerichtet, hat parallel mit dem Hinterrande eine scharfe Querleiste, welche sich an ihren beiden Enden nach vorn umbiegt, die Fläche zwischen den seitlichen Verlängerungen derselben unregelmässig grob vertieft punktirt.

Die Palpen dick, eiförmig, oben gewölbt, höchstens um die Hälfte länger als breit, rings mit feinen Borsten besetzt, welche weit länger sind, als der Durchmesser des Gliedes selbst beträgt. — Der Rüssel so lang als die Palpen.

Die Unterseite wie die obere, aber viel reichlicher und gleichmässiger vertieft punktirt, in jedem Pünktchen ebenfalls ein kurzes Härchen; hinter dem Mundsegmente beginnen zwei, vorn vereinigte, nach hinten divergirende und bis zum Hinterrande reichende, gerundete Längsleisten; der After befindet sich innerhalb des hintersten Dritttheiles der Körperlänge und ist von zwei, vor demselben zu einem Bogen vereinigten feinen Längsfalten umgeben. — Die sogenannten Luftschilde gross, kreisrund; die erhöhte Oeffnung derselben excentrisch, etwas nach unten und vorn gestellt. —

Die ersten Hüftenglieder an der Unterseite wenig gewölbt, der Quere nach grob gerunzelt, an der Basis gerundet, wenig länger als breit; die zweiten Hüftenglieder keulig, die Schenkel, Tibien und Metatarsen gegen das Ende etwas verdickt, seitlich zusammengedrückt. Die Tarsen seitlich zusammengedrückt, jene des ersten Beinpaares eingliederig, die der drei anderen Paare zweigliederig. — Die Beine sind mit kurzen abstehenden Borstchen dünn bewachsen. —

Körperlänge: 0^m 004, Breite: 0^m 0025, Länge eines Beines des ersten oder dritten Paares: 0^m 006, des zweiten: 0^m 05, des vierten: 0^m 0065.

Das eine Exemplar dieser Zecke, welches ich besitze, wurde Anfangs September 1869 in der Rosenmüllershöhle bei Muggendorf gesammelt.

10. *Eschatocephalus* Seidlitzii. n. spec.

Hellgelbbraun mit bräunlichgelben Beinen.

Körper dem Umrisse nach elliptisch, mit erhöhtem Seiten- und Hinterrande, vorn mit sehr schwachem Ausschnitte für die Aufnahme des Mundsegmentes; glänzend, mit sehr vereinzelt

vertieften Pünktchen, in welchem ein kurzes Härchen; die Pünktchen längs der vorderen Krümmung des Seitenrandes nicht zahlreicher.

Das Mundsegment hinten mit einer scharfen Querleiste, welche sich an ihren beiden Enden nach vorn umbiegt, die vordere Fläche etwas runzelig uneben und vertieft punktirt.

Die Palpen keulig, oben gewölbt, dabei an der Innenseite stärker aufgetrieben, mit Borsten besetzt, welche jedoch nicht so lang sind, als der Durchmesser der Palpe beträgt. — Der Rüssel so lang als die Palpen.

Die Unterseite glänzend, mit zwei stark erhöhten, abgerundeten Längsleisten, welche gegenüber dem dritten Beinpaare sich erheben und nach hinten divergirend verlaufen, weitschichtig grobvertieft punktirt, in jedem Grübchen ein kurzes Härchen. Der After im hinteren Dritttheile der Körperlänge, von zwei vorn in einem Bogen vereinigten Längsfalten umgeben.

Die ersten Hüftenglieder an der Basis gerundet, die zweiten kantig; die übrigen Glieder der Beine sehr gracil, an den Gelenkenden etwas aufgetrieben, das letzte Tarsalglied am Ende zugespitzt. Die Tarsen des ersten Beinpaares eingliederig; die der übrigen Beine aus je zwei Gliedern bestehend.

Körperlänge: 0^m 003, Breite: 0^m 002, Länge eines Beines des ersten Paares: 0^m 0065, des zweiten: 0^m 0055, des dritten: 0^m 0055, des vierten: 0^m 007.

Ich erhielt diese Art durch gütige Mittheilung des Herrn Dr. Seidlitz, welcher dieselbe in den Höhlen bei Almas entdeckte. Sie ist kleiner als Esch. Frauenfeldi, hat verhältnissmässig längere Beine, mit Ausnahme der Schenkel sind bei ihr die übrigen Glieder der Beine stielrund, die beiden erhöhten Falten an der Unterseite des Abdomen reichen nach vorn nur bis zum dritten Beinpaare (bei Esch. Frauenfeldi beginnen dieselben hinter den Mundtheilen), die Palpen sind fast keulig (bei Esch. Frauenfeldi eiförmig), die Borsten an denselben höchstens so lang, als die Breite des Gliedes beträgt.

Ueber die Spinnengattung *Titanoeca* Thor *).

Von Dr. L. Koch in Nürnberg.

Das Genus *Titanoeca*, dessen bis jetzt bekannte zwei Arten *Titanoeca quadriguttata* Hahn und *Kochii* Auss. von den früheren Autoren verschiedenen Gattungen (*Theridium*, *Asagena*, *Latrodectus*, *Amaurobius*) beigezählt worden waren, wurde zuerst von Thorell im Jahre 1864 (*On European Spiders* p. 124) aufgestellt. Vorher schon hatte Ausserer (*Die Arachniden Tirols* in den Verhandl. der zool.-bot. Ges. in Wien Jahrg. 1867 p. 163) die Ansicht ausgesprochen, dass die von ihm beschriebene Species (*Amaurobius Kochii*) nicht zu *Amaurobius* gehöre; ich selbst hatte diese Thiere längere Jahre in meiner Sammlung unter das Genus *Dictyna* eingereicht.

Der erste Eindruck, den die Betrachtung dieser Spinnen bewirkt, ist, besonders wenn man verschiedene Arten vor sich hat, der der sicheren Ueberzeugung, dass dieselben zu keinem der bekannten Genera gehören können, dass sie mit *Amaurobius* und *Dictyna* in nächster Verwandtschaft stehen und dass diese Arten gewiss in ein Genus zu vereinigen seien. Diese Thiere haben in allen Körperformen grosse Aehnlichkeit unter einander, die Schlankheit aller Theile bei den Männchen, die mehr gedrungene Gestalt der Weibchen, die eigenthümlich geformten Mandibeln bei ersteren haben sie mit *Dictyna* gemein; die Form und Richtung der Maxillen, die mit Stacheln bewehrten Beine,

*) Leider konnten zur Darstellung dieses interessanten Arachniden-Genus keine Abbildungen gegeben werden; diesem Mangel wurde jedoch durch besonders detaillirte Beschreibung der männlichen Palpentheile abzuhelpen gesucht. —

die von einander entfernt stehenden SA und den Aufenthalt unter Moos und Steinen, sowie die Form ihrer Eiersäcke mit Amaurobius. Bei einer sorgfältigen Untersuchung bieten sich wohl für die Unterscheidung von Titanoeca und Dictyna Merkmale genug; sehr schwierig wird dagegen die Aufgabe, solche für die Absonderung des Genus von Amaurobius zu gewinnen. Thorell (loc. cit.) kannte nur Weibchen und junge Männchen, und hielt sich, was die entwickelten Männchen betrifft, an die Beschreibung Ausserer's. Bei Titanoeca (Amaurobius) Kochii Auss., welche ich nicht für einerlei mit Tit. quadriguttata halten kann, sind die drei hinteren Beinpaare nicht bestachelt; bei den übrigen Arten haben wenigstens die Tibien und Metatarsen dieser Beinpaare Stacheln; bei verschiedenen auch der Femur des zweiten Paares. Die Art der Bestachelung kann sonach kein unterscheidendes Merkmal zwischen Amaurobius und Titanoeca abgeben. Auch die Form der Lippe ist, mit der einzigen Ausnahme, dass sie bei Amaurobius an der Basis eingeschnürt ist, bei beiden Gattungen gleich; diese obenerwähnte Einschnürung der Lippe ist für die Weibchen von Titanoeca das einzige Kennzeichen, welches sie von Amaurobius trennt. Die Klauen der weiblichen Palpen und der Tarsen, die Längenverhältnisse der Beine und die Gestalt des Cephalothorax haben in beiden Gattungen grosse Aehnlichkeit.

Die Männchen beider Genera sind durch schärfere Unterschiede von einander getrennt. Die Mandibeln bei Titanoeca sind vorn flach, bei einzelnen Arten, ähnlich wie bei Dictyna selbst etwas ausgehöhlt und bei allen Species an ihrer Aussenseite oben mit kurzen dicken Stacheln besetzt, die untere Hälfte der Aussenseite ist scharfkielig; die Tibien und Metatarsen des ersten und zuweilen auch zweiten Beinpaars sind unten mit einer Doppelreihe von Stacheln, welche kaum so lang sind, als der Durchmesser des Gliedes beträgt, besetzt.

Was im Uebrigen die Bestachelung der Beine betrifft, möge noch erwähnt werden, dass dieselbe bei Titanoeca äusserst variabel ist; von Tit. quadriguttata besitze ich eine grosse An-

zahl von Exemplaren und nur selten findet man mehrere, bei welchen die Zahl und Anordnung der Stacheln übereinstimmt; bei vielen sind die Beine der einen Seite anders als jene der anderen bestachelt. Bei den Beschreibungen der einzelnen Arten wird die Bestachelung der Beine so angegeben werden, wie sie bei mehreren Exemplaren übereinstimmend beobachtet wurde.

1. *Titanoeca quadriguttata*. Hahn.

Theridium quadriguttatum, Hahn. „Monogr. Araneorum.“ 8te Lieferung. Fig. a und b.

Theridium quadri-guttatum Hahn. „Die Arachniden.“ Bd. I. p. 84. T. XXI. Fig. 63 und 64.

Asagena quadri-guttata, C. Koch. „Uebersicht des Arachnidensystems.“ Hft. 1. p. 13.

Latrodectus quadriguttatus, C. Koch. „Uebersicht des Arachnidensystems.“ Heft 5. p. 23.

Theridium obscurum Walck (Faune Paris. T. 2, p. 209 n. 44, — Tabl. des Aran. p. 76 n. 23, — T. I, p. 85 f. 64. — Hist. nat. des Ins. Apt. T. II. p. 335) ist, wie schon aus der Beschreibung der Eiersäcke und der Eier zu entnehmen ist, eine andere Art; bei derselben haben auch die Weibchen die weissen Flecken auf dem Abdomen, was bei keiner der mir bekannten Arten des Genus *Titanoeca* der Fall ist.

Mas.

Der Cephalothorax röthlichbraun, gelblich behaart, die Mandibeln, Maxillen, Lippe und das Sternum rothbraun, gelblich behaart; das Abdomen schwarz, die Behaarung gelblich; an der Oberseite zunächst der Basis und in der Mitte je zwei weisse Flecken nebeneinander, die vorderen derselben etwas kleiner; die Spinnwarzen schwarzbraun. Die Beine röthlichbraun oder braungelb; die Schenkel dunkelbraun, zuweilen schwarzbraun gefärbt. Die Palpen schwarzbraun.

Femina.

Das Weibchen ist wie das Männchen gefärbt, nur ist der Cephalothorax weniger lebhaft röthlichbraun und die beiden

weissen Fleckenpaare an der Oberseite des Abdomen fehlen in allen Entwicklungsstufen des Thieres.

Mas.

Der Cephalothorax etwas länger als Pat. c. Tibia eines Beines des vierten Paares, um 0^m0075 länger als breit, vom Hinterrande schräg ansteigend und allmählich in die Kopfwölbung übergehend, in den Seiten des Brusttheiles gerundet, vorn verschmälert (um 0^m0075 schmaler als in der Mitte), mit einer länglichen Impression an der hinteren und je zwei abgekürzten Furchenstrichen an der seitlichen Abdachung, glänzend, sehr fein granulirt. Der Kopftheil oben und in den Seiten gewölbt, mit abstehenden, mässig langen, auf gröberen Körnchen sitzenden, steifen Haaren licht bewachsen.

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA etwas gebogen (*procurva*); die MA weiter als in ihrem Durchmesser von einander, von den SA und den hinteren MA gleichweit, ungefähr 1½mal so weit als ihr Durchmesser beträgt, vom Kopfrande aber wenigstens noch einmal so weit als von einander entfernt, rund, etwas kleiner als die SA. Letztere länglich rund, mit den hinteren SA an einem gemeinschaftlichen schrägen Wulste, von diesen fast in ihrem längeren Durchmesser entfernt. Die hintere Reihe breiter, wie die vordere gebogen, die MA von einander und der vorderen gleichweit, von den SA aber merklich weiter entfernt, etwas kleiner als die SA.

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, senkrecht abfallend, vorn nicht gewölbt, nicht divergirend, von der Basis bis zum Ende gleichbreit, am Ende schräg nach innen abgestutzt, das untere Ende etwas nach vorn gebogen. Die ganze Vorderseite mattglänzend, dicht fein granulirt und dabei der Quere nach gerunzelt, mit abstehenden kurzen Härchen spärlich besetzt; die Haare am unteren Ende länger und dichter. Die Aussenseite ist an der oberen Hälfte mit kurzen Stacheln besetzt; an der unteren zieht sich ein scharfer Längskiel bis zur Ein-

lenkung der Klauen herab. Die Klaue ziemlich lang, sehr kräftig, wenig gekrümmt.

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, vorn etwas breiter und gerundet, mit langen Haaren besetzt. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, schmal, gewölbt, in den Seiten leicht gerundet.

Das Sternum herzförmig, flach, mattglänzend, mit langen, nach Innen und Vorn gerichteten steifen Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen um $\frac{1}{3}$ länger als breit, vorn gerade abgestutzt, in den Seiten gerundet, hinten etwas spitz zulaufend, mit schwachem, blauem Metallschiller, mit abstehenden längeren und kürzeren Haaren licht bewachsen.

Das Femoralglied der Palpen sehr wenig nach Aussen gebogen; das Patellarglied nicht länger als dick, oben gewölbt; der Körper des Tibialgliedes dicker als lang, mit mehreren Fortsätzen; der obere Fortsatz besteht aus drei Theilen, der innere derselben ist kurz, breit und endet vorn in eine feine, nach Aussen gewendete und gekrümmte Spitze, an seiner Basis biegt er sich in den mittleren um; dieser ist beträchtlich breiter als der innere und scheint vorn gerade abgestutzt, biegt sich hier jedoch in den äusseren, nach hinten verlaufenden, mehrmals gewundenen, bandförmigen, schmalen Theil um; unter dem inneren Theile biegt sich ein breiter, am Ende abgestutzter Fortsatz nach Oben. Die Decke der Kopulationsorgane gewölbt, eiförmig, dicht lang behaart, an der Basis aussen in einen gebogenen glatten, kahlen Wulst endend.

Die Beine gracil, etwas glänzend, kurz und dünn behaart. Der Femur des ersten Paares an der Vorderseite gegen das Ende mit 2 Stacheln; die Tibien und Metatarsen dieses Paares unten mit einer Doppelreihe kurzer dicker Stacheln, auch an den Tarsen sind unten einige solche kurze Stacheln. Der Femur des zweiten Paares vorn am Ende mit einem Stachel, die Tibien und Metatarsen sind wie am ersten Paare mit Stacheln besetzt, doch sind diese beträchtlich länger; an den Tarsen dieses und der übrigen Paare sind keine Stacheln zu bemerken. Die

Schenkel des dritten Paares sind unbewehrt; die Tibien und Metatarsen sowohl unten als seitlich mit längeren Stacheln besetzt. Der Femur des vierten Paares nicht mit Stacheln bewehrt; die Tibien und Metatarsen wie bei dem dritten Paare bestachelt.

Länge des Cephalothorax: 0^m003, des Abdomen: 0^m0025, eines Beines des ersten Paares: 0^m007, des zweiten; 0^m0055, des dritten: 0^m005, des vierten: 0^m006.

Femina.

Der Cephalothorax im Verhältniss zur Länge etwas schmaler; die Augenstellung wie bei den Weibchen, nur sind die hinteren MA etwas grösser als die vorderen: die Mandibeln sind an der Basis knieförmig hervorgewölbt, dann leicht nach hinten gedrückt, nicht granuliert, überhaupt kürzer, dicker und reichlicher mit langen abstehenden Haaren besetzt; das Abdomen ist breiter als der Cephalothorax, in den Seiten stärker gerundet. Der Femur des ersten Beinpaares hat an seinem Ende vorn ebenfalls zwei Stacheln; an den Tibien unten gegen das Ende zwei längere Stacheln; die Metatarsen sind unten, wie bei den Männchen, mit einer Doppelreihe von Stacheln besetzt, welche jedoch etwas länger sind; an den Tarsen sind keine Stacheln zu bemerken; die Tibien und Metatarsen des zweiten Paares sind wie jene des ersten Paares bestachelt. Auch der Femur des dritten Paares hat an seinem Ende vorn einen Stachel, die Tibia besitzt oben zunächst der Basis einen Stachel, unten sowie der Metatarsus mehrere Stacheln; der Femur des vierten Paares ist unbewehrt. Tibia und Metatarsus sind wie bei den entsprechenden Gliedern des dritten Paares bestachelt.

Länge des Cephalothorax: 0^m0025, des Abdomen: 0^m003, eines Beines des ersten Paares: 0^m0055, des zweiten: 0^m0045, des dritten: 0^m004, des vierten: 0^m005.

Diese Art ist in dem Keuperlande der Umgebung Nürnbergs sehr selten und wird ausschliesslich unter der Cladoniendecke des Sandbodens trockner Föhrenwälder angetroffen; sehr

gemein dagegen ist sie im ganzen Juragebiete, wo sie sich unter Steinen vorfindet. Ausser der hiesigen Gegend besitze ich Exemplare aus Carlsbad in Böhmen, aus der Umgebung von Wien (von Herrn Dr. Schiner gesammelt); im südlichen Tirol scheint sie weit verbreitet zu sein; aus Meran erhielt ich sie von Dr. Milde und von Trient durch Herrn Prof. Canestrini; Herr Dr. Thomas fand sie in Thüringen, Herr Prof. Thorell bei Kissingen und Herr Prof. Canestrini auch bei Modena; nach Herrn Dr. Zimmermanns Mittheilung kommt sie auch bei Limburg an der Lahn und in Schlesien vor.

Entwickelte Männchen und Weibchen findet man von Mitte Mai an; die Weibchen bei den Eiersäcken Ende Mai bis Mitte Juni. Diese sind kugelig, durch gelblich-weisses, wolliges Gewebe gebildet und mit anklebenden Erdtheilchen meist bedeckt; die dünne Umhüllung umschliesst 20—25 orangegelbe, nicht unter einander verklebte Eierchen.

2. *Titanoeca Schineri* nov. sp.

Mas.

Der Cephalothorax und das erste Beinpaar hellröthlichbraun; die übrigen Beine braungelb; Mandibeln und Sternum dunkelrothbraun; das Abdomen schwarz, an der Oberseite in der Mitte zwei weisse Querflecken neben einander. Die Spinnwarzen braungelb, schwarz angelaufen. Maxillen und Lippe röthlichbraun, vorn gelblichweiss. Das Femoral-, Patellar- und Tibialglied der Palpen braungelb; der innere Fortsatz des letzteren weiss, die übrigen Fortsätze desselben schwarzbraun. Die Decke der Kopulationsorgane dunkelrothbraun.

Femina.

Der Cephalothorax hellröthlichbraun oder braungelb; die Mandibeln rothbraun; Maxillen und Lippe gelbbraun, vorn gelblichweiss. Das Sternum gelbbraun. Das Abdomen oliven-

braun; die Spinnwarzen gelbbraun. Die Beine braungelb; bei dem einen Exemplare die Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen der drei Vorderpaare und die Metatarsen und Tarsen des letzten Paares röthlichbraun. Das Femoral- und Patellarglied der Palpen braungelb; die beiden anderen Glieder röthlichbraun.

Mas.

Das Cephalothorax etwas länger, als Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares, um 0^m001 länger als an seiner breitesten Stelle breit, vom Hinterrande bis zum Uebergange in die Kopfwölbung schräg ansteigend, am Brusttheile in den Seiten stark gerundet, oberhalb der Palpen abgesetzt verschmälert und um 0^m001 schmaler als am Thorax, etwas glänzend, am Kopftheile mit schwarzen, auf Körnchen sitzenden Borsten besetzt; in der Mittellinie des Thorax eine lange Furche, an der seitlichen Abdachung desselben zwei deutliche Furchenstriche. Der Kopf vom Brusttheile seitlich abgesetzt, oben und in den Seiten gewölbt.

Die vordere Augenreihe nach hinten gebogen (*procurva*), die MA rund, in ihrem Durchmesser von einander, von den hinteren MA und den SA gleichweit und weiter als von einander, vom Kopfrande 1½mal so weit als von den hinteren MA entfernt; die SA länglich rund, grösser als die MA, mit den hinteren SA an einer gemeinschaftlichen, schrägen Erhöhung schräg gegen diese gestellt und kaum in der Breite ihres kürzeren Durchmessers von ihnen entfernt. Die hintere Reihe breiter, von Oben gesehen, wie die vordere, schwach nach hinten gebogen; die MA rund, so gross als die vorderen MA, von diesen und von einander gleichweit, von den SA aber merklich weiter entfernt; letztere länglich rund, so gross als die vorderen SA.

Die Mandibeln senkrecht vom Kopfrande abfallend, in der Mitte ausgehöhlt, von der Basis bis zum Ende gleichbreit, unten schräg abgestutzt, dicht aneinanderschliessend, an der Basis innen einen undeutlichen, abgerundeten Höcker bildend, dicht

fein granulirt, glanzlos, mit einzelnen grösseren Körnchen, auf welchen ein abstehendes, mässig langes Härchen sitzt. Die Haare am unteren Ende länger und dichter. An der Aussenseite zieht sich bis zur Mitte herab eine Längsreihe kurzer, starker Stachelborsten herab. Die Klaue sehr kräftig, mässig lang, stark gekrümmt. Am vorderen und hinteren Falzrande oben je ein kurzer, dicker Zahn.

Die Maxillen gerade vorgestreckt, vorn nur wenig breiter als an der Basis, gewölbt, ohne Impression in der Mitte, vorn gerundet, reichlich mit langen Borsten besetzt. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, schmal, in der Mitte der Länge nach erhöht, vorn gerundet. Längs der Lippe an den Maxillen innen eine abgerundete Kante.

Das Sternum fast kreisrund, flach, glanzlos, ohne Impressionen am Seitenrande, mit abstehenden, nach Vorn und Innen gerichteten, bräunlichen, langen, gelben Haaren reichlich besetzt.

Das Abdomen dem Umrisse nach elliptisch, fast um $\frac{1}{3}$ länger als breit, schwach seidenartig glänzend, mit abstehenden, gelblichen Haaren licht bewachsen.

Das unterste Paar der Spinnwarzen konisch, von oben und unten zusammengedrückt, das oberste kürzer, cylindrisch.

Das Femoralglied der Palpen nach aussen gebogen, gegen das Ende allmählich verdickt; das Patellarglied sehr kurz, nicht länger als dick; der Tibialtheil an der Oberseite kurz, mit langen Haaren besetzt, unten länger, etwas bauchig aufgetrieben und hier ebenfalls lang behaart; vorn endet dasselbe in eine Spitze, welche sich nach Innen wendet und die Basis eines weisslichen, nicht chitinisirten Wulstes bildet, dieser krümmt sich am Ende nach Aussen; oberhalb desselben ein mondförmiger Fortsatz, dessen inneres Horn dünner und stärker gebogen und der Länge nach gefurcht ist, und am Ende in eine feine Spitze ausläuft; das äussere Horn ist fast gerade und scheint ebenfalls in eine scharfe Spitze zu enden; doch bemerkt man bei sorgfältiger Betrachtung, dass diese Spitze sich nach hinten umbiegt und in ein langes, gewundenes Band ausläuft; zwischen den beiden Hörnern ragt ein

kurzer, aufwärts gebogener, am Ende breiter und stumpfer Fortsatz hervor.

Die Decke der Copulationsorgane eiförmig, gewölbt, reichlich mit langen, abstehenden Haaren besetzt. Die Beine licht und kurz behaart, das erste Paar länger und dicker als die übrigen. Die Schenkel oben leicht gewölbt. Keine Scopula. Nur die Schenkel des ersten Paares zeigen an ihrer Vorderseite einige kurze Stacheln, die übrigen Schenkel und sämtliche Patellen sind unbewehrt; dagegen sind sämtliche Tibien und Metatarsen mit Stacheln versehen; die Tibien des ersten Paares haben an der Unterseite vorne eine Längsreihe kurzer Stacheln, hinten sind sie mit ungeordneten, kurzen, sehr dicken Stacheln reichlich besetzt. Die Metatarsen des ersten Paares sind gekrümmt; die Tarsen dieses Paares ohne Stacheln.

Länge des Cephalothorax: 0^m 0035, des Abdomen: 0^m 004; eines Beines des ersten Paares: 0^m 011, des zweiten: 0^m 008, des dritten: 0^m 0075, des vierten: 0^m 009.

Femina.

Der Cephalothorax hat dieselbe Form, wie jener des Männchens, nur ist der Kopftheil merklich länger; die Augenstellung wie bei dem anderen Geschlechte; die Mandibeln sind etwas nach hinten gedrückt und springen an der Basis etwas höckerartig vor, vorn herab sind dieselben weder gewölbt noch in der Mitte ausgehöhlt, sie sind ebenfalls von der Basis bis zum Ende gleichbreit und weichen nicht auseinander, im unteren Dritttheil sind sie der Quere nach gerunzelt und vorn herab sowie in den Seiten reichlich mit langen, abstehenden Borsten besetzt; Maxillen, Lippe und Sternum wie beim Männchen; das Abdomen im ersten Dritttheile am breitesten und von da nach hinten etwas verschmälert, vorn und hinten gerundet. Die Schenkel des ersten Beinpaares dem Kopfe, jene des vierten dem Abdomen entsprechend gekrümmt. Das erste Beinpaar ebenfalls etwas dicker, als die übrigen, an den Schenkeln desselben vorn 2, an jenen des zweiten Paares vorn 1 Stachel, die übrigen Schenkel und

sämmtliche Patellen unbewehrt; sämmtliche Tibien unten mit einem oder zwei Stacheln besetzt. Die Metatarsen sind reichlich bestachelt.

Länge des Cephalothorax: 0^m 0035, des Abdomen: 0^m 004, eines Beines des ersten Paares: 0^m 009, des zweiten: 0^m 007, des dritten: 0^m 006, des vierten: 0^m 008.

Vorkommen: wahrscheinlich die Umgebung von Wien. Die Exemplare, welche ich besitze, fanden sich unter einer Sammlung von Spinnen, welche ich der gütigen Mittheilung des berühmten Dipterologen, meines Freundes Herrn Dr. R. Schiner, verdanke, vor.

3. *Titanoeca flavicoma* nov. spec.

Mas.

Cephalothorax und Mandibeln dunkelrothbraun; Maxillen, Lippe und Sternum schwarzbraun; das Abdomen schwarzbraun, gelb behaart; das Femoral-Patellar- und Tibialglied der Palpen röthlichbraun; das Femoral- und Patellarglied oben mit einem schwarzen Längsstreifen; die Fortsätze des Tibialgliedes und die Decke der Copulationsorgane schwarzbraun; die Hüften und Schenkel der Beine dunkelrothbraun, die übrigen Glieder röthlichbraun, gelblich behaart. Die Spinnwarzen dunkelrothbraun.

Femina.

Das Cephalothorax, die Mandibeln, Maxillen, die Lippe, das Sternum, die Palpen und Beine dunkelrothbraun; die Tarsen der Beine etwas heller gefärbt; das Abdomen olivenbraun, gelb behaart. Die Spinnwarzen braun.

Mas.

Der Cephalothorax etwas länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares; um 0^m 001 länger als breit, mattglänzend, vom Hinterrande bis zur Kopfwölbung schräg an-

steigend, in den Seiten gerundet, vorn über den Palpen abgesetzt verschmälert; die ganze Oberfläche ist fein geriebelt, auf dem Kopfteile weitschichtige, gröbere Granula, welche ein gelbes, steifes, mässig langes Haar tragen. In der Mittellinie der Thorax ein Längseindruck; an der seitlichen Abdachung desselben zwei abgekürzte Furchenstriche. Der Kopfteil oben und seitlich stark gewölbt, vom Thorax, ohne durch eine Furche abgesetzt zu sein, sich erhebend. Der Clypeus nicht so hoch als die Entfernung der vorderen und hinteren MA beträgt.

Die vordere Augenreihe sehr schwach nach hinten gebogen (*procurva*); die MA rund, von einander weiter als in ihrem Durchmesser, von den SA c. $1\frac{1}{2}$ mal so weit als von einander und ebensoweit von den hinteren MA entfernt; die SA mit der hinteren SA an einer gemeinschaftlichen, schrägen Erhöhung, von dieser in ihrem kürzeren Durchmesser entfernt, länglichrund, so gross als die MA. Die hintere Reihe, wie die vordere, gebogen, breiter; die Augen ebenfalls ziemlich von gleicher Grösse; die MA rund, weiter von einander, als die vorderen MA und von den SA noch weiter, als von einander, entfernt.

Die Mandibeln senkrecht abfallend, mattglänzend, dicht fein granuliert und dabei der Quere nach gerunzelt, mit abstehenden feinen Haaren besetzt, nicht divergierend, am unteren Ende schräg nach Innen abgestutzt, von der Basis bis zum Ende gleichbreit; die vordere Fläche kaum bemerkbar ausgehöhlt. Die Aussen-seite mit kurzen, dicken Stacheln besetzt und von der Mitte an bis zur Einlenkung der Klaue herab mit einem Längskiele.

Die Maxillen von der Basis an an Breite zunehmend, gerade vorgestreckt, wenig gewölbt, runzelig uneben, mit langen, auf groben Körnern sitzenden Borsten reichlich besetzt, vorn gerundet. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, beträchtlich länger als breit, in den Seiten fast gleichbreit, vorn gerundet.

Das Sternum herzförmig, flach, glanzlos, mit gelben, auf groben Körnern sitzenden, steifen, abstehenden Haaren bewachsen.



Das Abdomen der Umrisse nach oval, schmaler als der Cephalothorax, glanzlos, oben mit anliegenden dicken, gelben Haaren bedeckt; an der Unterseite ist die Behaarung länger, feiner und mehr bräunlichgelb; nur in der Falte hinter den Bronchialdeckeln bemerkt man lebhaft gelbe, dickere Haare wie an der Oberseite.

Das Femoralglied der Palpen kurz, stark nach aussen gebogen, gegen das Ende nur wenig verdickt; das Patellarglied nur wenig länger als dick, oben gewölbt und vor seinem vorderen Ende eine höckerartige Erhöhung bildend; das Tibialglied lang behaart; der Körper desselben ist vorn breiter als an der Basis und trägt mehrere Fortsätze; einen aufwärts gekrümmten, am Ende abgestumpften an der Innenseite; oben einen breiten, zweitheiligen; der innere Ast desselben windet sich abwärts und endet in eine Spitze; der äussere ist breit, vorn schräg abgestutzt und krümmt sich an seiner äusseren Ecke nach hinten um, läuft dann als breites, gebogenes Band nach hinten zurück. Die Decke der Copulationsorgane gewölbt, eiförmig, dicht und lang behaart, an der Basis aussen einen glatten, glänzenden, unbehaarten, gekrümmten Wulst bildend.

Die Beine etwas glänzend, kurz behaart; die Schenkel oben gewölbt, ohne Stacheln; jene des ersten Paares dicker; die Tibien des ersten Paares sind unten der ganzen Länge nach mit kurzen, dicken Stacheln besetzt; die Metatarsen dieses Paares sind leicht gebogen und, wie auch die Tarsen, mit kurzen Stacheln der ganzen Länge nach besetzt; auch die Tibien und Metatarsen des zweiten Paares sind an der Unterseite reichlich mit Stacheln besetzt; auch die Tibien und Metatarsen des dritten und vierten Paares sind mit Stacheln besetzt, jedoch etwas spärlicher.

Länge des Cephalothorax: 0^m 003, des Abdomen: 0^m 003, eines Beines des ersten Paares: 0^m 007, des zweiten: 0^m 0055, des dritten: 0^m 005, des vierten: 0^m 006.

Femina (unentwickelt).

Der Cephalothorax glänzend; der Thorax fein netzartig, der Kopftheil mit einzelnen, ein mässig langes, steifes Haar tragenden Körnchen bestreut; im Allgemeinen erscheint der Cephalothorax etwas schmaler und der Kopftheil länger als bei den Männchen. Die MA der vorderen Reihe weiter als in ihrem Durchmesser von einander entfernt; ausserdem ist die Stellung der Augen und ihre gegenseitige Entfernung dieselbe, wie bei dem Männchen. Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervorgewölbt, senkrecht abfallend, glänzend, oben glatt, an der unteren Hälfte der Quere nach gerunzelt, mit abstehenden, auf Körnchen sitzenden Haaren licht besetzt. Die Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt. Maxillen, Lippe und Sternum wie bei den Männchen. Das Abdomen vorn und in den Seiten gerundet, hinten etwas spitz zu laufend, oben gewölbt, wie bei dem Männchen mit gelben, dicken Haaren besetzt. — An den Beinen sind nur die Metatarsen mit Stacheln besetzt. —

Länge des Cephalothorax: $0^m 002$, des Abdomen: $0^m 003$, eines Beines des ersten Paares: $0^m 0045$, des zweiten: $0^m 003$, des dritten: $0^m 00275$, des vierten: $0^m 004$.

Aus dem Sabinergebirge. Von Herrn Dr. Seidlitz entdeckt und gütigst mitgetheilt.

Bei *Titanoeca flavicoma* ist, wie bei *Tit. tristis* das Abdomen der Männchen einfarbig; die Weibchen beider Arten unterscheiden sich darin, dass bei *T. flavicoma* die MA der vorderen Reihe weiter, als in der Breite ihres Durchmessers von einander entfernt stehen, während sie bei *T. tristis* nur in ihrem Durchmesser von einander abstehen. Bei *Tit. flavicoma* mas sind die Tarsen des ersten Beinpaares mit einigen kurzen Stacheln besetzt, bei *T. tristis* sind dieselben unbewehrt; bei ersterer Art ist der Fortsatz des Tibialgliedes der Palpen an der Innenseite kurz und nicht länger als der Stamm des Gliedes selbst, bei dem Männchen von *Tit. tristis* ist dieser Fortsatz sehr lang gewunden und endet in eine sehr feine Spitze. Die Weibchen von *Tit. flavicoma*, deren vordere MA von einander, wie bei *Tit.*

quadriguttata weiter als in ihrem Durchmesser von einander entfernt stehen, unterscheiden sich von dem Weibchen der letztgenannten Art dadurch, dass die vorderen MA vom Kopfrande kaum so weit als von der SA abstehen, während dieselben bei Tit. quadriguttata vom Kopfrande merklich weiter als von den SA entfernt sind.

4. *Titanoeca tristis* nov. spec.

Von dieser, durch Herrn Erber in Griechenland entdeckten Art findet sich die Abbildung des Weibchens (*Latrodectus tristis*) in dem *Catalogo sistematica degli Araneidi Italiani per Canestrini e Pavesi* Taf. III. f. 9.

Mas. et femina.

Der Cephalothorax röthlichbraun; die Mandibeln rothbraun; die Maxillen gelbbraun, schwärzlich angelaufen; die Lippe und das Sternum schwarzbraun; das Abdomen schwarz, mit bräunlichgelben Härchen bedeckt. Die Spinnwarzen schwarz. Die Beine gelbbraun, die Schenkel schwarz angelaufen. Die Palpen des Männchens braungelb. Das Femoral- und Patellarglied oben mit einem schwarzen Längsstreifen; die Fortsätze des Tibialgliedes schwarzbraun; die Decke gelbbraun, graugelb behaart.

Mas.

Der Cephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares, ziemlich hoch, hinten schräg ansteigend, in den Seiten des Brusttheiles mässig steil abgedacht, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, in den Seiten des Thorax gerundet, vorn mässig verschmälert, mattglänzend, fein granulirt; der Brusttheil mit einem länglichen Eindrucke an der hinteren Abdachung und zwei abgekürzten Furchenstrichen in den Seiten. Der Kopf oben und seitlich mit abstehenden Haaren spärlich besetzt.

Die vordere Augenreihe etwas, jedoch ganz unbedeutend nach hinten gebogen (*procurva*); die MA rund, an einem kleinen Vorsprunge, nicht ganz in ihrem Durchmesser von einander, von den SA und den hinteren MA gleichweit, c. $1\frac{1}{2}$ mal so weit als ihr Durchmesser beträgt und vom Kopfrande noch etwas weiter entfernt. Die SA länglichrund, mit dem hinteren SA an einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste, von diesem in der Breite ihres kürzeren Durchmessers entfernt. Die hintere Reihe, von Oben betrachtet, fast gerade, breiter; die MA rund, von einander in ihrem Durchmesser und weiter, als die vorderen, von dem SA fast doppelt soweit, als von einander entfernt.

Die Mandibeln stark nach hinten gedrückt, so lang als die vordersten Patellen, nicht so dick als die Vorderschenkel, von der Basis bis zum Ende gleich dick, mattglänzend, körnig-runzelig, vorn nicht gewölbt, an der Innenseite leicht ausgehöhlt, am untern Ende schräg nach Innen abgestutzt, licht mit abstehenden, massig langen Haaren besetzt. — Die Klaue ziemlich lang, wenig gekrümmt.

Die Maxillen an der Basalhälfte gewölbt, vorn gerundet, mit langen Borsten besetzt, am Innenrande kantig. Die Lippe mehr als halb so lang, als die Maxillen, beträchtlich länger als breit, vorn gerundet. Das Sternum schmal, herzförmig, wenig gewölbt, glänzend, glatt, mit bräunlichgelben, nach Innen gerichteten, steifen Haaren reichlich bewachsen.

Das Abdomen fettartig glänzend, schmaler als der Cephalothorax, oben mit kürzeren, unten mit längeren, angedrückten steifen Haaren licht bedeckt.

Das Femoralglied der Palpen fast gerade, gegen das Ende allmählich verdickt; der Patellartheil oben stark gewölbt, nicht länger als dick. — Das Tibialglied hat einen kurzen Körper, welcher sich an der Innenseite in ein ausgehöhlt, vorn aufwärts gebogenes, weissliches, durchscheinendes, am Ende verschmälertes Band verlängert und von welchem verschiedene Fortsätze abgehen; diese Fortsätze sind sehr glänzend; der obere besteht aus drei Theilen, der innere Theil desselben ist sehr lang und windet

sich bis zu seinem auslaufenden Ende in eine äusserst feine Spitze, welche aufwärts gebogen ist, zweimal an der Innenseite der Decke; der mittlere ist bandförmig und biegt sich, nachdem er sich gewunden, nach hinten in den äusseren um, letzterer kehrt gebogen zur Basis zurück. Unter dem inneren Theile biegt sich ein der Länge nach ausgehöhlter Fortsatz nach Oben und endet in zwei Zähne, einen unteren kurzen und einen oberen längeren, zwischen welchen der innere Theil des oberen Fortsatzes nach vorn verläuft. Die Decke gewölbt, eiförmig, reichlich mit langen Haaren besetzt; an der Basis aussen mit einem glatten, glänzenden, kahlen, gewundenen Wulste.

Die Beine dünn, die Schenkel oben leicht gewölbt; die des ersten Paares dem Kopfe, jene des vierten dem Abdomen entsprechend, stark gekrümmt; die Behaarung licht, mässig lang. An den Schenkeln des ersten Paares vorn gegen die Spitze einige Stacheln; an jenen des zweiten Paares am Ende vorn ein Stachel; die Tibien und Metatarsen des zweiten Paares unten mit einer Doppelreihe von kurzen, dicken Stacheln; die Tarsen unbewehrt; auch die Tibien und Metatarsen der übrigen Beine sind mit Stacheln an der Unterseite besetzt, doch sind die Stacheln länger, spärlicher und ungeordnet.

Länge des Cephalothorax: 0^m00225; des Abdomen: 0^m00225, eines Beines des ersten Paares: 0^m007, des zweiten: 0^m0055, des dritten: 0^m0045, des vierten: 0^m0055. —

Femina.

Der Kopftheil des Cephalothorax etwas breiter, länger und stärker gewölbt; die Augenstellung wie bei dem Männchen; die Mandibeln merklich dicker und innen leicht divergirend; das Abdomen so breit als der Cephalothorax, vorn und hinten rundlich abgestumpft, in den Seiten leicht gerundet, 1½ mal so lang als breit. — Die Schenkel des ersten Paares vorn am Ende mit einigen Stacheln; die übrigen Schenkel und die Tibien der beiden Vorderpaare ohne Stacheln. — Die Tibien des dritten

und vierten Paares unten am Ende mit einem Stachel, die Metatarsen sämtlicher Beine sind mit Stacheln besetzt. —

Länge des Cephalothorax: 0^m002 , des Abdomen: 0^m003 , eines Beines des ersten Paares: 0^m006 , des zweiten: 0^m005 , des dritten: 0^m004 , des vierten: 0^m0055 .

Vorkommen: Schweiz (Canton Tessin) von Herrn Prof. Pavesi; Italien (Modena und Lombardei) von Herrn Prof. Canestrini und Griechenland von Herrn Erber gesammelt.

Bei dem Weibchen von *Tit. tristis* sind die vorderen MA, wie bei *Tit. Schineri* nur in ihrem Durchmesser von einander entfernt; diese Geschlechter der beiden Arten sind jedoch leicht durch ihre Körpergrösse von einander zu unterscheiden (*Tit. Schineri*: Ceph. 0^m0035 , Abdomen: 0^m004 lang, — *Tit. tristis*: Ceph: 0^m002 , Abdomen: 0^m003 lang).

6. *Titanoeca Kochii* Auss.



Amaurobius Kochii Ausserer „Die Arachniden Tirols“ in den Verhandlg. der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1867 p. 162. Taf 7. f. 5.

Diese Art, welche ich selbst nicht gesehen habe, unterscheidet sich von *Tit. quadriguttata* sowohl durch die gegenseitige Entfernung der Augen der vorderen Reihe, als auch darin, dass die sechs Hinterbeine ohne Stacheln sind.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Vorwort	III
Vereinsthätigkeit	V
Bericht des Bibliothekar's	XVIII
Bericht des Conservator's	XXV
Mitglieder-Verzeichniss	XXVI
Kittel und Kriechbaumer, Syst. Uebersicht der Fliegen.	1
Neger, Ueber Cometen und Sternschnuppen	91
„ Ueber das Verhältniss der humanistischen Gymnasien zu den Naturwissenschaften	103
Seelhorst, Ueber Phosphore	117
Koch, Apterologisches aus dem fränkischen Jura	125
„ Ueber die Spinnengattung Titanoeca	153

~~~~~  
**Nürnberg. — Druck von Bieling (G. Dietz).**  
~~~~~



D. Fock del



20




21




22



23



24



25




26




27



28



29



30



31



32

de Saubert, 18



3 2044 106 304 181

